

Esercizio 1. Consideriamo \mathbb{Z}_8 . Applicando il teorema fondamentale di omomorfismo caratterizzare tutti i gruppi quoziente di \mathbb{Z}_8 .
Suggerimento: ricordare la struttura dei sottogruppi di \mathbb{Z}_8 e definire opportune applicazioni $\mathbb{Z}_8 \rightarrow \mathbb{Z}_8$.

Sappiamo che $(\mathbb{Z}_8, +)$ è ciclico e generato da 1. Per il teorema di struttura dei gruppi ciclici, si ha che \mathbb{Z}_8 ha tanti sottogruppi quanti sono i divisori di 8, ossia $\{2, 4\}$. Quindi abbiamo i sottogruppi:

$$\langle 1^{\frac{8}{2}} \rangle = \langle 1^4 \rangle = \langle 4 \rangle = \{[4], [8]\}$$

$$\langle 1^{\frac{8}{4}} \rangle = \langle 1^2 \rangle = \langle 2 \rangle = \{[2], [4], [6], [8]\}$$

Siano anche i sottogruppi banali \Rightarrow

$$\langle 1^1 \rangle = \mathbb{Z}_8$$

$$\langle 1^8 \rangle = \langle 8 \rangle = \{[8]\}$$

Tali sottogruppi, sono tutti normali.

Esercizio 2. Dimostrare che il gruppo degli automorfismi del gruppo di Klein V_4 è isomorfo a S_3 .

Suggerimento: osserviamo preliminarmente che un automorfismo trasforma sempre l'identità nell'identità e quindi manda l'insieme costituito dai restanti 3 elementi di V_4 in sé stesso. Esiste allora una mappa naturale $S_3 \rightarrow \text{Aut}(V_4)$ che è un isomorfismo di gruppi.

Il gruppo di Klein è $V_4 = \{Id, R_x, S_x, S_y\}$, tale gruppo non è ciclico, ed un suo automorfismo trasforma $Id \rightarrow Id$. Possiamo quindi tenere fissa l'identità, e considerare le "permutazioni" degli altri elementi. Ne segue in maniera naturale che $|\text{Aut}(V_4)| = 3! = 6 = |S_3|$. **Notazione:** denoto $\alpha \in \text{Aut}(V_4)$ così: $\begin{pmatrix} R & x & y \\ x & R & y \end{pmatrix}$ e

significa: $\alpha(Rx) = x \wedge \alpha(x) = Rx \wedge \alpha(y) = y$. Adesso definisco la seguente mappa Φ :

$$\Phi \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & x & y \\ R & x & y \end{pmatrix} \quad \Phi \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & x & y \\ R & y & x \end{pmatrix} \quad \Phi \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & x & y \\ y & x & R \end{pmatrix} \quad \Phi \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & x & y \\ x & R & y \end{pmatrix}$$

$\Phi \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & x & y \\ y & R & x \end{pmatrix} \quad \Phi \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & x & y \\ x & y & R \end{pmatrix}$ tale mappa è biettiva. E conserva ovviamente l'op., in quanto è la stessa. **NON SO COME PROSEGUIRE**

Esercizio 3. Per le seguenti permutazioni di S_8 determinare: inversa, decomposizione in cicli disgiunti, ordine, parità.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 5 & 6 & 3 & 2 & 7 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 3 & 6 & 2 & 8 & 7 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 5 & 6 & 3 & 2 & 7 & 1 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 7 & 5 & 4 & 8 & 2 & 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 3 & 6 & 2 & 8 & 7 & 1 & 5 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 7 & 4 & 2 & 1 & 8 & 3 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 5 & 6 & 3 & 2 & 7 & 1 & 4 \end{pmatrix} = (1 \ 8 \ 4 \ 3 \ 6 \ 7)(2 \ 5)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 3 & 6 & 2 & 8 & 7 & 1 & 5 \end{pmatrix} = (1 \ 4 \ 2 \ 3 \ 6 \ 7)(5 \ 8)$$

le due permutazioni hanno la stessa struttura ciclica.

l'ordine è $\text{lcm}(6, 2) = 2$.

$(1 \ 8 \ 4 \ 3 \ 6 \ 7)(2 \ 5) = (1 \ 7)(1 \ 6)(1 \ 3)(1 \ 4)(1 \ 2)(2 \ 5) \Rightarrow$ le permut. sono pari!

Esercizio 4. Sia $\sigma = (13564) \in S_9$. Sia $\tau = (45)(842)(793) \in S_9$.

Determinare σ^{-1} e τ^{-1} .

Determinare $\tau\sigma\tau^{-1}$.

Determinare (se esiste) $\tau \in S_9$ tale che $\beta = \tau\alpha\tau^{-1}$ con:

- $\alpha = (4657)(98123)$ $\beta = (5746)(123)(89)$:
- $\alpha = (1357)$ $\beta = (2468)$

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 4 & 2 & 1 & 6 & 3 & 5 & 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 2 & 3 & 5 & 4 & 6 & 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 8 & 3 & 2 & 5 & 6 & 7 & 4 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 2 & 7 & 4 & 5 & 6 & 8 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 8 & 3 & 2 & 4 & 6 & 7 & 5 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 2 & 7 & 4 & 5 & 6 & 8 & 3 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 8 & 7 & 2 & 4 & 6 & 9 & 5 & 3 \end{pmatrix} \quad \tau^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 4 & 9 & 5 & 8 & 6 & 3 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\tau\sigma\tau^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 8 & 7 & 2 & 4 & 6 & 9 & 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 2 & 5 & 1 & 6 & 4 & 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 4 & 9 & 5 & 8 & 6 & 3 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 7 & 8 & 4 & 1 & 6 & 2 & 9 & 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 4 & 9 & 5 & 8 & 6 & 3 & 2 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 7 & 1 & 3 & 6 & 5 & 2 & 4 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

• Nel punto 1 non esiste τ in quanto le due permutazioni hanno parità diverse.

$$\bullet \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 6 & 5 & 8 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$