


Instrucciones

Esta PEC ha de realizarse **de forma manuscrita** y escaneando posteriormente las páginas de forma ordenada en formato PDF.

Hay que entregar las soluciones a través de la plataforma docente en un único fichero PDF con el siguiente nombre **Apellido1Apellido2-PEC1**. **La PEC entregada deberá ir firmada con una declaración explícita en la que se asume la autoría individual del trabajo**. Hay un modelo de declaración al final de este documento. No se corregirá ninguna PEC que no cumpla estos requisitos.

Cuestiones

- Q1.** (0,5 puntos) Tenemos un conductor en forma de elipsoide de revolución, más alargado en los polos y más aplanado en el ecuador (véase en la figura adjunta el perfil de la elipse generatriz).



La superficie de este elipsoide se puede describir por la siguiente ecuación:

$$r_s(\theta, \varphi) = \frac{b}{\sqrt{1 - \epsilon^2 \cos^2 \theta}},$$

donde b, ϵ son respectivamente el semieje menor y la excentricidad de la elipse generatriz.

Para excentricidades pequeñas, el potencial alrededor del elipsoide conductor tiene la siguiente expresión hasta orden ϵ^2 :

$$V(r, \theta) = \frac{A}{r} \left[1 + \frac{\epsilon^2}{6} \left(1 + \left(\frac{b}{r} \right)^2 (3 \cos^2 \theta - 1) \right) \right].$$

Demuestre que la superficie del elipsoide es equipotencial hasta orden ϵ^2 y calcule el valor del potencial. Cuando sea oportuno puede usar el desarrollo de Taylor: $(1+x)^n \simeq 1+nx$.

- Q2.** (0,5 puntos) El cuadrupolo lineal es aquel que, expresado en una base tal que tiene forma diagonal, tiene una componente, generalmente $Q_{zz} = Q$, mayor que las demás en valor absoluto y, además, las otras componentes diagonales son iguales. Expresé de forma explícita el potencial producido por un cuadrupolo lineal en un punto genérico de coordenadas (r, θ, φ) .

- Q3.** (0,5 puntos) La acetona es un líquido polar cuya constante dieléctrica vale $\epsilon = 21 \epsilon_0$ y cuya molécula tiene un momento dipolar $p_o = 9,7 \times 10^{-30}$ Cm. Calcule la polarización de una muestra de acetona en cuyo seno se establece un campo eléctrico de 10^6 V/m.


Calcule qué fracción de dipolos moleculares deben estar alineados para producir esa misma polarización (suponiendo que el resto de dipolos están distribuidos al azar y no

producen polarización neta). La densidad de la acetona es $\rho_m = 784 \text{ kg/m}^3$ y su peso molecular $P_M = 58,08 \text{ g/mol}$.

- Q4.** (1 punto) Tenemos dos esferas concéntricas de radios R_1 y R_2 ($R_1 < R_2$). Calcule de forma razonada los coeficientes de potencial, p_{ij} y los de capacidad e influencia de este sistema, C_{ij} . Demuestre explícitamente que $p_{12} = p_{21}$, o bien, alternativamente $C_{12} = C_{22}$.

Ejercicios

- E1.** (2,5 puntos) En un cilindro dieléctrico de radio a y altura $6a$ hay tres huecos esféricos de radio a dispuestos como muestra la figura. Sobre la zona del cilindro exterior a los huecos esféricos se distribuye una carga cuya densidad es ρ .



Calcule el campo y potencial electrostáticos debido a la distribución de carga en el punto O.

- E2.** (2,5 puntos) Entre dos cilindros coaxiales, conductores e idealmente infinitos, de radios a, b ($a < b$), hay un material dieléctrico anisótropo. Si el cilindro tiene el eje coincidente con el eje z , las constantes dieléctricas principales del medio son $\varepsilon_y = \varepsilon_z = 2\varepsilon_0$ y $\varepsilon_x = 5\varepsilon_0$. Aplicamos una d.d.p. V_0 entre los dos conductores.
- (a) Calcule los campos \mathbf{E} y \mathbf{D} en el interior del medio dieléctrico.
 - (b) Calcule la distribución de carga en las superficies de ambos cilindros.
 - (c) Calcule la carga por unidad de longitud en ambos conductores y la capacidad por unidad de longitud del condensador formado por ambos.
- E3.** (2,5 puntos) Una gota de agua, que consideramos como un conductor, se somete a un potencial V_0 . La gota tiene un radio R .
- (a) Calcule la carga que adquiere la gota de agua.

Desconectamos la batería que proporciona el potencial V_0 y entonces la gota se rompe en otras dos gotas —digamos A y B— de tamaños $R_A, R_B = 2R_A$, de forma que quedan tocándose tangentes una a la otra.

- (b) Calcule las cargas y potenciales de las nuevas gotas de agua, en función los parámetros del enunciado, V_0 y R .

Las gotas se separan de forma que los puntos más cercanos entre ambas quedan separados por una milésima del radio de la gota original ($s = 10^{-3}R$). La gota más pequeña se conecta a tierra.

- (c) Calcule las cargas y potenciales de ambas gotas en esta situación.

Nota: Los coeficientes de capacidad e influencia de dos gotas de tamaños R_A, R_B , con $R_B = 2R_A$, cuando los puntos más próximos de su superficie se encuentran separados por una distancia $s \ll R_A$, se pueden aproximar por las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned}C_{AA}(s) &= 4\pi\epsilon_0 R_A \left(\frac{1}{3} \ln \frac{R_A}{s} + 0,975 \right), \\C_{BB}(s) &= 4\pi\epsilon_0 R_A \left(\frac{1}{3} \ln \frac{R_A}{s} + 2,184 \right), \\C_{AB}(s) &= -4\pi\epsilon_0 R_A \left(\frac{1}{3} \ln \frac{R_A}{s} + 0,481 \right).\end{aligned}$$

La forma de proceder en el segundo apartado es hacer los cálculos suponiendo $s > 0$ y solo al final tomar el límite $s \rightarrow 0$.

Declaración de Autoría

El alumno
con DNI número, declara que es el autor
único e individual de este trabajo, y que no ha usado sis-
temas de inteligencia artificial generativa para la redacción
u obtención de resultados.

Fdo: