



武汉大学 数学与统计学院  
School of Mathematics and Statistics, Wuhan University

2022年秋季教学课件

# 复变函数与积分变换

汪 玉 峰

武汉大学数学与统计学院

# 第四章 复级数

第一节 复数项级数

第二节 幂级数

第三节 Taylor级数

第四节 Laurent级数

# 第一节 复数项级数

## 一、复数项级数

## 二、例题

# 一、复数项级数

## 1. 复数序列的极限

**定义1.1** 自变量取正整数的复值函数  $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{C}$  称为**复数序列**, 记作  $z_n = f(n)$  或  $\{z_n\}$ .  $z_n = a_n + ib_n, a_n, b_n \in \mathbb{R}$  称为**通项** (一般项). 习惯上, 复数序列也写成

$$z_1 = a_1 + ib_1, z_2 = a_2 + ib_2, z_3 = a_3 + ib_3, \dots, z_n = a_n + ib_n, \dots$$

复变函数的极限定义搬过来, 我们有

**定义1.2** 设  $\{z_n\}$  是一个复数序列,  $z_0$  是一个复常数. 如果

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N \in \mathbb{Z}^+) (n > N \Rightarrow |z_n - z_0| < \varepsilon)$$

则称  $n$  趋于无穷大时数列  $\{z_n\}$  以  $z_0$  为极限, 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0 \text{ 或 } z_n \rightarrow z_0 (n \rightarrow \infty).$$

此时也称复数序列**收敛**, 否则称复数序列**发散**.

同复变函数的极限一样，我们有下列**等价定理**.

**定理 1.1** 设  $z_n = a_n + ib_n$ , 则复数列  $\{z_n\}$  收敛于  $z_0 = a_0 + ib_0$  **当且仅当** 实数列  $\{a_n\}$  与  $\{b_n\}$  分别收敛于  $a_0$  和  $b_0$ .

**注解** 由**等价定理**知，实数列一些性质和运算法则可以搬到复数列上.  
如**Cauchy收敛原理**:

复数列  $\{z_n\}$  收敛**当且仅当** 对任意正数  $\varepsilon$ , 存在  $N > 0$ , 当  $m, n > N$  时,

$$|z_n - z_m| < \varepsilon.$$

## 2. 复数项级数的和

**定义 1.3** 形如

$$z_1 + z_2 + z_3 + \cdots z_n + \cdots$$

称为**复数项级数**, 简称复级数. 记作  $\sum_{n=1}^{+\infty} z_n$  或  $\sum z_n$ .

定义1.4 如果部分和序列

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^n z_k = z_1 + z_2 + \cdots + z_n$$

收敛,则称复级数  $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$  收敛. 并且, 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \sigma$  称为复级数的和,

也称  $\sum_{n=1}^{+\infty} z_n$  收敛于  $\sigma$ . 记作

$$\sigma = \sum_{n=1}^{\infty} z_n.$$

若部分和数列  $\{\sigma_n\}$  不收敛,则称复级数  $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$  发散.

定理1.2 复级数  $\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + ib_n)$  收敛的充要条件是  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  都收敛.

$$\begin{aligned} \text{证明: } \sigma_n &= z_1 + z_2 + \cdots + z_n = (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + i(b_1 + b_2 + \cdots + b_n) \\ &= \omega_n + i\tau_n, \end{aligned}$$

由此证实了定理.

## 注解

由定理1.2及其证明知,

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + ib_n) = a + bi \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a, \sum_{n=1}^{\infty} b_n = b.$$

定理1.3 (收敛必要条件) 如果级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} z_n$  收敛, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$ .

证明: 如果级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} z_n$  收敛, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sigma_n - \sigma_{n-1}) = 0.$$

定理1.4 (Cauchy收敛原理) 复级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} z_n$  收敛当且仅当对任意正数  $\varepsilon$ , 存在  $N > 0$ ,

当  $n > N$ ,  $p$  为正整数时,

$$|z_{n+1} + z_{n+2} + \cdots + z_{n+p}| < \varepsilon.$$

证明: 利用等价定理(定理1.2)及实数列的Cauchy收敛原理, 并利用三角不等式

$$\begin{aligned} \left| a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p} \right|, \left| b_{n+1} + b_{n+2} + \cdots + b_{n+p} \right| &\leq \left| z_{n+1} + z_{n+2} + \cdots + z_{n+p} \right| \\ &\leq \left| a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p} \right| + \left| b_{n+1} + b_{n+2} + \cdots + b_{n+p} \right|. \end{aligned}$$

### 3. 绝对收敛与条件收敛

**定义1.5** 如果级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} |z_n|$  收敛, 则称复级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} z_n$  **绝对收敛**. 非绝对收敛的收敛级数称为**条件收敛**.

**定理1.5** 如果复级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} z_n$  绝对收敛, 则级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} z_n$  收敛.

证明: 由于  $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$  收敛, 那么  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}^+,$  使当  $n > N$  时, 对  $\forall p \in \mathbb{Z}^+,$  有

$$|z_{n+1}| + |z_{n+2}| + \cdots + |z_{n+p}| < \varepsilon. \text{ 从而}$$

$$\left| z_{n+1} + z_{n+2} + \cdots + z_{n+p} \right| \leq |z_{n+1}| + |z_{n+2}| + \cdots + |z_{n+p}| < \varepsilon,$$

这蕴含结论成立(引用Cauchy收敛原理(**定理1.4**)).



定理1.6 设  $z_n = a_n + ib_n$ , 则级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} z_n$  绝对收敛当且仅当实级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$  和  $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$  都绝对收敛.

证明: 由于

$$|a_k|, |b_k| \leq \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \leq |a_k| + |b_k| \Rightarrow \sum_{k=1}^n |a_k|, \sum_{k=1}^n |b_k| \leq \sum_{k=1}^n \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \leq \sum_{k=1}^n |a_k| + \sum_{k=1}^n |b_k|,$$

那么结论立即得到.

定理1.7(Cauchy) 设复级数  $\sum_{n=1}^{+\infty} z'_n$  和  $\sum_{n=1}^{+\infty} z''_n$  绝对收敛, 且和分别为  $\sigma'$  及  $\sigma''$ , 则级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (z'_1 z''_n + z'_2 z''_{n-1} + \cdots + z'_n z''_1)$$

绝对收敛于  $\sigma' \sigma''$ .

## 二、例题

例1 数列  $\alpha_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{i\frac{\pi}{n}}$  是否收敛?

解: 因为

$$\alpha_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{i\frac{\pi}{n}} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left( \cos \frac{\pi}{n} + i \sin \frac{\pi}{n} \right)$$

$$\longrightarrow a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cos \frac{\pi}{n}, \quad b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \sin \frac{\pi}{n}$$

$$\longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

所以数列  $\alpha_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) e^{i\frac{\pi}{n}}$  收敛, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 1$ .

例2 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(8i)^n}{n!}$  是否绝对收敛?

解: 因为

$$\left| \frac{(8i)^n}{n!} \right| = \frac{8^n}{n!},$$

所以由正项级数的比值判别法知:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8^n}{n!}$  收敛, 故原级数绝对收敛.

**例3** 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{2^n} i \right]$  是否绝对收敛?

解: 因为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$  收敛;  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$  也收敛, 故原级数收敛.

但  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$  为条件收敛, 所以原级数非绝对收敛.

## 第二节 幂级数

一、复变函数项级数和复变函数序列

二、幂级数

# 一、复变函数项级数和复变函数序列

**定义2.1** 设  $f_n(z)$  ( $n=1,2,\cdots$ ) 定义在复平面点集 $E$ 上,则

$$f_1(z) + f_2(z) + \cdots + f_n(z) + \cdots$$

称作 $E$ 上的**复变函数项级数**, 记作 $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(z)$ 或 $\sum f_n(z)$ .

如果对于任意 $z \in E$ , 数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(z)$ 收敛于某个复数 $f(z)$ , 则称函数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(z)$ 在 $E$ 上收敛于复函数 $f(z)$ ,  $f(z)$ 称作复变函数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(z)$ 的**和函数**.  
记作 $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(z) = f(z)$ .

而 $f_1(z), f_2(z), \cdots, f_n(z), \cdots$  称作**复变函数序列**, 记作 $\{f_n(z)\}_{n=1}^{+\infty}$ 或 $\{f_n(z)\}$ . 若

$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(z) = \varphi(z), \forall z \in E$ ,  $\varphi(z)$ 称作复变函数序列的**极限函数**.

## 二、幂级数

### 1. 幂级数的概念及Abel定理

形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n = c_0 + c_1 (z-a) + c_2 (z-a)^2 + \cdots, \quad c_n \in \mathbb{C} \quad (2.1)$$

称为幂级数.

**定理一 (Abel)** 如果幂级数(2.1)在某点 $z_1 (\neq a)$ 收敛, 则必在圆 $U : |z-a| < |z_1-a|$ 内**绝对收敛**. 如果幂级数(2.1)在某点 $z_0 (\neq a)$ 发散, 则必在圆 $U : |z-a| > |z_0-a|$ 内**发散**.

**证明:** 证明的基本思想与《高等数学》中实幂级数完全一致.

设 $z$ 是圆 $U$ 内任一点. 因为级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z_1-a)^n$ 收敛, 所以它的各项必有界, 即

$$|c_n (z_1-a)^n| \leq M \quad (n=0, 1, 2, \cdots).$$


于是有

$$\left| c_n (z - a)^n \right| = \left| c_n (z_1 - a)^n \right| \cdot \left| \frac{z - a}{z_1 - a} \right|^n \leq M \left| \frac{z - a}{z_1 - a} \right|^n$$

由于  $|z - a| < |z_1 - a|$ , 故级数  $\sum_{n=0}^{\infty} M \left| \frac{z - a}{z_1 - a} \right|^n$  为收敛的等比级数. 因而, 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n$  在圆  $U$  内绝对收敛. 定理另一部分用反证法可证.

## 2. 收敛半径

同实幂级数类似, 存在有限正数  $R$ , 使  $\sum c_n (z - a)^n$  在圆周  $|z - a| = R$  内绝对收敛, 在圆周  $|z - a| = R$  外发散,  $R$  称为此幂级数的收敛半径,  $|z - a| < R$  为收敛圆盘,  $|z - a| = R$  为收敛圆.



## 注解

一个幂级数在收敛圆周上有三种情况：

- 1) 处处收敛；
- 2) 处处发散；
- 3) 既有收敛点, 也有发散点.

**方法1 (比值法)** 如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lambda$ , 则

(1)  $\lambda = 0$ ,  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$  在复平面内处处收敛, 即  $R = \infty$ .

(2)  $\lambda = \infty$ , 则对  $z \neq 0$ ,  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$  均发散, 即  $R = 0$ .

(3)  $0 < \lambda < \infty$ , 那么收敛半径  $R = \frac{1}{\lambda}$ .

**证明:** 只证明(3).



由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1} z^{n+1}|}{|c_n z^n|} = |z| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lambda |z|,$$

那么, 根据达朗贝尔判别法,

$$|z| < \frac{1}{\lambda} \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} |c_n z^n| \text{ 收敛} \xrightarrow{\text{Abel 定理}} \sum_{n=1}^{\infty} |c_n z^n| \text{ 在 } |z| < \frac{1}{\lambda} \text{ 内收敛.} \quad (2.2)$$

另一方面, 用反证法证明断言:

$$|z| > \frac{1}{\lambda} \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n \text{ 发散.} \quad (2.3)$$

假设 (2.3) 不真. 那么存在  $|z_0| > 1/\lambda$  使得  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z_0^n$  收敛. 取  $z_1$  满足  $|z_0| > |z_1| > 1/\lambda$ .

根据 Abel 定理,  $\sum_{n=1}^{\infty} |c_n z_1^n|$  收敛. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1} z_1^{n+1}|}{|c_n z_1^n|} = |z_1| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lambda |z_1| > 1,$$

这与达朗贝尔判别法矛盾！因此，(2.3) 成立.

总之，联合(2.2) (2.3) 知结论(3) 成立.

**方法2 (根值法)** 如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \lambda$ ，则

(1)  $\lambda = 0$ ， $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$  在复平面内处处收敛，即  $R = \infty$ .

(2)  $\lambda = \infty$ ，则对  $z \neq 0$ ， $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$  均发散，即  $R = 0$ .

(3)  $0 < \lambda < \infty$ ，那么收敛半径  $R = \frac{1}{\lambda}$ .

**例** 试求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^p}$  ( $p$  为正整数) 的收敛半径.

解：因为  $c_n = \frac{1}{n^p}$ ,

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{n+1} \right)^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^p} = 1.$$

所以  $R = \frac{1}{\lambda} = 1$ .

### 3. 幂级数的运算性质

(1) 设  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, R = r_1, \quad g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n, R = r_2.$

$$f(z) \pm g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) z^n,$$

$$f(z)g(z) = \left( \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \right) \left( \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n b_0 + a_{n-1} b_1 + \cdots + a_0 b_n) z^n,$$

其中  $|z| < R, \quad R = \min(r_1, r_2)$

**定理四** 设幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$  的收敛半径为  $R$ , 则

(1) 它的和函数  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n$  在收敛圆  $|z - a| < R$  内解析.

(2) 当  $|z - a| < R$  时,  $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (z - a)^{n-1}$ .

(3) 设  $C$  为  $|z - a| < R$  内的一条(可求长)光滑曲线, 则

$$\int_c f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \int_c (z - a)^n dz \quad \text{或} \quad \int_a^z f(\zeta) d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} (z - a)^{n+1}.$$

**例** 把函数  $\frac{1}{z - b}$  表成形如  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n$  的幂级数, 其中  $a$  与  $b$  是不相等的复常数.

解: 把函数  $\frac{1}{z - b}$  写成如下的形式:

$$\frac{1}{z-b} = \frac{1}{(z-a)-(b-a)} = -\frac{1}{b-a} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-a}{b-a}}$$

代数变形, 使其分母中出现  $(z-a)$

凑出  $\frac{1}{1-g(z)}$

当  $\left| \frac{z-a}{b-a} \right| < 1$  时,  $\frac{1}{1-\frac{z-a}{b-a}} = 1 + \left(\frac{z-a}{b-a}\right) + \left(\frac{z-a}{b-a}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{z-a}{b-a}\right)^n + \cdots,$

故  $\frac{1}{z-b} = -\frac{1}{b-a} - \frac{1}{(b-a)^2}(z-a) - \frac{1}{(b-a)^3}(z-a)^2 - \cdots - \frac{1}{(b-a)^{n+1}}(z-a)^n - \cdots$

设  $|b-a| = R$ , 那末当  $|z-a| < R$  时, 级数收敛, 且其和为  $\frac{1}{z-b}$ .

## 第三节 Taylor级数

一、解析函数的泰勒展式

二、Taylor展开应用举例

# 一、解析函数的泰勒展式

Taylor定理

**定理** 设 $f(z) \in A(D)$ ,  $a \in D$ ,  $D$ 为区域. 若圆盘 $U : |z - a| < R$ 含于 $D$ , 则

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n,$$

这里

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta = \frac{1}{n!} f^{(n)}(a), \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

其中 $C_\rho : |\zeta - a| = \rho, 0 < \rho < R$ .

**证明:** 设 $z \in U$ .  $\exists C_\rho : |\zeta - a| = \rho, 0 < \rho < R$ , 使 $z$ 在 $C_\rho$ 内. 由柯西积分公式,


$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

由于

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - a) - (z - a)} = \frac{1}{\zeta - a} \frac{1}{1 - (z - a)/(\zeta - a)},$$

和

$$\left| \frac{z-a}{\zeta-a} \right| = \frac{|z-a|}{\rho} < 1, \quad \zeta \in C_\rho,$$



那么

$$\frac{1}{1-(z-a)/(\zeta-a)} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left( \frac{z-a}{\zeta-a} \right)^n$$


右端级数在  $C_\rho$  上关于  $\zeta$  一致收敛. 以  $C_\rho$  上有界函数  $\frac{f(\zeta)}{\zeta-a}$  乘上式两边得,

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta-a} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} (z-a)^n,$$

右端级数在  $C_\rho$  上关于  $\zeta$  一致收敛. 上式两边沿  $C_\rho$  积分,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta (z-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(\zeta)}{n!} (z-a)^n.$$




 **定理**表明: 若 $f(z) \in A(U(a, R))$ ,  $R \in (0, +\infty)$ , 则


$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n, z \in U(a, R), \quad (3.1)$$

这个表达式称为 $f$ 在 $z=a$ 点的**Taylor展式**. 这个表达式的右端幂级数称为 $f$ 在 $z=a$ 点的**Taylor级数**. 而

$$\frac{f^{(n)}(a)}{n!} \triangleq c_n$$

称作**Taylor系数**. 根据定理, Taylor系数还可以用积分表示.

 在《高等数学》中, 某邻域无穷可导的实变函数**不一定**在该邻域可以展开成幂级数. 但是, 解析函数在解析点可以展开成幂级数的.

 **Taylor级数的收敛半径**大于或等于 $R$ . 从定理证明过程看, 解析函数的幂级数展开可以归结为**柯西核** $\frac{1}{\zeta-z}$ 的展开!

**结论1** 幂级数是它的和函数在收敛圆盘内的Taylor展式. 换言之,

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n = f(z), z \in U(a, R) \Rightarrow c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}, n = 0, 1, 2, \dots.$$

求和

解析函数幂级数展式唯一性

**证明:** 利用逐项积定理.

**结论2** 若 $f$ 在某圆盘解析, 则它在此圆盘内的幂级数展式是唯一的.

换言之,

展开

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n, z \in U(a, R) \Rightarrow c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}, n = 0, 1, 2, \dots.$$

**证明:** 利用逐项积定理.

## 二、Taylor展开应用举例

**例1** 求  $e^z$ ,  $\cos z$  及  $\sin z$  在  $z=0$  的泰勒展开式.

**解:** 如《高等数学》一样, 利用Taylor定理直接计算得

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad R = +\infty;$$

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots, \quad R = +\infty;$$

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} + \cdots, \quad R = +\infty.$$

**注解**

用**直接法**将函数展开成Taylor级数: 计算

$$c_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0), \quad n = 0, 1, 2, \cdots$$

再用Taylor定理确定 $R$ .

**例2** 设  $f(z) = \ln(1+z)$  是  $\text{Ln}(1+z)$  的单值解析分支, 满足条件  $f(0) = 0$ , 求其在  $z=0$  的泰勒展开式.

**解:**  $-1$  是它的一个奇点, 所以

$$[\ln(1+z)]' = \frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - \cdots + (-1)^n z^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-z)^n \quad (|z| < 1)$$

设  $C$  为收敛圆  $|z| < 1$  内从  $0$  到  $z$  的线段, 将展开式两端沿  $C$  逐项积分, 得

$$\int_0^z \frac{1}{1+z} dz = \int_0^z \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n dz,$$

即

$$\ln(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \cdots + (-1)^n \frac{z^{n+1}}{n+1} + \cdots, \quad |z| < 1.$$

**例3** 求函数  $f(z) = (1+z)^\alpha$ ,  $f(0) = 1$ , 在  $z = 0$  处的幂级数展开式, 并求收敛半径.

**解:** 同《高等数学》, 计算在  $z=0$  处的  $n$  阶导数

$$f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1).$$

利用Taylor定理得

$$f(z) = (1+z)^\alpha = 1 + \alpha z + \binom{\alpha}{2} z^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n} z^n + \cdots, \quad |z| < 1,$$

二项展开式的推广

这里

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

## 小结

借助于一些已知基本初等解析函数的Taylor展开式(上面例1-例3), 结合解析函数的性质, 幂级数运算性质(四则运算, 逐项求导, 逐项积分等)和其它数学技巧(如代换等), 求解其它初等解析函数的Taylor展式. 这种方法通常称为间接法.

例如, 求  $\sin z$  在  $z = 0$  的Taylor展开式.

$$\sin z = \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}) = \frac{1}{2i} \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iz)^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iz)^n}{n!} \right] = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

间接法的优点:

不要求各阶导数与收敛半径, 因而比直接展开更为简洁, 使用范围也更为广泛.

例4 把函数  $\frac{1}{(1+z)^2}$  展开成  $z$  的幂级数.

解: 由于  $\frac{1}{(1+z)^2}$  在  $|z|=1$  上有一奇点  $z=-1$ , 且在  $|z|<1$  内处处解析,

可展开成  $z$  的幂级数,

$$\frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - \cdots + (-1)^n z^n + \cdots \quad |z| < 1$$

上式两边逐项求导,

$$\frac{1}{(1+z)^2} = -\left(\frac{1}{1+z}\right)' = 1 - 2z + 3z^2 - \cdots + (-1)^{n-1} n z^{n-1} + \cdots, \quad |z| < 1.$$

注解

本题可以直接用公式:

$$(1+z)^\alpha = 1 + \alpha z + \binom{\alpha}{2} z^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n} z^n + \cdots, \quad |z| < 1.$$

**例5** 将 $e^z \cos z$ 展成 $z$ 的幂级数. (课后习题类似题)

**解法1:** 容易知道收敛半径 $R = +\infty$ . 由于

$$e^z \cos z = \frac{1}{2} \left[ e^{(1+i)z} + e^{(1-i)z} \right],$$

那么

$$e^z \cos z = \frac{1}{2} \left[ \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(1+i)^n}{n!} z^n + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(1-i)^n}{n!} z^n \right] = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(1+i)^n + (1-i)^n}{n!} z^n = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\sqrt{2})^n \left( e^{\frac{n\pi}{4}i} + e^{\frac{n\pi}{4}i} \right)}{n!} z^n$$

继续化简得

$$e^z \cos z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\sqrt{2})^n \cos \frac{n\pi}{4}}{n!} z^n.$$



## 解法2: 用级数乘法.

$$\begin{aligned} e^z \cos z &= \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{z^j}{j!} \cdot \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!} = \sum_{j,k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{j!(2k)!} z^{j+2k} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left( \sum_{j+2k=n} \frac{(-1)^k}{j!(2k)!} \right) z^n \quad (\text{Cauchy乘积公式}) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left( \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^k \binom{2k}{n} \right) z^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left\{ \frac{1}{n!} \operatorname{Re} \left[ (1+i)^n \right] \right\} z^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\sqrt{2})^n \cos \frac{n\pi}{4}}{n!} z^n. \end{aligned}$$

## 第四节 Laurent级数

### 一、Laurent展式

### 二、例题

# 一、Laurent展式

## 1. 双边幂级数

形如

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} (z - z_0)^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \quad (4.1)$$

的幂级数称为**双边幂级数**.

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} (z - z_0)^{-n} \xrightarrow{\zeta = (z - z_0)^{-1}} \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} \zeta^n \xrightarrow{\text{收敛半径 } R} |\zeta| < R \text{ 收敛} \longrightarrow |z - z_0| > \frac{1}{R} = R_1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \xrightarrow{\text{收敛半径 } R_2} |z - z_0| < R_2$$

小结

1)  $R_1 > R_2$  : 两收敛域无公共部分,

2)  $R_1 < R_2$  : 两收敛域有公共部分  $R_1 < |z - z_0| < R_2$ .

收敛域

定义4.1 若级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} (z - z_0)^{-n} \quad \text{和} \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \quad (4.2)$$

都收敛, 则称双边幂级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \quad (4.3)$$


收敛, 并且, 双边幂级数的和函数等于(4.1)两个幂级数的和函数相加. 进一步, 双边幂级数(4.2)发散当且仅当(4.1)中至少一个幂级数发散.

类似定义双边幂级数绝对收敛、一致收敛和内闭一致收敛, 等等.

## 2. 幂级数的性质搬至双边幂级数

前一部分讨论表明: 双边幂级数  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$  的收敛区域为

圆环域  $R_1 < |z - z_0| < R_2$ .



定理4.0 若双边幂级数 (4.3) 的收敛圆环为

$$H : r < |z - z_0| < R \quad (0 \leq r < R \leq +\infty)$$

则

- 1) 双边幂级数在 $H$ 内收敛且内闭收敛于 $f(z) = f_1(z) + f_2(z)$ ;
- 2) 和函数 $f(z)$ 在 $H$ 内解析, 即 $f \in A(H)$ ;
- 3) 在 $H$ 内可逐项求导  $p$  次( $p = 1, 2, \dots$ ), 即

$$f^{(p)}(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \left[ (z - z_0)^n \right]^{(p)}, \quad z \in H.$$

- 4) 可沿 $H$ 内分段光滑曲线 $C$ 逐项积分, 即

$$\int_C f(z) dz = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \int_C (z - z_0)^n dz.$$

### 3. 解析函数的洛朗 (Laurent) 展开

### 洛朗 (Laurent) 定理

**定理4.1** 在圆环 $H: r < |z - a| < R$  ( $0 \leq r < R \leq +\infty$ )内解析的函数必可展成双边幂级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - a)^n, \quad (4.4)$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots), \quad (4.5)$$

$\Gamma$ 为圆 $|\zeta - a| = \rho$  ( $r < \rho < R$ ), 并且展式是唯一的.

**证明:** 设 $z$ 为圆环 $H$ 内任意取定的点, 作含于 $H$ 内的圆周 $\Gamma_1: |\zeta - a| = \rho_1$ ,  $\Gamma_2: |\zeta - a| = \rho_2$ , 使得  $\rho_1 < |z - a| < \rho_2$ , 由柯西积分公式有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta. \quad (4.6)$$

于 $\Gamma_2$ 上,  $\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - a} \frac{1}{1 - \frac{z-a}{\zeta - a}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}}$ 关于 $\zeta$ 一致收敛. 因此, 我们有

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n,$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta, (n = 0, 1, 2, \dots). \quad (4.7)$$

于 $\Gamma_1$ 上,  $\frac{1}{\zeta - z} = -\frac{1}{z-a} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\zeta - a}{z-a}} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\zeta - a)^{n-1}}{(z-a)^n}$ 关于 $\zeta$ 一致收敛. 因此, 我们有

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{-n+1}} d\zeta (z-a)^{-n} = -\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z-a)^n,$$

其中

$$c_{-n} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{-n+1}} d\zeta, (n = 1, 2, \dots). \quad (4.8)$$

故  $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n$ , 其系数  $c_n$  由(4.7)(4.8)给出. 由Cauchy定理得, (4.7)和(4.8)可换成沿  $\Gamma: |\zeta-a|=\rho (r < \rho < R)$  的积分. 由此得到(4.5).

最后, 来证展式是唯一的. 若

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c'_n (z-a)^n, \quad z \in H,$$

其两边乘  $\Gamma$  上的有界函数  $\frac{1}{(z-a)^{m+1}}$  并沿  $\Gamma$  积分得


$$\int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{m+1}} d\zeta = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c'_n \int_{\Gamma} \frac{1}{(\zeta-a)^{-n+m+1}} d\zeta = 2\pi i c'_m.$$

即

$$c'_m = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{m+1}} d\zeta.$$

故  $c_n = c'_n$  ( $n = 0, \pm 1, \dots$ ). 证毕.



 定理4.1表明：在圆环 $H: r < |z - a| < R$  ( $0 \leq r < R \leq +\infty$ )内解析的函数必可展成

$$f(z) = \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n}_{\text{Laurent级数}} = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} (z-z_0)^{-n}}_{\text{主要部分}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n}_{\text{解析部分}}$$

其中


$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots),$$

$\Gamma$ 为圆 $|\zeta - a| = \rho$  ( $r < \rho < R$ ), 并且展式是唯一的。


Laurent系数

Taylor级数为Laurent级数的特殊情形。


特殊圆环：



$$0 < |z - z_0| < R_2$$



$$R_1 < |z - z_0| < \infty$$



$$0 < |z - z_0| < \infty$$

## 二、例题

理论上应该有两种方法：**直接法与间接法**

(1) 直接展开法：利用定理公式计算系数  $c_n$

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

然后写出

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n.$$

这种方法只有在找不到更好方法时才用.

(2) 间接展开法

根据解析函数 Laurent 级数展开式的唯一性，可运用代数运算、代换、求导和积分等方法去展开。

这一方法成为Laurent 级数展开的**常用方法**。

**例1** 函数  $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$  在圆环域:

1)  $0 < |z| < 1;$

2)  $1 < |z| < 2;$

3)  $2 < |z| < +\infty.$


内解析, 把  $f(z)$  在这些区域内展成Laurent级数.

解:

$$f(z) = \frac{1}{(1-z)} - \frac{1}{(2-z)},$$

1) 在  $0 < |z| < 1$  内, 由于  $|z| < 1$ , 从而  $\left|\frac{z}{2}\right| < 1$  则  $\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots$

$$\frac{1}{2-z} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{2^2} + \cdots + \frac{z^n}{2^n} + \cdots \right)$$




$$\text{所以 } f(z) = (1+z+z^2+\cdots) - \frac{1}{2}\left(1+\frac{z}{2}+\frac{z^2}{4}+\cdots\right) = \frac{1}{2} + \frac{3}{4}z + \frac{7}{8}z^2 + \cdots$$

2) 在  $1 < |z| < 2$  内,

$$\text{由 } |z| > 1 \longrightarrow \left|\frac{1}{z}\right| < 1$$

$$|z| < 2 \longrightarrow \left|\frac{z}{2}\right| < 1$$




$$\frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = -\frac{1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots\right)$$

且仍有

$$\frac{1}{2-z} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{2^2} + \cdots + \frac{z^n}{2^n} + \cdots\right)$$

$$\begin{aligned}\text{于是 } f(z) &= -\frac{1}{z} \left( 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots \right) - \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{2^2} + \cdots \right) \\ &= \cdots - \frac{1}{z^n} - \frac{1}{z^{n-1}} - \cdots - \frac{1}{z} - \frac{1}{2} - \frac{z}{4} - \frac{z^2}{8} - \cdots\end{aligned}$$



3) 在  $2 < |z| < \infty$  内,

由  $|z| > 2 \xrightarrow{\text{blue arrow}} \left| \frac{2}{z} \right| < 1$  此时  $\frac{1}{2-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{2}{z}} = -\frac{1}{z} \left( 1 + \frac{2}{z} + \frac{4}{z^2} + \cdots \right)$

此时  $\left| \frac{1}{z} \right| < \left| \frac{2}{z} \right| < 1$ , 仍有  $\frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = -\frac{1}{z} \left( 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots \right)$

$$\text{故 } f(z) = \frac{1}{z} \left( 1 + \frac{2}{z} + \frac{4}{z^2} + \cdots \right) - \frac{1}{z} \left( 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \cdots \right) = \frac{1}{z^2} + \frac{3}{z^3} + \frac{7}{z^4} + \cdots .$$

**例2** 求函数  $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$  分别在  $z=1, 2$  去心邻域内的Laurent展式.

解: (1) 在1的(最大)去心邻域  $0 < |z-1| < 1$  内:

$$f(z) = -\frac{1}{z-1} - \frac{1}{1-(z-1)} = -\frac{1}{z-1} - \sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n.$$

(2) 在2的(最大)去心邻域  $0 < |z-2| < 1$  内:

$$f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{(z-2)+1} = \frac{1}{z-2} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-2)^n.$$

**例3** 求函数  $f(z) = \frac{1}{1-z} e^z$  在圆环  $0 < |1-z| < +\infty$  内的Laurent展开式.

解:  $f(z)$  在  $0 < |1-z| < +\infty$  内解析, 故

$$f(z) = \frac{1}{1-z} e^z = \frac{1}{1-z} e^{z-1+1} = -\frac{e}{z-1} e^{z-1} = -\frac{e}{z-1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n!} = -e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (z-1)^{n-1} \quad (0 < |z-1| < +\infty).$$



