Guion de video: EID Cálculo Intermedio

MAT1188. Grupo 6

Integral definida y área geométrica: contribuciones positivas y negativas

Duración del montaje: 5 minutos y 15 segundos.

Cómo usar este guion

El texto de narración está escrito para leerlo en voz alta. Las fórmulas y las indicaciones de pantalla sirven como apoyo y no se leen de principio a fin. Los tiempos corresponden al montaje final. La narración sirve también como apoyo para repasar antes de la defensa.

El montaje actual incorpora las tres voces y dura 5:15. Los tiempos de este documento corresponden a las tomas seleccionadas. Cada intervención está identificada en pantalla. El video completo, incluidos los créditos, debe durar entre 4 y 6 minutos.

Las escenas están en `scenes/escenas.py`. Los tiempos se fijan en `utils/guion.py` y los recortes en `utils/edicion.py`. El programa `montar.py` incorpora las grabaciones originales. Los recuadros se mantienen visibles mientras se explica cada elemento.

Datos y reparto

- **Pregunta central:** ¿Por qué una integral definida puede ser menor que el área geométrica total?
- **Ejemplo:** $f(x) = x^2 - 4$ en $[-3, 3]$, con raíces -2 y 2.
- **Resultados:** $A^+ = 14/3$, $A^- = 32/3$, integral -6 y área total $46/3$.
- **Catalina Javiera Vergara Alarcón:** fundamentos, de 00:00 a 01:27,60.
- **Ignacio Alexander De Celis Valencia:** ejemplo y aproximación, de 01:27,60 a 03:36.
- **Marcelo Fabián Santana Astorga:** límite, resultados y cierre, de 03:36 a 05:15.

El ejemplo es distinto del apunte base, que no desarrolla esta función en este intervalo. Los tres deben comprender el trabajo completo para la defensa.

Catalina: bloque 1

Escena 1: Portada. De 00:00 a 00:10,65

Tiempo previsto: 10,65 segundos. **Narración:** 23 palabras.

Qué se ve en pantalla

Curso, grupo, integrantes y pregunta central. El rótulo del bloque debe identificar a Catalina.

Narración

Hola, somos Catalina, Ignacio y Marcelo, del grupo seis. Explicaremos por qué una integral definida puede ser menor que el área geométrica total.

Indicaciones para el montaje

Mostrar la presentación y dejar visible la pregunta al terminar. No es necesario leer todos los datos de la portada.

Escena 2: TeoriaSigno. De 00:10,65 a 00:46,95

Tiempo previsto: 36,3 segundos. **Narración:** 95 palabras.

Qué se ve en pantalla

Rectángulos sobre y bajo el eje. Después, mostrar la suma y sus elementos:

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x, \qquad \Delta x = \frac{b-a}{n}, \qquad a < b.$$

El dibujo inicial es ilustrativo. El ejemplo principal se presenta en la escena 4.

Narración

Soy Catalina. Una suma de Riemann nos permite sumar pequeños aportes de una función. Dividimos el intervalo en n partes del mismo ancho, llamado delta x. En cada parte elegimos un punto muestra, que indica dónde calculamos la altura del rectángulo.
El aporte es esa altura multiplicada por el ancho. Como el ancho es positivo, el signo depende de la altura. Sobre el eje, el aporte es positivo. Bajo el eje, es negativo. Para una función continua en el intervalo, estas sumas se acercan a la integral definida al usar rectángulos cada vez más angostos.

Indicaciones para el montaje

Señalar el ancho, el punto muestra y la altura al nombrarlos. Mostrar luego un aporte positivo y uno negativo. Dejar una pausa para leer la suma.

Escena 3: TeoriaDefiniciones. De 00:46,95 a 01:27,60

Tiempo previsto: 40,65 segundos. **Narración:** 96 palabras.

Qué se ve en pantalla

Mostrar las dos áreas, ambas no negativas, y después las operaciones:

$$I = \int_a^b f(x)\,dx = A^+ - A^-, \qquad A_{\text{total}} = \int_a^b |f(x)|\,dx = A^+ + A^-.$$

El valor absoluto se muestra en la fórmula del área y se resalta al explicarlo.

Narración

Llamamos A más al área de las regiones sobre el eje y A menos al área de las regiones bajo él. Las dos son cantidades positivas o cero. El nombre A menos no significa que esa área sea negativa.
Para obtener la integral, restamos A menos a A más. Para obtener el área geométrica total, sumamos ambas. Esto también se expresa integrando el valor absoluto de la función, porque así contamos todos los aportes como positivos. La diferencia está en que la integral permite que los aportes se compensen. Ignacio mostrará cómo ocurre en nuestro ejemplo.

Indicaciones para el montaje

Relacionar cada región con su símbolo antes de mostrar las operaciones. Leer las fórmulas con calma y pasar al ejemplo.

Ignacio: bloque 2

Escena 4: EjemploPrincipal. De 01:27,60 a 02:01,20

Tiempo previsto: 33,6 segundos. **Narración:** 63 palabras.

Qué se ve en pantalla

Identificar a Ignacio. Mostrar $f(x) = x^2 - 4$ en $[-3, 3]$ y las raíces $x = -2$ y $x = 2$. La función es positiva en $[-3, -2)$ y $(2, 3]$, negativa en $(-2, 2)$ y cero en las raíces.

Narración

Soy Ignacio. Elegimos la función x al cuadrado menos cuatro, en el intervalo de menos tres a tres. Es un polinomio, así que es continua. Al igualarla a cero encontramos las raíces menos dos y dos. La función es positiva en los tramos exteriores y negativa entre las raíces. En las raíces vale cero. Por eso distinguimos dos regiones verdes y una roja.

Indicaciones para el montaje

Mostrar primero función e intervalo. Señalar las raíces y luego colorear las regiones. El ejemplo se comprobó como distinto al del apunte.

Escena 5: Rectangulos. De 02:01,20 a 02:37,95

Tiempo previsto: 36,75 segundos. **Narración:** 79 palabras.

Qué se ve en pantalla

Partición con $n = 6$, ancho $\Delta x = 1$ y puntos medios. Puntos muestra: $-2{,}5$, $-1{,}5$, $-0{,}5$, 0,5, 1,5 y 2,5. Mostrar altura y aporte.

Narración

Dividimos el intervalo en seis partes iguales y elegimos el punto medio de cada una. Como el intervalo mide seis unidades, el ancho de cada rectángulo es uno.
La altura se obtiene evaluando la función en el punto medio. Por ejemplo, en dos coma cinco, la altura es dos coma veinticinco. Al multiplicarla por el ancho, obtenemos un aporte de dos coma veinticinco. Usamos el mismo procedimiento para los otros cinco rectángulos y conservamos el signo de cada aporte.

Indicaciones para el montaje

Presentar la partición, los puntos medios y los rectángulos en ese orden. Hacer coincidir el ejemplo numérico con el rectángulo indicado.

Escena 6: SumaDeAportes. De 02:37,95 a 03:36

Tiempo previsto: 58,05 segundos. **Narración:** 91 palabras.

Qué se ve en pantalla

Mostrar por etapas:

$$S_6 = 4{,}5 - 11 = -6{,}5, \qquad A_6 = 4{,}5 + 11 = 15{,}5.$$

Las dos cantidades son aproximaciones. Los cuatro rectángulos negativos pertenecen a una misma región bajo la curva.

Narración

Los dos rectángulos positivos aportan dos coma veinticinco cada uno. En total suman cuatro coma cinco. Los cuatro negativos aportan menos uno coma setenta y cinco, menos tres coma setenta y cinco, menos tres coma setenta y cinco y menos uno coma setenta y cinco. Su suma es menos once. Por eso, la suma con signo da menos seis coma cinco. Para aproximar el área, sumamos los valores sin signo y obtenemos quince coma cinco. Son dos aproximaciones hechas con los mismos rectángulos. Marcelo explicará qué pasa al aumentar su número.

Indicaciones para el montaje

Mostrar cada suma mientras se explica. Mantener visible la palabra aproximación y dejar una pausa antes del cambio de voz.

Marcelo: bloque 3

Escena 7: Refinamiento. De 03:36 a 04:01

Tiempo previsto: 25 segundos. **Narración:** 63 palabras.

Qué se ve en pantalla

Identificar a Marcelo. Pasar de $n = 6$ a $n = 12$ y $n = 24$. La tabla muestra la suma con signo y el área aproximada.

Narración

Soy Marcelo. Conservamos la función, el intervalo y la elección del punto medio, pero aumentamos el número de rectángulos. Su ancho disminuye y la aproximación mejora en este ejemplo.
La suma con signo se acerca a menos seis. La suma de los valores sin signo se acerca a quince coma treinta y tres. Este proceso nos permite entender la integral como un límite.

Indicaciones para el montaje

Hacer coincidir el cambio de n con la voz. No leer todos los números de la tabla. Si es necesario aclararlo, n tiende a infinito como proceso, no como un valor que se sustituye.

Escena 8: ComparacionFinal. De 04:01 a 04:45

Tiempo previsto: 44 segundos. **Narración:** 91 palabras.

Qué se ve en pantalla

El cálculo exacto aparece antes de las barras y flechas. Se muestra una línea por vez:

$$F(x) = \frac{x^3}{3} - 4x, \qquad F'(x) = x^2 - 4.$$

$$A^+ = [F(x)]_{-3}^{-2} + [F(x)]_{2}^{3} = \frac{7}{3} + \frac{7}{3} = \frac{14}{3}.$$

$$\int_{-2}^{2} f(x)\,dx = -\frac{32}{3}, \qquad A^- = \frac{32}{3}.$$

$$I = \frac{14}{3} - \frac{32}{3} = -6, \qquad A_{\text{total}} = \frac{14}{3} + \frac{32}{3} = \frac{46}{3}.$$

Este desarrollo está incorporado en el código y sincronizado con las tomas elegidas.

Narración

Para comprobar los valores exactos usamos una antiderivada. Es una función cuya derivada devuelve la función original. En este caso es x al cubo dividido por tres, menos cuatro x. La evaluamos en los extremos de cada tramo y restamos los resultados.
Cada región exterior tiene área siete tercios. Juntas dan catorce tercios. En la región central, la integral vale menos treinta y dos tercios y su área es treinta y dos tercios. Al restar las áreas obtenemos la integral, menos seis. Al sumarlas obtenemos aproximadamente quince coma treinta y tres.

Indicaciones para el montaje

El valor exacto, cuarenta y seis tercios, queda visible en pantalla. Explicar primero el cálculo exacto. Luego señalar cómo las barras suman ambas áreas y cómo las flechas avanzan y retroceden hasta llegar a menos seis. Dejar pausas para seguir las operaciones.

Escena 9: RespuestaCentral. De 04:45 a 05:03

Tiempo previsto: 18 segundos. **Narración:** 40 palabras.

Qué se ve en pantalla

Pregunta central y comparación final. Mostrar la condición $A^- > 0$ para la desigualdad estricta.

Narración

Las regiones bajo el eje aportan valores negativos a la integral. El área geométrica suma todas las áreas sin signo. Por eso, si A menos es mayor que cero, la integral es menor. Si A menos vale cero, ambas coinciden.

Indicaciones para el montaje

Responder mirando la comparación, sin volver a leer todas las fórmulas. Aclarar que menos seis no representa un área geométrica negativa.

Escena 10: Creditos. De 05:03 a 05:15

Tiempo previsto: 12 segundos. **Narración:** 25 palabras.

Qué se ve en pantalla

Mostrar el apunte, Stewart, Thomas y Manim. Incluir Claude, Codex y Whisper, sus usos y la forma de comprobar los resultados. El detalle puede quedar en la ficha para que se lea sin apuro. Los enlaces, ediciones y apartados de apoyo están registrados en el documento de referencias del repositorio.

Narración

Las fuentes y el uso de inteligencia artificial están detallados en los créditos y en la ficha. Comprobamos los cálculos y revisamos las escenas. Gracias.

Indicaciones para el montaje

Mantener los créditos legibles. La pauta no exige leerlos en voz alta. La frase de cierre es opcional y no reemplaza la declaración escrita ni la explicación matemática de cada integrante.

Resumen de tiempos

N.	Escena	Inicio	Fin	Seg.	Voz
1	Portada	00:00	00:10,65	10,65	Catalina
2	TeoriaSigno	00:10,65	00:46,95	36,3	Catalina
3	TeoriaDefiniciones	00:46,95	01:27,60	40,65	Catalina
4	EjemploPrincipal	01:27,60	02:01,20	33,6	Ignacio
5	Rectangulos	02:01,20	02:37,95	36,75	Ignacio
6	SumaDeAportes	02:37,95	03:36	58,05	Ignacio
7	Refinamiento	03:36	04:01	25	Marcelo
8	ComparacionFinal	04:01	04:45	44	Marcelo
9	RespuestaCentral	04:45	05:03	18	Marcelo
10	Creditos	05:03	05:15	12	Marcelo
Total del montaje				**315**	**5:15**

Revisión antes de entregar

- Ensayar las tres voces y comprobar los tiempos reales. No hacer un corte si la explicación todavía no termina.
- Dar más tiempo al contenido matemático que a la presentación y los créditos.
- Revisar los apoyos del valor absoluto y del cálculo exacto, ya incorporados en las escenas.
- Mantener la diferencia entre aproximación y valor exacto. Con seis rectángulos, $S_6 = -6{,}5$. La integral exacta vale -6.
- Repasar el apunte y los apartados de Stewart y Thomas indicados en el registro de referencias. Las ediciones y las páginas ya se verificaron.
- Revisar que los créditos y la ficha describan el apoyo real de Claude, Codex y Whisper. Incluyen el guion, los documentos, las pruebas y el montaje.
- Las tres voces están incorporadas. Antes de entregar, el equipo debe reproducir y revisar el montaje completo.
- Comprobar el curso, confirmar la sección indicada y verificar la duración, el repositorio y la versión del código en la ficha. El MP4 se entrega separado del PDF.

Preparación para la defensa

La rúbrica indica un máximo de diez minutos y la elección al azar de un integrante presente. La persona elegida responde cuatro preguntas. Por eso, cada integrante debe poder explicar el tema, justificar el procedimiento, interpretar los resultados y describir cómo afectan los parámetros del código al dibujo. No hace falta memorizar instrucciones de Manim.