

Notes on Analysis III

FE enthusiast enthusiast

2025.09.09

课程概要

- 课程名：数学分析 III (Honor)
- 周课时：4+质量未知的双周习题课+不知道多久的课后整理
- 授课教师：杨诗武
- 给分方法：作业 40% + 期中 30% + 期末 30%，作业非 routine
- 课程大纲：
 - Fourier 级数与 Fourier 变换
 - 分布理论（广义函数）
 - Sobolev 空间和嵌入定理
- 参考资料：于品的数分讲义和自编讲义（但自编讲义并不完全可信，上面可能出现很严重的错误，无法作为一个很好的笔记参考资料.）

可能是最需要笔记整理的一门课……

Week 1: 2025/9/8 2025/9/10**1 Fourier 级数**

本笔记参考了大量 thu 23 年分析讲义（于品改良版）里面的内容.

1.1 引入

Fourier 级数的研究来源于**偏微分方程**，具体来说，在物理中我们会自然地想要去求解关于“状态”的方程，其一个维度是位置，一个维度是时间. 这样就自然地导向 PDE 问题的一个求解. 比如下述的细导线上的热传导方程：

$$\partial_t u = \partial_x^2 u + f. \quad (1)$$

其中 $u = u(t, x)$, $t \in [0, +\infty)$, $x \in [0, L]$, t 代表时间, x 代表在导线上所处位置 (导线长度为 L), u 代表 t 时刻 x 位置处的温度. 我们还需要一些额外的条件：

- 初值给定：零时刻的温度分布 u_0 被给定.
- 边值给定： $u(\cdot, 0) = u(\cdot, L) = 0$ ，它的物理意义是 u 两端保持在固定的温度.
- 最后我们不妨设 $f = 0$ ，即导线上没有热源，温度是自由扩散的.

我们再采用分离变量的方式来尝试求解 PDE，设 $u(t, x) = T(t)X(x)$ ，则 (1) 可化简为

$$T'(t)X(x) = T(t)X''(x) \Rightarrow \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{T(t)}.$$

固定 t 移动 x 会发现 $\frac{X''(x)}{X(x)}$ 取常值，再移动 t 会发现两边取相同的常值，即存在 c 使得同时有

$$X''(x) = c \cdot X(x), \quad T'(t) = c \cdot T(t).$$

这样问题就化归为了常微分方程的求解. 比如说 T 的解应当是

$$T(t) = A \cdot e^{ct}.$$

回忆 $X''(x) = c \cdot X(x)$ 这类方程的求解过程是通过把高阶导数转化为高维向量的一阶导数，即

$$\begin{pmatrix} X(x) \\ X'(x) \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ c & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X(x) \\ X'(x) \end{pmatrix}.$$

问题就转化为了 $\mathbf{X}' = \mathbf{A} \cdot \mathbf{X}$ 这种向量值的一阶常微分方程. 求解的方法是把矩阵 A 对角化（这也是我第一次看到线性代数的交叉应用，在 Artin Cpt 5 的后几章有）然后把它转化为一维的情形. 由于方程 $X''(x) = c \cdot X(x)$ 是线性的，故最后的解空间也具备线

性：函数空间可以自然地看作一个（当然是无穷维的）线性空间，解空间就是它的一个子空间。

根据边值限制， X 存在零点，这导致 X 的解应形如

$$A \cdot \cos(\lambda x) + B \cdot \sin(\lambda x).$$

其中 $\lambda^2 = -c$. 代入 $X(0) = X(L) = 0$ 后可知 $A = 0$ 并且 $\lambda L = k\pi$ 对某个整数 k 成立. 这给出 $c = -(k\pi/L)^2$, 从而

$$u(t, x) = \square \cdot e^{-(k\pi/L)^2 t} \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right).$$

更一般地，由于偏微分方程 (1) 在 $f = 0$ 时的解也具有线性，所以从形式上来说，对不同的 k 对上式进行线性组合都可以得到一个满足 (1) 的解. 或者我们可以写成

$$u(t, x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k e^{-(k\pi/L)^2 t} \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right).$$

（注意从线性空间的角度来说， a_k 中应该只有有限项非零）我们想起 $u(t, x)$ 还需要满足初值条件 $u_0 = u(0, \cdot)$. 所以如果存在序列 $\{a_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 使得

$$u_0(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right),$$

那么就可以模拟出 PDE 的一组解. 注意到这时候 $u_0(x)$ 必须是一个奇函数. 最后，当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $u(t, x) \rightarrow 0$ ，这也符合我们的直观，即如果导线两端的温度固定为零，那么足够长时间后整个导线上温度都趋于 0. 我们称 $t \rightarrow +\infty$ 时 u 的解为方程的稳态解.

我们再来看另一个（个人认为适配性更强的）例子. 给定一个定义在圆周上的函数 f ，它能否成为调和函数的边界？即给定定义在 ∂D 上的函数 f ，是否存在 D 上的函数 u 使得

$$\begin{cases} \Delta u = 0; \\ u(x) = f(x), \quad x \in \partial D \end{cases} \quad ? \quad (2)$$

这个方程的求解实际上和上面一样也具有物理意义. 为此，我们先把上面的热传导方程推广到高维，高维版本中位置 x 被替换成 $\mathbb{R}^n$ 中的点，热方程中的 ∂_x^2 被替换成更一般的 Laplace 算子 Δ . 这样的话，圆盘上无热源的热传导方程被表述为

$$\partial_t u = \Delta u. \quad (3)$$

现在我们给定初值 u_0 和边值，注意此时边值不再是一维情形中“端点”上的值，而是一个定义在整个边界上的函数 f . 我们考虑足够长时间后方程的稳态解. 如果 $f \equiv 0$ 那么稳态解仍然为 $u \equiv 0$ ，对一般的 f ，它的稳态解就是满足 (2) 的函数 u . 换句话说，从物理上只要给定边值 f ，就能够模拟出一组 (2) 的解，我们关注有没有具体把它表示出来的方式.

自然地, 我们通过极坐标来求解这个方程: 换元 $v(r, \theta) = u(r \cos \theta, r \sin \theta)$, 那么 v 应当满足

$$\begin{cases} \frac{\partial^2}{\partial r^2} v + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} v + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} v = 0; \\ v(1, \theta) = g(\theta) := f(\cos \theta, \sin \theta), \quad \theta \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

仍然采用分离变量法, 设 $v(r, \theta) = a(r)b(\theta)$, 则条件化为

$$\begin{aligned} a''(r)b(\theta) + \frac{1}{r}a'(r)b(\theta) + \frac{1}{r^2}a(r)b''(\theta) &= 0. \\ \Rightarrow \frac{r^2 a''(r) + r a'(r)}{-a(r)} &= \frac{b''(\theta)}{b(\theta)}. \end{aligned}$$

这推出左右两边等于同一个定值, 即存在常数 c 使得

$$b''(\theta) = c \cdot b(\theta), \quad r^2 a''(r) + r a'(r) + c \cdot a(r) = 0.$$

我们注意到 θ 实际是在一个圆周 $S^1 = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 上定义的, 或者说如果把 θ 看成实变量, 所有以 θ 为变量的函数都应当以 2π 为周期. 我们会同时采用两种看法, 即我们谈论 θ 自动代表它所在的 $\text{mod } 2\pi$ 的等价类, 有时也会把函数自动认为是周期函数. 这里为了让函数 b 满足周期性, 选定 $c = -k^2, k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 那么 b 的解空间由周期函数 $\cos(k\theta)$ 和 $\sin(k\theta)$ 张成, 即

$$b(\theta) = A \cdot \cos(k\theta) + B \cdot \sin(k\theta).$$

当 $k = 0$ 时, $b(\theta)$ 的解是线性函数, 根据周期性只能是常值函数. 再来看关于 a 的方程, 注意到代入一个单项式之后方程是齐次的, 因此可以猜测解就是单项式. 严格来说, 可以换元 $r = e^s, \alpha(s) = a(e^s)$, 那么

$$\alpha'(s) = a'(e^s) \cdot e^s, \quad \alpha''(s) = a''(e^s) \cdot e^{2s} + a'(e^s) \cdot e^s.$$

因此关于 a 的方程实际上是

$$\alpha''(s) - k^2 \alpha(s) = 0.$$

它的解空间由 e^{ks} 和 e^{-ks} 生成, 即存在常数 C, D 使得

$$\alpha(s) = C \cdot e^{ks} + D \cdot e^{-ks}.$$

重新代回 $\alpha(s) = a(e^s)$ 可得 $a(r) = C \cdot r^k + D \cdot r^{-k}$. 根据实际意义 $r = 0$ 时函数值应当有限, 所以我们只考虑 $a(r) = C \cdot r^k$ 的情况. 特别地, 当 $k = 0$ 时这意味着 $a(r)$ 也需是常值函数.

从而, 根据 Laplace 算子的线性, $\Delta v = 0$ 的解空间包含以下一些函数张成的线性子空间:

$$v(r, \theta) = 1, \quad v(r, \theta) = r^k \cos(k\theta), \quad v(r, \theta) = r^k \sin(k\theta).$$

所以只要边值条件能够表示成这些函数在 $r = 1$ 时的一个线性组合

$$f(\theta) = A + \sum_{k \in \mathbb{N}^*} (a_k \cos(k\theta) + b_k \sin(k\theta))$$

就能给出 u 的一个形式解

$$v(r, \theta) = A + \sum_{k \in \mathbb{N}^*} (a_k r^k \cos(k\theta) + b_k r^k \sin(k\theta)).$$

这又是一个非常标准的“用三角级数表示解”的问题！

如果三角函数的出现仍然让人感到奇怪，这里还有一个更统一的表达形式。回忆在解 ODE 时解空间里会出现 $\sin \theta$ 和 $\cos \theta$ 的来源是如果在复值函数中考虑问题，解空间会由 $e^{i\theta}$ 和 $e^{-i\theta}$ 生成，在实值函数中投影产生了 $\cos \theta$ 和 $\sin \theta$ 。所以我们可以干脆直接考虑其复版本，这也有显而易见的好处：一方面是表达形式更统一了：

$$f(\theta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ik\theta}, \quad u(r, \theta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k r^{|k|} e^{ik\theta}.$$

另一方面，在进行微分积分相关的运算时 $e^{i\theta}$ 这种函数得到的结果相比三角函数是更自然的，这一点很快就会看到。

Definition 1.1.1 (Fourier 级数). 我们在圆周 $S^1 \cong \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 上定义如下两种 Fourier 级数：

- 实形式 $f: S^1 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k \in \mathbb{N}^*} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$.
- 复形式 $f: S^1 \rightarrow \mathbb{C}$, $f(x) \sim \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx}$.

由于圆周 S^1 是紧的，我们可以方便地考虑积分。不难注意到

$$\int_{S^1} e^{ikx} dx = \begin{cases} 2\pi, & k = 0; \\ 0, & k \neq 0. \end{cases}$$

其中 dx 是圆周上的子流形测度，它由覆叠 $\pi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 所赋予，我们也可以看作是在实轴上某个长为 2π 的区间内作积分。

作为单位根求和的连续版本，它告诉我们 $\{e^{ikx}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 满足某种正交性质：我们把函数空间看作线性空间，并在空间上定义内积

$$\langle f, g \rangle = \int_{S^1} f(x) \overline{g(x)} \frac{dx}{2\pi},$$

那么 $\{e^{ikx}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 可以自然地看作内积空间的一组标准正交基（这么说很明显有问题：一是线性组合是有限项组合，这里使用无限项求和，就已经超出了代数的范畴；二是我们只验证了它标准正交，还没有说明是一组基），而把 f 表示成 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx}$ 可以通过正交分解

$$f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle f, e^{ikx} \rangle e^{ikx}.$$

具体计算这个系数，就得到了著名的 Fourier 系数：

Definition 1.1.2 (Fourier 系数). 我们为可积函数 $f \in L^1(S^1, \mathbb{C})$ 定义其第 k 个 Fourier 系数为

$$\hat{f}(k) = \langle f, e^{ikx} \rangle = \int_{S^1} f(x) e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi}.$$

并且我们说 f 对应的 Fourier 级数为

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) e^{ikx}.$$

f 的可积性保证了 $|\hat{f}(k)|$ 拥有一致上界 $\|f\|_{L^1}$, 十分方便后续的讨论.

注意定义对 Lebesgue 可积函数进行, 这是因为 S^1 已经被赋予了好的测度 (鉴于积分里经常要除以 2π , 所以我们可以设 S^1 上的标准测度为 $d\xi = \frac{dx}{2\pi}$, 此时圆周的测度为 1, 相当于进行了等比放缩), 在这个测度空间上可以考虑积分, 也可以考虑各种 L^p space.

现在框架已经搭好了, 就是研究 f 与其 Fourier 级数之间的关系, 我们当然希望在级数的意义下其 Fourier 级数收敛到 f , 但是在逐点意义下这并不总对任何可积函数成立. 因此, 还需要进一步的分析:

- 我们可以更换不同的收敛模式来考虑这个问题. 比如把逐点收敛更换为几乎处处收敛, L^1 意义下收敛, 或者更强的一致收敛.
- 我们可以对不同正则性的函数来考虑这个问题. 比如把可积函数更换成 L^p 函数, 连续函数, α -Hölder 函数, 可微函数, 光滑函数; 或者增加有界之类的条件.
- 我们可以更换级数本身. 如果级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 不收敛, 那么可以看看把它进行写操作后得到的级数是否收敛, 比如把 a_k 替换成前 k 项的平均数, 收敛速度会变快.
- 我们可以考虑系数序列. 直接看序列 $\{\hat{f}(k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 所具有的性质, 比如敛散性, 比如增长或下降的速度. 反过来, 我们也想知道从这个序列本身的性质能不能推得函数 f 所具有的一些性质 (在应用中由很大价值).
- 上面所述的“线性空间”理论能否被严格化, 从而可从线性代数的角度去考察函数问题, 提供了不同的视角.
-

1.2 Fourier 级数和卷积

我们首先来考虑 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) e^{ikx}$ 的逐点收敛性质. 我们先把它写成一个函数列收敛的形式, 设

$$S_N(f)(x) = \sum_{|k| \leq N} \hat{f}(k) e^{ikx}$$

我们要研究的就是是否有 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(f) = f$. 把 $S_N(f)$ 的表达式具体写开:

$$\begin{aligned} S_N(f)(x) &= \sum_{|k| \leq N} \int_{S^1} f(\theta) e^{-ik\theta} d\xi \cdot e^{ikx} \\ &= \int_{S^1} f(\theta) \left(\sum_{|k| \leq N} e^{ik(x-\theta)} \right) d\xi. \end{aligned}$$

设

$$D_N(f)(x) = \sum_{|k| \leq N} e^{ikx} = \frac{\sin(N + \frac{1}{2})\theta}{\sin \frac{\theta}{2}},$$

则 $S_N(f)(x) = (f * D_N(f))(x)$, 其中卷积在测度 $d\xi$ 对应的积分下定义, 所以问题就转化为看是否有 $\lim_{N \rightarrow \infty} f * D_N(x) = f$. 我们回忆上学期学习恒同逼近核时提到过类似的概念, 即我们可以通过研究核 D_N 本身的性质来推出某些模式下的收敛, 这里 D_N 被称为 **Dirichlet 核**. 我们回忆一下 (一维情形中) 恒同逼近核的定义, 当然把命题改为 S^1 不影响任何事情.

Definition 1.2.1 (恒同逼近核). 我们说一族函数 $\{K_\varepsilon\}_{\varepsilon \in \mathbb{R}^+}$ 是一维的**恒同逼近核**, 如果它满足以下三个条件:

- $\int_{S^1} K_\varepsilon d\xi = \int_{S^1} K_\varepsilon \frac{dx}{2\pi} = 1$; (归一性)
- $|K_\varepsilon| \leq A \cdot \varepsilon^{-1}$; (广泛的小性)
- $|K_\varepsilon| \leq A \cdot \varepsilon |x|^{-2}$. (在远离原点处的小性)

恒同逼近核满足以下两个性质, 在上学期的笔记 P26 上有详细解释.

Proposition 1.2.2 (L^1 收敛). 如果 K_ε 是恒同逼近, 那么对任何 $f \in L^1(S^1)$, 均有 $K_\varepsilon * f$ 可积, 并且

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|K_\varepsilon * f - f\|_{L^1} = 0.$$

Proposition 1.2.3 (a.e.-逐点收敛). 如果 f 可积, K_ε 为恒同逼近, 则 f 在所有 Lebesgue 点处有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (K_\varepsilon * f)(x) = f(x).$$

特别地, 由于可积函数几乎所有点均是 Lebesgue 点, 所以 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (K_\varepsilon * f) \rightarrow f$, a.e.

可惜的是 $D_N(f)$ 不是一个好的恒同逼近核, 虽然对它沿 S^1 积分后是 1, 但是它是快速震荡的, 所以在原点之外没有关于 θ 的小性.

其次, 恒同逼近核的概念太强, 它在 Lebesgue 点附近都能得到收敛性质, 稍弱一些的我们可以考虑下面积分核的概念. (也称为 good kernel, 顺带一提实分析教材中两者引入顺序似乎是反过来的?)

Definition 1.2.4 (积分核). 给定 S^1 上的一族连续函数 $K_N(x)$, 如果它满足

(i) K_N 是概率密度, 即 $\int_{S^1} K_N(x) d\xi = 1$;

(ii) K_N 在 $L^1(S^1)$ 上一致有界, 即存在常数 $M > 0$ 使得

$$\int_{S^1} |K_N(x)| d\xi \leq M, \quad \forall n \geq 0.$$

(iii) 当 $N \rightarrow +\infty$ 时, $\{K_N\}_{N \geq 0}$ 主要集中在 $x = 0$ 附近, 即对任意 $\delta > 0$, 均有

$$\int_{S^1 \setminus (-\delta, \delta)} |K_N(x)| d\xi \rightarrow 0.$$

称 $\{K_N(x)\}$ 是 S^1 上的一族好的积分核.

换句话说, 我们只希望在积分的意义下有小性就可以了. 实际上, 我们可以证明恒同逼近核一定是积分核. 但是 Dirichlet 核甚至也不是积分核: 它不满足 (ii)(iii) 这两条性质. 为了让震荡频率减弱下来, 我们采用 Césaro 求和: 定义

$$\sigma_N(f) := \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_k(f).$$

并考虑是否有 $\lim_{N \rightarrow \infty} \sigma_N(f) = f$ 成立. 根据线性, $\sigma_N(f)$ 的收敛性也能被转化为一个卷积, 并且卷积核也可以如下表示:

$$F_N(f) := \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} D_k(f) = \sum_{|k| \leq N-1} (N - |k|) e^{ikx} = \frac{1}{N} \left(\frac{\sin \frac{N}{2} \theta}{\sin \frac{1}{2} \theta} \right)^2.$$

注意 $\theta \rightarrow 0$ 时确实有 $F_N(f) \rightarrow N$. 由于这个核有一个 N 的控制, 我们可以证明这是一个好核.

Proposition 1.2.5. $\{F_N(f)\}_{N \geq 1}$ 是一族好核.

- (i) 可以直接通过线性得到:

$$\int_{S^1} F_N(f) d\xi = \int_{S^1} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_k(f) d\xi = \frac{1}{N} \cdot N = 1.$$

- (ii) 显然, 因为 $F_N(f)$ 是非负的, 所以

$$\int_{S^1} |F_N(f)| d\xi = \int_{S^1} F_N(f) d\xi = 1.$$

注意 $D_N(f)$ 就不是非负的!

- (iii) 在 $\theta \in S^1 \setminus (-\delta, \delta)$ 时, $|\sin \frac{1}{2} \theta|$ 有一个非平凡的下界 $\sin \frac{1}{2} \delta$. 这导致我们可以直接放缩

$$F_N(f) \leq \frac{1}{N} \cdot \left(\frac{1}{\sin \frac{1}{2} \delta} \right)^2.$$

对它积分后令 $N \rightarrow \infty$ 当然趋于 0.

所以 Fejer 核是一个好核 (积分核)! 我们广泛地证明好核有以下两个对应于恒同逼近核的收敛性质成立:

Theorem 1.2.6 (L^1 收敛). 如果 $\{K_N\}$ 是好的积分核, 那么对任何 $f \in L^1(S^1)$, 均有 $K_N * f$ 可积, 并且

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|K_N * f - f\|_{L^1} = 0.$$

Proof. 直接进行计算:

$$\begin{aligned} (K_N * f - f)(x) &= \left(\int_{S^1} K_N(\theta) f(x - \theta) d\xi \right) - f(x) \\ &= \int_{S^1} K_N(\theta) (f(x - \theta) - f(x)) d\xi. \end{aligned}$$

第二个等号用到了积分核的第一个性质. 两边对 x 积分:

$$\begin{aligned} \|K_N * f - f\|_{L^1} &\leq \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{S^1} \int_{S^1} |K_N(\theta)| |f(x - \theta) - f(x)| d\theta dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{S^1} |K_N(\theta)| \|\tau_{-\theta} f - f\|_{L^1} d\theta. \end{aligned}$$

其中 $\tau_{-\theta} f(x) = f(x - \theta)$. 由于 f 是可积函数, 我们知道

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \|\tau_{-\theta} f - f\|_{L^1} = 0.$$

从而可以进行截断估计. 对任意 $\varepsilon > 0$ 取 δ 使得对任意 $|\theta| \leq \delta$ 均有 $\|\tau_{-\theta} f - f\|_{L^1} < \varepsilon$, 又根据 f 的可积性存在一致常数 P 使得对任意 θ 均有 $\|\tau_{-\theta} f - f\|_{L^1} < P$.

$$\begin{aligned} \|K_N * f - f\|_{L^1} &\leq \frac{1}{2\pi} \varepsilon \cdot \int_{(-\delta, \delta)} |K_N(\theta)| d\theta + \frac{1}{2\pi} P \cdot \int_{S^1 \setminus (-\delta, \delta)} |K_N(\theta)| d\theta \\ &\leq \varepsilon M + P \cdot \int_{S^1 \setminus (-\delta, \delta)} |K_N(\theta)| d\xi. \end{aligned}$$

这用到了积分核的第二个性. 令 $N \rightarrow \infty$ 可根据第三个性得到右边这项 $\rightarrow 0$, 然后再根据 ε 的任意性就可以得到

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|K_N * f - f\|_{L^1} = 0.$$

证毕.



Theorem 1.2.7 (连续点处的逐点收敛). 如果 $\{K_N(x)\}$ 是好的积分核, $f \in L^1(S^1)$ 且在 S^1 上一致有界, 那么在 f 的连续点 x 处有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} f * K_N(x) = f(x).$$

Proof. 做法和上面完全类似, 只不过这次对单点估计: 如果 x 是连续点, 那么对任意 $\varepsilon_f > 0$ 都存在 δ 使得对任意 $|y| \leq \delta$ 均有 $|f(x - y) - f(x)| \leq \varepsilon_f$. 再设 $|f|$ 在 S^1

上的一致上界为 P .

$$\begin{aligned}
 |f * K_N(x) - f(x)| &= \left| \int_{S^1} (f(x-y) - f(x)) K_N(y) d\xi \right| \\
 &\leq \int_{|y| \leq \delta} |f(x-y) - f(x)| |K_N(y)| d\xi \\
 &\quad + \int_{S^1 \setminus (-\delta, \delta)} |f(x-y) - f(x)| |K_N(y)| d\xi \\
 &\leq \varepsilon_f \cdot \int_{(-\delta, \delta)} |K_N(y)| d\xi + 2P \cdot \int_{S^1 \setminus (-\delta, \delta)} |K_N(y)| d\xi.
 \end{aligned}$$

根据积分核的后两条性质, 令 $N \rightarrow \infty$ 可得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} |f * K_N(x) - f(x)| \leq \varepsilon_f \cdot M.$$

再根据 ε_f 的任意性即得结论. $\square$

Corollary 1.2.8 ($C^0 \rightarrow \sigma_N(f)$ 一致收敛). 对 $f \in C^0(S^1)$, 有一致收敛 $f * F_N \rightrightarrows f$, 即

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \|f * F_N - f\|_{L^\infty} = 0.$$

从而 $\sigma_N(f)$ 一致收敛到 f .

Proof. 由于 S^1 是紧的, 所以连续性自动推出一致有界性, 从而根据上面的定理推得逐点收敛性. 回忆上面的证明, 由于 S^1 上的连续可推出一致连续, 所以可以选择一个一致的 δ 使得对任意 $x \in S^1$ 和 $|y| \leq \delta$ 均有 $|f(x-y) - f(x)| \leq \varepsilon_f$. 这就导致上面证明中逐点放缩可以替换成一致的放缩.

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|f * K_N(x) - f(x)\|_{L^\infty} \leq \varepsilon_f \cdot M.$$

这就推得了一致收敛性成立. $\square$

Corollary 1.2.9 (Weierstrass). 任意连续函数 $f \in C^0(S^1)$ 都可以一列三角多项式一致逼近. 或者说, 三角多项式在 $(C(S^1), \|\cdot\|_{L^\infty})$ 上稠密.

Proof. 这是因为如果我们展开 $\sigma_N(f)$ 就会发现它是一个有限项三角函数求和.

$$\sigma_N(f)(x) = \sum_{|k| \leq N} \left(1 - \frac{|k|}{N}\right) \hat{f}(k) e^{ikx}.$$

而对实值函数 f 有 $\widehat{f(-n)} = \overline{\widehat{f(n)}}$. 所以可以验证 $\sigma_N(f)$ 是实系数的三角多项式. $\square$

Remark. 我们可以用这个命题重新证明多项式版本的 Weierstrass 定理, 那个定理是对 $f \in C^0([a, b])$ 进行的, 我们把它的定义域平移到半圆周上, 然后用 Tietze 扩张定理连续延拓到整个 S^1 上. 最后我们可以把三角多项式写成级数的形式, 显然它可以用多项式一致逼近, 就完成了证明.

当然, 我们还可以证明 $F_N(f)$ 是恒同逼近核, 以得到更强的性质.

Proposition 1.2.10. $\{F_N(f)\}_{N \geq 1}$ 是一族恒同逼近核.

Proof. 只需证明后两条. 首先 $\frac{\sin \frac{N}{2}\theta}{\sin \frac{1}{2}\theta}$ 在 S^1 上只有可去间断点, 因此存在上界, 所以满足第二条性质. 又因为存在 c 使得 $|\sin \frac{1}{2}\theta| \geq |\theta|$ 成立, 把它放掉就得到一个二次的控制.

$$\frac{1}{N} \left(\frac{\sin \frac{N}{2}\theta}{\sin \frac{1}{2}\theta} \right)^2 \leq \frac{1}{N} \frac{1}{\frac{c}{2}\theta} = A \cdot \frac{1}{N\theta^2}.$$

注意到 Dirichlet 核只能给出一阶的控制, 从而不是恒同逼近核. $\left\langle \frac{1}{x} \right\rangle$

Corollary 1.2.11 (a.e.-逐点收敛). 对任意 S^1 上的可积函数 f , 均有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sigma_N(f) = f, \quad \text{a.e.}$$

1.3 Dirichlet 核与逐点收敛性

我们先从比较好的函数说起. 要想 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) e^{ikx}$ 收敛到 f , 首先我们需要它收敛, 一个非常直观的充分条件就是级数绝对收敛, 即 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(k)| < +\infty$. 这时如果 $f \in C(S^1)$ 就能推出一致收敛.

Proposition 1.3.1. 如果 $f \in C(S^1)$ 并且 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(k)| < +\infty$, 那么 f 对应的 Fourier 级数一致收敛到 f , 即 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) e^{ikx} \Rightarrow f(x)$.

Proof. 首先我们证明 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) e^{ikx}$ 一致收敛到一个函数, 这和 Fourier 理论无关. 只需证明 $S_N(f)$ 是 L^∞ 空间中的 Cauchy 列. 对任意 $q > p \geq N$, 我们有

$$\|S_p(f) - S_q(f)\|_{L^\infty} = \left\| \sum_{p < |k| \leq q} \hat{f}(k) e^{ikx} \right\|_{L^\infty} \leq \sum_{p < |k| \leq q} |\hat{f}(k)| \leq \sum_{|k| \geq N} |\hat{f}(k)|.$$

后者在 $N \rightarrow +\infty$ 时显然 $\rightarrow 0$, 所以我们可以设 $S_N(f) \Rightarrow g$. 接下来证明很有意思: 我们可以研究 g 的 Fourier 级数, 并证明系数序列也是 $\{\hat{f}(k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$. 证明很简单, 因为

$$\langle S_N(f), e^{ikx} \rangle = \int \sum_{|m| \leq N} \hat{f}(m) e^{imx} \cdot e^{-ikx} d\xi = \hat{f}(k)$$

对一切 $N \geq k$ 成立, 所以两边取极限就可知 $\hat{g}(k) = \hat{f}(k)$. 于是我们需要一个引理. $\left\langle \frac{1}{x} \right\rangle$

Lemma 1.3.2 (Fourier 系数的唯一性). 如果 $f \in L^1(S^1)$ 满足 $\hat{f}(k) = 0$ 对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 成立, 那么 $f = 0$, a.e. 也即在 L^1 空间中有 $f = 0$.

Proof. 根据题意, $\int_{S^1} f(x)e^{-ikx} d\xi = 0$ 对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 成立. 对任意连续函数 $h \in C^0(S^1)$, 根据推论 1.2.9, 对任意 N 均有

$$\int_{S^1} f(x)\sigma_N(h)(x) d\xi = 0.$$

从而根据 $\sigma_N(h)(x) \rightrightarrows h$ 和 $f \in L^1$ 可知 $\int_{S^1} f(x)h(x) dx = 0$. 再根据连续函数在 L^1 空间中稠密, 可取一系列连续函数逼近 f , 从而得到 $\int_{S^1} f^2(x) d\xi = 0$, 这给出 $f(x) = 0, \text{a.e.}$ 证毕. $\square$

Remark. 我们这里没有循环论证, 一句话来说相当于“三角多项式在 C^0 中稠密, 而 C^0 又在 L^1 中稠密”来推出需证的命题.

回到原题, 根据 f, g 的连续性可知 $f = g$, 从而 $S_N(f) \rightrightarrows f$, 证毕. $\square$

Remark. 上面的证明其实也可以在 $f \in L^1(S^1)$ 时进行, 此时级数一致收敛到的函数 g 满足 $f = g, \text{a.e.}$ 特别地, 这给出 f 和一个连续函数几乎处处相等, 这对于可积函数来说是非平凡的.

但是即使在 $f \in C^0$ 时, Fourier 级数也可以在单点处有很坏的性质, 下面的 du Bois-Reymond 反例就是一个 Fourier 级数在 0 处不收敛的连续函数的例子.

Example 1.3.3 (du Bois-Reymond). 构造的大概想法是这样的:

- 我们把 Fourier 级数比作一些“波”的叠加, 我们现在构造一个函数 f , 它不是波的叠加, 而是所谓“波包”的叠加. 我们让波包内部是震荡的, 但波包整体是收敛的. 这样对波包叠加后得到的级数 f 收敛, 但是如果把它用 Fourier 系数分解成波, 就会受到内部震荡的影响, 从而导致 Fourier 级数不是收敛的.

具体而言, 一个波包是说

$$W_K(x) = e^{i(2K)x} \sum_{1 \leq |k| \leq K} \frac{e^{ikx}}{k}.$$

整体来看, 类似 Abel 求和的想法, 我们可以推得当 $x \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{k} \right| &= \left| \sum_{k=1}^{\infty} (e^{ix} + \cdots + e^{ikx}) \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \right| \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{e^{i(k+1)x} - e^{ix}}{e^{ix} - 1} \cdot \frac{1}{k(k+1)} \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{|e^{ix} - 1|} \cdot \frac{1}{k(k+1)}. \end{aligned}$$

其中 $x \neq 0$ 时 $e^{ix} - 1$ 是非零常值. 这意味着, 存在一个仅和 x 有关的常数 $C(x)$, 使得

$$|W_K(x)| < C(x), \quad \forall K \in \mathbb{N}^*.$$

当 $x = 0$ 时正负抵消, 我们直接有 $W_K(0) = 0$, 从而也是满足上式的. 定义

$$f(x) = \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{l^2} \cdot W_{K_l}(x).$$

那么在每点处, $f(x)$ 都是绝对收敛的级数, 并且可以证明函数项级数收敛到一个连续函数 f .

接下来我们更细地去看每一个波包. 首先我们选取 K_{l+1} 远大于 K_l 从而使得每个波包是不交的, 这能够立即让我们写出 f 对应的 Fourier 系数: 如果对某个 l 有 $k = K_l + c$ 那么 $\hat{f}(k) = \frac{1}{l^2 c}$. 现在我们来考虑 $S_{2K_l}(f)(0) = \frac{1}{l^2} \sum_{|k| \leq 2K_l} \hat{f}(k)$: 第 l 个波包之前的频率已经完全抵消了, 第 l 个波包恰好经过了一半, 频率之和恰好是调和级数 $-\frac{1}{l^2} \sum_{i=1}^{K_l} i^{-1}$. 但我们知道调和级数是发散的, 差不多是 $\log K_l$ 这个量级, 所以我们只需要取 K_l 足够大使得比如说 $\log K_l > l^3$, 那么就可以让 $S_{2K_l}(f)(0)$ 发散, 进而使 Fourier 级数在 0 处不收敛.

Dirichlet 核与 Fejer 核最大的区别在于它不是恒正的, 从而只能通过震荡来在积分层面上控制函数. 这样的想法当然能让我们联想到经典的 Riemann-Lebesgue 引理.

Theorem 1.3.4 (Riemann-Lebesgue). 对任意正长度区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 和 $f \in L^1([a, b])$, 均有

$$\lim_{|N| \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) e^{iNx} dx = 0.$$

Proof. 想法是进行逼近, 我们注意到 $C^1([a, b])$ 在 L^1 空间中是稠密的, 先对 C^1 函数证明结论:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) e^{iNx} dx &= \frac{1}{iN} \int_a^b f(x) (e^{iNx})' dx \\ &= \frac{1}{iN} \left((f(x) e^{iNx}) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x) e^{iNx} dx \right). \end{aligned}$$

我们直接取模长, 那么第一项模长小于等于 $|f(a)| + |f(b)|$, 根据 C^1 性 $f'(x)$ 也是可积的, 因此第二个积分的模长也存在上界, 令 $|N| \rightarrow \infty$ 当然得到极限为 0.

剩下的部分完全就是逼近. 只需注意到

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) e^{iNx} dx \right| &\leq \left| \int_a^b (f(x) - g(x)) e^{iNx} dx \right| + \left| \int_a^b g(x) e^{iNx} dx \right| \\ &\leq \|f - g\|_{L^1} + \left| \int_a^b g(x) e^{iNx} dx \right| \end{aligned}$$

然后取 $g \in C^1$ 使得 $\|f - g\|_{L^1}$ 足够小即可.



这当然可以推出对 S^1 上的可积函数有类似的事情成立, 然后取实虚部又可知结论对三角函数成立.

Corollary 1.3.5 (Fourier 系数归零). 对任意 $f \in L^1(S^1)$, 均有 $\lim_{|N| \rightarrow \infty} \widehat{f}(N) = 0$, 即 Fourier 系数最终会趋于零.

上面的证明也指出, 当 f 的正则性更好时, 用分部积分可以推得更强的收敛性质. 事实上 f 和 f' 的 Fourier 系数有如下关系:

Proposition 1.3.6. 如果 $f \in C^1(S^1)$, 记 $g = f' \in C^0(S^1)$. 则

$$\widehat{g}(n) = \mathbf{i}n \widehat{f}(n)$$

特别地由于 Fourier 系数总是一致有界的, 我们可以得到 $\widehat{f}(n) = O(n^{-1})$. 更一般地, 当 $f \in C^k(S^1)$ 时 $\widehat{f}(n) = O(n^{-k})$. 每多一阶可微性, Fourier 系数的衰减就快一阶.

Proof. 因为 S^1 是闭流形, 计算边界时候会直接 vanish 掉, 所以当 $N \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} \int_{S^1} f(x) e^{-\mathbf{i}Nx} d\xi &= \frac{1}{-\mathbf{i}N} f(x) (e^{-\mathbf{i}Nx})' d\xi = \frac{1}{-\mathbf{i}N} \cdot - \int_{S^1} f'(x) e^{-\mathbf{i}Nx} d\xi \\ &= \frac{1}{\mathbf{i}N} \cdot \widehat{g}(N). \end{aligned}$$

当 $N = 0$ 时自然有 $\int_{S^1} f'(x) d\xi = 0$, 这就完成了证明. $\square$

有一个自然的问题是, 是否对每个序列 $\{a_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 都能找到一个可积函数 $f \in L^1(S^1)$ 使得 $\{\widehat{f}(k)\}_{k \in \mathbb{Z}} = \{a_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$? 根据定理 1.3.4 和 1.1.2, 我们知道 a_k 必须有界且 $\lim_{|k| \rightarrow \infty} a_k = 0$. 但是这足够吗? 下面一个非常技巧性的手法给出了另一个广泛满足的性质, 所以这个问题并非简单.

Example 1.3.7 (原函数的 Fourier 级数). 我们知道 S^1 上函数 f 存在原函数当且仅当 $\int_{S^1} f d\xi = 0$, 这样我们可以从 0 开始比如说定义

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt,$$

那么确实有 $F(0) = F(2\pi)$, 即定义是良好的. 利用 Fubini 定理, 我们可以计算 $\widehat{F}$ 的 Fourier 系数.

$$\begin{aligned} \widehat{F}(0) &= \int_{S^1} \left(\int_0^x f(t) dt \right) d\xi_x = \int_{S^1} (2\pi - x) f(x) d\xi_x \\ &= - \int_{S^1} x f(x) d\xi_x, \\ \widehat{F}(k) &= \int_{S^1} \left(\int_0^x f(t) dt \right) e^{-\mathbf{i}kx} d\xi_x = \int_{S^1} \left(\int_t^{2\pi} e^{-\mathbf{i}kx} dx \right) f(t) d\xi_t \\ &= \int_{S^1} \left(\frac{1}{-\mathbf{i}k} e^{-\mathbf{i}kx} \Big|_t^{2\pi} \right) f(t) d\xi_t = \frac{1}{\mathbf{i}k} \int_{S^1} e^{-\mathbf{i}kt} f(t) d\xi_t \\ &= \frac{1}{\mathbf{i}k} \widehat{f}(k). \end{aligned}$$

注意当 $k \neq 0$ 时, 这和“求导运算”给出的 Fourier 系数之间的关系是吻合的. 对原函数利用 Féjer 核一致收敛性 1.2.8, 得到一个不平凡的结果:

$$\begin{aligned}\sigma_N(F)(x) &= \sum_{|k| \leq N} \left(1 - \frac{|k|}{N}\right) \widehat{F}(k) e^{ikx} \\ &= \widehat{F}(0) + \sum_{1 \leq |k| \leq N} \left(1 - \frac{|k|}{N}\right) \cdot \frac{1}{ik} \widehat{f}(k) e^{ikx} \\ &= \widehat{F}(0) + \sum_{1 \leq |k| \leq N} \frac{\widehat{f}(k)}{ik} e^{ikx} - \sum_{1 \leq |k| \leq N} \frac{|k|}{iNk} \widehat{f}(k) e^{ikx}.\end{aligned}$$

令 $N \rightarrow \infty$, 左边就一致收敛到 $F(x)$. 此时, 由 $\lim_{N \rightarrow \infty} \left| \widehat{f}(k) \right| \rightarrow 0$ 容易得到

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{1 \leq |k| \leq N} \left| \widehat{f}(k) \right| \rightarrow 0.$$

因此上式可化简为

$$F(x) = \widehat{F}(0) + \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{1 \leq |k| \leq N} \frac{\widehat{f}(k)}{ik} e^{ikx}.$$

令 $x = 0$, 根据 $F(0) = 0$, 上式可转化为

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{1 \leq |k| \leq N} \frac{\widehat{f}(k)}{k} \right) = -i \widehat{F}(0) = i \int_{S^1} x f(x) d\xi.$$

由 f 可积可得 $xf(x)$ (在 S^1 上可积), 因而

$$\sum_{|k| \geq 1} \frac{\widehat{f}(k)}{k}$$

极限存在, 这给出了不同于之前的一条限制, 比如当 $a_k \sim \frac{1}{\log|k|}$ 时, 就不存在适配的一个 f , 因为 $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k \log k}$ 发散.

Week 2:2025/9/15 2025/9/17

下面证明 Dirichlet 核有类似 Riemann-Lebesgue 引理的性质.

Lemma 1.3.8 (局部化引理). 设 $f \in L^1(S^1)$, 则对任意 $x \in S^1$ 以及 $\delta > 0$, 有

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{\delta \leq |y| \leq \pi} D_N(y) f(x-y) dy = 0.$$

Proof. 我们把问题转化为 Riemann-Lebesgue 引理.

$$\begin{aligned} \int_{\delta \leq |y| \leq \pi} D_N(y) f(x-y) dy &= \int_{\delta \leq |y| \leq \pi} \frac{\sin(N + \frac{1}{2})y}{\sin \frac{y}{2}} f(x-y) dy \\ &= \int_{\delta \leq |y| \leq \pi} \sin(N + \frac{1}{2})y \cdot \frac{f(x-y)}{\sin \frac{y}{2}} dy. \end{aligned}$$

注意到当 $\delta \leq |y| \leq \pi$ 时 $\sin \frac{y}{2}$ 有一致下界 $\sin \frac{\delta}{2}$, 从而使 $\frac{f(x-y)}{\sin \frac{y}{2}} \in L^1$, 利用 Riemann-Lebesgue 引理即得结论. $\square$

上面的命题告诉我们, Dirichlet 卷积后的结果只和它很小一个范围内的积分有关,

$$f * D_N = \int_{|y| \leq \delta} D_N(y) f(x-y) dy + \int_{|y| \geq \delta} D_N(y) f(x-y) dy$$

后者在 $N \rightarrow +\infty$ 的意义下 $\rightarrow 0$, 我们希望前者在 $N \rightarrow \infty$ 时是收敛的. 由于只需要在 y 很小的情况下讨论, 所以 $(\sin \frac{y}{2})^{-1}$ 可以归结为对 $2y^{-1}$ 的讨论, 即: 只要 f 的正则性可以让 $y^{-1}f(x-y)$ 变得可积, $S_N(f)(x)$ 就有收敛点. 这可以总结成如下的定理:

Theorem 1.3.9 (Dini). 设 f 在 S^1 上可积, 并且存在常数 c 以及 $\delta > 0$ 使得在 x_0 处有

$$\int_0^\delta \frac{|f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2c|}{t} dt < +\infty,$$

那么 $S_N(f)(x_0)$ 收敛到一点, 且 $\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N(f)(x_0) = c$.

这个命题大概是说, 只需要 c 和 $\frac{1}{2}(f(x_0+t) + f(x_0-t))$ 足够接近, 其误差关于 $\frac{1}{t} dt$ 可积, 就可以良好地给出收敛性.

Proof. 我们首先利用局部化引理, 把 $(-\delta, \delta)$ 之外的部分排除.

$$\begin{aligned} S_N(f)(x_0) - c &= \int_{S^1} D_N(y) f(x-y) \frac{dy}{2\pi} - c = \int_{S^1} D_N(y) (f(x-y) - c) \frac{dy}{2\pi} \\ &= \int_{-\delta}^\delta D_N(y) (f(x-y) - c) \frac{dy}{2\pi} + \int_{|y| \geq \delta} D_N(y) (f(x-y) - c) \frac{dy}{2\pi}. \end{aligned}$$

我们已经证明了

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\left| \int_{|y| \geq \delta} D_N(y) f(x-y) \frac{dy}{2\pi} \right| + \left| c \cdot \int_{|y| \geq \delta} D_N(y) \frac{dy}{2\pi} \right| \right) = 0.$$

然后根据 $D_N(y) = \frac{\sin(N+\frac{1}{2})y}{\sin\frac{1}{2}y}$ 的偶性, 积分就能化为

$$\begin{aligned}\int_{-\delta}^{\delta} D_N(y)(f(x-y)-c)\frac{dy}{2\pi} &= \int_0^{\delta} D_N(y)(f(x-y)+f(x+y)-2c)\frac{dy}{2\pi} \\ &= \int_0^{\delta} \sin(N+\frac{1}{2})y \cdot \frac{f(x-y)+f(x+y)-2c}{\sin\frac{1}{2}y} \frac{dy}{2\pi}.\end{aligned}$$

根据条件, 右边的函数是可积的 (存在 $\square$ 使得 $\sin\frac{1}{2}y \geq \square \cdot y$ 对 $y \in [0, \delta)$ 成立), 因此使用 Riemann-Lebesgue 引理就能完成证明. $\square$

它的一个推论是下述结果:

Proposition 1.3.10. 如果存在常数 $0 < \alpha \leq 1$, $\delta > 0$ 以及 c_+, c_- 使得

$$|f(x_0+t)-c_+|+|f(x_0-t)-c_-| \leq C \cdot t^\alpha, \quad \forall t \in (0, \delta),$$

那么 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(f)(x_0) = \frac{c_++c_-}{2}$.

Proof. 条件直接推出

$$\frac{|f(x_0+t)+f(x_0-t)-c_+-c_-|}{t} \leq C \cdot t^{\alpha-1}.$$

当 $\alpha-1 \in (-1, 0]$ 时, $t^{\alpha-1}$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 于是 Dini 定理 1.3.9 的条件满足, 于是收敛性成立. $\square$

Corollary 1.3.11. 对任意 $f \in C^\alpha(S^1)$, $0 < \alpha \leq 1$ 均有 $S_N(f)$ 逐点收敛到 f . 其中 $C^\alpha(S^1)$ 表达的是 S^1 上的 α -Hölder 连续函数.

实际上还能证明更强的命题成立, 逐点收敛可以被替换成一致收敛 $S_N(f) \Rightarrow f$! Bernstein 证明了 $\alpha > \frac{1}{2}$ 时的情形, 证明很有调和分析的味道, 进行二进分拆估计 (上学期证明一个命题时也用到).

Theorem 1.3.12 (Bernstein). 对 $\alpha \in (\frac{1}{2}, 1]$ 及任意 S^1 上的 C^α -Hölder 连续函数 f , 其 Fourier 系数绝对收敛到 f .

Proof. 我们的目标是证明 $\sum |\widehat{f}(k)| < +\infty$, 从而根据命题 1.3.1 可推得一致收敛性. 根据逐点收敛的结论我们有

$$f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(k) e^{ikx}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

则对任意 $h \in \mathbb{R}$, 有

$$f(x+h)-f(x-h) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(k) e^{ikx} 2i \sin(kh).$$

固定 h , 将其看成一个新的关于 x 的函数, 其第 k 个 Fourier 系数是 $2i \sin(kh) \widehat{f}(k)$. 从而根据 Parseval 恒等式 (我也不知道 ysw 为什么的编排方式为什么会在没讲它的时候证明这个命题?):

$$\|f(x+h)-f(x-h)\|_{L^2} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |2i \sin(kh) \widehat{f}(k)|^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} 4 |\widehat{f}(k)|^2 |\sin(kh)|^2. \quad (1)$$

另一方面, 根据 C^α 收敛性质, $f(x+h) - f(x-h) \leq C \cdot |h|^\alpha$, 所以存在常数 C 使得

$$\|f(x+h) - f(x-h)\|_{L^2} \leq C \cdot |h|^{2\alpha}. \quad (2)$$

(1)(2) 结合得到一个关于 $\sum |\hat{f}(k)|^2$ 和 h 的不等式, 并且 h 可以自取. 接下来进行二进分拆, 根据

$$\sin \frac{k\pi}{2^{p+1}} \geq \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \forall k \in [2^{p-1}, 2^p);$$

令 $h = \frac{\pi}{2^{p+1}}$, 把 $[2^{p-1}, 2^p)$ 以外含 k 的项都放为 0:

$$C \cdot \frac{\pi^{2\alpha}}{2^{2(p+1)\alpha}} \geq \sum_{2^{p-1} \leq |k| < 2^p} \left(\sin \frac{k\pi}{2^{p+1}} \right)^2 |\hat{f}(k)|^2 \geq \sum_{2^{p-1} \leq |k| < 2^p} \frac{1}{2} |\hat{f}(k)|^2.$$

然后把平方放成线性和:

$$\left(\sum_{2^{p-1} \leq |k| < 2^p} |\hat{f}(k)| \right)^2 \leq 2^{p-1} \left(\sum_{2^{p-1} \leq |k| < 2^p} |\hat{f}(k)|^2 \right) \leq 2^{(1-2\alpha)p-2\alpha} \pi^{2\alpha}.$$

当 $\alpha > \frac{1}{2}$ 时和 p 有关的求和是收敛的. 即

$$\begin{aligned} \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(k)| &= |\hat{f}(0)| + \sum_{p=1}^{\infty} \left(\sum_{2^{p-1} \leq |k| < 2^p} |\hat{f}(k)| \right) \\ &\leq |\hat{f}(0)| + \sum_{p=1}^{\infty} 2^{\frac{1-2\alpha}{2}p-\alpha} \pi^\alpha \\ &\leq |\hat{f}(0)| + 2^{-\alpha} \pi^\alpha \frac{2^{\frac{1-2\alpha}{2}}}{1 - 2^{\frac{1-2\alpha}{2}}} < +\infty. \end{aligned}$$

证毕. $\square$

当 $\alpha \in (0, \frac{1}{2}]$ 时, 如果 f 具有有界变差性 (从而可以放出另一个界), 仍然可以得到绝对收敛.

Proposition 1.3.13 (Zygmund). 对 $\alpha \in (0, \frac{1}{2}]$ 以及任意 S^1 上的 C^α -Hölder 连续函数 f , 如果 f 还是有界变差函数, 那么其 Fourier 系数一致收敛到 f .

最后我们来看有界变差函数, 或者说单调函数的 Fourier 级数收敛性. 我们知道有界变差函数总是 L^1 的, 并且每点的左右极限均存在. (直接利用有界变差函数能被写为两个单调函数之差即可) 可以猜到结论是如下的 Jordan 定理:

Theorem 1.3.14 (Jordan). 给定有界变差函数 $f \in BV(S^1)$, 则对任意 $x_0 \in S^1$ 均有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(f)(x_0) = \frac{f^+(x_0) + f^-(x_0)}{2}.$$

Proof. 首先把问题还变成分积分形式:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{S^1} D_N(y) \left(f(x_0 - y) - \frac{f^+(x_0) + f^-(x_0)}{2} \right) d\xi = 0.$$

根据局部化引理 1.3.8, 只需证明存在 $\delta > 0$ 使得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{(-\delta, \delta)} D_N(y) \left(f(x_0 - y) - \frac{f^+(x_0) + f^-(x_0)}{2} \right) \frac{dy}{2\pi} = 0.$$

根据 $D_N(y)$ 的偶性, 上式可转化为

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^\delta D_N(y) (f(x_0 + y) + f(x_0 - y) - f^+(x_0) - f^-(x_0)) \frac{dy}{2\pi} = 0$$

从而根据对称性只需证 (注意到 $f^+(x_0)$ 只和 x_0^+ 附近的值有关, 两边独立)

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^\delta D_N(y) (f(x_0 + y) - f^+(x_0)) \frac{dy}{2\pi} = 0. \quad (1)$$

接下来注意到 (1) 式关于函数 f 是线性的, 而根据有界变差函数的结构定理可知 f 能写成两个单调函数的差, 因此我们只需对单调函数证明 (1) 即可. (严格来说 S^1 上没法定义单调函数, 只有在局部上讨论时才能这么看) 记 $g(y) = f(x_0 + y) - f^+(x_0)$, 那么 $\lim_{y \rightarrow 0^+} g(y) = 0$. 并且 g 是单调增函数. 现在我们把 $D_n(y)$ 的具体表达式写出来, (1) 就转化为

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^\delta \frac{\sin(N + \frac{1}{2})y}{\sin \frac{1}{2}y} g(y) \frac{dy}{2\pi} = 0.$$

当 δ 足够小时 $\sin \frac{1}{2}y$ 是单调的, 我们希望把它严格地换成 $\frac{1}{2}y$. 利用下述不等式:

$$\frac{2}{y} \leq \frac{1}{\sin \frac{1}{2}y} \leq \frac{2}{y} + \frac{y}{6}, \quad \forall 0 < y \leq \pi.$$

从而

$$\int_0^\delta \sin \left((N + \frac{1}{2})y \right) g(y) \left| \frac{1}{\sin \frac{1}{2}y} - \frac{2}{y} \right| dy \leq \int_0^\delta \frac{y}{6} g(y) dy \leq \frac{\delta^2}{6} g(\delta).$$

这就说明了把 $\sin \frac{1}{2}y$ 替换成 $\frac{1}{2}y$ 后得到的结果接近. 接下来利用第二积分中值定理: 由于 $g(y)$ 非负单调, 故存在 $c \in [0, \delta]$ 使得

$$\int_0^\delta \frac{\sin(N + \frac{1}{2})y}{y} g(y) dy = g(\delta) \int_c^\delta \frac{\sin(N + \frac{1}{2})y}{y} dy.$$

进一步地,

$$\int_c^\delta \frac{\sin(N + \frac{1}{2})y}{y} dy = \int_{(N + \frac{1}{2})c}^{(N + \frac{1}{2})\delta} \frac{\sin t}{t} dt.$$

而函数 $F(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$ 是有界的, 所以上式存在一致上界, 综上存在一致常数 M 使得

$$\left| \int_0^\delta D_N(y) g(y) \frac{dy}{2\pi} \right| \leq M \cdot g(\delta)$$

成立. 根据 δ 选取的任意性就可知上式只能为 0, 证毕.



1.4 L^p 空间和 Fourier 级数

对任意测度空间 $(X, \mathcal{F}, \mu)$, 除了 L^1 之外还可以定义 L^p 空间的概念. L^p 空间是线性的 Banach 空间. 对 $1 < p < +\infty$, 可以定义

$$\|f\|_{L^p} = \left(\int |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

那么 L^p 空间就是在 a.e. 相等的意义下所有 L^p 范数有限的函数构成的空间. 可以证明 Minkovski 不等式 $\|f+g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}$ 成立, 因而良好定义了一个范数. 当 $p = +\infty$ 时, 可以定义 L^∞ 空间, 其范数为本性上界

$$\|f\|_{L^\infty} = \inf \{M \mid m(\{x : |f(x)| > M\}) = 0\}.$$

根据 Hölder 不等式, $\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^{p'}}$ 对 $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$ 成立. 事实上 L^p 和 $L^{p'}$ 在某种意义上构成对偶空间, 在对偶空间上的二元运算 $(f, g) \mapsto \int fg$ 具有好的性质, 特别地, L^2 空间和自身对偶. 从而如果 $f, g \in L^2$ 则 $fg \in L^1$. L^2 空间上带有完备的内积

$$\langle f, g \rangle = \int fg dx.$$

它构成所谓的 Hilbert 空间. 这个空间把分析性质和线性代数的性质结合在一起.

Definition 1.4.1 (Hilbert 空间). Hilbert 空间是**可分的完备内积空间**. (可分就是为了让空间有可数的“基”.)

Example 1.4.2. 除了上面的 L^2 空间之外, 在序列空间上也能定义内积. 定义 ℓ^2 空间是

$$\ell^2 = \left\{ \{a_k\}_{k=1}^\infty \mid \sum_{k=1}^\infty |a_k|^2 < +\infty \right\}.$$

那么 $\langle a, b \rangle = \sum_{k=1}^\infty a_k b_k$ 就是一个良好定义的内积.

其实 ℓ^2 也是某种意义下的 L^2 空间, 这是在测度空间 $(\mathbb{Z}, \mathcal{P}(\mathbb{Z}), \#)$ 上考虑 L^2 性所得结果. 其中 $\#$ 是计数测度, 就满足 $\#S = |S|$.

Hilbert 空间上的运算和线性空间上的运算的最大区别是, 线性空间中只能做有限线性组合, 但是 Hilbert 空间中

$$\sum_{k=1}^\infty a_k e_k$$

是有定义的, 即可作无穷求和. 我们关心的基也不是选择公理求出的基, 而是在无穷求和的意义下的一组基. 虽然这么说, 但反而在允许无穷求和后事情变得更加直观, 而且我们所想象中基的性质都是满足的.

Definition 1.4.3 (标准正交基). 给定 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$, 如果 $f, g \in \mathcal{H}$ 满足 $\langle f, g \rangle = 0$ 则称它们**正交**. 如果有一个至多可数集 $\{e_k\}$ 其中元素两两正交, 则称其为一个**正交系**. 如果 $\|e_k\| = 1$ 对任意 k 成立则称其为**标准正交系**. 如果标准正交系 $\{e_k\}$ 的有限维线性组合在 $\mathcal{H}$ 中稠密, 那么称其为一组**标准正交基**.

Theorem 1.4.4. 给定 $\{e_k\}$ 为 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的标准正交系. TFAE:

- (1) $\{e_k\}$ 为标准正交基;
- (2) 如果 $f \in \mathcal{H}$, $\langle f, e_k \rangle = 0$ 则 $f = 0$ (无穷和系数的唯一性);
- (3) 对任意 $f \in \mathcal{H}$ 均有 $f = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, e_k \rangle e_k$, 即有限和 $S_N(f) = \sum_{k=1}^N \langle f, e_k \rangle e_k$ 收敛到 f 本身.
- (4) 对任意 $f \in \mathcal{H}$ 有 Parseval 恒等式 $\|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2$.

Proof. (1) $\Rightarrow$ (2): 只需证明 $\|f\| = 0$. 根据有限维线性组合的稠密性, 对任意 $\varepsilon > 0$ 均存在 N 与 $a_1, \dots, a_N$ 使得

$$\left\| f - \sum_{k=1}^N a_k e_k \right\| < \varepsilon.$$

但是根据条件有 $\langle f, \sum_{k=1}^N a_k e_k \rangle = 0$, 所以上式推出 $\|f\| < \varepsilon$, 根据 ε 的任意性可得 $\|f\| = 0$.

(2) $\Rightarrow$ (3): 我们证明 $S_N(f)$ 构成一个 Cauchy 列. 这是因为 $S_N(f)$ 是 f 在某个有限维线性空间中的投影, 因此其范数不超过 f 的范数, 而后者有限.

$$\langle f, S_N(f) \rangle = \sum_{k=1}^N \langle f, \langle f, e_k \rangle e_k \rangle = \sum_{k=1}^N \langle f, e_k \rangle^2 = \langle S_N(f), S_N(f) \rangle.$$

因此 $\langle f - S_N(f), S_N(f) \rangle = 0$, 所以 $\|S_N(f)\| \leq \|f\|$. 很明显 $\{\|S_N(f)\|\}_{N \geq 1}$ 是单调增列, 因此也是 Cauchy 列. 这样根据

$$\|S_N(f) - S_M(f)\|^2 = \|S_N(f)\|^2 - \|S_M(f)\|^2, \quad N > M;$$

所以 $\{S_N(f)\}_{N \geq 1}$ 也是 Cauchy 列, 它收敛到一个函数 g . 最后由于

$$\langle g, e_k \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \langle g, S_N(f) \rangle = \langle f, e_k \rangle$$

结合上条件 (2) 就证明了 $f = g$.

(3) $\Rightarrow$ (4): 这时因为对任意 $\varepsilon > 0$ 都存在 N 使得 $\|f - S_N(f)\| < \varepsilon$, 这推出 $\sum_{k=1}^N |\langle f, e_k \rangle|^2 > \|f\|^2 - \varepsilon$. 根据 ε 的任意性以及上面过程中已经证明的 $\|f\| \geq \sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, e_k \rangle|^2$ 恒成立就得到结论.

(4) $\Rightarrow$ (1): 还是因为 $S_N(f)$ 和 $f - S_N(f)$ 正交, 所以对任何 $\varepsilon > 0$ 都可以使 N 使得 $\|f\|$ 和 $\|S_N(f)\|$ 足够接近, 这就使得 $\|f - S_N(f)\| < \varepsilon$, 从而推得稠密性. $\square$

Remark. 根据上述证明, 只要取定一组 Hilbert 基, 那么 L^2 空间内的所有函数 f 和它的系数 $\{\langle f, e_k \rangle\}_{k \geq 1}$ 之间是一一对应的 (当然在有限维时也有类似的事情成立, 但利用到函数空间上是不是就觉得很非平凡了呢) 并且线性结构, 内积结构都被这个对应所保持. 这就意味着, 所有 Hilbert 空间都同构于典范的 ℓ^2 空间. 反过来, 只要系数 $\sum |a_k|^2 < +\infty$, 他就决定了一个 $f \in L^2$.

代回到经典的 Fourier 级数理论, 我们就是讨论 $\{e^{ikx}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 是否构成一组 Hilbert 基. 前面的引理 1.3.2 已经说明了在 L^1 空间中如果 $\langle f, e^{ikx} \rangle = 0$ 那么可以推出 $f = 0$, a.e. 由于 $L^2 \subset L^1$, 这就证出了上面定理 1.4.4 中的第二条. 从而, 我们关心的 Fourier 级数收敛问题在 L^2 空间上是恒成立的.

对任意一组标准正交基, 我们都可以构造类似的 Fourier 分解并给出相应的 Parseval 恒等式. 比如把 $\{\cos kx\}$ 和 $\{\sin kx\}$ 拼起来也是一组标准正交基, 比如说对 $\{1, x, x^2, \dots\}$ 利用 Gram-Schmidt 正交化. 对 Hilbert 空间这个正交化仍然可以有效进行, 是基于下面的定理:

Theorem 1.4.5. 任何 Hilbert 空间都有标准正交基. 特别地, 这推出任何无穷维 Hilbert 空间都同构于 ℓ^2 空间.

Proof. 首先我们可以取出可数个线性无关的函数 $f_1, f_2, \dots$ 满足 $\overline{\text{span} f_i} = \mathcal{H}$. 然后把它逐个进行正交化: 如果某个 f_i 包含于其它 f_j 张成的线性空间的闭包的话, 就把它删去; 否则把它标准正交化使得其范数为 1, 并且和它之前的 f_i 均垂直. 可数步操作后得到的 $\tilde{f}_i$ 是正交系并且仍满足 $\overline{\text{span} \tilde{f}_i} = \mathcal{H}$, 所以是标准正交基. $\square$

Example 1.4.6. 在以前的作业中曾出现过 Legendre 多项式和 Hermite 多项式, 其实它们都是正交系.

在 $L^2([-1, 1], dx)$ 中对单项式 $\{1, x, x^2, x^3\}$ 进行正交化得到 Legendre 多项式

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n).$$

在 $L^2(\mathbb{R}, e^{-x^2} dx)$ 上对 $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$ 进行正交化得到 Hermite 多项式

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}.$$

Week 3: 2025/9/22 2025/9/24

我们知道在有限维内积空间中对任何线性函数 f , 均存在它在空间中的一个对偶 x_0 使得 $f = \langle \cdot, x_0 \rangle$. Riesz 表示定理证明了在 Hilbert 空间中有类似的事情成立.

Theorem 1.4.7 (Riesz). T 是 $\mathcal{H}$ 上的有界线性函数, 即

$$|T(x)| \leq C \|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{H}.$$

那么存在 $x_0 \in \mathcal{H}$ 使得 $T(x) = \langle x, x_0 \rangle$.

Proof. 首先回忆线性空间情形的证明, 这是因为实内积作为非退化的双线性函数 $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 诱导了线性单射 $V \rightarrow [V \rightarrow \mathbb{R}] = V^*$. 在无穷情形下这未必是同构, 有限维时根据 $\dim V = \dim V^*$ 得到同构关系. 如果要具体写出对应的 x_0 , 注意到 $\text{codim ker } f = 1$, 所以只要取出向量 $x_0 \in (\text{ker } f)^\perp$ 并满足 $T(x_0) = 1$, 那么就有 $T(x) = \langle x, x_0 \rangle$. 在 Hilbert 空间中方法完全类似.

定义线性子空间

$$\mathcal{H}_0 = \ker T.$$

我们想证明正交分解成立, 即对任意 $x \in \mathcal{H}$ 都有分解

$$x = x_0 + x_1, \quad x_0 \in \mathcal{H}_0, x_1 \perp \mathcal{H}_0.$$

有限维时我们可以考虑子空间的一组标准正交基 $\{e_i\}$ 并用 $\sum \langle x, e_i \rangle e_i$ 来表示 x_0 , 在 Hilbert 空间中需要证明它收敛到 $\mathcal{H}_0$ 中.

不过还有一种更自然的方法来看这件事: x 往 $\mathcal{H}_0$ 的投影 x_0 是使得 $\|x - x_0\|$ 最小的一个 $x_0 \in \mathcal{H}$. 而这件事很容易在 Hilbert 空间下考虑: 定义

$$d(x, \mathcal{H}_0) = \inf_{y \in \mathcal{H}_0} \|x - y\|.$$

我们证明下确界一定能被取到. 先取一列 $\{y_n\}_{n \geq 1}$ 使得 $\{\|y_n - x\|\}_{n \geq 1} \rightarrow d(x, \mathcal{H}_0)$, 我们先证明 $\{y_n\}$ 是 Cauchy 列. 注意到直接放三角不等式不等号是反的, 这里我们运用平行四边形法则

$$\begin{aligned} \|y_n - y_m\|^2 &= \|(y_n - x) - (y_m - x)\|^2 \\ &= 2\|y_n - x\|^2 + 2\|y_m - x\|^2 - \|y_n + y_m - 2x\|^2 \\ &\leq 2\|y_n - x\|^2 + 2\|y_m - x\|^2 - 4d(x, \mathcal{H}_0)^2. \end{aligned}$$

从而 $\|y_n - y_m\|$, $n, m > N$ 在 N 足够大时可以任意小, 所以 $\{y_n\}$ 是 Cauchy 列, 设 $\{y_n\} \rightarrow x_0$. 但 x_0 不一定仍然落在 $\mathcal{H}_0$ 中.

这时我们需要注意到题目中要求 T 是有界线性函数, 有界性给出

$$C\|y_n - x_0\| \geq |T(y_n - x_0)| = |T(x_0)|, \quad \forall n \geq 1 \Rightarrow T(x_0) = 0.$$

于是 $x_0 \in \mathcal{H}_0$. 令 $x_1 = x - x_0$, 我们证明 $\langle x_1, y \rangle = 0$ 对任意 $y \in \mathcal{H}_0$ 成立. 这和线性空间一样.

$$\begin{aligned} \|x_1\| &\leq \|x_1 + \lambda y\|, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R} \\ \Rightarrow 2\lambda \langle x_1, y \rangle + \lambda^2 \langle y, y \rangle &\geq 0, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

考虑 Δ 即得 $\langle x_1, y \rangle = 0$.

回到原题, 如果 $\mathcal{H}_0 = \mathcal{H}$ 则结论已经成立! 否则任取 $u \in \mathcal{H}$, $u \perp \mathcal{H}_0$ 使得 $T(u) = 1$. 那么对任意 $x \in \mathcal{H}$, 均有 $x - T(x)u \in \ker T = \mathcal{H}_0$, 而且 $T(x)u \perp \mathcal{H}_0$. 所以 $T(x)u$ 是 x 在正交分解中的一项, 即 $x_1 = T(x)u$. 所以

$$\langle x, u \rangle = \langle x_1, u \rangle = T(x) \langle u, u \rangle = T(x).$$

证毕.



2 Fourier 级数的应用

2.1 等分布问题

考虑取值在 $[0, 1]$ 上的数列 $\{\xi_k\}$, 我们想研究它是否均匀地分布在 $[0, 1]$ 上. 我们可以给它一个严格的定义:

Definition 2.1.1. 如果数列 $\{\xi_k\}_{k \geq 1}$ 满足对任意 $a < b \in [0, 1]$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\{k \leq n \mid \xi_k \in [a, b]\}|}{n} = b - a.$$

则称 $\{\xi_k\}_{k \geq 1}$ 在 $[0, 1]$ 上是等分布的. 特别地, $\{\xi_k\}_{k \geq 1}$ 在 $[0, 1]$ 上稠密.

有趣的是等分布问题确有一个容易计算的等价形式, 它就是 (在竞赛中也非常著名的) Weyl 判别准则.

Theorem 2.1.2 (Weyl). 设 $\{\xi_k\}_{k \geq 1}$ 是区间 $[0, 1]$ 上的序列. 下面结论等价:

- (1) $\{\xi_k\}$ 等分布.
- (2) 对任意 $[0, 1]$ 上的 Riemann 可积函数 f , 均有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

- (3) 对任意 $\ell \in \mathbb{N}^*$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{2\pi i \ell f(\xi_k)} \right) = 0.$$

Proof. 注意到 (2) 是显著更强的, 我们先用 (2) 来推出 (1) 和 (3):

- (2) $\Rightarrow$ (1): 对每个区间 $[a, b] \subset [0, 1]$, 取 $f = \chi_{[a, b]}$ 即得到等分布的定义.
- (2) $\Rightarrow$ (3), 对每个 $\ell \in \mathbb{N}^*$ 取 $f = e^{2\pi i \ell x}$, RHS 都是 0, 就得到 (3).

从而反向的 (1) $\Rightarrow$ (2) 和 (3) $\Rightarrow$ (2) 的思路就很明显: 注意到结论 (2) 明显是线性的, 所以前者相当于问如果 (2) 对阶梯函数成立, 那么是否对所有函数成立? 后者相当于问如果 (2) 对三角多项式成立, 那么是否对所有函数成立?

证明是明显的, 根据 Riemann 积分的定义, 我们可以取上下阶梯函数 $f_+(x)$ 和 $f_-(x)$ 使得 $f_+(x) \geq f(x) \geq f_-(x)$ 恒成立, 并且

$$\int_0^1 f_+(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \leq \varepsilon, \quad \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 f_-(x) dx \leq \varepsilon.$$

而 $f_+(x)$ 和 $f_-(x)$ 作为阶梯函数已经满足 (2), 所以

$$\left| \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n f_{\pm}(\xi_k) \right) - \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \varepsilon.$$

再根据大小关系,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n f_-(\xi_k) \right) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \right) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n f_+(\xi_k) \right).$$

所以

$$\left| \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \right) - \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \varepsilon$$

根据 ε 选取的任意性即得结论. 后者更为容易: 因为根据 1.2.9 三角多项式可以一致逼近连续函数, 所以 LHS 估计的误差是一致的, 这立刻得到对连续函数 (2) 都是成立的. 同样地我们可以选取连续函数 $f_{\pm}(x)$ 满足上面两条性质, 所以连续函数可以替代之前阶梯函数的位置, 从而完成证明. $\square$

Remark. Problem From The Book 第 15 章有提到一样的证明, 从现在的角度来看这个命题把分析里的逼近想法体现地非常好.

我们接下来用上面的等价命题 (3) 来考虑几个例子. 这个条件最好用的地方在于自动在 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上考虑问题, 从而完美适配那些“看小数部分”的序列.

Example 2.1.3 (Dirichlet 小定理). 给定无理数 σ , 数列 $\xi_k = \{k\sigma\}$ 在 $(0, 1)$ 上等分布.

Proof. 只需要验证 (3), 注意到在指数上“取小数部分”会直接消失.

$$\left| \sum_{k=1}^n e^{2\pi i k \sigma} \right| = \left| \frac{e^{2\pi i \ell \sigma} - e^{2\pi i \ell (n+1) \sigma}}{1 - e^{2\pi i \ell \sigma}} \right| \leq \frac{2}{|1 - e^{2\pi i \ell \sigma}|}.$$

它是有界的, 所以当然有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{2\pi i k \sigma} = 0.$$

$\square$

Example 2.1.4. 给定非零实数 a 和 $\sigma \in (0, 1)$, 定义 $\xi_k = \{ak^\sigma\}$. 则 $\{\xi_k\}_{k \geq 1}$ 在 $(0, 1)$ 上等分布.

Proof. 我们要考虑的序列是 $e^{2\pi i \ell (ak^\sigma)}$, 根据 a 的任意性只需对 $b = 2\pi \ell a$ 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{ibk^\sigma} = 0.$$

我们希望证明它和积分 $\int_1^{n+1} e^{ibx^\sigma} dx$ 之间的差不大: 一方面,

$$\begin{aligned} \int_1^{n+1} e^{ibx^\sigma} dx &= \int_1^{n+1} \frac{x^{1-\sigma}}{ib\sigma} (e^{ibx^\sigma})' dx \\ &= \frac{1}{ib\sigma} (x^{1-\sigma} e^{ibx^\sigma}) \Big|_1^{n+1} - \frac{1}{ib\sigma} \int_1^{n+1} (1-\sigma)x^{-\sigma} e^{ibx^\sigma} dx \\ &\leq \left| \frac{(n+1)^{1-\sigma} + 1}{b\sigma} \right| + \left| \frac{1}{b\sigma} \int_1^{n+1} (x^{1-\sigma})' dx \right| \\ &\leq 2 \left| \frac{(n+1)^{1-\sigma} + 1}{b\sigma} \right|. \end{aligned}$$

(注意这一项不是周期的, 所以需要用分部积分搞出一项 $x^{1-\sigma}$ 后完成放缩) 另一方面,

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n e^{ibk^\sigma} - \int_1^{n+1} e^{ibx^\sigma} dx \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} (e^{ibk^\sigma} - e^{ibx^\sigma}) dx \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} |e^{ibx^\sigma} - e^{ibk^\sigma}| dx \\ &\leq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} |bx^\sigma - bk^\sigma| dx \\ &\leq \sum_{k=1}^n |b|((k+1)^\sigma - k^\sigma) = |b|((n+1)^\sigma - 1). \end{aligned}$$

第一个不等号用到了 $|e^{ia} - e^{ib}| \leq |a - b|$, 这是因为左侧是单位圆上两点之间的弦长, 右边至少是两点之间的弧长. 根据 $\sigma \in (0, 1)$ 可知

$$\sum_{k=1}^n e^{ibk^\sigma} = O(n^{\max\{\sigma, 1-\sigma\}}) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e^{2\pi i \ell k^\sigma} = 0.$$

所以 $\{\xi_k\}_{k \geq 1}$ 在 $(0, 1)$ 上等分布. $\left\langle \frac{n}{x} \right\rangle$

Example 2.1.5. 任意给定 $a \in \mathbb{R}$, 对 $k \geq 1$ 定义 $\xi_k = \{a \log(k)\}$. 则 $\{\xi_k\}_{k \geq 1}$ 在 $[0, 1]$ 上不是等分布的.

Proof. 还是代入验证: 要考虑序列为 $e^{2\pi i \ell (a \log k)}$, 设 $b = 2\pi \ell a$, 只需看 $e^{ib \log k}$. 我们看积分 $\int_1^{n+1} e^{ib \log x} dx$:

$$\begin{aligned} \int_1^{n+1} e^{ib \log x} dx &= \int_1^{n+1} \frac{x}{ib} (e^{ib \log x})' dx \\ &= \left(\frac{n+1}{ib} e^{ib \log(n+1)} - \frac{1}{ib} \right) - \int_1^{n+1} \frac{1}{ib} e^{ib \log x} dx. \end{aligned}$$

所以

$$\int_1^{n+1} e^{ib \log x} dx = \frac{(n+1)e^{ib \log(n+1)} - 1}{ib + 1}.$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n e^{ib \log k} - \int_1^{n+1} e^{ib \log x} dx \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} (e^{ib \log k} - e^{ib \log x}) dx \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} |e^{ib \log x} - e^{ib \log k}| dx \\ &\leq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} |b \log x - b \log k| dx \\ &\leq \sum_{k=1}^n |b|(\log(k+1) - \log(k)) = |b| \log(n+1). \end{aligned}$$

所以 $|\sum_{k=1}^n e^{ib \log k}| = \Theta(n)$, 并且大概有 (注意到 $b \in \mathbb{R}$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\sum_{k=1}^n e^{ib \log k}|}{n} = \frac{1}{ib + 1}.$$

所以数列在 $[0, 1]$ 上不是等分布的. $\left\langle \frac{n}{x} \right\rangle$

2.2 Roth 三项等差数列定理

我们首先引入有限 Fourier 分析的概念. 本节考虑的对象是 $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 和在 G 上定义的函数. 可以想象 G 类似于之前的 S^1 , 可以实现为一个圈, 也可以实现为 $\mathbb{Z}$ 的商空间. 我们现在考虑 G 上的复值函数所成集合 $\text{Hom}(G, \mathbb{C})$. 有限集上关于连续, 收敛这样的概念都变得平凡了, 函数 $f \in \text{Hom}(G, \mathbb{C})$ 和数组 $(f(g))_{g \in G}$ 之间可以建立显然的同构, 从而 $\text{Hom}(G, \mathbb{C})$ 就是 n 维复线性空间. 换句话说, 所有 $[g \mapsto \mathbf{1}_{g=h}]$ 构成 $\text{Hom}(G, \mathbb{C})$ 的一组基.

G 上可以赋予计数测度, 因此可以谈论积分 (就是有限的求和) 以及各种 L^p 范数. 特别地, 我们可以定义内积:

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} f(x) \overline{g(x)}.$$

现在我们可以考虑 $\text{Hom}(G, \mathbb{C})$ 作为内积空间的一组标准正交基. 回忆我们在竞赛中常用的单位根的性质: 记 $\zeta = e^{\frac{2\pi i}{n}}$, 则对 $x \in \mathbb{Z}$.

$$\frac{1}{n} \sum_{x=0}^{n-1} \zeta^{kx} = \mathbf{1}_{k \equiv 0 \pmod{n}},$$

我们把它翻译为在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上 Fourier 分析的语言: 对 $k \in G$ 定义 $\chi_k(x) = \zeta^{kx}$, 则

$$\langle \chi_k, \chi_l \rangle = \frac{1}{n} \sum_{x=0}^{n-1} \zeta^{(k-l)x} = \mathbf{1}_{k=l}.$$

所以 $\{\chi_k\}_{k \in G}$ 构成 $\text{Hom}(\mathbb{C}, G)$ 的一组标准正交基. (既然这里都已经使用特征标的记号了, 这个命题在有限群表示论中对应的就是: 全体特征标是 G 上的 class function 作为内积空间的一组标准正交基, 所谓 class function 就是把一个共轭类打到一个相同的元素. 我之前还真没注意到这会和 Fourier 分析有上关系. 当然对于交换群情形, 所有不可约表示都是一维的, 我们也可以具体写出它的特征标.) 我们立刻可以使用 Fourier 理论 (也可以不使用, 有限维情况下都是线性代数的简单练习) 得到下面的一些命题.

- 定义

$$\widehat{f}(k) = \langle f, \chi_k \rangle = \sum_{x=0}^{n-1} f(x) e^{-\frac{2\pi i k}{n} x}.$$

那么 Fourier 级数收敛到 f , 即正交分解

$$f = \sum_{k=0}^{n-1} \langle f, \chi_k \rangle \chi_k \Rightarrow f(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \widehat{f}(k) e^{\frac{2\pi i k}{n} x}.$$

在有限维的意义下我们可以直接展开求和来验证其正确性.

- $\text{Hom}(G, \mathbb{C})$ 通过基 $\{\chi_k\}_{k \in G}$ 同构于 $\mathbb{C}^n$, 即 $f \mapsto (\widehat{f}(0), \widehat{f}(1), \dots, \widehat{f}(n-1))$ 是内积空间之间的同构. 我们发现右边还可以作为一个 G 上的复值函数 (这在 $L^2(S^1)$ 上是做不到的), 我们就把它定义为函数 $\widehat{f}$, 称为 f 的 Fourier 变换.

- 内积空间之间的同构说明:

$$\langle f, g \rangle = \sum_{k=0}^{n-1} \widehat{f}(k) \overline{\widehat{g}(k)}.$$

特别地,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} |\widehat{f}(k)|^2 = \|f\|^2 = \sum_{k=0}^{n-1} |\widehat{f}(k)|^2.$$

即有限维情形的 Parseval 恒等式.

- 我们可以定义卷积其中卷积定义为

$$f * g(x) = \sum_{k=0}^{n-1} f(k)g(x-k).$$

对一般的群 G 有类似的操作. 那么频率空间上卷积就是正常的乘法:

$$\widehat{f * g} = \widehat{f} \cdot \widehat{g}.$$

我们还可以定义 $f \in \text{Hom}(G, \mathbb{C})$ 的各种 L^p 范数:

$$\|f\|_{L^p} = \left(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} |f(k)|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \|f\|_{L^\infty} = \max_{k \in G} |\widehat{f}(k)|.$$

接下来我们开始 Roth 定理的证明. Roth 定理的叙述是: 如果一数列在自然数中有正密度, 那么其中必然存在三项等差数列.

Theorem 2.2.1 (Roth 三项等差数列定理). 对 $A \subset \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 定义 A 在自然数中的上密度为

$$\bar{\rho}(A) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\#\{x \in A, x \leq n\}}{n}.$$

如果 $\bar{\rho}(A) > 0$, 那么 A 中一定包含三项等差数列 (公差不为 0). 即是存在两两不等的 $x, y, z \in A$ 使得 $x + z = 2y$.

我们现在圆周 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上看这个问题, 即在 $\text{mod } n$ 意义下三项等差数列个数的估计, 或者说满足同余方程 $x + z \equiv 2y \pmod{n}$ 的解数, 出于技术性原因让 n 是奇数让 $2y$ 取遍完系. 这可以让我们用上 Fourier 分析 (其实也没有那么神秘, titu 上也出现过这样的手法)

$$\begin{aligned} \#\{(x, y, z) : x, y, z \in A, x + z \equiv 2y \pmod{n}\} &= \sum_{x \in A} \sum_{y \in A} \sum_{z \in A} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} e^{-\frac{2\pi i k}{n}(x+z-2y)} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{x, y, z \in A} e^{-\frac{2\pi i k}{n}x} e^{-\frac{2\pi i k}{n}(-2y)} e^{-\frac{2\pi i k}{n}z} \mathbf{1}_{x \in A} \mathbf{1}_{y \in A} \mathbf{1}_{z \in A} \\ &= n^2 \sum_{k=0}^{n-1} \widehat{\mathbf{1}_A}(k) \widehat{\mathbf{1}_A}(-2k) \widehat{\mathbf{1}_A}(k) \\ &= \frac{1}{n} |A|^3 + n^2 \sum_{k=0}^{n-1} \widehat{\mathbf{1}_A}(k)^2 \widehat{\mathbf{1}_A}(-2k). \end{aligned}$$

自然地, 我们希望 $k = 0$ 这项为主项, $k \neq 0$ 的项都比较少, 这样可以得到等差数列出现次数大于零, 从而得到结论. 用概率的想法可以佐证这一点:

- 设 $|A| = \delta n$, 我们以 δ 的概率均匀随机选取 A 中元素, 那么对任意的 $(x, y) \in A \times A$, 有 δ 的概率存在 A 中元素 z 使得 $n \mid x + z - 2y$, 从而等差数列个数的期望是 $\delta^3 N^2$, 恰好是这里的第一项.

根据恒等式

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left| \widehat{\mathbf{1}_A}(k) \right|^2 = \|\mathbf{1}_A\|^2 = \frac{|A|}{n} = \delta,$$

如果每个 $\widehat{\mathbf{1}_A}(k), k \neq 0$ 都比较小, 比如说其绝对值有一致上界 ε , 那么等差数列个数至少为

$$\delta^3 n^2 - n^2 \varepsilon \cdot \sum_{k=0}^{n-1} \left| \widehat{\mathbf{1}_A}(k) \right|^2 = (\delta^3 - \delta \varepsilon) n^2.$$

也就是我们希望 ε 比 δ^2 要小即可. 不过对于原题来讲并不是 $\varepsilon < \delta^2$ 就够了, 我们还需要证明有 $\mathbb{N}$ 上的三项等差数列, 这需要我们有很多等差数列才能满足. 我们先来尝试在这样的 ε 足够小时证明 $\bmod n$ 意义下存在等差数列能推出一般的等差数列存在, 为此先规范化上面的概念:

Definition 2.2.2. 给定 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的子集 A , 我们称 A 是 ε -等分布的, 如果对任意 $k \neq 0$ 均有

$$\left| \widehat{\mathbf{1}_A}(k) \right| = \frac{1}{n} \left| \sum_{x \in A} e^{-\frac{2\pi i k x}{n}} \right| \leq \varepsilon$$

成立.

事实上, 如果存在一组 $(x, y, z) \in A^3$ 使得 $x, y \in [\frac{1}{3}n, \frac{2}{3}n)$, 那么一定通过同余方程 $x + z \equiv 2y \pmod{n}$ 能推出 $x + z = 2y$ 成立. 我们设

$$A_{\frac{1}{3}} = A \cap [\frac{1}{3}n, \frac{2}{3}n).$$

所以如果 $|A_{\frac{1}{3}}|$ 较大, 就应当存在满足要求的序列. 具体来进行计算: 设 $|A_{\frac{1}{3}}| = cn$, 那么

$$\begin{aligned} & \sum_{x \in A_{\frac{1}{3}}} \sum_{y \in A_{\frac{1}{3}}} \sum_{z \in A} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} e^{-\frac{2\pi i k}{n}(x+z-2y)} = n^2 \sum_{k=0}^{n-1} \widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(k) \widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(-2k) \widehat{\mathbf{1}_A}(k) \\ &= c^2 \delta n^2 + n^2 \sum_{k \neq 0} \widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(k) \widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(-2k) \widehat{\mathbf{1}_A}(k) \\ &\geq c^2 \delta n^2 - n^2 \sum_{k \neq 0} \left| \widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(k) \right| \left| \widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(-2k) \right| \cdot \varepsilon \\ &\geq c^2 \delta n^2 - \varepsilon n^2 \cdot \left(\sum_{k \neq 0} \left| \widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(k) \right|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{k \neq 0} \left| \widehat{\mathbf{1}_{A_{\frac{1}{3}}}}(-2k) \right|^2 \right)^{1/2} \\ &\geq c^2 \delta n^2 - \varepsilon n^2 \cdot c = c(c\delta - \varepsilon) n^2. \end{aligned}$$

注意到使得 $x = y = z$ 的数列项数为 $O(n)$, 所以当 c 差不多是 ε/δ 这个量级的时候等差数列项数就够了. 前面说过 ε 差不多是 δ^2 这个量级的, 所以 c 和 δ 是一个量级的, 这使得我们要去精心控制一些常数才能完成证明.

- 我们首先考虑存在 $\varepsilon < \frac{1}{8}\delta^2$ 使得 A 是 ε -等分布的情形. 接下来分为两类:

- 如果 $c > \frac{1}{4}\delta$, 那么 $\{1, \dots, n\}$ 中的等差数列至少有

$$c(c\delta - \varepsilon)n^2 > \frac{1}{32}\delta^3 n^2$$

个, 并且至多有 n 个公差为 0 的等差数列. 当 $n > C \cdot \delta^{-3}$ 时这推出这样的等差数列存在.

- 如果 $c < \frac{1}{4}\delta$, 那么 $A_{\frac{1}{3}}$ 只占到 A 的 $1/4$ 左右, 即不在 $A_{\frac{1}{3}}$ 中的还有 $\frac{3}{4}\delta n$ 个数落在剩下的总长为 $\frac{2}{3}n$ 的两段数中, 密度升高到了 $\frac{9}{8}\delta$. 这提示我们可以无穷地操作下去, 因为存在一个不依赖于 n 和 δ 的常数 $\frac{1}{8}$, 使得每次可以找到一个子数列 S 满足 $S \cap A$ 在 S 中占比为之前的 $\frac{9}{8}$ 倍. 因此存在一个不依赖于 δ, n 的常数 D 使得操作 D 次后密度超过 1, 所以只要 n 充分大使得操作 D 次, 每次缩小长度至 $\frac{1}{3}n$, 最后还剩下数就可推出矛盾. 这里的整个思想也将用来解决 $\varepsilon > \frac{1}{8}\delta^2$ 的情形.

- 再考虑存在某个 k 使得 $|\widehat{\mathbf{1}_A}(k)| \geq \frac{1}{8}\delta^2$ 的情形, 在这种情况下我们会找一个子等差数列 S 使得 $A \cap S$ 在 S 中密度升高正常数倍, 这就完成了证明.

为此我们其实要考虑 $\sum \mathbf{1}_A \mathbf{1}_S$ 这样的量. 我们先来证明一个引理:

Lemma 2.2.3. 对任意 $f, g \in \text{Hom}(G, \mathbb{C})$ 和 $k \in G$, 我们都有

$$n^2 |\widehat{f}(k)| |\widehat{g}(k)| \leq \sum_{x \in G} \left| \sum_{y \in G} f(y) \overline{g(y-x)} \right|.$$

Proof. 令 $F(x) = \sum_{y \in G} f(y) \overline{g(y-x)}$, 则 F 的第 k 个 Fourier 系数为

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{x=0}^{n-1} F(x) e^{-\frac{2\pi i k}{n} x} &= \frac{1}{n} \sum_{x=0}^{n-1} \sum_{y=0}^{n-1} f(y) \overline{g(y-x)} e^{-\frac{2\pi i k}{n} x} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{y=0}^{n-1} f(y) e^{-\frac{2\pi i k}{n} y} \sum_{x=0}^{n-1} \overline{g(y-x)} e^{-\frac{2\pi i k}{n} (y-x)} \\ &= n \widehat{f}(k) \overline{\widehat{g}(k)}. \end{aligned}$$

因此需证的命题转化为

$$\frac{1}{n} \sum_{x \in G} |F(x)| \geq |\widehat{F}(k)|, \quad \forall k \in G.$$

这是容易的, 只需写出具体表达式

$$|\widehat{F}(k)| = \frac{1}{n} \left| \sum_{x \in G} F(x) e^{-\frac{2\pi i k}{n} x} \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{x \in G} |F(x)|.$$

(这等价于 $\|f\|_{L^1} \geq \|\widehat{f}\|_{L^\infty}$, 我们早在定义 1.1.2 中就验证了这在任何测度空间上均成立.)



关键是这个引理说明了什么：我们分别取 $f = \mathbf{1}_A$ 和 $g = \mathbf{1}_B$. 从而如果 f, g 在某个频率上的值都很大，那么存在一个平移量 x ，使得

$$|A \cap (B - x)| \geq n \left| \widehat{f}(k) \widehat{g}(k) \right|.$$

所以我们的目标转变为对每个 k 去选取一个 B ，它在频率 k 上的值都比较大，并且它的结构比较“整齐”：任意平移之后都近似于是等差数列或者可以分拆为一个等差数列.

- 我们想选择的 B 在 $\text{mod } n$ 的意义下是一个等差数列

$$\{-md, -(m-1)d, \dots, -d, 0, d, \dots, (m'-1)d, m'd\}$$

它的总长度不超过 $\frac{n}{2}$ ，从而任意平移一个 x 它都能被分为两个等差数列的并. 另一方面， $\widehat{\mathbf{1}_B}(k)$ 应当形如

$$\frac{1}{n} \sum_{x \in B} e^{-\frac{2\pi i k}{n} x} = \frac{1}{n} \sum_{j=-m}^{m'} e^{-\frac{2\pi i k d}{n} j}.$$

我们想让它比较大，就需要让所有单位根都尽量接近 1，即让 kd 尽量小.

- 依此我们用下面的数论方法来取出 d 满足 (Thue Lemma)

$$0 < d \leq \sqrt{n}, \quad 0 \leq (kd) \bmod n \leq \sqrt{n}.$$

考虑把 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 分割成 $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 个连续段 $A_1, A_2, \dots, A_t$ ，每个连续段有 $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 或 $\lceil \sqrt{n} \rceil$ 个数，然后考虑映射

$$\varphi: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow [t] \times [t]: a \mapsto (p, q) \text{ s.t. } a \in A_p, ka \in A_q.$$

那么根据抽屉原理存在两个数的像相同，它们中大数减小数就得到满足这里要求的 d .

- 取 $m = m' = \frac{1}{8} \lfloor \frac{n}{d} \rfloor$ ，就得到大小约为 $\frac{1}{4} \sqrt{n}$ 的集合 B ，它占到的长度至多为 $\frac{1}{4}n$ ，从而不会造成重叠. 接下来计算 $\widehat{\mathbf{1}_B}(k)$ 和 $\frac{|B|}{n}$ 之间的差距：

$$\begin{aligned} \left| \widehat{\mathbf{1}_B}(k) - \frac{|B|}{n} \right| &= \frac{1}{n} \left| \sum_{j=-m}^{m'} (e^{-\frac{2\pi i k d}{n} j} - 1) \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{j=-m}^{m'} \frac{2\pi(kd)(\bmod n)}{n} |j| \\ &\leq \frac{2\pi}{n\sqrt{n}} \cdot \sum_{|j| \leq \frac{|B|}{2}} |j| \leq \frac{2\pi}{n\sqrt{n}} \left(\frac{|B|}{2} \right)^2 \leq \frac{|B|}{2n}. \end{aligned}$$

所以 $\widehat{\mathbf{1}_B}(k)$ 至少有 $\frac{|B|}{2n}$ 这么大，我们可以配合上之前所假设的存在 k 使得 $|\widehat{\mathbf{1}_A}(k)|$ 较大完成证明.

- 记 $f_A = \mathbf{1}_A - \delta$, 那么 f_A 的零频率为 0 ($\sum_x f_A(x) = |A| - \delta n = 0$), 其余频率和 $\mathbf{1}_A$ 相同. 因此

$$n^2 \widehat{f_A}(k) \widehat{\mathbf{1}_B}(k) \geq n^2 \cdot \frac{1}{8} \delta^2 \cdot \frac{|B|}{2n} = \frac{\delta^2 |B|}{16} n.$$

所以根据引理 2.2.3,

$$\sum_{x \in G} ||A \cap (B - x)| - \delta |B|| = \sum_{x \in G} \left| \sum_{y \in G} (\mathbf{1}_A(y) - \delta) \overline{\mathbf{1}_B(y - x)} \right| \geq \frac{\delta^2 |B|}{16} n.$$

又因为

$$\sum_{x \in G} \left(\sum_{y \in G} (\mathbf{1}_A(y) - \delta) \overline{\mathbf{1}_B(y - x)} \right) = \sum_{y \in G} (\mathbf{1}_A(y) - \delta) \sum_{x \in G} \overline{\mathbf{1}_B(x)} = 0,$$

所以存在 $x \in G$ 使得

$$\sum_{x \in G} (|A \cap (B - x)| - \delta |B|) \geq \frac{\delta^2 |B|}{32}.$$

这时 $A \cap (B - x)$ 在 $B - x$ 中所占总密度为 $\delta + \frac{\delta^2}{32}$, 大于 A 在 G 中所占的密度. 此时 $B - x$ 被分为两个等差数列, 只需考虑 A 和两边的交. 如果有一个等差数列里元素个数实在太少 (比如少于 $\delta + \frac{\delta^2}{64}$), 那么就选择另一个, 就算它占满里面元素也不会太多, 反之就直接考虑所占密度更大的一个即可.

总结: 我们证明了

Proposition 2.2.4. 假设 $A \subset \{0, 1, \dots, n\}$, $|A| = \delta n$ 并且 $n > 33\delta^{-2}$. 那么, 要么 A 中含三项等差数列, 要么存在一个长度至少为 $\frac{\delta^2}{256} \sqrt{N}$ 的等差数列 P , 使得 $|A \cap P| \geq (\delta + \frac{\delta^2}{64}) |P|$.

我们只需考虑后者一直成立的情形, 经过 $\lfloor \frac{65}{\delta} \rfloor$ 次缩减我们可以让密度从 δ 升高到 2δ , 从而经过

$$\frac{65}{\delta} + \frac{65}{2\delta} + \frac{65}{4\delta} + \dots \leq \frac{130}{\delta}$$

次缩减密度为超过 1, 这时导致矛盾. 因此我们只需要最初的 n 满足 $\frac{130}{\delta}$ 次缩减后长度不低于 $33\delta^{-2}$ 即可. k 次缩减后长度至少为

$$\frac{\delta^4}{256^2} N^{\frac{1}{2^k}} \geq 33\delta^{-2} \Rightarrow \log n \geq C \cdot 2^{130\delta^{-1}} \Rightarrow \log \log n \geq C \cdot \delta^{-1}.$$

至此完成了定理证明.

习题课 1: 2025/9/18 未补全

习题课的内容是关于 L^p 空间性质的补充.

Proposition 2.2.5.

$$\log(tx + (1-t)y) \geq t \log x + (1-t) \log y.$$

Proof. 直接根据 Jensen 不等式可得, 或者也可以展开为

$$x^t y^{1-t} \leq tx + (1-t)y. \quad (*)$$



Proposition 2.2.6 (Hölder). 假设 $f \in L^p$, $g \in L^q$, 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 那么 $fg \in L^1$ 并且 $\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^p} \cdot \|g\|_{L^q}$.

Proof. 如果 $\|f\|_{L^p} = 0$ 或者 $\|g\|_{L^q} = 0$, 那么 $f = 0$, a.e. 或者 $g = 0$, a.e.. 从而 $fg = 0$, a.e., 就做完了.

下面考虑 $\|f\|_{L^p} \neq 0$ 且 $\|g\|_{L^q} \neq 0$ 的情形, 记

$$f_0 = \frac{f}{\|f\|_{L^p}}, \quad g_0 = \frac{g}{\|g\|_{L^q}}.$$

对 f_0, g_0 逐点使用不等式 (*), 得到

$$|f_0 g_0| \leq t |f_0|^{\frac{1}{t}} + (1-t) |g_0|^{\frac{1}{1-t}}.$$

令 $t = \frac{1}{p}$, 则 $1-t = \frac{1}{q}$, 上式化为

$$|f_0 g_0| \leq \frac{1}{p} |f_0|^p + \frac{1}{q} |g_0|^q.$$

进行积分:

$$\int |f_0 g_0| \, dm \leq \frac{1}{p} \int |f_0|^p \, dm + \frac{1}{q} \int |g_0|^q \, dm = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

这就给出

$$\int |fg| \, dm \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

证毕.



Corollary 2.2.7. $L^p \cap L^q \subset L^r$, $1 \leq p < r < q$.

Proof. 对 f 本身使用 Hölder 不等式: 首先存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$\frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{q} = \frac{1}{r}. \quad (1)$$

下证明对 $1 \leq p < r < q$ 总有

$$\|f\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^p}^\theta \|f\|_{L^q}^{1-\theta},$$

即

$$\int |f^r| dm \leq \left(\int |f^p| dm \right)^{\frac{r\theta}{p}} \left(\int |f^q| dm \right)^{\frac{r(1-\theta)}{q}}. \quad (2)$$

我们想利用 Hölder 不等式, 但是 p 和 q 不是对偶的. 所以我们要做以下两件事:

- 选取对偶的 $\tilde{p}, \tilde{q}$.
- 选取函数 g, h 使得 $gh = f^r$, 对其使用 Hölder 不等式 $\|gh\|_{L^1} \leq \|g\|_{L^{\tilde{p}}} \|h\|_{L^{\tilde{q}}}$ 得到需证式.

一个非常自然的想法就是照着 (2) 的系数选择 $\tilde{p} = \frac{p}{r\theta}$ 和 $\tilde{q} = \frac{q}{r(1-\theta)}$. (我们看到根据 (1) $\tilde{p}$ 和 $\tilde{q}$ 的确是对偶的, 这其实从另一方面解释了之前为什么会选择这样的 θ) 再选择 g, h 使得 $g^{\tilde{p}} = f^p$, $h^{\tilde{q}} = f^q$, 即 $g = f^{r\theta}$, $h = f^{r(1-\theta)}$. 现在把所有事情展开就得到结果.

$$\begin{aligned} \int |f^r| dm &= \int |gh| dm \leq \left(\int |g^{\tilde{p}}| dm \right)^{1/\tilde{p}} \left(\int |h^{\tilde{q}}| dm \right)^{1/\tilde{q}} \\ &= \left(\int |f^p| dm \right)^{\frac{r\theta}{p}} \left(\int |f^q| dm \right)^{\frac{r(1-\theta)}{q}}. \end{aligned}$$

证毕. □

Corollary 2.2.8. $L^r \subset L^p + L^q$, $1 \leq p < r \leq q$.

Proof. 我们借助 $L^1 \cap L^r \subset L^p$ 和 $L^\infty \cap L^r \subset L^q$ 来完成分解:

$$\begin{aligned} h &= f \cdot \mathbf{1}_{\{|f| \leq 1\}} \in L^q; \\ g &= f \cdot \mathbf{1}_{\{|f| > 1\}} \in L^p. \end{aligned}$$

一方面, h 显然是本性有界的, 所以落在 L^∞ 中, 因此 h 落在 $L^\infty \cap L^r \subset L^q$ 中.

另一方面, $|g^r| \geq |g|$ 恒成立, 所以

$$\|g\|_{L^r} = \left(\int |g^r| dm \right)^{1/r} \geq \left(\int |g| dm \right)^{1/r} = \|g\|_{L^1}^{1/r}.$$

故 $\|g\|_{L^1} < +\infty$, 即 $g \in L^1 \cap L^r \subset L^p$. 证毕. □

Proposition 2.2.9 (Minkowski). 若 $f, g \in L^p$, 则 $f + g \in L^p$. 并且它们的范数满足

$$\|f + g\|_{L^p} \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Proof. 证明是利用好函数逼近. 设 $h_N = |f + g|^{p-1} \chi_{E_N}$, 其中

$$E_N = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| \leq N, |g(x)| \leq N, |x| \leq N\}.$$

从而 h_N 是紧支有界函数, 从而一定可积, 故 $h_N \in L^q$. 根据 Hölder 不等式,

$$\int |f + g| h_N dm \leq \int |f| h_N dm + \int |g| h_N dm \leq (\|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}) \|h_N\|_{L^q}.$$

一方面,

$$\|h_N\|_q^q = \int |h_N|^q dm = \int |f+g|^p \chi_{E_N} dm,$$

所以上式其实是

$$\|h_N\|_q^{q-1} \leq (\|f\|_p + \|g\|_p)^q.$$

最后令 $N \rightarrow \infty$ 会得到 $|h_N|^q \rightarrow |f+g|^{q(p-1)} = |f+g|^p$, 根据控制收敛定理就有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int |h_N|^q dm = \int |f+g|^p dm.$$

这就得到了 $\|f+g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}$.



Remark. Minkowski 不等式保证了 L^p 是赋范线性空间.

Proposition 2.2.10 (Integral Minkowski). 假设 $0 < p < q < \infty$, 则

$$\| \|f(x, y)\|_{L_x^p} \|_{L_y^q} \leq \| \|f(x, y)\|_{L_y^q} \|_{L_x^p}.$$

Proof. 把上式展开就得到

$$\left(\int \left(\int |f(x, y)|^p dx \right)^{\frac{q}{p}} dy \right)^{\frac{1}{q}} \leq \left(\int \left(\int |f(x, y)|^q dy \right)^{\frac{p}{q}} dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

令 $G(x) = \|f(x, y)\|_{L_y^q}$, 待定系数并利用 Hölder 不等式:

$$\int |f(x, y)|^p G^{-r} G^r dx \leq \left(\int |f(x, y)|^{ps} G^{-rs} dx \right)^{\frac{1}{s}} \left(\int G(x)^{rt} dx \right)^{\frac{1}{t}}.$$

取 $\frac{1}{s} + \frac{1}{t} = 1$, $rt = p$, $ps = q$, 那么上式化为

$$\int |f(x, y)|^p dx \leq \left(\int |f(x, y)|^q G(x)^{-rs} dx \right)^{\frac{1}{s}} \|G\|_{L^p}^{\frac{p}{t}}.$$

取 q/p 次幂然后再次积分:

$$\begin{aligned} \int \left(\int |f(x, y)|^p dx \right)^{\frac{q}{p}} dy &\leq \|G\|_{L^p}^{\frac{q}{t}} \int \left(\int |f(x, y)|^q G^{-rs}(x) dx \right) dy \\ (\text{Fubini}) &= \|G\|_{L^p}^{\frac{q}{t}} \int G(x)^{-rs} \int G^{-rs} \left(\int |f(x, y)|^q dy \right) dx \\ &= \|G\|_{L^p}^{\frac{q}{t}} \int G^{q-rs}(x) dx. \end{aligned}$$



Corollary 2.2.11.

$$\int \|f\|_{L_x^p} dy \geq \left\| \int f(x, y) dy \right\|_{L_x^p}.$$

Corollary 2.2.12. $\|f * g\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}$, $1 + \frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$.

Proof. 我们证明一个简单情形:

$$\begin{aligned}\|f * g\|_{L^p} &= \left\| \int f(t)g(x-t) dt \right\| \\ &\leq \int \|f(t)g(x-t)\|_{L_x^p} dt \leq \|f(t)\| \|g\|_{L^p} dt = \|f\|_{L^1} \|g\|_{L^p}.\end{aligned}$$



Proposition 2.2.13 (Hardy). 对 $f \in L^p(\mathbb{R})$, 定义

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(y) dy.$$

那么 $F \in L^p(\mathbb{R})$, 并且 $\|F\|_{L^p} \leq \frac{p}{p-1} \|f\|_p$.

Proof. F 可以重写为

$$F(x) = \int_0^1 f(tx) dt.$$

所以

$$\|F\|_{L^p} \leq \int_0^1 \|f(tx)\|_{L_x^p} dt \leq \int_0^1 \|f\|_{L^p} dt = \|f\|_{L^p}.$$



3 Appendix A: Homeworks

3.1 第一次作业

Problem 1

假设 f 是 $[0, 2\pi]$ 上可积的复值函数. 证明, f 几乎处处是实值函数当且仅当对任意的 $k \in \mathbb{Z}$,

$$\widehat{f(k)} = \widehat{f(-k)}.$$

Proof.

$$\begin{aligned}\widehat{f(-k)} &= \int_{S^1} f(x) e^{ikx} \frac{dx}{2\pi}, \quad \widehat{f(k)} = \overline{\int_{S^1} f(x) e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi}} \\ &= \int_{S^1} \overline{f(x)} e^{ikx} \frac{dx}{2\pi}.\end{aligned}$$

这样条件成立当且仅当对函数 $g(x) = f(x) - \overline{f(x)}$, $\widehat{g(k)} = 0$ 对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 成立, 这等价于 $g(x) = 0$, a.e., 也等价于 f 几乎处处是实值函数. 

Problem 2

假设 f, g 是 $[0, 2\pi]$ 上的可积函数. 证明卷积在频率可积上来看就是正常的乘积:

$$\widehat{f * g(k)} = 2\pi \widehat{f(k)} \widehat{g(k)}.$$

(这里的卷积没有自带的系数 $1/2\pi$.)

Proof. 直接计算.

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi} \widehat{f * g(k)} &= \int_{S^1} f * g(x) e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} \\ &= \int_{S^1} \left(\int_{S^1} f(y) g(x-y) \frac{dy}{2\pi} \right) e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} \\ &= \int_{S^1} \int_{S^1} f(y) e^{-iky} \cdot g(x-y) e^{-ik(x-y)} \frac{dy}{2\pi} \frac{dx}{2\pi} \\ (s = x - y, t = y) &= \int_{S^1} \int_{S^1} f(s) e^{-iks} \cdot g(t) e^{-ikt} \frac{ds}{2\pi} \frac{dt}{2\pi} \\ &= \int_{S^1} f(s) e^{-iks} \frac{ds}{2\pi} \int_{S^1} g(t) e^{-ikt} \frac{dt}{2\pi} \\ &= \widehat{f(k)} \widehat{g(k)}.\end{aligned}$$



Problem 3

f 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的奇函数. 它在 $[0, \pi]$ 上的定义为

$$f(x) = x(\pi - x).$$

证明, 对任意的 $x \in \mathbb{R}$, 我们都有

$$f(x) = \frac{8}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin((2k-1)x)}{(2k-1)^3}.$$

Proof. 我们知道如果 f 是绝对连续函数, 那么就有 Riemann-Lebesgue 引理成立. 而 f 绝对连续可推出 $f \cdot e^{ikx}$ 也是绝对连续的, 因此可对其使用 Riemann-Lebesgue 定理. 这就得到对 $k \neq 0$,

$$\begin{aligned} \widehat{f}(k) &= \int_{S^1} f(x) e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} = \frac{1}{-ik} \left(\int_{S^1} f(x) (e^{-ikx})' \frac{dx}{2\pi} \right) \\ &= \frac{1}{ik} \int_{S^1} f'(x) e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} = \frac{1}{ik} \widehat{f'}(k). \end{aligned}$$

回到原题, f 可定义在 S^1 上,

$$f'(x) = \begin{cases} \pi - 2x, & x \in [0, \pi]; \\ \pi + 2x, & x \in [-\pi, 0]. \end{cases}, \quad f''(x) = \begin{cases} -2, & x \in (0, \pi); \\ 2, & x \in (-\pi, 0). \end{cases}$$

由 $f, f' \in AC(S^1)$, 可以利用上面的公式, 得到

$$\widehat{f}(k) = \frac{1}{(ik)^2} \widehat{f''}(k), \quad k \neq 0.$$

计算 $\widehat{f''}(k)$:

$$\begin{aligned} \widehat{f''}(k) &= \int_{-\pi}^0 2e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} - \int_0^{\pi} 2e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} \\ &= -4 \int_0^{\pi} e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{4}{ik} (e^{-ik\pi} - 1) = \begin{cases} -\frac{4}{ik\pi}, & 2 \nmid k, \\ 0, & 2 \mid k \end{cases}. \end{aligned}$$

又根据 f 是奇函数可知 $\widehat{f}(0) = 0$, 所以

$$\widehat{f}(0) = 0, \quad \widehat{f}(k) = \begin{cases} \frac{4}{ik^3\pi}, & 2 \nmid k, \\ 0, & 2 \mid k \end{cases}.$$

最后根据 $f \in C^1$ 可知 Fourier 系数逐点收敛到 f , 从而

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(k) e^{ikx} = \sum_{k \geq 1, 2 \nmid k} \frac{4}{ik^3\pi} (e^{ikx} - e^{-ikx}) \\ &= \sum_{k \geq 1, 2 \nmid k} \frac{8i \sin(kx)}{ik^3\pi} = \frac{8}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin((2k-1)x)}{(2k-1)^3}. \end{aligned}$$

Problem 4

假设 f 是定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的奇函数, 在 $(0, \pi]$ 上取值为 $\frac{\pi-x}{2}$. 证明

$$\frac{\pi-x}{2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k}, \quad \forall x \in (0, \pi].$$

Proof. 由于 Fourier 系数只 a.e. 依赖于 f 的取值, 所以我们可以通过周期延拓, 认为 f 有 Fourier 级数. 注意到延拓后在 $(0, 2\pi)$ 上 f 的表达式就是 $f(x) = \frac{\pi-x}{2}$. 因此

$$\begin{aligned} \hat{f}(k) &= \int_0^{2\pi} \frac{\pi-x}{2} e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} \\ &= -\frac{1}{ik} \cdot \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\pi-x}{2} e^{-ikx} \right) \Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{ik} \int_0^{2\pi} -\frac{1}{2} e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} \\ &= -\frac{1}{2ik\pi} \cdot \left(\frac{\pi-2\pi}{2} - \frac{\pi-0}{2} \right) = \frac{1}{2ik}, \quad k \neq 0. \end{aligned}$$

此外根据 f 是奇函数易得 $\hat{f}(0) = 0$. 由于 f 在每个 $x \in (0, \pi]$ 附近都是 C^1 的, 因此有逐点收敛性成立.

$$\frac{\pi-x}{2} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) e^{ikx} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2ik} (e^{ikx} - e^{-ikx}) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k}.$$

证毕. $\square$

Problem 5

设 f 在 $\mathbb{R}$ 上是以 2π 为周期的函数, 它在 $[-\pi, \pi]$ 上的定义为

$$f(x) = |x|.$$

试计算 f 的 Fourier 系数, 并通过考虑 $f(0)$ 证明:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{1}{6} \pi^2.$$

进一步证明

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{1}{90} \pi^4.$$

Proof. 由 $f(x) \in AC(S^1)$ 以及

$$f'(x) = \begin{cases} -1, & x \in (-\pi, 0); \\ 1, & x \in (0, \pi) \end{cases}$$

我们可以研究 $\tilde{f}'(x)$. 根据第 3 题中的结论, 对 $k \neq 0$,

$$\hat{f}'(k) = \begin{cases} \frac{2}{ik\pi}, & 2 \nmid k; \\ 0, & 2 \mid k \end{cases}.$$

容易计算得 $\widehat{f}(0) = \frac{\pi}{2}$, 那么

$$\widehat{f}(0) = \frac{\pi}{2}, \quad \widehat{f}(k) = \begin{cases} -\frac{2}{k^2\pi}, & 2 \nmid k; \\ 0, & 2 \mid k \end{cases}.$$

由于在 0 附近 f 是 Lipschitz 的, 所以 Fourier 级数在 0 处收敛到 $f(0) = 0$.

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(k) = \frac{\pi}{2} - 2 \sum_{k \geq 1, 2 \nmid k} \frac{2}{k^2\pi} \\ &\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{4}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

再考虑以 2π 为周期的偶函数 g , 在 $[0, \pi]$ 上取值为 $g(x) = \frac{1}{6}x^3 - \frac{\pi}{4}x^2$. 那么在 $[0, \pi]$ 上,

$$g'(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{\pi}{2}x, \quad g''(x) = x - \frac{\pi}{2}.$$

$g'(x)$ 是奇函数, 根据 $g'(0) = g'(\pi) = 0$ 知它也是 2π 周期函数. $g''(x)$ 是偶函数, 根据 $g''(0) = -\frac{\pi}{2}$, $g''(\pi) = \frac{\pi}{2}$ 可知 g'' 连续, 并且就是 $f - \frac{\pi}{2}$. 因此对 $k \neq 0$,

$$\widehat{g}(k) = \frac{1}{(\mathbf{i}k)^2} \widehat{g''}(k) = -\frac{1}{k^2} \cdot f(k) = \begin{cases} \frac{2}{k^4\pi}, & 2 \nmid k; \\ 0, & 2 \mid k. \end{cases}$$

另一方面, 计算 $\widehat{g}(0)$:

$$\int_0^\pi \left(\frac{1}{6}x^3 - \frac{\pi}{4}x^2 \right) \frac{dx}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{24}x^4 - \frac{\pi}{12}x^3 \right) \Big|_0^\pi = -\frac{\pi^3}{48}.$$

所以 $\widehat{g}(0) = -\frac{\pi^3}{24}$. g 在 0 附近 C^1 , 所以 Fourier 级数在 0 附近收敛到 $g(0) = 0$.

$$0 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{g}(k) = -\frac{\pi^3}{24} + 2 \sum_{k \geq 1, 2 \nmid k} \frac{2}{k^4\pi} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} = \frac{\pi^4}{96}.$$

又因为

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^4} = \frac{1}{16} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{16}{15} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} = \frac{16}{15} \cdot \frac{\pi^4}{96} = \frac{\pi^4}{90}.$$

证毕.



Problem 6

假设常数 $0 < \alpha < 1$, f 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的函数. 它在 $[0, 2\pi]$ 上的定义为

$$f(x) = \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)} e^{i(\pi-x)\alpha}.$$

通过计算它的 Fourier 系数, 证明

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(k + \alpha)^2} = \frac{\pi^2}{\sin(\pi\alpha)^2}.$$

Proof. 直接计算 Fourier 系数:

$$\begin{aligned} \hat{f}(k) &= \int_0^{2\pi} \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)} e^{i(\pi-x)\alpha} e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} \\ &= \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)} \int_0^{2\pi} e^{i((\pi-x)\alpha - kx)} \frac{dx}{2\pi} \\ &= \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)} \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{-i(\alpha + k)} \left(e^{i((\pi-x)\alpha - kx)} \right) \Big|_0^{2\pi} \\ &= \frac{1}{2\sin(\pi\alpha)} \cdot \frac{1}{-i(\alpha + k)} \cdot (e^{-i\pi\alpha} - e^{i\pi\alpha}) \\ &= \frac{1}{2\sin(\pi\alpha)} \cdot \frac{1}{-i(\alpha + k)} \cdot (-2\sin(\pi\alpha)) \\ &= \frac{1}{\alpha + k}. \end{aligned}$$

而

$$\|f(x)\|_{L^2}^2 = \left(\int_0^{2\pi} |f(x)|^2 \frac{dx}{2\pi} \right) = \frac{\pi^2}{\sin(\pi\alpha)^2}.$$

所以根据 Parseval 恒等式,

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(k + \alpha)^2} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(k)|^2 = \|f(x)\|_{L^2}^2 = \frac{\pi^2}{\sin(\pi\alpha)^2}.$$



Problem 7

假设常数 $0 < \alpha < 1$, 通过计算函数 $\cos(\alpha x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数证明

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{\alpha + k} + \frac{1}{\alpha - k} \right) = \frac{\alpha\pi - \sin(\alpha\pi)}{\alpha \sin(\alpha\pi)}.$$

Proof. 设 $f(x) = \cos(\alpha x)$. 首先来计算 $\langle e^{i\beta x}, e^{ikx} \rangle$:

$$\begin{aligned} \langle e^{i\beta x}, e^{ikx} \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} e^{i\beta x} e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi} = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(\beta-k)x} \frac{dx}{2\pi} \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{i(\beta - k)} e^{i(\beta-k)x} \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{i(\beta - k)} \cdot (e^{i(\beta-k)\pi} - e^{-i(\beta-k)\pi}) \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{i(\beta - k)} \cdot 2i \sin((\beta - k)\pi) = \frac{(-1)^k \sin(\beta\pi)}{(\beta - k)\pi}. \end{aligned}$$

需求的 Fourier 系数就是

$$\begin{aligned}\widehat{f}(k) &= \frac{1}{2}(\langle e^{i\alpha x}, e^{ikx} \rangle + \langle e^{-i\alpha x}, e^{ikx} \rangle) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{(-1)^k \sin(\alpha\pi)}{(\alpha - k)\pi} + \frac{(-1)^k \sin(-\alpha\pi)}{(-\alpha - k)\pi} \right) \\ &= \frac{(-1)^k \sin(\alpha\pi)}{2\pi} \left(\frac{1}{\alpha - k} + \frac{1}{\alpha + k} \right).\end{aligned}$$

由于 f 在 0 附近 C^1 , 因此 Fourier 级数在 0 处收敛到 $f(0) = 1$. 从而

$$\begin{aligned}1 &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(k) = \frac{\sin(\alpha\pi)}{2\pi} \sum_{k \in \mathbb{Z}} (-1)^k \left(\frac{1}{\alpha - k} + \frac{1}{\alpha + k} \right) \\ &= \frac{\sin(\alpha\pi)}{2\pi} \left(\frac{2}{\alpha} + \sum_{k=1}^{\infty} 2 \left(\frac{1}{\alpha - k} + \frac{1}{\alpha + k} \right) \right).\end{aligned}$$

从而

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\alpha - k} + \frac{1}{\alpha + k} \right) = \frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)} - \frac{1}{\alpha} = \frac{\alpha\pi - \sin(\alpha\pi)}{\alpha \sin(\alpha\pi)}.$$

证毕.



Problem 8: 余元公式

对于 $0 < \alpha < 1$, 证明

$$\begin{aligned}\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) &= B(\alpha, 1-\alpha) = \int_0^{\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{1+t} dt \\ &= \frac{1}{\alpha} + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{\alpha+k} + \frac{1}{\alpha-k} \right).\end{aligned}$$

由此得到余元公式

$$\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)}, \quad \forall 0 < \alpha < 1.$$

Proof. 首先回顾 B 函数和 Γ 之间关系的证明:

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, \quad \forall p, q > 0.$$

首先对 $\Gamma(p) = \int_0^{\infty} t^{p-1} e^{-t} dt$ 使用变量替换 $t = x^2$ 可得

$$\Gamma(p) = \int_0^{\infty} x^{2p-2} e^{-x^2} d(x^2) = 2 \int_0^{\infty} x^{2p-1} e^{-x^2} dx.$$

于是

$$\begin{aligned}\Gamma(p)\Gamma(q) &= 4 \int_0^{\infty} x^{2p-1} e^{-x^2} dx \int_0^{\infty} y^{2q-1} e^{-y^2} dy \\ &= \int_{(0, \infty) \times (0, \infty)} x^{2p-1} y^{2q-1} e^{-x^2-y^2} dx dy \\ &= 4 \int_{(0, +\infty) \times (0, \frac{\pi}{2})} (r \cos \theta)^{2p-1} (r \sin \theta)^{2q-1} e^{-r^2} r dr d\theta \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta \cdot 2 \int_0^{\infty} r^{2p+2q-1} e^{-r^2} dr.\end{aligned}$$

后者是 $\Gamma(p+q)$. 前者根据 B 函数的定义, 换元 $x = \sin^2 \theta$ 得到

$$\begin{aligned} B(p, q) &= \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 \theta)^{p-1} (\cos^2 \theta)^{q-1} d(\sin^2 \theta) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin \theta)^{2p-2} (\cos \theta)^{2q-2} \cdot 2 \sin \theta \cos \theta d\theta \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta. \end{aligned}$$

注意到 $\Gamma(1) = 1$, 故 $\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = B(\alpha, 1-\alpha)$. 再证明第二步, 换元 $x = \frac{t}{1+t}$ 后得到

$$\begin{aligned} B(p, 1-p) &= \int_0^1 \left(\frac{t}{1+t}\right)^{\alpha-1} \left(\frac{1}{1+t}\right)^{-\alpha} d\frac{t}{1+t} \\ &= \int_0^\infty \frac{t^{\alpha-1}}{(1+t)^{-1}} \cdot \frac{1}{(1+t)^2} dt \\ &= \int_0^1 \frac{t^{\alpha-1}}{1+t} dt + \int_1^\infty \frac{t^{\alpha-1}}{1+t} dt \\ &= \int_0^1 \frac{t^{\alpha-1} + t^{-\alpha}}{1+t} dt \\ &= \int_0^\infty \sum_{k=0}^\infty (-1)^k (t^{k+\alpha-1} + t^{k-\alpha}) dt \\ &= \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \cdot \left(\frac{1}{k+\alpha} t^{k+\alpha} + \frac{1}{k-\alpha+1} t^{k-\alpha+1} \right) \Big|_0^1 \\ &= \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \cdot \left(\frac{1}{k+\alpha} + \frac{1}{k-\alpha+1} \right) \\ &= \frac{1}{\alpha} + \sum_{k=1}^\infty (-1)^k \cdot \left(\frac{1}{\alpha+k} + \frac{1}{\alpha-k} \right) = \frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)}. \end{aligned}$$



Problem 9

证明连续函数的 Fourier 系数可以衰减地任意慢, 即任给正数序列 $\{b_k\}_{k \geq 1}$, $b_k \rightarrow 0$, 总存在 $[0, 2\pi]$ 上的连续函数 f , 使得存在无穷多个 $k \geq 0$ 满足 $|\hat{f}(k)| \geq b_k$.

Proof. 取 $\{b_k\}_{k \geq 1}$ 的子列 $\{b_{k_i}\}_{i \geq 1}$ 使得 $b_{k_i} \leq \frac{1}{2^i}$, 这样就有 $\sum b_{k_i} < +\infty$. 考虑函数

$$f(x) = \sum_{i=1}^\infty b_{k_i} \cdot e^{ik_i x}.$$

我们证明 $S_n(x) = \sum_{i=1}^n b_{k_i} \cdot e^{ik_i x}$ 是 L^∞ 中的 Cauchy 列, 这是因为对 $m > n \geq N$,

$$\|S_n(x) - S_m(x)\|_{L^\infty} = \left\| \sum_{i=n+1}^m b_{k_i} e^{ik_i x} \right\|_{L^\infty} \leq \sum_{i=n+1}^m |b_{k_i}| \leq \sum_{i \geq N} b_{k_i}.$$

再根据 $\sum b_{k_i} < +\infty$ 即得结论. 从而 $S_n(x)$ 一致收敛, f 是连续函数, 并且满足 $|\hat{f}(k)| = \langle f, e^{ikx} \rangle = b_{k_i}$. 这就证明了满足要求的 f 存在.



Problem 10: 等周不等式

假设 $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是平面上连续可微的简单闭曲线, 周长为 ℓ , 围成区域面积为 A . 证明 $4\pi A \leq \ell^2$.

Proof. 我们为曲线选取弧长参数 dt , 则 $x'(t)^2 + y'(t)^2 = 1$ 恒成立. 由于缩放平面不会对需证式造成影响, 我们可以不妨设曲线长度 $\ell = 2\pi$, 只需证明 $A \leq \pi$. 根据 Stokes 公式, 设围成区域为 D , 则

$$\int_0^{2\pi} x(t)y'(t) dt = \int_{\partial D} x dy = \int_D 1 dx \wedge dy = A.$$

我们可把 x, y 看作定义在 S^1 上的函数, 根据 $x, y, x', y' \in C(S^1)$ 可知 $x, y, x', y' \in L^2(S^1)$. 我们在 L^2 空间下考虑:

$$A = \int_{S^1} x(t)y'(t) dt = 2\pi \cdot \langle x, y' \rangle. \quad (1)$$

根据 $x'(t)^2 + y'(t)^2 = 1$ 恒成立可知

$$\int_{S^1} x'(t)^2 + y'(t)^2 \frac{dt}{2\pi} = 1 \Rightarrow \|x'\|^2 + \|y'\|^2 = 1. \quad (2)$$

设 x, y 的 Fourier 系数分别为 $\{a_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 和 $\{b_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$, 则 x' 和 y' 对应的 Fourier 系数分别为 $\{ika_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 和 $\{ikb_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$.

代入 (2):

$$1 = \|x'\|^2 + \|y'\|^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} (k^2 |a_k|^2 + k^2 |b_k|^2).$$

代入 (1):

$$\begin{aligned} A &= 2\pi \cdot \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k \overline{ikb_k} \leq 2\pi \cdot \sum_{k \in \mathbb{Z}} |ka_k b_k| \\ &\leq 2\pi \cdot \frac{1}{2} \sum_{k \in \mathbb{Z}} |k| (|a_k|^2 + |b_k|^2) \\ &\leq 2\pi \cdot \frac{1}{2} \sum_{k \in \mathbb{Z}} k^2 (|a_k|^2 + |b_k|^2) = \pi. \end{aligned}$$

证毕.



Problem 11

假设 $f(t)$ 是在 $\mathbb{R}_{>0}$ 上定义的 Lebesgue 可积函数. 我们定义它的 Laplace 变换为:

$$(\mathcal{L}f)(x) = \int_0^\infty f(t)e^{-xt} dt.$$

其中 $x > 0$. 证明

$$\mathcal{L}(f \bullet g)(x) = (\mathcal{L}f)(x)(\mathcal{L}g)(x).$$

这里卷积定义为

$$f \bullet g(t) = \int_0^t f(x)g(t-x) dx.$$

Proof. 直接计算.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(f \bullet g)(x) &= \int_0^\infty \left(\int_0^t f(y)g(t-y) dy \right) e^{-xt} dt \\ &= \int_{(t,y) \in (0,+\infty) \times (0,t)} f(y)g(t-y)e^{-xt} dt dy \\ (r=t-y, s=y) &= \int_{(r,s) \in \mathbb{R}_{>0}^2} f(s)g(r)e^{-x(r+s)} ds dr \\ &= \int_0^\infty f(s)e^{-xs} ds \cdot \int_0^\infty g(t)e^{-xt} dt = (\mathcal{L}f)(x)(\mathcal{L}g)(x). \end{aligned}$$



Problem 12

假设 f 是 $[0, 2\pi]$ 上的有界变差函数, 证明存在常数 C 使得对任意的整数 k 均有

$$|\widehat{f}(k)| \leq \frac{C}{1+|k|}.$$

Proof. 设 f 的全变差为 M , 则对 $k \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} |\widehat{f}(k)| &= \left| \int_0^{2\pi} f(x)e^{-ikx} dx \right| \\ &= \left| \int_0^{\pi/k} (f(x) - f(x + \frac{\pi}{k}) + \cdots + f(x + \frac{(2k-2)\pi}{k}) - f(x + \frac{(2k-1)\pi}{k}))e^{-ikx} dx \right| \\ &\leq \int_0^{\pi/k} \left| f(x) - f(x + \frac{\pi}{k}) \right| + \cdots + \left| f(x + \frac{(2k-2)\pi}{k}) - f(x + \frac{(2k-1)\pi}{k}) \right| dx \\ &\leq \int_0^{\pi/k} M dx = \frac{M\pi}{k}. \end{aligned}$$

同理可知对 $k < 0$ 也有 $|\widehat{f}(k)| \leq \frac{M\pi}{-k}$, 所以存在常数 C 对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 均满足

$$|\widehat{f}(k)| \leq \frac{C}{1+|k|}.$$



Problem 13

假设对某个常数 $0 < \alpha < 1$, f 是 $[0, 2\pi]$ 上的 C^α -Hölder 连续函数, 证明存在常数 C 使得

$$|\widehat{f}(k)| \leq C(1+|k|)^{-\alpha}.$$

Proof. 对 $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} |\widehat{f}(k)| &= \left| \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx \right| \\ &= \left| \int_0^{\pi/k} (f(x) - f(x + \frac{\pi}{k}) + \cdots + f(x + \frac{(2k-2)\pi}{k}) - f(x + \frac{(2k-1)\pi}{k})) e^{-ikx} dx \right| \\ &\leq \int_0^{\pi/k} \left| f(x) - f(x + \frac{\pi}{k}) \right| + \cdots + \left| f(x + \frac{(2k-2)\pi}{k}) - f(x + \frac{(2k-1)\pi}{k}) \right| dx \\ &\leq \int_0^{\pi/k} M \cdot k \left(\frac{\pi}{k} \right)^\alpha dx = \frac{M\pi}{k^\alpha}. \end{aligned}$$

对 $k < 0$ 同理. 因此存在常数 C 使得对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 均有

$$|\widehat{f}(k)| \leq \frac{C}{(1+|k|)^\alpha}.$$



Problem 14

假设对某个常数 $0 < \alpha < 1$, f 是 $[0, 2\pi]$ 上的 C^α -Hölder 连续的周期函数. 证明 f 的 Fourier 级数一致收敛到 f .