

# Notes on Complex Analysis

FE enthusiast enthusiast

2025.09.27

## 课程概要

- 课程名：复变函数
- 周课时：3
- 授课教师：郭帅
- 参考资料：复变函数简明教程，谭小江.

由于这门课基本是抄书，所以笔记不会以课堂笔记的形式进行. 我会记录一些自己的在复变上的一些想法，非常可能不完全正确. 参考资料可能也不会局限于某一本书. 个人更加喜欢从几何，拓扑的角度来研究复变（比如很多定理的表述似乎都能有更多的几何想法在里面）所以可能里面会有一些拓扑，有一些流形（黎曼面）的观点.

## 1 复导数和 Riemann 面

在学习复变的开始我们会遇到复导数  $\frac{\partial}{\partial z}$  和  $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ ，它们被形式地记为

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

它们可以“形式地”参与运算，比如说  $f(z) = z^k$  求偏导就是  $\frac{\partial f}{\partial z} = kz^{k-1}$  而  $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ . 不过这个定义很奇怪，它当然不应该是一个形式上的东西！我们应当更加正规地来看它，于是我们顺带引入一些复流形（主要是 Riemann 面）中的概念。

类似实流形，我们应当先在每点  $a$  处给出切向量（切空间），余切向量（余切空间）的定义，然后推广到开集  $U$  上形成向量场和微分形式. 在实流形中我们有如下几种定义切向量的方式：

- 几何看法：我们把流形嵌入  $\mathbb{R}^n$  中，每条过  $a$  的曲线都会在  $a$  处给出一个落在  $N$  维空间中的切向量，全体切向量构成切空间. 这是一个  $n$  维线性空间（ $n$  维流形维数），它能被可视化在  $\mathbb{R}^N$  中.
- 内蕴几何看法：我们可以直接用流形上曲线的等价类来表示切向量，这样就不需要嵌入在  $\mathbb{R}^n$  中.
- 分析看法：切向量是一种算子，它作用在全体实值函数  $C^\infty(U, \mathbb{R})$  上，给出这个函数沿该切向量的方向导数. 因此在一组局部坐标系下，我们常说  $\frac{\partial}{\partial x_i}$  构成了切空间的一组基，它可以作用在函数  $f$  上给出  $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ .
- 抽象看法：我们把上面的概念抽象化，一个微分算子是映射  $D : C^\infty(U, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ ，满足线性性  $D(af + bg) = aD(f) + bD(g)$  和（在  $a$  处的）Leibniz 法则  $D(fg) = f(a)D(g) + D(f)g(a)$ .

在实情形下我们可以这样证明全体导子都有方向导数给出：

$$D(f) = \sum_{i=1}^n D(x_i) \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_a.$$

（这里  $D$  中的  $x_i$  和偏导中的  $x_i$  都应被视为函数而非单纯的坐标分量.）对任意线性映射  $T$ ，它都能被写为  $\sum a_i x_i$  的形式，从而根据线性有

$$D(T) = \sum D(x_i) \frac{\partial T}{\partial x_i} \Big|_a.$$

但是任何光滑函数都能被近似到线性函数：具体来说，

$$f(x) = f(a) + \int_0^1 df|_{tx+(1-t)a}(x-a) dt = f(a) + \sum_{i=1}^n (x_i - a_i) \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_{tx+(1-t)a} dt.$$

所以根据 Leibniz 法则，

$$Df = \sum_{i=1}^n D(x_i - a_i) \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_a = \sum_{i=1}^n D(x_i) \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_a.$$

回到复值函数的讨论, 自然地我们只需把上面定义里  $D$  的定义域稍作修改, 改为  $C^\infty(U, \mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$  就可以了. 新的切空间成为复线性空间, 如果选定一组局部坐标卡, 它可被写为

$$\text{span}_{\mathbb{C}}\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right)_{1 \leq i \leq n} = T_a U \otimes \mathbb{C}.$$

所以我们解释了  $\frac{\partial}{\partial z}$  和  $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$  的确是自然定义的算子, 并且它们也可以张成整个切空间. 但是为什么要这样定义呢? 从微分 (余切空间) 的角度来看或许更自然.

在实流形上, 余切空间被定义为切空间的<sup>对偶空间</sup>, 或者说  $T_a U$  上的线性函数构成的空间. 但我们发现余切空间有很好的<sup>外微分</sup>结构, 所以之后有不少讨论都围绕余切空间展开. 比如说对每个函数  $f$  都可以定义  $df$ , 它在  $a$  处把切向量  $v$  打到  $D_v(f)$ , 也就是  $v$  方向上的方向导数. 在一组局部坐标下, 坐标函数  $x_i$  的微分给出了余切空间的一组基  $dx_i|_a$ . 通过取  $f$  是  $x_i$  的线性组合可知, 全体  $df|_a$  也给出了全体余切向量.

因此, 我们也可以用另一种不涉及到切向量的方法来直接从函数入手定义余切空间 (这时反而切空间被视为其对偶来定义.) 观察到如果两个函数在  $a$  附近的局部形态相同那么它们微分给出相同的值. 具体地, 如果两个函数在  $a$  的某个开邻域  $W$  上等同, 就说它们在  $a$  附近等价. 定义  $a$  处的<sup>光滑函数芽</sup> (germ) 就是全体光滑函数在  $a$  处的等价类, 记为  $\mathcal{E}_a$ , 它同样是  $U$  上的代数. 记

$$\mathfrak{m}_a = \{f \in \mathcal{E}_a, f(a) = 0\}, \quad \mathfrak{m}_a^2 = \left\{f \in \mathcal{E}_a, \frac{\partial f}{\partial x_i} \Big|_a = 0, \forall i\right\}.$$

那么就可以定义余切空间是<sup>芽函数的等价类</sup>  $\mathfrak{m}_a/\mathfrak{m}_a^2$ . 对每个函数  $f$ ,  $df_a$  就定义为  $f - f(a)$  所在的等价类. 很明显上面两个定义给出的空间是相同的, 我们做的只不过是全体函数商去那些微分为零的函数. (我目前不知道上面更深的知识, 但是确实能够感受到后一种定义方法已经在往代数方向走了.) 我们证明  $dx_a, dy_a$  (把  $x, y$  看成函数!) 仍然是余切空间的一组基, 因为根据光滑函数的 Taylor 展开,

$$f(z) = f(a) + \frac{\partial f}{\partial x}(x - x(a)) + \frac{\partial f}{\partial y}(y - y(a)) + o(z - a).$$

所以

$$df_a = \frac{\partial f}{\partial x} dx_a + \frac{\partial f}{\partial y} dy_a.$$

现在搬到复值函数上. 在一个复数坐标卡上,  $x, y$  这两个函数分别代表它朝实部, 虚部方向的投影. 这时我们发现:  $z$  和  $\bar{z}$  是在情形下两个更自然的函数 ( $z$  就代表恒等映射, 还有比恒等映射更自然的东西吗?), 根据上面的表达式, 我们有

$$dz_a = dx_a + i dy_a, \quad d\bar{z}_a = dx_a - i dy_a.$$

所以  $\{dz_a, d\bar{z}_a\}$  也可以作为余切空间的一组基, 可以验证 (也可以说定义) 函数  $f$  在

$z, \bar{z}$  方向的偏导数就是  $df_a$  在两个分量上的系数.

$$df_a = \frac{\partial f}{\partial z} dz_a + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} d\bar{z}_a.$$

$$f(z) = f(a) + \frac{\partial f}{\partial z}(z - a) + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(\bar{z} - \bar{a}) + o(z - a).$$

这就说明了为什么复导数在应用时看上去是“形式求导”，并且此时明显要比之前用  $x, y$  分量从形式看上去更自然.（注意：这两个偏导数应当被放在一起讨论，正如在不同坐标系下  $x$  分量对应的坐标函数可以相等，但是  $\frac{\partial}{\partial x}$  的意义则不同）研究它们的意图也就水落石出：因为对解析函数  $f$ ,

$$f(z) = f(a) + \frac{\partial f}{\partial z}(z - a) + o(z - a) \Rightarrow df_a = \frac{\partial f}{\partial z} dz.$$

此即 Cauchy-Riemann 方程  $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ .

## 2 第一次作业

## Problem 1: 习题 2-3

证明: (1) 如果  $f, \bar{f}$  均解析, 那么  $f$  为常值函数;  
 (2) 如果  $f$  解析, 且  $|f|$  为常值函数, 则  $f$  为常值函数.

*Proof.* (1) 对任意点  $z_0 \in \mathbb{C}$ ,

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}, \quad \bar{f}'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\overline{f(z)} - \overline{f(z_0)}}{z - z_0}.$$

两个极限都存在. 分别取  $z = z_0 + \lambda$  和  $z = z_0 + \lambda i$  ( $\lambda \in \mathbb{R}$ ) 得到:

$$\begin{aligned} \bar{f}'(z_0) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\overline{f(z_0 + \lambda)} - \overline{f(z_0)}}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\overline{f(z_0 + \lambda) - f(z_0)}}{\lambda} = \overline{f'(z_0)}; \\ \bar{f}'(z_0) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\overline{f(z_0 + i\lambda)} - \overline{f(z_0)}}{i\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\overline{f(z_0 + i\lambda) - f(z_0)}}{-i\lambda} = -\overline{f'(z_0)}. \end{aligned}$$

从而  $f'(z_0) = 0$ , 根据  $z_0$  的任意性  $f$  为常值函数.

(2) 设  $|f| \equiv c$ , 则  $\text{im } f \subset \{z \in \mathbb{C} : |z| = c\}$ . 如果存在一点  $z_0$  使得  $f'(z_0) \neq 0$ , 则  $f$  把  $z_0$  的一个开邻域同胚到  $f(z_0)$  的一个开邻域上. 但是  $\text{im } f$  没有内点, 矛盾. 从而对任意  $z_0$  均有  $f'(z_0) = 0$ , 故  $f$  为常值函数.  $\left\langle \frac{u}{v} \right\rangle$

## Problem 2: 习题 2-5

设  $f = u + iv$  解析, 且  $f'$  处处非零. 证明: 对任意  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ , 曲线 (?)  
 $u(x, y) = c_1$  和  $v(x, y) = c_2$  正交.

*Proof.* 考虑直线  $l_1 = \{z : \text{Re } z = c_1\}$  和  $l_2 = \{z : \text{Im } z = c_2\}$ , 则这两条直线在复平面上正交. 由于  $f$  解析且  $f'$  处处非零, 因此  $f$  在每点处都是局部同胚, 从而对每个  $z$ ,  $f^{-1}(z)$  都是离散集, 选定  $w \in f^{-1}(z)$ , 则一条从  $z$  出发的道路可被唯一提升为从  $w$  出发的一条道路. 所以一条直线的原像是很多条不交的曲线的并.

$f^{-1}(l_1) \cap f^{-1}(l_2) = f^{-1}(c_1 + ic_2)$ , 取出任意  $w \in f^{-1}(c_1 + ic_2)$ , 则根据局部同胚性仅有  $u$  中一条曲线和  $v$  中一条曲线在  $w$  处相交. 根据解析映射的保角性, 这两条曲线的夹角应当和它们像的夹角相同, 都是  $\pi/2$ . 所以这两条曲线正交, 证毕.  $\left\langle \frac{u}{v} \right\rangle$

## Problem 3: 习题 2-6(1)

设  $u(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ . 问:  $u(x, y)$  何时是一个解析函数的实部? 如果是, 求  $v$  使得  $f = u + iv$  是解析函数.

*Proof.* 我们需要  $u$  是一个调和函数, 求二阶偏导:

$$\Delta u(x, y) = 2a + 2c = 0.$$

所以我们要求  $a + c = 0$ . 此时对每点  $z_0 = x_0 + \mathbf{i}y_0 \in \mathbb{C}$ , 考虑一条从 0 到  $z_0$  的曲线  $\gamma$  从  $(0, 0)$  横向匀速走到  $(x_0, 0)$  再纵向走到  $(x_0, y_0)$ , 定义

$$\begin{aligned} v(x_0, y_0) &= \int_{\gamma} (\partial_x u \, dy - \partial_y u \, dx) = \int_{\gamma} ((2ax + by) \, dy - (bx + 2cy) \, dx) \\ &= \int_0^{x_0} (-bx + 2c \cdot 0) \, dx + \int_0^{y_0} (2ax_0 + by) \, dy \\ &= -\frac{1}{2}bx_0^2 + 2ax_0y_0 + \frac{1}{2}by_0^2. \end{aligned}$$

即  $v = \frac{1}{2}b(y^2 - x^2) + 2axy$  满足  $f = u + \mathbf{i}v$  是解析函数. 

*Remark.* 这种问题还有另一个解法, 比如当  $a + c = 0$  时,  $u$  可以写为

$$u = \left(\frac{a}{2} + \frac{b}{4\mathbf{i}}\right)z^2 + \left(\frac{a}{2} - \frac{b}{4\mathbf{i}}\right)\bar{z}^2.$$

为了得到解析函数, 我们需要消去  $\bar{z}$  项, 但我们又需要保证得到一个实函数, 于是选取

$$v = \frac{1}{\mathbf{i}}\left(\frac{a}{2} + \frac{b}{4\mathbf{i}}\right)z^2 - \frac{1}{\mathbf{i}}\left(\frac{a}{2} - \frac{b}{4\mathbf{i}}\right)\bar{z}^2.$$

就可使  $u + \mathbf{i}v$  只含  $z^2$  项, 在差一个常数的意义下这样的选取是唯一的. 这种方法不需要求积分.

#### Problem 4: 习题 2-8

设  $f$  解析并有连续导函数, 且  $f'(z_0) \neq 0$ , 证明: 存在  $z_0$  的邻域  $U$  和  $f(z_0)$  的邻域  $V$ , 使得  $f: U \rightarrow V$  是双射. 用 C-R 方程证明  $f^{-1}: V \rightarrow U$  也解析.

*Proof.* 设  $f = u + \mathbf{i}v$ , 将  $f$  视为  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  的函数. 根据反函数定理, 存在  $z_0$  的邻域  $U$  和  $f(z_0)$  的邻域  $V$  使得  $f: U \rightarrow V$  是  $C^1$  同胚. 因此局部上反函数存在, 根据  $f$  满足 C-R 方程可知:

$$\text{Jac}_z(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ -\frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial x} \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

根据  $f^{-1}$  的 Jacobi 矩阵满足  $\text{Jac}_{f(z)}(f^{-1}) \circ \text{Jac}_z(f) = \text{id}$  可知:

$$\text{Jac}_{f(z)}(f^{-1}) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

所以  $f^{-1}$  也满足 C-R 方程, 因此是解析的. 

#### Problem 5: 习题 2-9

设  $f: (x, y) \mapsto (u(x, y), v(x, y))$  是区域  $\Omega_1$  到  $\Omega_2$  的  $C^\infty$  同胚. 称  $f$  是保面积的, 如果对  $\Omega_1$  内任意以光滑曲线为边界的有界开集  $O$ ,  $f(O)$  和  $O$  的面积都相等. (对任意可测集  $E$  都有  $m(f(E)) = m(E)$ ?) 证明: 如果  $f$  是保面积的, 且函数  $f = u + \mathbf{i}v$  解析, 则  $f(z) = e^{\mathbf{i}\theta}z + c$ ,  $\theta \in \mathbb{R}$ ,  $c \in \mathbb{C}$ .

*Proof.* 根据多元微积分中的换元公式可知, 对任意区域  $\Omega$ ,

$$\int_{\Omega} 1 \, dx \, dy = \int_{f(\Omega)} 1 \, dx \, dy = \int_{\Omega} |\det(df)| \, dx \, dy.$$

如果  $f$  是保面积的, 在每点  $z$  处我们可以取一串开球  $B_{1/n}(z)$ , 当  $n$  足够大时总有  $B_{1/n}(z) \subset \Omega_1$ . 根据  $\det(df)$  的连续性,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{B_{1/n}(z)} |\det(df)| \, dx \, dy = |\det(df)(z)| \cdot |B_{1/n}(z)|.$$

所以  $|\det(df)| \equiv 1$ . 由于  $df$  是复线性映射, 这直接给出  $|f'(z)| = 1$  恒成立. 由  $f$  解析可知  $f'$  解析, 根据习题 2-3 结论可知  $f'$  为常值函数, 于是存在  $\theta \in \mathbb{R}$  使得  $f' \equiv e^{i\theta}$ , 这也就是说  $(f - e^{i\theta}z)' \equiv 0$ , 于是  $f - e^{i\theta}z \equiv c$ . 证毕.  $\square$

#### Problem 6: 习题 2-14

设  $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} n^2 z^n$ ,  $g(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} (n^2 + 1)z^n$ .

(1) 如果  $g/f = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots$ , 求  $a_0, a_1, a_2$ .

(2) 如果  $f \circ g = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots$ , 求  $a_0, a_1, a_2$ .

*Proof.* 把  $f$  移到右侧, 解方程:

$$(z + 4z^2 + 9z^3)(a_0 + a_1 z + a_2 z^2) = 2z + 5z^2 + 10z^3 \pmod{z^4}.$$

即

$$a_0 z + (4a_0 + a_1)z^2 + (9a_0 + 4a_1 + a_2)z^3 = 2z + 5z^2 + 10z^3.$$

解得  $a_0 = 2, a_1 = -3, a_2 = 4$ .

第二部分:

$$\begin{aligned} a_0 + a_1 z + a_2 z^2 &= (2z + 5z^2 + 10z^3) + 4(2z + 5z^2 + 10z^3)^2 \pmod{z^3} \\ &= 2z + 21z^2. \end{aligned}$$

所以  $a_0 = 0, a_1 = 2, a_2 = 21$ .  $\square$

#### Problem 7: 习题 2-15

如果级数  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$  收敛, 证明  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  收敛并且其和与求和顺序无关.

*Proof.* 只需证明  $\sum_{n=0}^k a_n$  是 Cauchy 列. 由于  $\sum_{n=0}^k |a_n|$  是 Cauchy 列, 因此对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N > 0$  使得对任意  $n > m > N$  均有

$$\sum_{i=m}^n |a_i| < \varepsilon.$$

所以

$$\left| \sum_{i=m}^n a_i \right| \leq \sum_{i=m}^n |a_i| < \varepsilon.$$

所以  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  收敛.

再证明与求和顺序无关: 对任意  $\varepsilon > 0$ , 设  $N$  满足  $\sum_{n=N}^{\infty} |a_n| < \varepsilon$ . 无论按什么顺序, 总存在一个时刻  $N'$  使得对任意  $m > N'$  均有  $\sum_{n=0}^m a_{\sigma(n)}$  包含  $a_1, \dots, a_N$ , 从而

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n - \sum_{n=0}^m a_{\sigma(n)}$$

中  $a_1$  至  $a_N$  项系数均为零, 之后的项系数可能为 1 或 0, 所以

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n - \sum_{n=0}^m a_{\sigma(n)} \right| \leq \sum_{n=N'}^{\infty} |a_n| < \varepsilon.$$

所以后者的极限就是  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ .



#### Problem 8: 习题 2-20

设  $f$  在  $\mathbb{C}$  上解析, 并将上半平面映到上半平面, 将实轴映到实轴. 证明在实轴上  $f'(z) \geq 0$ .

*Proof.* 任选  $z \in \mathbb{R}$ , 首先根据  $f$  把实轴映到实轴可知

$$f'(z) = \lim_{w \rightarrow z, q \in \mathbb{R}} \frac{f(w) - f(z)}{w - z} \in \mathbb{R}.$$

如果  $f'(z) < 0$ , 根据  $\operatorname{Re} f(z + \lambda i) > 0$  对  $\lambda > 0$  成立可知

$$\arg \frac{f(z + \lambda i) - f(z)}{\lambda i} \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

但是  $\lambda \rightarrow 0$  时上式的辐角应当趋向于  $f'(z)$  的辐角, 即  $-\pi$ , 矛盾.



#### Problem 9: 习题 2-22

(1) 设  $z_1, z_2$  是单位圆中任意两个互不相等的点, 证明存在单位圆到自身的分式线性变换  $L$ , 使得  $L(z_1) = 0, L(z_2) > 0$ . 问: 这样的分式线性变换是否唯一?

(2) 设  $L$  是 (1) 中给定的分式线性变换, 证明:  $L^{-1}$  将实轴变为和过  $z_1, z_2$  并和单位圆周垂直的圆.

*Proof.* (1) 我们证明这样的  $L$  存在: 由于  $L$  保单位圆而分式线性变换都保反演对应点, 我们记一个点  $z$  关于单位圆的反演对应点为  $z^*$ . 所以要想  $L(z_1) = 0$ , 只需  $L(z_1^*) = \infty$ . 这样只需要关于一个以  $z_1^*$  为圆心而和单位圆正交的圆作反演 (这是能做到的: 因为  $z_1^*$  在圆外, 以  $Oz_1^*$  为直径作圆和单位圆交于  $A, B$  两点, 以  $|z_1^*A|$  为半径作圆即可).



此时  $z_2$  仍然在圆内, 考虑一个旋转把  $z_2$  送到正实轴上, 这样不改变  $L(z_1) = 0$  而使  $L(z_2) > 0$ .

再证明变换是唯一的, 我们来证明  $L(z_2)$  的位置固定. 这是因为考虑过  $z_1, z_2$  的和单位圆正交的圆与单位圆交点  $\xi_1, \xi_2$ , 那么复交比  $(\xi_1, \xi_2; z_1, z_2)$  在分式线性变换下不变, 并且由于这个圆的像是过  $L(z_1), L(z_2)$  和单位圆正交的圆 (就是实轴), 所以  $\{L(\xi_1), L(\xi_2)\} = \{\pm 1\}$ ,

$$(1, -1; 0, L(z_2)) = \frac{1}{1 - L(z_2)} : \frac{-1}{-1 - L(z_2)} = \frac{1 + L(z_2)}{1 - L(z_2)}.$$

于是  $\frac{1+L(z_2)}{1-L(z_2)} = (\xi_1, \xi_2; z_1, z_2)$  或者  $\frac{1-L(z_2)}{1+L(z_2)} = (\xi_1, \xi_2; z_1, z_2)$ , 显然这两个方程的根互为相反数, 负根被舍去, 正根就是  $L(z_2)$  的固定值记为  $p$ . 所以  $L$  是把  $z_1, z_2, z_1^*$  送到  $0, p, \infty$  的分式线性变换, 这样的变换唯一.

(2) 上面的论述已经说明了.



#### Problem 10: 习题 2-27

设给定的四个点  $z_1, z_2, z_3, z_4$  按顺序位于圆周  $K$  上, 证明其交比

$$(z_1, z_2; z_3, z_4) > 0.$$

*Proof.* 首先考虑  $z_1$  和  $z_4$  之间不含  $z_2, z_3$  的那段弧上一点, 以该点为圆心任意半径作反演, 那么得到一条直线, 并且  $z_1, z_2, z_3, z_4$  顺次分布. 再通过旋转, 平移和翻折不妨设该直线为实轴并且  $z_j$  从左到右排列在实轴上, 整个过程中交比不改变. 此时  $z_1 - z_3, z_2 - z_3, z_1 - z_4, z_2 - z_4$  都小于零, 于是

$$(z_1, z_2; z_3, z_4) = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} : \frac{z_1 - z_4}{z_2 - z_4} > 0.$$



#### Problem 11: 习题 2-29

设  $a_1, a_2, a_3, a_4$  两两不等, 求

$$f = \sqrt{(z - a_1)(z - a_2)(z - a_3)(z - a_4)}$$

单值解析函数存在的最大区域.

*Proof.* 首先  $f$  在  $a_1, a_2, a_3, a_4$  处不解析, 并且在剩余区域上都是双值函数. 记  $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ , 并任取一个基点  $*$ . 对任何  $z \in \Omega, w \in f(z)$  和以  $z$  为起点的一条道路  $\gamma$ ,  $f$  把  $\gamma$  提升为一条以  $w$  为起点的道路. 设  $\gamma$  的终点为  $z'$ , 定义  $\gamma_* : f(z) \rightarrow f(z')$  把  $w \in f(z)$  送到  $\gamma$  在  $w$  处提升所得道路的终点. 由于  $f(z), f(z')$  都是离散集, 因此同伦的道路给出的  $\gamma_*$  是相同的. 从而逆道路  $\gamma^{-1}$  给出的  $\gamma_*^{-1}$  满足  $\gamma_* \gamma_*^{-1} = \gamma_*^{-1} \gamma_* = \text{id}$ , 所以  $\gamma_*$  是集合间的双射, 由于集合大小为 2, 只有两种双射.

如果对任意区域  $D$  上以  $*$  为基点的回路  $\gamma: [0, 1] \rightarrow D$  均有  $\gamma_* = \text{id}$ , 那么任取  $\star \in f(*)$ , 对任意  $z \in D$  考虑一条从  $*$  到  $z$  的道路  $\phi$ , 定义  $g(z) = \phi_*(\star)$ . 不同的路径  $\phi, \phi'$  满足  $\phi_* = \phi'_*$ , 否则会导致  $\phi_*^{-1}\phi'_* \neq \text{id}$ , 矛盾. 这样  $g$  就是一个单值解析分支, 反之如果单值解析分支存在也一定要求基点处的回路满足  $\gamma_* = \text{id}$  (否则  $\gamma_*$  会把两个元素交换, 这是不行的), 因此该条件是充要的.

根据同伦不变性, 只需考察  $\pi_1(\Omega, *) \rightarrow \text{Aut}(f(*)) \cong \{\pm 1\}$ ,  $[\gamma] \mapsto [\gamma_*]$  的作用效果. 根据拓扑学的知识,  $\pi_1(\Omega, *)$  是有 4 个生成元的自由群, 4 个代表元分别为恰好内部包含某个  $z_i$  的圈 (记为  $\gamma_i$ ), 我们具体考虑某个  $\gamma_i$ .

记  $f_i(z) = \sqrt{z - z_i}$ , 那么对任意  $j \neq i$ ,  $\gamma_j$  零伦, 从而  $(\gamma_j)_* = \text{id}$ . 但是回路  $\gamma_i$  辐角总变化为  $2\pi$ , 所以  $(\gamma_i)_*$  会交换集合内的两个点. 由于函数的乘法也是连续的, 将这些终点相乘可以发现  $f_* \neq \text{id}$ , 于是它会交换  $f(*)$  中的两个点. 所以  $\pi_1(\Omega, *)$  中每个代表元都被送到  $-1$ , 即我们希望区域  $\Omega$  中仅存在同伦于偶数个代表元相加而得的那些圈. 一种方法是去掉两条分别连接  $z_1 z_2$  和  $z_3 z_4$  的不交曲线, 这样  $\gamma_1 \gamma_2$  和  $\gamma_3 \gamma_4$  就必须一起出现, 从而构成一个最大区域 (任意添加一点都不满足要求). 

### 3 第二次作业

#### Problem 12: 习题 3-1

如果  $f$  是区域  $\Omega$  上的解析函数,  $\gamma: t \mapsto z(t), t \in [0, b]$  是  $\Omega$  中一光滑曲线,  $f$  在  $\gamma$  上处处不为零. 令  $\Gamma$  是由  $t \mapsto f(z(t)), t \in [0, b]$  定义的曲线, 证明变元替换公式

$$\int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \int_{\Gamma} \frac{d\omega}{\omega}.$$

*Proof.* 把积分拉回到曲线  $\gamma$  上:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz &= \int_0^b \frac{f'(z(t))}{f(z(t))} z'(t) dt, \\ \int_{\Gamma} \frac{d\omega}{\omega} &= \int_0^b \frac{(f \circ \gamma)'(t)}{f \circ \gamma(t)} dt = \int_0^b \frac{f'(z(t))}{f(z(t))} z'(t) dt. \end{aligned}$$

所以两式相等. 

#### Problem 13: 习题 3-3

设  $\gamma$  是  $\mathbb{C}$  中一光滑曲线,  $\phi(z)$  是  $\gamma$  上的连续函数, 利用倒数定义证明:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\phi(w)}{w - z} dw$$

在  $\mathbb{C} - \gamma$  上解析.

*Proof.* 任取  $z, z_1 \in \mathbb{C} - \gamma$ ,

$$f(z_1) - f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\phi(w)}{w - z_1} - \frac{\phi(w)}{w - z} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\phi(w)(z_1 - z)}{(w - z_1)(w - z)} dw.$$

由于  $\mathbb{C} - \gamma$  是开集, 因此存在  $d > 0$  使得  $B_d(z)$  和  $\gamma$  无交, 即  $|w - z| \geq d$  对任意  $w \in \gamma$  成立. 所以对任意  $z_1$  满足  $|z - z_1| < \varepsilon < d$ , 均有  $z_1 \notin \gamma$ , 并且积分

$$\left| \int_{\gamma} \frac{\phi(w)}{(w - z_1)(w - z)} dw \right| \leq \frac{L(\gamma)}{d(d - \varepsilon)}$$

有界并且函数一致连续, 所以

$$\lim_{z_1 \rightarrow z} \frac{f(z_1) - f(z)}{z_1 - z} = \lim_{z_1 \rightarrow z} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\phi(w)}{(w - z_1)(w - z)} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\phi(w)}{(w - z)^2} dw.$$

故复导数存在. 

#### Problem 14: 习题 3-5

设  $f$  在区域  $\Omega$  上解析,  $z_0 \in \Omega$ . 证明:

(1)  $f$  在  $z_0$  邻域内可展开为  $z - z_0$  的幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n.$$

(2) 此幂级数的收敛半径大于等于  $\text{dist}(z_0, \partial\Omega)$ ,

(3) 如果  $f$  为  $(x_0 - r, x_0 + r)$  上的实函数, 在  $x_0$  处展开的 Taylor 级数收敛于  $f$ , 且这一级数的收敛半径  $R > r$ , 则对任意  $x' \in (x_0 - r, x_0 + r)$ ,  $f$  在  $x'$  处展开的 Taylor 级数收敛于  $f$ .

*Proof.* (1) 取  $z_0$  的开邻域  $B_r(z_0)$  使得  $\overline{B_r(z_0)} \subset \Omega$ , 则可通过对  $\partial B_r(z_0)$  使用 Cauchy 公式证明  $f$  在  $B_r(z_0)$  上可被展开为幂级数  $f = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ . 根据幂级数的求导法则可知

$$f^{(m)}(z_0) = \left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n \right)^{(m)}(z_0) = m! a_m.$$

所以  $a_n = f^{(n)}(z_0)/n!$ .

(2) 在上一问中取  $r_0 = \text{dist}(z_0, \partial\Omega)$ , 根据最短距离的定义可知确实有  $B_{r_0}(z_0) \subset \Omega$ . 所以对任意  $r < r_0$  都有  $\overline{B_r(z_0)} \subset \Omega$ , 所以收敛半径大于等于  $r$ . 根据任意性可知收敛半径大于等于  $\text{dist}(z_0, \partial\Omega)$ .

(3) 由于  $f$  在  $x_0$  处可展开为幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$  的形式, 并且收敛半径为  $R > r$ , 那么我们可以直接用幂级数的形式来代替  $f$ .  $f$  可延拓为  $B_r(x_0) \subset \mathbb{C}$  上的幂级数  $f = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ . 根据收敛性,  $f$  是  $B_r(x_0)$  上的解析函数, 所以每点处的 Taylor 级数都收敛于  $f$ . 特别地,  $f$  在  $x'$  处展开的 Taylor 级数收敛于  $f$  (因为幂级数的实导数和复导数相同). 

## Problem 15: 习题 3-6

计算积分:

$$\int_{|z+i|=1} \frac{e^z}{1+z^2} dz, \quad \int_{|z|=1} \bar{z} dz.$$

*Proof.* 第一个函数在  $\mathbb{C} - \{\pm i\}$  上都是解析的,  $f(z) = \frac{e^z}{z-i}$  在  $\mathbb{C} - \{i\}$  上是解析的, 因此可使用 Cauchy 型积分得到:

$$\int_{|z+i|=1} \frac{e^z}{(z+i)(z-i)} dz = \int_{|z+i|=1} \frac{f(z)}{z+i} dz = 2\pi i \cdot f(-i) = -\pi e^{-i}.$$

第二个函数可以考虑  $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $\gamma(\theta) = e^{i\theta}$ ,

$$\int_{|z|=1} \bar{z} dz = \int_0^{2\pi} e^{-i\theta} \cdot i e^{i\theta} d\theta = 2\pi i.$$



## Problem 16: 习题 3-7

计算:

$$(1) \int_{|z|=2} \frac{dz}{z^3(z+3)^2}; \quad (2) \int_{|z|=R} \frac{dz}{(z-a)^n(z-b)}$$

*Proof.* (1) 当  $n \neq -1$  时,

$$\int_{|z|=2} z^n dz = \int_{|z|=2} d\left(\frac{1}{n+1} z^{n+1}\right) = 0.$$

当  $n = -1$  时,

$$\int_{|z|=2} z^{-1} dz = \int_0^{2\pi} e^{-i\theta} i e^{i\theta} d\theta = 2\pi i.$$

函数  $f(z) = (z+3)^{-2}$  在  $\overline{B_2(0)}$  上解析, 于是可展开为幂级数形式.

$$(z+3)^{-2} = f(0) + f'(0)z + \frac{f''(0)}{2}z^2 + \dots$$

计算知  $f'(z) = -2(z+3)^{-3}$ ,  $f''(z) = 6(z+3)^{-4}$ , 所以  $f''(0) = 6 \cdot 3^{-4} = 2/27$ . 因此

$$\int_{|z|=2} \frac{f(z)}{z^3} dz = \int_{|z|=2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^{n-3} dz = 2\pi i \cdot \frac{f''(0)}{2} = \frac{2\pi i}{27}.$$

(2) 分情况讨论. 如果  $a, b$  都不在圆盘内, 则积分结果为 0. 如果  $a, b$  都在圆盘内, 那么由于  $f$  明显地能延拓到  $\infty$  处, 并且  $f(\infty) = 0$ . 所以在  $S^2$  上曲线  $|z| = R$  零伦, 因此积分结果也为 0. 如果  $a$  在圆盘内而  $b$  在圆盘外, 则需要考虑  $(z-b)^{-1}$  在  $a$  点处的 Taylor 展开的第  $n-1$  项系数. 易知

$$[(z-b)^{-1}]^{(n-1)} = (-1)^{n-1} (n-1)! (z-b)^{-n}.$$

所以其系数为  $(-1)^{n-1}(n-1)!(a-b)^{-n}/(n-1)! = (-1)^{n-1}(a-b)^{-n}$ . 于是积分结果为  $2\pi i \cdot (-1)^{n-1}(a-b)^{-n}$ . 当  $a$  在圆盘外而  $b$  在圆盘内时, 积分直接为 Cauchy 型积分, 结果为  $\frac{2\pi i}{(b-a)^n}$ . 

### Problem 17: 习题 3-8

设  $f$  在  $D_0(z_0, R) = \{z : 0 < |z - z_0| < R\}$  上解析, 证明: 存在常数  $c$ , 使  $f(z) - \frac{c}{z - z_0}$  在  $D_0(z_0, R)$  上有原函数.

*Proof.* 这是因为存在  $c$  使得

$$\int_{\partial D(z_0, R/2)} \frac{c}{z - z_0} dz = 2c\pi i = \int_{\partial D(z_0, R/2)} f(z) dz.$$

而  $D_0(z_0, R)$  中任意回路都同伦于  $n$  个圈连接起来所得结果, 因此对任意回路  $\gamma$  均有

$$\int_{\gamma} f(z) - \frac{c}{z - z_0} dz = 0.$$

因此从任何一点  $z_1 \in D_0(z_0, R)$  出发, 为每个  $w$  选定一条从  $z_1$  到  $w$  的道路  $\gamma(z_1, w)$ , 可以给出良定义的函数

$$F(w) = \int_{\gamma(z_1, w)} f(z) - \frac{c}{z - z_0} dz.$$

特别地, 对任意一个方向, 都可以选取一个  $\gamma(z_1, w)$  使得曲线最终以该方向靠近  $w$ , 所以在任意方向上求导结果都是  $f(w) - \frac{c}{w - z_0}$ , 从而  $F$  给出  $f(z) - \frac{c}{z - z_0}$  的原函数. 

### Problem 18: 习题 3-15

设  $f$  在区域  $\Omega$  上解析但不是多项式, 证明: 存在  $z_0 \in \Omega$ , 使得对任意  $n$ , 均有  $f^{(n)}(z_0) \neq 0$ .

*Proof.* 考虑  $P_n = \{z \in \Omega : f^{(n)}(z) = 0\}$ . 如果  $P_n$  不是孤立集, 则根据  $f^{(n)}$  的解析性,  $f^{(n)}$  在  $\Omega$  上恒为零, 所以  $f$  的更高阶导数也在  $\Omega$  上恒为零. 因此每点处的 Taylor 展开从  $f^{(n)}(z)$  开始全为零, 故每点附近  $f$  都展现为多项式. 设某个  $z$  附近有  $f = P$ , 则  $P$  的定义域显然可延拓到整个  $\mathbb{C}$  上, 并且仍然是解析函数. 这导致  $f$  和  $P$  在一个开集上等同, 所以在整个  $\Omega$  上均等同. 这导致  $f = P$ , 与题目条件矛盾!

因此  $P_n$  中无极限点, 所以  $P_n$  为可数集,  $\bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$  也为可数集. 但区域  $\Omega$  中含有不可数个顶点, 因此存在  $z_0$  使得  $f^{(n)}(z_0) \neq 0$  对任意  $n$  成立. 

### Problem 19: 习题 3-18

设  $f$  在  $\overline{B_1(0)}$  的邻域上解析, 令  $\gamma = f(\partial B_1(0))$ . 证明:  $\gamma$  的弧长  $L \geq 2\pi |f'(0)|$ .

*Proof.* 考虑参数化  $\phi: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}, \theta \mapsto e^{i\theta}$ , 则  $\gamma = f \circ \phi$ . 因此

$$L = \int_0^{2\pi} |(f \circ \phi)'(\theta)| d\theta = \int_0^{2\pi} |f'(e^{i\theta}) \cdot ie^{i\theta}| d\theta = \int_0^{2\pi} |f'(e^{i\theta})| d\theta.$$

根据  $f$  在  $\overline{B_1(0)}$  邻域上解析可知  $f'$  可展开为幂级数, 从而存在解析函数  $g$  使得对任意  $\theta$  均有

$$f'(e^{i\theta}) = f'(0) + e^{i\theta} \cdot g(e^{i\theta}).$$

另一方面,

$$0 = \int_{S^1} g dz = \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) ie^{i\theta} d\theta.$$

所以

$$\int_0^{2\pi} |f'(e^{i\theta})| d\theta \geq \left| \int_0^{2\pi} f'(e^{i\theta}) d\theta \right| = \left| \int_0^{2\pi} f'(0) d\theta \right| = 2\pi |f'(0)|.$$



#### Problem 20: 习题 3-19

设  $f$  将  $D(0, 1)$  单叶地映为  $D$ , 证明:  $D$  的面积  $A(D) \geq \pi |f'(0)|^2$ .

*Proof.* 根据面积公式,

$$\begin{aligned} A(D) &= \int_{A(D)} 1 dx dy = \int_D |\det df| dx dy = \int_D |f'|^2 dx dy \\ &= \int_0^1 r \int_0^{2\pi} |f'(re^{i\theta})|^2 d\theta dr. \end{aligned}$$

根据上题结论, 令  $g(z) = (f')^2(rz)$ , 则

$$\int_0^{2\pi} |f'(re^{i\theta})|^2 d\theta = \int_0^{2\pi} |g(e^{i\theta})| d\theta \geq 2\pi |g'(0)| = 2\pi |f'(0)|^2.$$

所以

$$A(D) \geq \int_0^1 r \cdot 2\pi |f'(0)|^2 dr = \pi |f'(0)|^2.$$



#### Problem 21: 习题 3-20

设非常数的函数  $f$  在  $1 < |z| < \infty$  上解析, 且  $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$  存在, 记为  $f(\infty)$ .

证明:

$$(1) f(\infty) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(Re^{i\theta}) d\theta, \quad R > 1. \quad (\text{没看懂原题为什么对 } |z| = R \text{ 求积分.})$$

(2) 在  $z > 1$  上最大模原理成立.

*Proof.* 条件告诉我们  $f$  可定义在 Riemann 球面  $S^2$  (我们就把它等同为  $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ ) 中  $D(0, 1)$  的外部. 定义  $\phi: \mathbb{C} \cup \{\infty\} \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ ,  $z \mapsto 1/z$ . 则  $f \circ \phi$  是  $\overline{B(0, 1)} \rightarrow \mathbb{C}$  的解析函数, 则它可进行幂级数展开. 设  $f \circ \phi(z) = (f \circ \phi)(0) + z \cdot g(z)$ ,  $g$  为解析函数. 则根据 Cauchy 定理,

$$0 = \int_{|w|=1/R} g(w) dw = \int_0^{2\pi} g(e^{i\theta}/R) i e^{i\theta} d\theta$$

所以

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(Re^{i\theta}) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (f \circ \phi)(e^{-i\theta}/R) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (f \circ \phi)(0) d\theta = f(\infty).$$

由于  $f \circ \phi$  在  $B(0, 1)$  上最大模原理成立, 因此  $f \circ \phi$  在  $B(0, 1)$  上模长无法取到最大值, 即  $f$  在  $z > 1$  时模长无法取到最大值. 

## 4 第三次作业

### Problem 22: 3-22

设  $f$  在  $D(0, 1)$  上解析, 证明: 存在序列  $\{z_n\} \subset D(0, 1)$ , 使得其同时满足:

- (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = 1$ ;
- (2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n)$  存在.

*Proof.* 假设命题不成立, 考虑  $f: D(0, 1) \rightarrow \mathbb{C} \hookrightarrow \overline{\mathbb{C}}$ . 对任意序列  $\{z_n\}$  满足  $|z_n| \rightarrow 1$  均有  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n)$  不存在. 由于  $\overline{\mathbb{C}}$  是紧集, 因此  $\{f(z_n)\}$  存在一个聚点  $p$ . 如果  $p \neq \infty$ , 那么可以选取  $\{z_n\}$  的一个子列  $\{z_{n_i}\}$  使得  $\lim_{i \rightarrow \infty} f(z_{n_i}) = p$ , 从而满足题目要求, 假设错误.

所以总有  $p = \infty$ , 故函数  $f$  可以连续地延拓到  $\overline{D(0, 1)}$  上, 满足  $f|_{\partial D} \equiv \infty$ . 考虑  $g = 1/f$ , 则  $g$  变为  $D(0, 1)$  上的亚纯函数, 并且可连续延拓到  $\partial D$  上, 满足  $g|_{\partial D} \equiv 0$ . 则  $g$  在  $\partial D$  附近的一个带状邻域  $U$  上是全纯的. 现在利用对称原理,  $g$  可被解析延拓到  $U \cup \partial D \cup U'$  上, 此时  $g^{-1}(0)$  是区域内部的一个有极限点的集合, 这导致  $g$  在整个区域上都取值为 0. 因此  $f$  在整个  $U$  上取值为  $\infty$ , 这和  $f$  的解析性矛盾. 因此满足题目要求的序列总存在. 

### Problem 23: 3-25

证明如果  $f$  在  $\mathbb{C}$  上解析且  $L^2$ , 则  $f \equiv 0$ .

*Proof.* 对  $f^2$  使用平均值原理, 对任意  $z \in \mathbb{C}$  均有

$$|f^2(z)| \leq \frac{1}{\pi R^2} \int_{|w-z| \leq R} |f^2(z)| dx dy \leq \frac{1}{\pi R^2} \|f\|_{L^2}^2.$$

对任意  $R > 0$  成立, 令  $R \rightarrow \infty$  可知  $|f(z)| = 0$ , 即  $f \equiv 0$  成立. 

## Problem 24: 3-27

设  $f$  在  $D(0, 1)$  上解析,  $\operatorname{Re} f(z) \geq 0$ ,  $f(0) = a > 0$ , 证明

$$\left| \frac{f(z) - a}{f(z) + a} \right| \leq |z|, \quad |f'(0)| \leq 2a.$$

若  $a = 1$ , 则

$$\frac{1 - |z|}{1 + |z|} \leq |f(z)| \leq \frac{1 + |z|}{1 - |z|}.$$

*Proof.* 由于  $f$  在  $D(0, 1)$  上解析, 故它可展开为幂级数形式  $f(z) = f(0) + f'(0)z + \dots$ , 因此

$$g(z) = \frac{f(z) - f(0)}{z - 0} = \frac{f(z) - a}{z}$$

也是解析函数. 又因为  $\operatorname{Re} f(z) \geq 0$  对任意  $z \in D(0, 1)$  成立, 故

$$f(z) + a \neq 0, \quad |f(z) - a| \leq |f(z) + a|, \quad \forall z \in D(0, 1).$$

后者是因为  $f(z)$  总是落在复数  $a, -a$  的垂直平分线的右侧. 从而函数

$$h(z) = \frac{g(z)}{f(z) + a}$$

也是解析函数. 对任意  $z \in D(0, 1)$ , 选择  $|z| < R < 1$ , 则根据最大模原理

$$|h(z)| \leq \max_{|z|=R} |h(z)| \leq \max_{|z|=R} \frac{1}{|z|} = \frac{1}{R}.$$

令  $R \rightarrow 1$  即可得  $|h(z)| \leq 1$ . 特别地当  $z = 0$  时  $g(0) = f'(0)$ ,  $f(0) + a = 2a$ , 所以上式变为  $|f'(0)/2a| \leq 1$ . 特别地令  $a = 1$ , 则上式变为

$$|z| \geq \frac{|f(z) - 1|}{|f(z) + 1|} \geq \frac{\max(1 - |f(z)|, |f(z)| - 1)}{1 + |f(z)|}.$$

化简即得结论. 

## Problem 25: 3-28

如果  $f$  是从上半平面到自身的解析同胚, 证明

$$f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, \quad ad - bc > 0.$$

*Proof.*  $\overline{\mathbb{C}}$  上的解析同胚

$$\Phi(z) = \frac{1 + iz}{z + i}$$

把上半平面同胚到圆盘  $D(0, 1)$ . 因此对任意上半平面的解析自同胚  $f$ ,  $\Phi f \Phi^{-1}$  都是单位圆盘到自身的解析自同胚. 同样地, 选取任何一个单位圆盘的解析自同胚  $g$ ,



$\Phi^{-1}g\Phi$  也一定给出一个上半平面到自身的解析自同胚. 因此  $f$  一定形如  $\Phi^{-1}g\Phi$ . 根据单位圆盘中的结论, 对  $g = e^{i\theta} \frac{z-z_0}{1-\bar{z}_0z}$ ,

$$\begin{aligned} f(z) &= \Phi^{-1} \circ g \left( \frac{1+iz}{z+i} \right) \\ &= \Phi^{-1} \left( e^{i\theta} \frac{(i-z_0)z + (1-z_0i)}{(1-\bar{z}_0i)z + (i-\bar{z}_0)} \right) \\ &= \frac{(1-\bar{z}_0i)z + (i-\bar{z}_0) - ie^{i\theta}[(i-z_0)z + (1-z_0i)]}{e^{i\theta}[(i-z_0)z + (1-z_0i)] - i(1-\bar{z}_0i)z - i(i-\bar{z}_0)}. \end{aligned}$$

令  $e^{i\theta/2}(1+iz_0) = A$ ,  $e^{i\theta/2}(1-iz_0) = B$ , 则上式可写为

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{\bar{A}z + i\bar{B} + Az - iB}{iAz + B - i\bar{A}z + \bar{B}} \\ &= \frac{\operatorname{Re} Az + \operatorname{Im} B}{-\operatorname{Im} Az + \operatorname{Re} B}. \end{aligned}$$

所以  $f$  一定可写为  $\frac{az+b}{cz+d}$  的形式, 四个系数都是实数. 另一方面, 所有这样的  $f$  只要  $ad-bc \neq 0$  就给出  $\mathbb{C}$  到  $\mathbb{C}$  的解析自同胚. 由于系数都是实数, 因此  $f$  把  $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$  送到  $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ , 故只需验证  $f$  是否把上半平面中一点打到上半平面内. 考虑  $z = i$ ,

$$\frac{ai+b}{ci+d} = \frac{(ai+b)(-ci+d)}{c^2+d^2} = \frac{bd+ac+(ad-bc)i}{c^2+d^2}.$$

所以  $f$  把上半平面映到上半平面当且仅当  $ad-bc > 0$ , 这就证明了题目结论.  $\left\{ \frac{1}{2} \right\}$

#### Problem 26: 3-32

设  $f$  在圆环  $D = \{z : 1 < |z| < 2\}$  上解析, 在  $\bar{D}$  上连续, 如果

$$\max_{|z|=1} |f(z)| \leq 1, \quad \max_{|z|=2} |f(z)| \leq 2;$$

证明

(1)  $\forall z \in D, |f(z)| \leq |z|$ ;

(2) 如果  $f(z) \neq e^{i\theta}z$ , 且在  $|z| = 1$  上恒有  $|f| \equiv 1$ , 在  $|z| = 2$  上恒有  $|f| \equiv 2$ , 则  $f$  在圆环  $\{z : 1 < |z| < 2\}$  上有零点.

*Proof.* (1)  $g(z) = f(z)/z$  在  $D$  上解析, 在  $\bar{D}$  上连续. 根据  $\bar{D}$  的紧性设  $g$  在  $z_0$  处取到模长最大值, 则根据最大模原理  $z_0 \notin D$ . 因此对任意  $z \in D$  均有

$$|g(z)| \leq \max_{w \in \partial D} \frac{|f(w)|}{|w|}.$$

分  $w \in \{|z| = 1\}$  和  $w \in \{|z| = 2\}$  两种情形, 都能推出边界上最大值为 1, 因此  $|f(z)| \leq |z|$ .

(2) 如果  $g$  为常值映射, 那么根据它在边界处保模长可知存在  $\theta$  使得  $f(z) = e^{i\theta}z$ , 矛盾. 下假设  $g$  在  $D$  上不是常值映射. 设  $g$  在  $z_0 \in \bar{D}$  处取模长最小值. 如果  $z_0 \in \partial D$ , 那么  $|g(z_0)| = 1$ , 那么  $g$  在  $D$  上模长恒为 1, 这导致  $g$  是常值映射, 矛盾!

所以  $z_0 \in D$ . 如果  $|g(z_0)| \neq 0$ , 那么根据  $g$  是开映射它把  $z_0$  的邻域送到  $g(z_0)$  的邻域, 一定存在邻域内一个点的模长比  $g(z_0)$  小, 矛盾. 所以  $g(z_0) = 0$ , 这导致  $f(z_0) = 0$ , 证毕.  $\square$

### Problem 27: 3-34

设  $ds = \frac{|dz|}{1-|z|^2}$  是圆盘  $D(0,1)$  的非欧度量.

(1) 证明: 对  $z_1, z_2 \in D(0,1)$ , 过  $z_1, z_2$  且和圆周  $|z|=1$  垂直的圆弧是  $D(0,1)$  中连结  $z_1, z_2$  的最短曲线 (测地线). 问: 这样的测地线是否唯一?

(2) 设  $l$  是  $D(0,1)$  中对  $ds$  给定的一条测地线,  $P \in D(0,1)$  是  $l$  外任给的一点, 证明过  $P$  有  $D(0,1)$  中无穷多条测地线不与  $l$  相交.

*Proof.* (1) 这样的测地线是唯一的. 先考虑  $z_1 = 0, z_2 = r \in (0,1)$  的情形. 此时任取曲线  $\gamma: [0,1] \rightarrow D(0,1)$ , 起点为  $z_1$ , 终点为  $z_2$ , 则

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} ds &= \int_0^1 \frac{|\gamma'(t)|}{1-|\gamma(t)|^2} dt \\ &\geq \int_0^1 \frac{x'(t)}{1-|x(t)|^2} dt = \left( \frac{1}{2} \log \frac{1+x(t)}{1-x(t)} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \log \frac{1-z_2}{1+z_2}. \end{aligned}$$

等号成立当且仅当  $|\gamma(t)| = |x(t)|$  恒成立且  $x'(t) \geq 0$  恒成立. 这导致  $\gamma$  只能是从  $z_1$  到  $z_2$  的直线段, 并且不同的  $\gamma$  之间只差一个参数变换. 由于对圆盘内任意两点  $z_1, z_2$  都存在一个解析自同胚把  $0$  打到  $z_1$ , 把  $r$  打到  $z_2$ , 同时把  $0, r$  之间的测地线打到  $z_1, z_2$  之间的测地线. 于是这个解析同胚给出了  $0, r$  之间测地线和  $z_1, z_2$  之间测地线的一一对应, 从而任何  $z_1, z_2$  之间的测地线均唯一.

(2) 我们先考虑  $P = 0$  的情形, 此时  $l$  是欧氏空间中和单位圆正交的一段不过原点的圆弧, 设这个圆圆心为  $A$ , 和单位圆一个交点为  $B$ , 那么  $\triangle ABO$  是直角三角形, 因此  $O$  在  $\odot A$  的外侧. 适当旋转可使  $\odot A$  完全落在虚轴的左侧. 此时存在  $\varepsilon$  使得整块区域  $|\operatorname{Re} z| \leq \varepsilon$  和圆弧无交, 这块区域中已经可以划出无穷条直径, 因此过  $O$  有无穷多条测地线和  $l$  不相交.

对一般的  $P$  使用一个解析自同胚可将  $P$  映到  $0$ , 把  $l$  映到  $l'$ . 选出无穷个与  $l'$  不交的测地线, 它的原像就是无穷多和  $l$  不交的过  $P$  的测地线, 证毕.  $\square$

## 5 第四次作业

### Problem 28: 4-3

设  $f$  在圆环区域  $\Omega = \{z: r < |z - z_0| < R\}$  上解析, 证明  $f$  在圆环区域上的 Laurent 展开式是唯一的.

*Proof.* 设  $f$  在圆环区域上有展开式

$$f = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n;$$

我们证明系数  $a_n$  由  $f$  本身的性质决定. 考虑任意圆环上的一条绕一圈的逆时针道路  $\gamma$ , 计算

$$\int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^m} dz = \int_{\gamma} \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^{n-m} dz.$$

根据解析性可知  $f$  在  $\Omega$  内闭一致连续, 因此幂级数能逐项求积分.

$$\int_{\gamma} \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^{n-m} dz = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \int_{\gamma} (z - z_0)^{n-m} dz.$$

由于  $(z - z_0)^{n-m}$  在  $\mathbb{C} - \{z_0\}$  上可积, 因此根据同伦不变性能将积分化为在任意半径的圆环  $|w - z_0| = R$  上积分. 因此

$$\int_{\gamma} (z - z_0)^{n-m} dz = \begin{cases} 0, & n \neq m-1; \\ 2\pi i, & n = m-1. \end{cases}$$

所以

$$\int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^m} dz = 2\pi i a_{m-1}.$$

从而可以从  $f$  本身的信息来读出所有系数  $a_{m-1}$ , 即 Laurent 展开式唯一. 

#### Problem 29: 4-6

设  $f(z)$  在圆环  $0 < r < |z - z_0| < R < +\infty$  上解析, 在闭圆环  $r \leq |z - z_0| \leq R$  上连续, 且

$$f(Re^{i\theta} + z_0) = 0, \quad \forall \theta \in [0, 2\pi).$$

证明:  $f(z) \equiv 0$ .

*Proof.* 根据  $f$  在圆环上的展开式, 内环路积分贡献主部, 外环路积分贡献正则部分. 由于外环路上  $f$  的值恒为零, 因此  $f$  正则部分为 0, 即

$$f = \sum_{n=1}^{+\infty} a_{-n} (z - z_0)^{-n}.$$

此时由于  $f$  在圆环上收敛, 故  $f(1/(z - z_0))$  收敛半径至少为  $1/r$ , 这导致  $f(1/z)$  可解析延拓到以 0 为圆心半径为  $1/r$  的圆盘上, 从而  $f$  可被延拓到整个区域  $|z - z_0| > r$  上. 延拓后  $f$  仍然在  $|z - z_0| = R$  上恒为 0, 从而  $f^{-1}(0)$  中存在极限点. 因此  $f(z) \equiv 0$ , 证毕. 

#### Problem 30: 4-8

证明: 环形区域  $D(0, 0, 1)$  与  $D(0, r, R)$  不解析同胚, 其中  $0 < r < R$ .

*Proof.* 设  $f: D(0,0,1) \rightarrow D(0,r,R)$  为解析同胚. 我们可将  $f$  看作从 0 的去心邻域到  $\mathbb{C}$  的解析映射, 此时 0 可被看作一个孤立奇点.

由于恒有  $|f(z)| \leq R$ , 从而  $f$  在 0 附近是有界的, 因而  $f$  可延拓到整个圆盘  $D(0,1)$  上, 延拓后给出  $D(0,1) \rightarrow D(0,r,R) \cup \{f(0)\}$  的连续映射.

取绕  $D(0,r,R)$  一圈的回路  $\gamma$ , 根据  $f$  在  $D(0,0,1)$  上的同胚性可找到圈的原像  $\gamma' \subset D(0,0,1)$ . 现在  $\gamma'$  在  $D(0,1)$  上存在一个到常值道路的同伦, 这个同伦通过  $f$  被送到  $D(0,r,R) \cup \{f(0)\}$  上, 因此这条回路是零伦的.

但由于  $r > 0$ , 因此  $\gamma$  在  $D(0,r,R) \cup \{f(0)\} \subset \overline{D(0,r,R)} \simeq S^1$  中不可能是零伦的, 矛盾. 这导致不存在满足要求的解析同胚.  $\left\{ \frac{0}{0} \right\}$

#### Problem 31: 4-11

设  $f$  在  $\mathbb{C}$  上仅有孤立奇点的函数,  $g$  是  $\mathbb{C}$  上不为常数的亚纯函数. 如果  $g \circ f$  在  $\mathbb{C}$  上亚纯, 证明  $f$  在  $\mathbb{C}$  上亚纯.

*Proof.* 只需证明  $f$  在  $\mathbb{C}$  上不存在本性奇点  $z_0$ . 假设存在, 设为  $z_0$ . 则  $f$  把  $z_0$  的任意开邻域  $U$  映为  $\mathbb{C}$  的稠密子集. 另一方面, 由于  $g \circ f$  亚纯, 取任意  $g(f(z_0))$  在  $\overline{\mathbb{C}}$  上的有界开邻域  $V$ , 考虑  $U = f^{-1}(V) \ni z_0$ . 因此  $g(f(U)) \subset V$ , 所以  $g(\overline{f(U)}) \subset \overline{V}$ . 所以  $g$  把  $\mathbb{C}$  解析地映到  $\overline{\mathbb{C}}$  上的一个有界小圆盘, 从而可看作解析地映到了  $\mathbb{C}$  上的一个有界区域内. 根据 Liouville 定理,  $g$  是常值函数, 矛盾.  $\left\{ \frac{0}{0} \right\}$

#### Problem 32: 4-13

设  $f$  是整函数, 如果其将任意无界的集合映为无界的集合, 证明  $f$  是多项式.

*Proof.* 假设  $f$  不是多项式, 则  $\infty$  为  $f$  的一个本性奇点. 因此对任意  $R > 0$ ,  $f$  把  $\{z: |z| > R\}$  映为  $\mathbb{C}$  的稠密子集. 选定任意有界开集  $U \subset \mathbb{C}$ , 则对任意  $R$  有  $\{z: |z| > R\} \cap f^{-1}(U) \neq \emptyset$ . 从而  $f^{-1}(U)$  是无界集, 矛盾. 因此  $f$  是多项式.  $\left\{ \frac{0}{0} \right\}$

#### Problem 33: 4-17

试用 Picard 大定理证明: 如果整函数  $f$  满足  $f(z)$  为实数当且仅当  $z$  为实数, 则  $f(z) = az + b$ , 其中  $a, b \in \mathbb{R}$ .

*Proof.* 假设  $f$  是超越整函数. 由于  $f(z) \in \mathbb{R} \Rightarrow z \in \mathbb{R}$ , 故  $f$  把上半平面完全映到上半平面, 或者把上半平面完全映到下半平面, 不妨设为前者.

设  $f = u + \mathbf{i}v$ , 则对  $z \in \mathbb{R}$ ,

$$f'(z) = \lim_{w \rightarrow z} \frac{f(w) - f(z)}{w - z} = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{f(z + \lambda \mathbf{i}) - f(z)}{\lambda \mathbf{i}}.$$

根据  $\operatorname{Im}(f(z + \lambda \mathbf{i}) - f(z)) = \operatorname{Im} f(z + \lambda \mathbf{i}) > 0$  可知  $\operatorname{Re} f'(z) > 0$ . 再根据

$$f'(z) = \lim_{w \rightarrow z} \frac{f(w) - f(z)}{w - z} = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \frac{f(z + \lambda) - f(z)}{\lambda} \in \mathbb{R}$$

可知对  $z \in \mathbb{R}$  恒有  $f'(z) > 0$ . 因此  $f$  在实轴上为严格单调增函数.

但是根据 Picard 小定理, 如果  $\infty$  为  $f$  的本性奇点, 则对任意  $R$  均有  $f(\{z : |z| > R\})$  能取遍所有值, 除了一个例外. 从而  $f(\mathbb{C})$  会取遍所有值无穷多次, 除了一个例外. 但是所有实值在  $f(\mathbb{R})$  中都至多出现一次, 因此也在整个  $f(\mathbb{C})$  中至多出现一次, 矛盾.

再考虑  $f$  是多项式的情形. 上面的推理仍然奏效, 即  $f$  限制在  $\mathbb{R}$  上为严格增函数, 从而每个值至多取一次. 如果  $\deg f \geq 2$ , 则一定存在  $\lambda \in \mathbb{R}$  使得  $f + \lambda$  无重根 (只需使所有  $f'$  的根都不是  $f + \lambda$  的根即可). 从而  $f = -\lambda$  有两个根, 矛盾. 因此  $\deg f \leq 1$ . 又因为  $f$  不能是常值函数, 故只能  $f = az + b$ . 令  $z = 0$  知  $b \in \mathbb{R}$ , 再令  $z = 1$  知  $a \in \mathbb{R}$ . 最后检验知  $f(z) = az + b$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$  均满足要求.  $\square$

#### Problem 34: 3-35

设  $f : D(0, 1) \rightarrow D(0, 1)$  是解析映射, 证明对  $D(0, 1)$  内的任意光滑曲线  $\gamma$  均有  $s(f(\gamma)) \leq s(\gamma)$ . 其中  $s(\gamma)$  代表曲线  $\gamma$  的非欧长度.

*Proof.* 这是因为根据 Schwarz 引理  $d(f(z_1), f(z_2)) \leq d(z_1, z_2)$ , 从而根据  $\gamma$  的长度是度量的积分就可知  $s(f(\gamma)) \leq s(\gamma)$ .  $\square$

## 6 第五次作业

#### Problem 35: 4-19

设  $f$  是  $\overline{\mathbb{C}}$  上的亚纯函数. (似乎要求非常数?) 证明:  $f$  在  $\overline{\mathbb{C}}$  上零点的个数和极点的个数相同.

*Proof.*  $f$  可视为  $\overline{\mathbb{C}} \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$  的全纯映射. 对任意值  $y \in \overline{\mathbb{C}}$ , 记  $d(y)$  是  $y$  在计重数下的原像个数. 我们证明  $d$  是  $\overline{\mathbb{C}}$  上的连续函数.

对每个  $y \in \overline{\mathbb{C}}$  和  $x \in f^{-1}(y)$ , 存在  $x$  的邻域  $U_x$  和  $y$  的邻域  $V_x$  使得  $f : U_x \rightarrow V_x$  形如  $z \mapsto z^k$ , 因此  $f^{-1}(y) \cap U_x = \{x\}$ . 从而  $f^{-1}(y)$  在  $\overline{\mathbb{C}}$  上没有聚点 (否则根据连通性  $f$  是常值函数), 所以  $f^{-1}(y)$  是有限集, 记为  $x_1, x_2, \dots, x_\alpha$ . 考虑这有限个  $V_{x_i}$  的交, 记为  $V$ .  $f^{-1}(V)$  被分为  $\alpha$  个互不相交的部分, 第  $i$  个部分位于  $U_i$  中. 设  $x_i$  的重数为  $k_i$ , 则  $f$  在  $U_i$  上形如  $z \mapsto z^{k_i}$ , 因此每个  $y' \in V$ ,  $y' \neq y$  都在  $U_i$  上贡献  $k_i$  个重数为 1 的原像. 由于这  $\alpha$  个区域内已经囊括了  $y'$  所有可能的原像, 因此  $y'$  的原像重数总和与  $y$  的原像重数总和相同, 这就证明了  $d$  的连续性. 由于  $d$  只能取整值并且  $\overline{\mathbb{C}}$  是连通的, 所以  $d$  在整个  $\overline{\mathbb{C}}$  上取值相同. 特别地, 零点个数和极点个数 ( $\infty$  的带权重原像个数) 相同, 证毕.  $\square$

## Problem 36: 4-21

对单位圆盘证明 Mittag-Leffler 定理, 即: 设  $\{z_n\}$  是单位圆盘中任意序列, 在单位圆盘内无极限点,  $L_n$  是在  $z_n$  处给定的 Laurent 展式的主部, 则存在单位圆盘上的亚纯函数以  $\{z_n\}$  为极点,  $L_n$  为其在  $z_n$  处 Laurent 展式的主部.

*Proof.* 任取正实数序列  $\{a_n\}$  使得  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$ . 由于  $\{z_n\}$  在单位圆盘内无极限点, 故对任意  $r \in (0, 1)$ ,  $\{z_n\} \cap \overline{D(0, r)}$  是有限集. 对每个  $n$ , 考虑最大的  $k_n \in \mathbb{N}$  使得  $1 - \frac{1}{k_n} < |z_n|$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} k_n = +\infty$ .

由于  $L_n$  是在  $z_n$  处的 Laurent 展式, 这是一个关于  $(z - z_n)^{-1}$  的多项式, 它在  $\overline{D(0, 1 - \frac{1}{k_n})}$  上收敛. 因此存在  $\overline{D(0, 1 - \frac{1}{k_n})}$  上的多项式  $P_n$  使得

$$\max_{z \in D(0, 1 - \frac{1}{k_n})} |P_n(z) - L_n(z)| < a_n.$$

现在考虑

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} (P_n(z) - L_n(z)).$$

对任意  $M \in \mathbb{N}$ , 存在  $N$  使得对任意  $n \geq N$  均有  $k_n > M$ . 一方面,

$$\sum_{n=1}^N (P_n(z) - L_n(z))$$

在  $D(0, 1 - \frac{1}{M})$  上是亚纯函数, 对每个包含在该区域内的  $z_n$  其展开式都是  $L_n$ . 另一方面,

$$\sum_{n \geq N} |P_n(z) - L_n(z)| \leq \sum_{n \geq N} a_n < +\infty.$$

从而是解析函数. 这样构造出的  $f$  就满足要求.



## Problem 37: 4-22

设  $f$  是区域  $D$  上的亚纯函数, 且  $f(D) \neq \overline{\mathbb{C}}$ . 证明存在  $C$  上的解析函数  $h, g$  使得  $f = h/g$ .

*Proof.* 设  $z_0 \notin f(D)$ , 考虑  $F = (f(z) - z_0)^{-1}$ , 则  $F$  是亚纯函数. 如果存在  $z$  使得  $F(z) = \infty$ , 则  $f(z) = z_0$ , 矛盾. 因此  $F$  是  $D$  上的全纯函数, 所以  $f = 1/F + z_0$  是两个全纯函数之商.



## Problem 38: 4-24

证明:

$$\left( \frac{1}{\sin z} \right)^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(z - \pi n)^2}.$$

*Proof.* 我们知道  $\sin z = \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz})$  是  $\mathbb{C}$  上的解析函数, 因此  $1/\sin^2 z$  在  $\mathbb{C}$  上亚纯, 并且其极点就是所有满足  $\sin z = 0$  的点. 设  $z = a + bi$ , 根据展开式

$$\sin z = 0 \Leftrightarrow e^{iz} = e^{-iz} \Leftrightarrow e^{-b} \cdot e^{ia} = e^{-b} \cdot e^{-ia}.$$

于是  $b = 0$  并且  $2a = 2n\pi$ , 所以  $z = \pi n, n \in \mathbb{Z}$  是所有函数的极点, 只需考虑函数在每个  $\pi n$  处的主部.

由于  $\sin^2 z = \sin^2(z - \pi n)$ , 故表达式对每个  $n \in \mathbb{Z}$  都是对称的. 我们考虑在  $z$  处的展开:

$$\sin^2 z = \left( \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \right)^2 = \frac{-e^{2iz} - e^{-2iz} + 2}{4} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} 2^{2k-1}}{(2k)!} z^k.$$

因此  $\sin^2 z = z^2 \cdot f$ , 其中  $f$  是常数项为 1 的收敛幂级数. 从而  $1/\sin^2 z = z^{-2} \cdot f^{-1}$ ,  $f^{-1}$  在 0 附近有界, 从而解析. 于是  $1/\sin^2 z$  在 0 处的主部是  $1/z^2$ , 进而在  $k\pi$  处的主部是  $1/(z - k\pi)^2$ . 这就表明,

$$F = \frac{1}{\sin^2 z} - \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(z - \pi n)^2}$$

是  $\mathbb{C}$  上的解析函数. 我们再证明  $F$  是  $\mathbb{C}$  上的有界函数:

- 首先  $F(z) = F(z + \pi)$ , 从而  $F$  在横向是周期函数.
- 固定任意  $a \in [0, \pi]$ , 则当  $|b|$  足够大时

$$\left| \frac{1}{\sin z} \right| = \frac{2}{|e^{iz} - e^{-iz}|} = \frac{2}{|e^{ai-b} - e^{-ai+b}|} \leq \frac{2}{|e^b - e^{-b}|} \rightarrow 0.$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{|z - \pi n|^2} &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{b^2 + |a - \pi n|^2} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{b^2 + n^2} \\ &\leq |b| \cdot \frac{2}{b^2} + \sum_{n=b+1}^{\infty} \frac{2}{n^2} \leq \frac{4}{|b|} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

并且二者的收敛都和  $a$  的选取无关. 因此  $f$  在  $[0, \pi] \times \mathbb{R}$  上有界, 因此在整个  $\mathbb{C}$  上有界, 所以  $F$  在  $\mathbb{C}$  上恒为常数. 又因为取  $a = 0, b \rightarrow \infty$  时有  $F \rightarrow 0$ , 所以常数为 0. 这就证明了结论. 

#### Problem 39: 4-26

- (1) 问:  $\mathbb{C}$  的怎样的全纯自同胚保  $\mathbb{C}$  的欧氏度量  $ds^2 = |dz|^2$  不变?
- (2) 问: 扩充复平面  $\overline{\mathbb{C}}$  的怎样的全纯自同胚保  $\overline{\mathbb{C}}$  的球度量  $ds^2 = \frac{4|dz|^2}{(1+|z|^2)^2}$  不变?

*Proof.* (1)  $\mathbb{C}$  的全纯自同胚都形如  $f: z \mapsto az + b$ .  $f$  保度量  $ds$  当且仅当  $|f'(z)| = 1$  恒成立, 由于  $f'$  是解析函数, 故  $f'(z)$  为常数  $e^{i\theta}$ , 因此  $f = e^{i\theta}z + b$ . 可验证对任意  $\theta \in \mathbb{R}$  和  $b \in \mathbb{C}$  上述  $f$  都是保欧氏度量的.

(2)  $\bar{\mathbb{C}}$  的全纯自同胚都形如  $f: z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ .  $f$  保度量  $ds$  当且仅当对任意  $z \in \bar{\mathbb{C}}$  均有

$$\frac{2}{1+|z|^2} = \frac{2|f'(z)|}{1+|f(z)|^2}.$$

代入  $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$  可知

$$f'(z) = \frac{a}{cz+d} - \frac{c(az+b)}{(cz+d)^2} = \frac{ad-bc}{(cz+d)^2}.$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+|z|^2} &= \frac{|ad-bc|}{|az+b|^2+|cz+d|^2}. \\ \Leftrightarrow \frac{(|a|^2+|c|^2)|z|^2+(a\bar{b}+\bar{c}d)z+(\bar{a}b+\bar{c}d)\bar{z}+(|b|^2+|d|^2)}{1+|z|^2} &= |ad-bc|. \end{aligned}$$

对任意  $z$  成立, 因此

$$\begin{cases} a\bar{b}+\bar{c}d=0; \\ |a|^2+|c|^2=|b|^2+|d|^2=|ad-bc|. \end{cases}$$

如果  $a, b, c, d$  中有 0, 不妨  $a=0$ , 则  $c, d$  中也有 0. 但  $a, b, c, d$  不能都是 0, 所以  $d=0$ ,  $|b|^2=|c|^2=|bc|$ . 于是  $f(z)=e^{i\theta}/z$ , 同理  $f(z)=e^{i\theta}z$  也满足要求.

下设  $a, b, c, d$  都不是 0, 则  $|a|/|d|=|c|/|b|$ , 代入第二个式子得到  $|a|/|d|=|c|/|b|=1$ . 于是  $|ad-bc| \leq |ad|+|bc|=|a|^2+|c|^2$ , 所以  $ad$  和  $bc$  方向相反, 这等价于  $a\bar{b}+\bar{c}d=0$ .

所以  $a, b, c, d$  只需满足  $|a|=|d|$ ,  $|b|=|c|$  以及  $\arg a+\arg d=\arg b+\arg c+\pi$ . 我们可以适当将  $a, b, c, d$  共同旋转一个角度, 使得  $\arg a+\arg d=\arg b+\arg c+\pi=0$ . 这就得到  $d=\bar{a}$  以及  $c=-\bar{b}$ , 并且之前讨论的两类也可囊括其中.

综上, 所有满足要求的  $f$  形如  $f = \frac{az+b}{-\bar{b}z+\bar{a}}$ .



## 7 第六次作业

### Problem 40: 习题 5-1

指出下列函数孤立奇点的类型, 并计算在该点处的留数:

$$(2) z^3 \cos \frac{1}{z-1}, \quad (4) e^{\frac{1}{z}} \frac{1}{1-z}.$$

*Proof.* (2) 设函数为  $f$ .  $f$  在  $z=1$  处是本性奇点, 在  $z=\infty$  处是极点. 计算函数在 1 处的留数: 设  $w=z-1$ , 则

$$f(z) = f(w+1) = (w+1)^3 \cos w^{-1} = (w+1)^3 \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{w^{-2k}}{(2k)!}.$$



计算其  $w^{-1}$  项系数:

$$\begin{aligned}[w^{-1}]f(w+1) &= 3[w^{-2}]\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{w^{-2k}}{(2k)!} + [w^{-4}]\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{w^{-2k}}{(2k)!} \\ &= 3\cdot\left(-\frac{1}{2!}\right) + \frac{1}{4!} = -\frac{35}{24}.\end{aligned}$$

因此  $\operatorname{Res}_{z=1}(f) = -\frac{35}{24}$ ,  $\operatorname{Res}_{z=\infty}(f) = \frac{35}{24}$ .

(4) 设函数为  $f$ ,  $f$  在  $z=0$  处为本性奇点, 在  $z=1$  处为极点. 先考虑  $f$  在  $z=0$  附近的展开:

$$\begin{aligned}[z^{-1}]e^{\frac{1}{z}}\frac{1}{1-z} &= [z^{-1}](1+z^{-1}+\frac{z^{-2}}{2!}+\frac{z^{-3}}{3!}+\dots)(1+z+z^2+\dots) \\ &= 1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\dots = e-1.\end{aligned}$$

即  $\operatorname{Res}_{z=0}(f) = e-1$ . 另一方面,  $z=1$  是  $f$  的一阶极点, 所以  $\operatorname{Res}_{z=1}(f) = -e^{\frac{1}{z}}|_{z=1} = -e$ . 

#### Problem 41: 习题 5-2

求下列函数在指定点处的留数:

$$(2) \frac{\sin(z^3)}{(1-\cos z)^3}, z=0; \quad (4) z \log^{-3}(1-z), z=0.$$

*Proof.* (2) 考虑  $f(z) = \sin(z^3)$  和  $g(z) = (1-\cos z)^3$  的 Taylor 展开式:

$$\begin{aligned}f(z) &= z^3 - \frac{z^9}{3!} + \frac{z^{15}}{5!} - \dots, \quad g(z) = \left(\frac{z^2}{2!} - \frac{z^4}{4!} + \frac{z^6}{6!} - \dots\right)^3 \\ &= \frac{1}{8}z^6 - \frac{1}{32}z^8 + \dots\end{aligned}$$

因此  $z=0$  是  $f/g$  的三阶极点,  $f/g$  在  $z=0$  附近的展开式形如  $a_{-3}z^{-3} + a_{-2}z^{-2} + a_{-1}z^{-1} + \dots$  于是可逐一求得这些系数.

$$1 = \frac{1}{8}a_{-3}, \quad 0 = \frac{1}{8}a_{-2}, \quad 0 = -\frac{1}{32}a_{-3} + \frac{1}{8}a_{-1} \Rightarrow a_{-1} = 2.$$

即  $f/g$  在  $z=0$  处的留数为 2.

(4) 考虑  $f(z) = \log^3(1-z)$  的 Taylor 展开式:

$$f = \left(-z - \frac{z^2}{2} - \frac{z^3}{3} - \dots\right)^3 = -z^3 - \frac{3}{2}z^4 - \dots$$

因此  $z=0$  是函数  $z/f$  的二阶极点,  $z/f$  在  $z=0$  附近展开式形如  $a_{-2}z^{-2} + a_{-1}z^{-1} + \dots$  于是可逐一求得这些系数.

$$1 = -a_{-2}, \quad 0 = -\frac{3}{2}a_{-2} - a_{-1} \Rightarrow a_{-1} = \frac{3}{2}.$$

即  $z/f$  在  $z=0$  处的留数为  $\frac{3}{2}$ . 

## Problem 42: 习题 5-3

设  $z_k$  是  $f(z) = \frac{1}{z^4 + a^4}$  ( $a \neq 0$ ) 的极点, 证明

$$\operatorname{Res}_{z=z_k}(f) = -\frac{z_k}{4a^4}.$$

*Proof.* 由于  $a \neq 0$ , 故  $z^4 + a^4 = 0$  有四个不同复根, 也就是说  $z_k$  是  $f$  的一阶极点. 设  $z^4 + a^4 = \prod_{i=1}^4 (z - z_i)$ , 那么

$$\operatorname{Res}_{z=z_k}(f) = \frac{1}{\prod_{i \neq k} (z_k - z_i)} = \frac{1}{(z^4 + a^4)'|_{z=z_k}} = \frac{1}{4z_k^3} = -\frac{z_k}{4a^4}.$$

证毕.

