

三角函数

任意角

为了描述旋转运动，就要对角的概念进行拓展，既要描述旋转的角度的大小，也要描述旋转的方向。

定义

1. 角是由一条射线绕其端点旋转到另一个位置所形成的图形. 一条射线绕其端点旋转的过程就可以形成角，由其初始位置，终止位置，旋转方向可以确定这个角.
2. 射线初始的位置称作是角的始边，终止的位置称作角的终边.
3. 逆时针旋转的角我们称为正角，顺时针旋转的角我们称为负角，射线没有绕端点旋转则对应零角.
4. 任意角之间加减运算就是角的终边旋转的叠加，例如 $540^\circ + (-90^\circ) = 450^\circ$ 代表着终边绕顶点逆时针旋转 540° 后再顺时针旋转 90° ，也可以说终边绕顶点旋转 540° 后再旋转 -90° ，得到了 450°

象限角

1. 平面直角坐标系是我们研究位置的工具，在直角坐标系内，我们可以利用直角坐标系的象限描述角所在的位置. 借助平面直角坐标系，可以将几何问题代数化，利用点的坐标来研究与角相关的问题.
2. 角的顶点与坐标系原点重合，角的始边与坐标系中 x 轴的非负半轴重合，此时终边位于第几象限，我们就说这个角是第几象限角.
3. 终边在坐标轴上时不属于任何象限.

终边相同的角

1. 终边旋转完整的若干周前后位置相同，这样的角我们称为终边相同的角.
2. 终边相同的角之间相差 $k \cdot 360^\circ (k \in \mathbb{Z})$.
3. 与角 α 终边相同的角的集合可以写成 $\{\beta | \beta = \alpha + k \cdot 360^\circ (k \in \mathbb{Z})\}$
4. 利用终边相同的角可以帮助我们简化问题，例如：判断一个角的象限的时候，可以先找到在 0° 到 360° 之间的与其终边相同的角，通过判断终边相同的角的象限，进而知道原本的角的象限.

例题：

1. 试判断下列命题是否正确：

- (1) 小于 90° 的角是锐角；..... ()
- (2) 第一象限角小于第二象限角； ()
- (3) 终边相同的角一定相等； ()
- (4) 相等的角终边一定相同； ()
- (5) 若 $90^\circ < a < 180^\circ$ ，则 a 是第二象限角. ()

2. -2021° 是第_____象限角.

3. 角 a 是第四象限角，则角 $180^\circ - a$ 是第_____象限角.

4. 分别写出第一、二、三、四象限角的集合.

5. 角的顶点在坐标系的原点, 始边与 x 轴的正半轴重合, 那么终边在下列位置的角的集合分别是:

(1) x 轴正半轴: _____;

(2) x 轴: _____;

(3) y 轴负半轴: _____;

(4) y 轴: _____;

(5) 直线 $y = -x$: _____;

(6) 直线 $y = \pm x$: _____.

6. 如果 α 是第二象限角, 那么 $\frac{\alpha}{2}, \frac{\alpha}{3}$ 是第几象限角?

7. 若 α 与 β 是终边相同的角, 则 $\alpha - \beta$ 的终边一定在……………()

(A) x 轴的非负半轴上

(B) x 轴的非正半轴上

(C) y 轴的非正半轴上

(D) y 轴的非负半轴上

弧度制

度量的单位是可以根据需求和方便来选取的. 例如长度单位有米、厘米、毫米等; 度量重量, 我们可以采用克, 千克, 或者吨来作为单位. 度量角度可以选取弧度制以方便度量.

弧度制的定义

1. 角度制的定义: 把周角分成 360 份, 以其中的一份叫做 1° 的角. 这种以“度”作为单位来度量角的单位制叫做角度制.

2. 圆心角、半径和弧长之间的关系: 圆的半径为 r , n° 的圆心角所对弧长 $l = \frac{\pi r n}{180}$. 体现了弧长、半径和圆心角之间的关系. 通过进一步变形, 得到 $n = \frac{180}{\pi} \frac{l}{r}$, 表明圆心角可以由弧长和半径的比值来确定.

3. 弧度制的定义: 用弧长和半径的比值来表示角的大小 $|\alpha| = \frac{l}{r}$, 将弧长的等于半径的弧所对的圆心角称作是 **1 弧度的角 (1 rad)**. 用弧度作为单位来度量角的单位制叫做弧度制. 对于任意角, 弧度制和角度值是一样的, 正角对应的弧度值为正数, 负角对应的弧度值为负数, 零角对应的弧度值为 0.

4. 弧度制下扇形的弧长与面积公式: $l = \alpha \cdot r, S = \frac{\alpha \cdot r^2}{2}$

5. 弧度制的优点: 统一了角度与长度的单位, 建立了角和实数之间的一一对应关系, 简化了三角计算.

6. 注: rad 可以省略不写

弧度制与角度制的转化

以周角为桥梁构建换算公式. 周角在角度制下是 360° , 在弧度制下是 2π rad. 因此, $360^\circ = 2\pi$ rad. 故对于 n° 角 (其弧度下为 α 弧度), $\frac{360^\circ}{n^\circ} = \frac{2\pi}{\alpha}$, 即 $n^\circ = \frac{180}{\pi} \alpha$ rad, α rad = $\frac{\pi}{180} n^\circ$. 特别地, 1 弧度所对应的角度制为 $\frac{180^\circ}{\pi}$, 1° 对应的弧度制为 $\frac{\pi}{180}$ rad.

例题:

1. 已知圆心角为 $\frac{\pi}{6}$ 的扇形的半径为 1, 则该扇形的面积是_____

弧度制	0				$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$				
角度制		30°	45°	60°				180°	225°	270°	360°

- 一扇形周长是32 cm, 扇形的圆心角为多少弧度时, 这个扇形的面积最大? 最大面积是多少?
- 填写表格
- 在与 2025 弧度角的终边相同的角中, 绝对值最小的角是_____.
- 若角 α 和角 β 的和是 1 弧度, 差为 1° , 则 α 和 β 的弧度数分别为_____.

任意角的正弦、余弦、正切、余切

- 锐角的正弦、余弦、正切、余切 (初中所学):
 给定锐角 α , 在角 α 一边的射线 OA 上取异于 O 点的一点 P , 过 P 做另一边 OB 的垂线, 垂足为 M , 形成直角三角形 OMP , 分别度量 $|OM|, |OP|, |PM|$, 即可得到 $\sin\alpha = \frac{|PM|}{|OP|}, \cos\alpha = \frac{|OM|}{|OP|}, \tan\alpha = \frac{|PM|}{|OM|}, \cot\alpha = \frac{|OM|}{|PM|}$
- 任意角的正弦、余弦、正切、余切:
 将任意角 α 置于平面直角坐标系中, 角 α 的顶点与坐标系原点重合, 角的始边与坐标系中 x 轴的非负半轴重合. 在其终边上任取异于 O 的一点 P , 坐标为 (x, y) , 设 $|OP| = r$, 则 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. 这样就可以分别定义任意角 α 的正弦、余弦、正切、余切为: $\sin\alpha = \frac{y}{r}, \cos\alpha = \frac{x}{r}, \tan\alpha = \frac{y}{x} (x \neq 0), \cot\alpha = \frac{x}{y} (y \neq 0)$.
- 利用单位圆简化定义:
 单位圆是指半径为 1 个单位的圆, 在没有特殊说明的时候, 单位圆是指圆心在原点, 半径为 1 个单位的圆.
 将任意角 α 置于平面直角坐标系中, 角 α 的顶点与坐标系原点重合, 角的始边与坐标系中 x 轴的非负半轴重合. 设 P 为终边与单位圆的交点, 坐标为 (x, y) . 则角 α 的正弦、余弦、正切、余切为: $\sin\alpha = y, \cos\alpha = x, \tan\alpha = \frac{y}{x} (x \neq 0), \cot\alpha = \frac{x}{y} (y \neq 0)$.
- 对于任意角都有正弦和余弦值, 当终边位于 y 轴时 ($\alpha = k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})$) 不存在正切值, 当终边位于 x 轴时 ($\alpha = k\pi (k \in \mathbf{Z})$) 不存在余切值.
- 平面直角坐标系上的点可以用其与原点连线的长度 r 和连线与 x 轴正方向之间夹角 θ 的三角函数值来表示, 即 $P(r \cdot \cos\theta, r \cdot \sin\theta)$

任意角三角函数值的符号

	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\tan\alpha$	$\cot\alpha$
第一象限角	+	+	+	+
第二象限角	+	-	-	-
第三象限角	-	-	+	+
第四象限角	-	+	-	-

只有给定一个任意角的两个以上的三角函数值，或给定一个三角函数值并明确所在象限，才能唯一确定该角的终边位置.

特殊角的三角函数

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	0
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	1
$\tan\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	-	$-\sqrt{3}$	-1	0	1	-	0
$\cot\alpha$	-	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	-	1	0	-

同角三角函数的关系

- 平方关系: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$
- 商数关系: $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$, $\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$

同角三角函数的关系为恒等式. 此处的恒等式不是指对任意角都成立, 而是指当角 α 使得等式两边有意义的时候, 等式成立.

例题:

- 已知角 α 的终边经过下列各点, 求角 α 的正弦、余弦、正切、余切.
 - $A(-8, -6)$, 则 $\sin\alpha =$ _____, $\cos\alpha =$ _____, $\tan\alpha =$ _____, $\cot\alpha =$ _____;
 - $B(\sqrt{3}, -1)$, 则 $\sin\alpha =$ _____, $\cos\alpha =$ _____, $\tan\alpha =$ _____, $\cot\alpha =$ _____.
- 已知 $\sin\alpha = \frac{4}{5}$, $\alpha \in (0, \pi)$, 则 $\tan\alpha$ 等于_____.
- 计算: $\cos\frac{\pi}{3} - \tan\frac{\pi}{4} + \frac{3}{4}\tan^2\frac{7\pi}{6} - \sin\frac{5\pi}{6} + \cos^2\frac{\pi}{6} + \sin\frac{3\pi}{2} =$ _____.
- 已知角 θ 满足 $\sin\theta < 0$ 且 $\cos\theta > 0$, 则角 θ 是第_____象限的角.
- 设 $y = \sin\alpha \cdot \cos\alpha \cdot \cot\alpha$, 且 α 是象限角, 则 y 的符号为..... ()

(A) 恒正 (B) 恒负 (C) 可能为 0 (D) 不确定
- 在 $\triangle ABC$ 中, 有 $\cos A \cdot \tan B \cdot \cot C < 0$, 则这三角形是_____三角形.
- 若 $\tan\alpha = \sqrt{3}$, $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 那么 $\cos\alpha - \sin\alpha$ 的值是_____.
- 若 $\sin\theta = \frac{m-3}{m+5}$, $\cos\theta = \frac{4-2m}{m+5}$ 都有意义, 则 $m =$ _____.
- 已知 $\sin\alpha + \cos\alpha = \frac{1}{5}$, α 是第二象限角, 那么 $\tan\alpha =$ _____.

10. 已知 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$ ($0 < \alpha < \pi$), 求:
 (1) $\sin \alpha - \cos \alpha$; (2) $\sin^3 \alpha + \cos^3 \alpha$; (3) $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha$.
11. 若 $\cos x + \sin y = \frac{1}{4}$, 则 $\sin^2 x - \sin y$ 的取值范围是_____.
12. 设 $\cot x = 2$, 则 $\frac{2 \cos x - 4 \sin x}{5 \cos x + 3 \sin x} =$ _____, $3 \sin^2 x - 4 \cos^2 x =$ _____.
13. 已知 $\tan \alpha = \sqrt{2}$, 求下列各式的值:
 (1) $\sin \alpha + 2 \cos \alpha$;
 (2) $\frac{\cos \alpha - 5 \sin \alpha}{3 \cos \alpha + \sin \alpha}$;
 (3) $\frac{\sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha - 3 \cos^2 \alpha}{5 \sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha + 1}$;
 (4) $2 \sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha$.
14. (1) 已知 $\tan \alpha - \cot \alpha = \frac{1}{4}$, 求 $\tan^3 \alpha - \cot^3 \alpha$
 (2) 已知 $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha} = 2$, 求 $\sin \alpha \cdot \cos \alpha$ 的值.
15. 使函数 $y = \sqrt{\sin x} + \sqrt{16 - x^2}$ 有意义的 x 的取值范围是_____; 使函数 $y = \lg \sin(\cos x)$ 有意义的 x 的取值范围是_____.

诱导公式

1. 终边相同的角的三角函数值相等:

$$\sin(\alpha + 2k\pi) = \sin \alpha, \cos(\alpha + 2k\pi) = \cos \alpha$$

$$\tan(\alpha + 2k\pi) = \tan \alpha, \cot(\alpha + 2k\pi) = \cot \alpha$$

其中 $k \in \mathbf{Z}$ 利用这组公式可以将求任意角的三角函数值的问题转化为求一个 $[0, 2\pi)$ 内的角的三角函数值问题.

2. 终边关于原点对称的角的正弦与余弦互为相反数, 正切和余切相等:

$$\sin(\alpha + \pi) = -\sin \alpha, \cos(\alpha + \pi) = -\cos \alpha$$

$$\tan(\alpha + \pi) = \tan \alpha, \cot(\alpha + \pi) = \cot \alpha$$

利用这组公式可以将求 $[0, 2\pi)$ 内角的三角函数值的问题转化为求一个 $[0, \pi)$ 内角的三角函数值的问题.

3. 终边关于 y 轴对称的角的正弦相等, 余弦、正切、余切互为相反数:

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha, \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha, \cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha$$

利用这组公式可以将求 $[0, \pi)$ 内角的三角函数值的问题转化为求一个 $[0, \frac{\pi}{2})$ 内角的三角函数值的问题.

4. 终边关于 x 轴对称的角的正弦, 正切, 余切互为相反数, 余弦相等:

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha, \cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha, \cot(-\alpha) = -\cot \alpha$$

利用这组公式可以将求负角的三角函数值的问题转化为求一个正角的三角函数值的问题.

5. 终边关于 $y = x$ 对称的两个角, 一个角的正弦等于另一个角的余弦, 一个角的正切等于另一个角的余切:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos\alpha, \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin\alpha$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot\alpha, \cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan\alpha$$

利用这组公式可以实现正弦和余弦的互换，正切和余切的互换.

6. 终边逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 后的角的正弦等于旋转前的角的余弦，旋转后的角的余弦等于旋转前的角的正弦的相反数，旋转后的角的正切等于旋转前的余切的相反数，旋转后的余切等于旋转前的正切的相反数：

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos\alpha, \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin\alpha$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\cot\alpha, \cot\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\tan\alpha$$

利用这组公式可以实现正弦和余弦的互换，正切和余切的互换.

奇变偶不变，符号看象限：诱导公式是体现角 $\alpha + k \cdot \frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbf{Z}$) 的三角函数值与角 α 的三角函数值之间的关系. 当 k 为奇数的时候，三角函数名相应变化，当 k 为偶数的时候，三角函数名不变. 因为当等式两端都有意义的时候，诱导公式是恒成立的，所以诱导公式中的正负号可以通过将 α 视作一个锐角的时候（其三角函数值都是正的），看 $\alpha + k \cdot \frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbf{Z}$) 的象限来判断.

例题：

- 若 $P(-3, 4)$ 为角 a 终边上一点，则 $\cos(2\pi - a) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 已知角 θ 的终边过点 $(1, -2)$ ，则 $\cos(\pi + \theta) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 若 $\cos\alpha = -\frac{3}{5}$, a 是第二象限角，则 $\sin(\alpha + \pi) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 已知 $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ，则 $\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 若 $\sin a = \frac{1}{3}$, $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ ，则 $\sin\left(\alpha - \frac{3\pi}{2}\right)$ 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- 已知 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，且 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ ，则 $\tan\varphi = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 下列等式中恒成立的是 $\dots\dots\dots$ ()

(A) $\sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = -\cos\alpha$	(B) $\cos\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = \sin\alpha$
(C) $\tan\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = -\cot\alpha$	(D) $\cot\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = \cot\alpha$
- 已知点 $P\left(\sin(\pi + \theta), \sin\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right)\right)$ 在第三象限，则角 θ 所在的象限是 $\dots\dots\dots$ ()

(A) 第一象限	(B) 第二象限	(C) 第三象限	(D) 第四象限
----------	----------	----------	----------
- 已知角 α 的顶点与原点 O 重合，始边与 x 轴的正半轴重合，将 α 的终边按顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{2}$ 后，过点 $P\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$ ，则 $\cos\alpha$ 等于 $\dots\dots\dots$ ()

(A) $-\frac{4}{5}$	(B) $\frac{4}{5}$	(C) $-\frac{3}{5}$	(D) $\frac{3}{5}$
--------------------	-------------------	--------------------	-------------------
- 若 $\cos(\pi - \alpha) = \frac{\sqrt{5}}{3}$ ，且 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ ，则 $\sin(\pi + \alpha) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 已知 $\sin(\alpha - \pi) = \frac{2}{3}$ ，且 $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ ，则 $\tan\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 已知 $\sin\left(\alpha - \frac{2\pi}{3}\right) = \frac{1}{4}$, 则 $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) =$ _____.

13. 已知 $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{3}{5}$, 则 $\cos(\pi + \alpha)$ 的值为_____.

14. 已知 $\cos(11\pi - 3) = p$, 用 p 表示 $\tan(-3) =$ _____.

15. 已知 $\cos 170^\circ = m$, 则 $\tan 10^\circ$ 的值为_____.

16. 已知 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) + 3\cos(\pi - \theta) = \sin(-\theta)$, 则 $\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta = \dots\dots\dots$ ()

(A) $\frac{1}{5}$

(B) $\frac{2}{5}$

(C) $\frac{3}{5}$

(D) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

17. 化简:

(1) $\frac{\cos(\pi + \alpha)\sin(\alpha + 2\pi)}{\tan(-\alpha - \pi)\cos(-\pi + \alpha)}$

(2) $\frac{\sin(2\pi - \alpha)\cos(\pi + \alpha)\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)\cos\left(\frac{11\pi}{2} - \alpha\right)}{\cos(\pi - \alpha)\sin(3\pi - \alpha)\sin(-\pi - \alpha)\sin\left(\frac{9\pi}{2} + \alpha\right)}$

(3) $\frac{\sin(2\pi - \alpha)\tan(\pi + \alpha)\cot(-\pi - \alpha)}{\cos(\pi - \alpha)\tan(3\pi - \alpha)}$

18. 设 $f(\theta) = \frac{2\cos^3\theta + \sin^2(2\pi - \theta) + \cos(-\theta) - 3}{2 + 2\cos^2(\pi + \theta) + \cos(2\pi - \theta)}$, 求 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

19. 已知 $f(x) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)\cos(-x)\sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)}{\sin(-\pi - x)\cos(2\pi - x)}$.

(1) 化简 $f(x)$;

(2) 若 x 是第三象限角, 且 $\tan x = 2$, 求 $f(x)$ 的值.

20. 已知 $\sin\alpha$ 是方程 $3x^2 - 10x - 8 = 0$ 的根, 且 α 为第三象限角,

求 $\frac{\sin\left(\alpha + \frac{3\pi}{2}\right)\sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right)\tan^2(2\pi - \alpha)\tan(\pi - \alpha)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)}$ 的值.

21. 已知 $\sin(3\pi - \alpha) = \sqrt{2}\sin(2\pi + \beta)$, $\sqrt{3}\cos(-\alpha) = -\sqrt{2}\cos(\pi + \beta)$, 且 $0 < \alpha < \pi$, $0 < \beta < \pi$, 求 $\sin\alpha, \sin\beta$.

22. 已知 $\sin\theta, \cos\theta$ 是关于 x 的方程 $x^2 - ax + a = 0 (a \in \mathbf{R})$ 的两个根.

(1) 求 $\cos^3\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + \sin^3\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)$ 的值.

(2) 求 $\tan(\pi - \theta) - \frac{1}{\tan\theta}$

和角公式、差角公式

两角差的余弦公式

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta + \sin\alpha \cdot \sin\beta$$

两角和的余弦公式

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta - \sin\alpha \cdot \sin\beta$$

两角和的正弦公式

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta + \cos\alpha \cdot \sin\beta$$

两角差的正弦公式

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta - \cos\alpha \cdot \sin\beta$$

两角和与差的正切公式

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \cdot \tan\beta} \quad \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha \cdot \tan\beta}$$

例题：

1. 下列四个命题中，假命题是…………… ()

(A) 存在这样的 α, β 值，使得 $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta - \cos\alpha \sin\beta$

(B) 不存在无穷多的 α, β 值，使得 $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta - \cos\alpha \sin\beta$

(C) 对于任意的 α, β 值，都有 $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta$

(D) 不存在 α, β 值，使得 $\sin(\alpha + \beta) \neq \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta$

2. 已知 $\sin\alpha = -\frac{3}{5}$ ， α 是第四象限角，求 $\sin\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)$ ， $\cos\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)$ ， $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$

3. 已知 $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ，且 $\sin\alpha = \frac{1}{3}$ ， $\cos\beta = \frac{1}{4}$ ，则 $\sin(\alpha + \beta) =$ _____

4. 已知 $\tan\alpha = 2$ ，求 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ ， $\tan\left(\frac{\pi}{6} - \alpha\right)$ ， $\cot\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right)$ 的值

5. 已知 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{2}{3}$ ， $\sin(\alpha - \beta) = \frac{2}{5}$ ，求 $\frac{\tan\alpha}{\tan\beta}$ 。

6. 已知 $\sin\alpha = \frac{4}{5}$ ， $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ ， $\cos\beta = -\frac{5}{13}$ ， β 是第三象限角，求 $\cos(\alpha - \beta)$ 的值。

7. 已知 $\cos(\alpha - \beta) = \frac{5}{13}$ ， $\sin\alpha = -\frac{4}{5}$ ， $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ， $\beta \in (0, \pi)$ ，则 $\cos\beta =$ _____。

8. (1) 已知 $\tan\alpha = \frac{1}{7}$ ， $\tan\beta = \frac{3}{4}$ ，则 $\alpha + \beta =$ _____

(2) 已知 $\tan\alpha = \frac{1}{7}$ ， $\tan\beta = \frac{3}{4}$ ， α, β 均为锐角，则 $\alpha + \beta =$ _____

(3) 已知 $\tan\alpha = \frac{1}{7}$ ， $\tan\beta = \frac{3}{4}$ ， $\alpha \in (0, \pi)$ ， $\beta \in (0, 2\pi)$ ，则 $\alpha + \beta =$ _____

9. 证明： $\sin(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta) = \sin^2\alpha - \sin^2\beta$

10. 化简： $\frac{\tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) - \tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)}{\tan 2\alpha} - \tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)\tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right)$ 。

11. 若 $\triangle ABC$ 不是直角三角形，求证： $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$

12. 已知关于 x 的方程 $mx^2 + (2m - 3)x + (m - 2) = 0$ ($m \neq 0$) 的两个根为 $\tan\alpha, \tan\beta$ ，求 $\tan(\alpha + \beta)$ 的最小值。

13. 设 $\sin\theta + \cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{3}$ ， $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ ，求 $\tan\theta - \cot\theta$ 的值。

辅助角

$$a\sin\alpha + b\cos\alpha = \sqrt{a^2 + b^2}\sin(\alpha + \varphi) \quad \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \cos\varphi, \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \sin\varphi\right)$$

常用特例: $\sin\alpha + \cos\alpha = \sqrt{2}\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$

例题:

1. 用辅助角公式化简, 表示为 $A\sin(\omega x + \varphi)$, $\omega > 0$ 且 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 的形式

(1) $\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha + \frac{1}{2}\cos\alpha =$ _____.

(2) $\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha - \frac{1}{2}\cos\alpha =$ _____.

(3) $\sin\alpha - \sqrt{3}\cos\alpha =$ _____.

(4) $2\cos\alpha + 2\sqrt{3}\sin\alpha =$ _____.

(5) $\sin\alpha + \cos\alpha =$ _____.

(6) $-\sin\alpha - \cos\alpha =$ _____.

2. 将下列各式化为 $A\sin(\alpha + \varphi)$ ($A > 0$) 的形式:

(1) $\cos\left(\frac{\pi}{3} + x\right) + \cos x;$

(2) $\sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right).$

3. 函数 $y = \sqrt{3}\sin x - \cos x$ 的最小值为_____

4. 已知 $5\sqrt{3}\sin x + 5\cos x = 6$, $\sqrt{2}\sin y + \sqrt{6}\cos y = 1$, 且 $x \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right)$, $y \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 求 $\cos(x + y)$.

5. 已知 $3\sin\alpha + 4\cos\alpha = 5\sin(\alpha + \beta)$, 且 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$, 则 $\tan\alpha =$ _____

6. $\triangle ABC$ 的内角 A 满足 $\sin A + \cos A > 0$ 且 $\tan A - \sin A < 0$, 则 A 的取值范围是_____

7. 求 $y = \frac{\sqrt{5}\sin x + 1}{\cos x + 2}$ 的值域.

倍角公式

α 倍角的三角函数值可以用 α 的三角函数值来表示

二倍角公式

1. $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$

2. $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$

3. $\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$

常用变式: $(\sin\alpha + \cos\alpha)^2 = 1 + \sin 2\alpha$

三倍角公式

$$1. \sin 3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha$$

$$2. \cos 3\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha$$

例题:

$$1. \text{ 已知 } \alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right), \sin\alpha = \frac{12}{13}, \text{ 求 } \sin 2\alpha, \cos 2\alpha, \tan 2\alpha$$

$$2. \text{ 化简: (1) } \cos^4 \frac{\alpha}{2} - \sin^4 \frac{\alpha}{2} \quad (2) \frac{1}{1 - \tan\alpha} - \frac{1}{1 + \tan\alpha} \quad (3) 1 + 2\cos^2\theta - \cos 2\theta$$

3. 证明:

$$(1) 2\cos^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta - 1 = \sqrt{2}\sin\left(2\theta + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$(2) \frac{1 + \sin 2\theta + \cos 2\theta}{1 + \sin 2\theta - \cos 2\theta} = \cot\theta$$

$$4. \text{ 在 } \triangle ABC \text{ 中, } \cos A = \frac{4}{5}, \tan B = 2, \text{ 求 } \tan(2A + 2B) \text{ 的值.}$$

$$5. \text{ 已知 } \tan\alpha = \frac{1}{7}, \tan\beta = \frac{1}{3}, \alpha, \beta \text{ 均为锐角, 则 } \alpha + 2\beta = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$6. \text{ 若 } \sin\left(\frac{\pi}{6} - \alpha\right) = \frac{1}{3}, \text{ 则 } \cos\left(\frac{2\pi}{3} + 2\alpha\right) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$7. \text{ 若 } \frac{\sin\alpha + \cos\alpha}{\sin\alpha - \cos\alpha} = \frac{1}{2}, \text{ 则 } \tan 2\alpha = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$8. \text{ 若 } \alpha \in (0, \pi), \sin\alpha + \cos\alpha = \frac{1}{3}, \text{ 则 } \cos 2\alpha = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$9. \sqrt{2}\sin\frac{\pi}{32}\cos\frac{\pi}{32}\cos\frac{\pi}{16}\cos\frac{\pi}{8} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$10. \text{ 已知 } \frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi, \text{ 化简: } \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\theta}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$11. \text{ 已知 } \sin\left(\frac{\pi}{4} + 2\alpha\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4} - 2\alpha\right) = \frac{1}{4}, \alpha \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right), \text{ 求 } 2\sin^2\alpha + \tan\alpha - \cot\alpha - 1 \text{ 的值.}$$

半角公式

$\frac{\alpha}{2}$ 的三角函数值可以用 $\cos\alpha$ 来表示, 但需要注意: 要根据 $\frac{\alpha}{2}$ 的象限来确定符号.

$$1. \sin\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{2}}$$

$$2. \cos\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1 + \cos\alpha}{2}}$$

$$3. \tan\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{1 + \cos\alpha}}$$

$$\text{特别地, } \tan\frac{\alpha}{2} = \frac{\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}} = \frac{2\sin\frac{\alpha}{2} \cdot \cos\frac{\alpha}{2}}{2\cos\frac{\alpha}{2} \cdot \cos\frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin\alpha}{1 + \cos\alpha} = \frac{1 - \cos\alpha}{\sin\alpha}$$

例题:

$$1. \text{ 已知 } \cos\alpha = \frac{3}{5}, \text{ 且 } \alpha \text{ 的终边在第一象限, 求 } \sin\frac{\alpha}{2}, \cos\frac{\alpha}{2}, \tan\frac{\alpha}{2}$$

2. 化简: $\frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x} \cdot \frac{\cos x}{1 + \cos x} \cdot \frac{\sin x}{1 - \cos x} =$ _____.
3. 若 $\alpha \in (0, \pi)$, 且 $\sqrt{3}\sin\alpha + 2\cos\alpha = 2$, 则 $\tan\left(\frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{3}\right) =$ _____
4. (1) 已知 $\sin\theta = \frac{3}{5}$, θ 为第二象限角, 则 $\tan\frac{\theta}{2} + 2\cos\frac{\theta}{2} =$ _____.
- (2) 已知 $\sin\theta = \frac{3}{5}$, $\frac{5\pi}{2} < \theta < 3\pi$, 则 $\tan\frac{\theta}{2} + 2\cos\frac{\theta}{2} =$ _____.
5. 若 $\sin^2\left(x + \frac{\pi}{8}\right) - \cos^2\left(x - \frac{\pi}{8}\right) = \frac{1}{4}$, $x \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\tan x =$ _____
6. 若 $\frac{1 + \tan\alpha}{1 - \tan\alpha} = 2025$, 则 $\frac{1}{\cos 2\alpha} + \tan 2\alpha =$ _____
7. 设 $\frac{1 + \sin x}{\cos x} = \frac{22}{7}$ 且 $\frac{1 + \cos x}{\sin x} = \frac{m}{n}$, 其中 $\frac{m}{n}$ 为最简分数, 则 $m + n =$ _____.
8. 在 $\triangle ABC$ 中, $\tan\frac{A}{2} + \cot\frac{A}{2} = \frac{10}{3}$, $\cos B = \frac{5}{13}$ (1) 求 $\cos(A - B)$ (2) 求 $\cos\left(\frac{A - B}{2}\right)$

万能公式

α 的三角函数值可以用 $\tan\frac{\alpha}{2}$ 来表示

- $\sin\alpha = \frac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2\frac{\alpha}{2}}$
- $\cos\alpha = \frac{1 - \tan^2\frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2\frac{\alpha}{2}}$
- $\tan\alpha = \frac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2\frac{\alpha}{2}}$

例题:

- 已知 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, $\tan\alpha = -2$, 则 $\sin(\pi + 2\alpha) =$ _____.
- 若 $\frac{\sin\theta + \cos\theta}{\sin\theta - 2\cos\theta} = \frac{1}{2}$, 则 $\sin 2\theta =$ _____.
- 若 $\frac{\sin\alpha}{1 + \cos\alpha} = \frac{1}{2}$, 则 $\sin\alpha + \cos\alpha$ 的值为_____.
- 已知 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\tan\alpha = 2$, 则 $\sin^2\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) - 2\cos^2\alpha + 1$ 的值为_____
- 已知 $\tan^2\alpha - 2\tan^2\beta = 1$, 求证 $\cos 2\beta = 2\cos 2\alpha + 1$
- 已知 $6\sin^2\alpha + \sin\alpha\cos\alpha - 2\cos^2\alpha = 0$, $\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, 求 $\sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

积化和差与和差化积

$$1. \sin\alpha \cdot \cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$2. \cos\alpha \cdot \sin\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

$$3. \cos\alpha \cdot \cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$4. \sin\alpha \cdot \sin\beta = -\frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$$

$$5. \sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$6. \sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$7. \cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$8. \cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

例题:

1. 已知 $f(\theta) = \sin 4\theta + \sin 3\theta$, 且 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 是 $f(\theta)$ 在 $(0, \pi)$ 内的三个不同零点, 则 $\cos\theta_1 + \cos\theta_2 + \cos\theta_3 =$ _____

2. 已知 $\sin(2\alpha - \frac{\pi}{12}) = \frac{\sqrt{2}}{3}$, 则 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{3}) \cdot \tan(\alpha + \frac{\pi}{12}) =$ _____

3. 已知 $\sin 2(\alpha + \gamma) = n \sin 2\beta$, 求 $\frac{\tan(\alpha + \beta + \gamma)}{\tan(\alpha - \beta + \gamma)}$ 的值.

4. 已知 $\sin x + \sin y = \sqrt{2}$, $\cos x + \cos y = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 求 $\cos(x + y)$ 及 $\tan x + \tan y$ 的值.

三角函数的图像与性质


函数的周期性

如果对于函数 $f(x)$, 在定义域内的任意一个自变量 x , 都有一个非零的常数 T , 使得 $x + T$ 也在定义域内, 并且 $f(x) = f(x + T)$. 那么我们说 $f(x)$ 是周期函数, T 为 $f(x)$ 的一个周期. 如果在所有的周期中存在一个最小的正数, 那么这个周期我们称作最小正周期. 如不加说明, 周期通常指最小正周期.

性质推论:


1. 如果 T 是 $f(x)$ 的周期, 那么 $k \cdot T (k \in \mathbb{Z} \text{ 且 } k \neq 0)$ 都是 $f(x)$ 的周期
2. 不是所有周期函数都有最小正周期, 例如: 常函数 $y = c$
3. 若函数在两个不同位置具有对称性, 则其具有周期性.

正弦函数的图像和性质



1. 定义：对于任意一个实数 x ，都有唯一确定的正弦值 $\sin x$ 与之对应，按照这个对应关系建立的函数就叫做正弦函数，记作 $y = \sin x$. 正弦函数的定义域是实数集 $\mathbf{R}$.
2. 绘制函数图像：借助单位圆可以做出图像；绘制简图方法：五点法
3. 定义域： $\mathbf{R}$
4. 周期性：最小正周期为 2π
5. 奇偶性：奇函数
6. 对称轴： $k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$
7. 对称中心： $(k\pi, 0), k \in \mathbf{Z}$
8. 单调性：在 $\left[2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}\right]$ 内单调递增，在 $\left[2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}\right]$ 内单调递减，其中 $k \in \mathbf{Z}$
9. 最值：最大值为 1，最小值为 -1，值域为 $[-1, 1]$

余弦函数的图像和性质



1. 定义：对于任意一个实数 x ，都有唯一确定的余弦值 $\cos x$ 与之对应，按照这个对应关系建立的函数就叫做余弦函数，记作 $y = \cos x$. 余弦函数的定义域是实数集 $\mathbf{R}$.
2. 绘制函数图像：借助单位圆可以做出图像；绘制简图方法：五点法；可以利用正弦函数图像向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 得到余弦函数的图像.
3. 定义域： $\mathbf{R}$
4. 周期性：最小正周期为 2π
5. 奇偶性：偶函数

6. 对称轴: $k\pi, k \in \mathbf{Z}$
7. 对称中心: $\left(k\pi + \frac{\pi}{2}, 0\right), k \in \mathbf{Z}$
8. 单调性: 在 $[2k\pi - \pi, 2k\pi]$ 内单调递增, 在 $[2k\pi, 2k\pi + \pi]$ 内单调递减, 其中 $k \in \mathbf{Z}$
9. 最值: 最大值为 1, 最小值为 -1, 值域为 $[-1, 1]$

例题:

1. 已知正弦函数过点 $\left(\frac{\pi}{6}, m\right)$, 则 $m =$ _____
2. 函数 $y = \sin x$ 的单调增区间为_____
3. 函数 $y = \sin 2x$ 的严格减区间为_____
4. 函数 $y = \sin x, x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 的值域是_____
5. 函数 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ 的图象的对称轴为_____, 对称中心为_____
6. 下列说法中不正确的是.....()
 - (A) 正弦函数, 余弦函数的定义域是 $\mathbf{R}$, 值域是 $[-1, 1]$
 - (B) 余弦函数当且仅当 $x = 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$ 时, 取得最大值 1
 - (C) 余弦函数在 $\left[2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}\right] (k \in \mathbf{Z})$ 上都是严格减函数
 - (D) 余弦函数在 $[2k\pi - \pi, 2k\pi] (k \in \mathbf{Z})$ 上都是严格增函数
7. 函数 $f(x) = \cos x, x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 的值域为_____.
8. 函数 $f(x) = \cos x + \cos 2x$ 的值域是_____.
9. 函数 $y = \cos 2x, x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 的单调增区间是_____.
10. 已知函数 $y = 2 \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$, 当函数值为 -2 时, 自变量 x 的取值集合为_____.
11. 函数 $y = \frac{\sqrt{\sin x}}{1 + \cos x}$ 的定义域是_____.
12. 函数 $y = \cos 2x + \sin^2 x$ 的值域是_____
13. 若函数 $y = \log_2 \sin x + \log_2 \cos x$, 则下列命题正确的是.....()
 - (A) 函数是偶函数
 - (B) 函数定义域是 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$
 - (C) 函数最大值 -1
 - (D) 函数的最小正周期为 π

$A\sin(\omega x + \varphi)$ 的图像和性质

在物理学和工程技术的许多问题中,经常会遇到形如 $y = A\sin(\omega x + \varphi)$ 的函数(其中 A, ω, φ 为常数),例如:物体做简谐运动,如单摆摆动或者弹簧在震动的过程中,物体离开平衡位置的位移 y 与时间 x 的关系为 $y = A\sin(\omega x + \varphi)(A > 0, \omega > 0)$

若 $A < 0$ 或者 $\omega < 0$, 可以利用诱导公式 $\sin(-\alpha) = -\sin\alpha, -\sin\alpha = \sin(\alpha + \pi)$ 将 A, ω 化为正数.

下面给出 $A\sin(\omega x + \varphi)(A > 0, \omega > 0)$ 的函数图像和性质.

1. A

A 是物体振动时离开平衡位置的最大距离,称为该震动的振幅. A 越大,震动的幅度越大.

2. ω

单摆或者弹簧往复振动一次所需的时间 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 称为该震动的周期(最小正周期). 单位时间内振动的次数, $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ 称为振动的频率. $\omega = 2\pi f$ 称为圆频率. ω 越大,周期越小,频率越大.

3. φ

$\omega x + \varphi$ 称为该振动的相位. 当 $x = 0$ 时的相位,即 φ 称为初始相位,简称初相, φ 的改变会使得图像左右平移.

例题:

1. 函数 $y = -2\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right)$ 的振幅为_____

2. 函数 $y = 2\sin\left[2\left(x + \frac{1}{6}\right)\right]$ 的初始相位是_____

3. 将函数 $y = \sin x$ 图像上各点的横坐标缩小为原来的 $\frac{1}{4}$, 纵坐标不变, 再将所得图像向左平移 $\frac{\pi}{24}$ 个单位长度得到函数 $y = f(x)$ 的图像, 则 $f(x)$ 的解析式为_____.

4. 已知函数 $f(x) = 2\cos\left(\frac{\pi}{4} - 3x\right), x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 则 $f(x)$ 的单调递增区间是_____

5. 关于函数 $f(x) = 2\sin\left(3x - \frac{3\pi}{4}\right)$, 以下说法:

① 其最小正周期为 $\frac{2\pi}{3}$

② 图像关于点 $\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 对称

③ 直线 $x = -\frac{\pi}{4}$ 是其一条对称轴

其中说法正确的序号是_____

6. 已知函数 $f(x) = \sin\omega x + a\cos\omega x(\omega > 0)$ 的最小正周期为 2π

(1) 求 ω 的值

(2) 已知直线 $x = -\frac{\pi}{4}$ 是函数 $f(x)$ 的一条对称轴, 求 $f(x)$ 的最大值与最小值

7. 判断下列函数的奇偶性, 并写出最小正周期


① $f(x) = \sin^6 x + \cos^6 x$; _____, _____

② $f(x) = a\sin^2 x + b\cos^2 x(a^2 + b^2 \neq 0, b \neq a)$; _____, _____

8. 已知函数 $f(x) = \cos\omega x(\omega > 0)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 3 个零点, 则 ω 的取值范围是_____

9. 已知函数 $f(x) = \cos(\omega x + \frac{\pi}{3}) (\omega > 0)$ 在区间 $[\pi, 2\pi]$ 有且仅有 3 个零点, 则 ω 的取值范围是 _____.

正切函数的图像和性质



- 定义: 对于任意一个不等于 $k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})$ 的实数 x , 都有唯一确定的正切值 $\tan x$ 与之对应, 按照这个对应关系建立的函数就叫做正切函数, 记作 $y = \tan x$. 正切函数的定义域是 $\{x | x \neq k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})\}$.
- 绘制函数图像: 借助单位圆可以做出图像.
- 定义域: $\{x | x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}\}$
- 周期性: 最小正周期为 π
- 奇偶性: 奇函数
- 对称中心: $(\frac{k\pi}{2}, 0), k \in \mathbf{Z}$
- 单调性: 在 $(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2})$ 内单调递增, 其中 $k \in \mathbf{Z}$
- 最值: 没有最大值或最小值, 值域为 $\mathbf{R}$

例题:

- 正切函数的最小正周期是_____, 对称中心为_____
- 有人说: “正切函数在整个定义域内是单调递增的函数.” 这句话对吗? 为什么? _____.
- 函数 $\tan(ax + b) (a \neq 0)$ 的最小正周期为_____
- 根据正切函数的图像, 写出使下列不等式成立的 x 值的集合:
(1) $1 + \tan x \geq 0$ (2) $\tan x - \sqrt{3} \geq 0$
- 函数 $y = |\tan x|$ 的最小正周期为_____
- 函数 $y = \sqrt{1 - \tan^2 x}$ 的定义域为_____

7. 关于 x 的不等式 $\tan 2x \leq -1$ 的解集为_____

8. $f(x) = \begin{cases} \tan(\pi x), & x \geq 0 \\ f(x+1), & x < 0 \end{cases}$, 则 $f\left(-\frac{2}{3}\right) =$ _____

9. 已知函数 $f(x) = \tan\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$) 在区间 $\left(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right)$ 上单调, 则 ω 的取值范围为_____

反三角函数

函数 $y = \arcsin x (x \in [-1, 1])$ 、 $y = \arccos x (x \in [-1, 1])$ 与 $y = \arctan x (x \in (-\infty, +\infty))$ 分别称为反正弦函数、反余弦函数与反正切函数. 这些函数统称为反三角函数.

$y = \sin x \left(x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\right)$ 与 $y = \arcsin x (x \in [-1, 1])$ 互为反函数.

$y = \cos x (x \in [0, \pi])$ 与 $y = \arccos x (x \in [-1, 1])$ 互为反函数.

$y = \tan x \left(x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\right)$ 与 $y = \arctan x (x \in (-\infty, +\infty))$ 互为反函数.

正弦定理和余弦定理

解三角形

解三角形是指在三角形的三条边和三个角中至少已知其中三个 (至少已知一条边) 求其余的边和角的任务.

正弦定理

在三角形中, 任意一边与其对角的正弦值之比为确定的常数, 该常数为三角形外接圆的直径, 即对 $\triangle ABC$ 有: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$. 已知两角及一边的情况下的解三角形问题首先考虑正弦定理.

余弦定理

在三角形中, 任意一边的平方等于其余两边的平方减去二倍的两边及其夹角的余弦值的乘积, 即对 $\triangle ABC$ 有: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$, $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cdot \cos B$, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$. 已知两边及其夹角的解三角形问题首先考虑余弦定理. 余弦定理是勾股定理的推论, 勾股定理是余弦定理的特例.

余弦定理的变形: $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$, $\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$, $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$. 已知三边的解三角形问题首先考虑余弦定理的变形.

注: 已知两边以及一边的对角时, 利用正弦定理和余弦定理均可作为突破口.

三角形面积公式

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}ac\sin B = \frac{1}{2}bc\sin A$$

例题:

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $b = 3, c = 2, \sin C = \frac{\sqrt{2}}{3}$, 则 $B =$ _____

2. 在 $\triangle ABC$ 中, $A = 60^\circ, a = 7, b = 8$, 则三角形..... ()

(A) 有一解


(B) 有两解

(C) 无解

(D) 不确定

3. 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 8, A = 45^\circ$, 要使 $\triangle ABC$ 被唯一确定, 那么 BC 的取值范围是_____.

4. 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 6, B = 30^\circ, C = 120^\circ$, 则 $\triangle ABC$ 的面积是_____.
5. 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 5, B = 105^\circ, C = 15^\circ$, 则此三角形的最大边的长为_____.
6. 在 $\triangle ABC$ 内, 已知三边之比为 $2:3:4$, 则该三角形的最大角的余弦值为_____.
7. 在 $\triangle ABC$ 内, 三边 a, b, c 满足 $a^2 = b^2 + c^2 + bc$, 则 a 的对角 $A =$ _____.
8. 若 $\triangle ABC$ 的三个内角满足 $\sin A : \sin B : \sin C = 5 : 11 : 13$, 则 $\triangle ABC$ ()
- (A) 一定是锐角三角形
- (B) 一定是直角三角形
- (C) 一定是钝角三角形
- (D) 可能是锐角三角形, 也可能是钝角三角形
9. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $a = \sqrt{6}, b = \sqrt{3} + 1, C = \frac{\pi}{4}$, 求 c, A, B
10. 在 $\triangle ABC$ 中, 若三内角满足 $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin B \sin C + \sin^2 C$, 则 $A =$ _____.
11. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\cos A = \frac{\sin B}{2 \sin C}, b = 4\sqrt{3}, 2 \sin B = \sqrt{3}$, 则 $a =$ _____.
12. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 若 $a = \sqrt{3}$, 且 $c - 2b + 2\sqrt{3} \cos C = 0$, 则该三角形外接圆的半径为_____.
13. 已知半径为 R 的圆外接于 $\triangle ABC$, 且 $2R(\sin^2 A - \sin^2 C) = (\sqrt{3}a - b) \sin B$.
- (1) 求角 C ;
- (2) 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.
14. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $c = 5$.
- (1) 若 $\frac{a}{4b} = \frac{\sin B}{\sin A}, C = \frac{\pi}{2}$, 求 a
- (2) 若 $ab = 20$, 求 $\triangle ABC$ 的面积的最大值.
15. 设 $\triangle ABC$ 的三边分别为 a, b, c , 设 BC 边中线为 AM , 高线为 AH , A 的角平分线为 AE , 求 AM, AH, AE 及 $\triangle ABC$ 的内切圆和外接圆半径 r, R 的长度
16. 草坪上有一个带有围栏的边长为 $30m$ 的正三角形活动区域 ABC , 点 P 在边 BC 上, 且 $|PB| = 2|PC|$, 小闵同学在该区域玩耍, 他在 P 处放置了一个手电筒, 若手电筒发出的光线张角 (任两条光线的最大夹角) 为 60° , 则手电筒在 ABC 内部所能照射到的地面的最大面积为_____ m^2
17. 小申同学观察发现, 生活中有些时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 $1m$ 的垂直于水平面放置的杆子, 与斜面的接触点分别为 A, B , 它们在阳光的照射下呈现出影子. 阳光可视为平行光, 其中一根杆子的影子在水平面上, 长度为 $0.4m$, 另一根杆子的影子完全在斜面上, 长度为 $0.45m$. 则斜面的底角 $\theta =$ _____. (结果用角度制表示, 精确到 0.01°)



18. 已知点 B 在点 C 正北方向, 点 D 在点 C 的正东方向, $BC = CD$, 存在点 A 满足 $\angle BAC = 16.5^\circ$, $\angle DAC = 37^\circ$, 则 $\angle BCA =$ _____.(精确到 0.1°)
19. 一个机器零件的形状是有缺口的圆形铁片, 如图中实线部分为裁剪后的形状. 已知这个圆的半径是 13cm , $AB = 8\text{cm}$, $BC = 6\text{cm}$, 且 $AB \perp BC$, 则圆心到点 B 的距离约为 _____ cm . (结果精确到 0.1cm)

