


解析几何-椭圆

椭圆的定义

我们把平面上到两个不同定点 F_1 、 F_2 的距离之和等于常数 (大于 $|F_1F_2|$) 的点的轨迹叫做椭圆. 这两个定点 F_1 、 F_2 叫做椭圆的焦点, 两个焦点之间的距离 $|F_1F_2|$ 叫做椭圆的焦距.


例子 取一段长为 $2a$ 的绳子, 将它的两端都固定在图板的一点 O , 将铅笔尖套在绳子里并拉紧绳子, 使笔尖 P 移动一周, 那么笔尖点 P 就画出了一个圆心为 O 、半径为 a 的圆.

把这段长为 $2a$ 的绳子, 将它的两端分别固定在图板上不同的两点 F_1 和 F_2 处 ($|F_1F_2| < 2a$), 将铅笔尖套在绳子里并拉紧绳子, 使笔尖 P 顺势移动一周, 那么笔尖点 P 就画出了一个椭圆.



椭圆的标准方程

椭圆标准方程的建立



如图所示, 以线段 F_1F_2 的中点为坐标原点, 以 $\overrightarrow{F_1F_2}$ 的方向为 x 轴正方向, 建立平面直角坐标系. 设椭圆的焦距 $|F_1F_2| = 2c$ ($c > 0$), 则点 F_1 、 F_2 的坐标分别为 $(-c, 0)$ 、 $(c, 0)$.

设动点 $M(x, y)$ 是椭圆上任意一点, 则点 M 到两个定点 F_1 、 F_2 的距离之和等于常数, 设为 $2a$ ($a > 0$), 那么椭圆上点的集合为: $\{M \mid |MF_1| + |MF_2| = 2a, 2a > 2c > 0\}$.


所以, 由 $|MF_1| + |MF_2| = 2a, 2a > 2c > 0$, 得 $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$

移项可得 $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$.

两边平方得 $(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2$. 整理得 $a^2 - cx = a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$.

两边再平方得 $a^4 - 2a^2cx + c^2x^2 = a^2(x-c)^2 + a^2y^2$. 整理, 得 $(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$.

因为 $2a > 2c > 0$, 即 $a > c > 0$. 所以 $a^2 - c^2 > 0$, 设 $b^2 = a^2 - c^2$, 且 $b > 0$, 则可以得到表示焦点在 x 轴上的椭圆的标准方程: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$).



类似地, 如果以焦点 F_1 、 F_2 所在直线为 y 轴, 线段 F_1F_2 的垂直平分线为 x 轴, 建立平面直角坐标系, 则可得焦点在 y 轴上的椭圆的方程: $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 其中焦点是 $F_1(0, -c)$ 、 $F_2(0, c)$, 且 $b^2 = a^2 - c^2$ ($b > 0$).

求动点轨迹方程的一般步骤

回顾一下求椭圆标准方程的过程, 其步骤概括如下:

- ① 建系: 建立适当的平面直角坐标系;
- ② 设点: 设出曲线上任意一点的坐标;
- ③ 找等量关系: 曲线上任一点满足的等量关系 (几何关系);
- ④ 坐标化: 把相关点的坐标代入等量关系;
- ⑤ 化简: 把曲线方程化到最简形式;
- ⑥ 检验: 检验以方程的解为坐标的点在曲线上.

例题:

1. 椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ 上点 P 到上焦点的距离为 4, 则点 P 到下焦点的距离为……………()
 (A) 6 (B) 3 (C) 4 (D) 2
2. 已知定点 F_1 、 F_2 , 其中 $F_1(-4, 0)$, $F_2(4, 0)$, 动点 P 满足 $|PF_1| + |PF_2| = 8$, 则动点 P 的轨迹是……………()
 (A) 椭圆 (B) 圆 (C) 直线 (D) 线段
3. (1) 若方程 $\frac{x^2}{16-m} + \frac{y^2}{m+9} = 1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆, 则实数 m 的取值范围是_____
- (2) 若方程 $x^2 + ky^2 = 3$ 表示焦点在 x 轴上的椭圆, 则实数 k 的取值范围是_____
4. 已知定点 $F_1(-4, 0)$ 、 $F_2(4, 0)$ 和动点 $M(x, y)$, 求满足 $|MF_1| + |MF_2| = 2a$ ($a > 0$) 的动点 M 的轨迹.
5. 求满足下列条件的椭圆的标准方程.
 - (1) 焦距是 12, 椭圆上一点到两个焦点的距离之和等于 16;
 - (2) 焦点坐标分别为 $(0, -2)$, $(0, 2)$, 且经过点 $(4, 3\sqrt{2})$;
 - (3) 经过两点 $(\sqrt{3}, -2)$, $(-2\sqrt{3}, 1)$.
6. 求与两圆 $C_1: (x+2)^2 + y^2 = 1$ 和 $C_2: x^2 - 4x + y^2 - 45 = 0$ 都相切的动圆圆心 P 的轨迹方程.
7. 椭圆有这样的光学性质: 从椭圆的一个焦点出发的光线, 经椭圆反射后, 反射光线必经过椭圆的另一个焦点. 今有一个水平放置的椭圆形台球盘, 点 A 、 B 是它的两个焦点, 长轴长为 $2a$, 焦距为 $2c$. 当放在点 A 的小球 (小球的半径不计), 从点 A 沿直线击出, 经椭圆壁反弹后再回到点 A 时, 小球经过的路程是……………()
 (A) $4a$ (B) $2(a-c)$
 (C) $2(a+c)$ (D) 以上三种情况都有可能

8. 已知点 F_1 、 F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (0 < b < 10)$ 的左、右焦点, P 是椭圆上一点.

(1) 若 $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$ 且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积为 $\frac{64\sqrt{3}}{3}$, 求实数 b 的值

(2) 求 $|PF_1| \cdot |PF_2|$ 的最大值

椭圆的性质


在解析几何中, 可利用曲线的方程研究曲线的几何性质. 我们从椭圆的标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 出发, 可以得到椭圆的下列性质.

1. 对称性

在标准方程中, 用 $-x$ 代换 x , 或用 $-y$ 代换 y , 或用 $-x$ 、 $-y$ 代换 x 、 y , 标准方程依然成立. 这就是说, 若点 $M_1(x, y)$ 的坐标满足方程, 则它关于 y 轴、 x 轴、坐标原点的对称点 $M_2(-x, y)$ 、 $M_3(x, -y)$ 、 $M_4(-x, -y)$ 也都满足方程, 所以椭圆关于 y 轴、 x 轴和坐标原点对称. 因此, 椭圆既是轴对称图形, 有两条互相垂直的对称轴; 也是中心对称图形, 其唯一的对称中心叫做椭圆的中心. 在椭圆标准方程的条件下, 椭圆的对称轴就是坐标轴, 对称中心就是坐标原点.

2. 顶点

椭圆与它的对称轴的交点叫做椭圆的顶点.




如图所示, 对于焦点在 x 轴的椭圆, 在它的标准方程中, 令 $x = 0$, 得 $y = \pm b$; 令 $y = 0$, 得 $x = \pm a$. 这样我们就得到了椭圆与坐标轴 (对称轴) 的交点坐标: $A_1(-a, 0)$ 、 $A_2(a, 0)$ 、 $B_1(0, -b)$ 、 $B_2(0, b)$, 这四个点都是椭圆的顶点.

因为 $a > b > 0$, 我们把线段 A_1A_2 、 B_1B_2 分别叫做椭圆的长轴和短轴, 长轴长等于 $2a$, 短轴长等于 $2b$; 而把 a 和 b 分别叫做椭圆的长半轴的长和短半轴的长. 椭圆的焦距为 $2c$, 椭圆的半焦距为 c , 三者之间的数量关系为 $a^2 = b^2 + c^2$.

椭圆的两个焦点都在它的长轴上, 而椭圆的长轴和短轴分别在椭圆的两条相互垂直的对称轴上.

3. 范围

由椭圆的标准方程可知, 椭圆上任一点的坐标 (x, y) 都满足不等式 $\frac{x^2}{a^2} \leq 1, \frac{y^2}{b^2} \leq 1$, 即 $-a \leq x \leq a, -b \leq y \leq b$.



这就是说椭圆位于直线 $x = \pm a$ 和直线 $y = \pm b$ 所围成的矩形内.

4. 离心率

我们将椭圆的焦距与长轴长的比 $\frac{c}{a}$ 叫做椭圆的离心率, 记作 $e = \frac{c}{a}$, 因为 $a > c > 0$, 所以 $0 < e < 1$.

固定 a 不变, e 越接近 1, 则 c 越接近 a , 从而 $b = \sqrt{a^2 - c^2}$ 越小, 此时椭圆越扁; 反之, e 越接近 0, 则 c 越接近 0, 从而 $b = \sqrt{a^2 - c^2}$ 越接近 a , 此时椭圆越接近于圆, 极限时, 如果 $a = b$, 则 $c = 0$, 即椭圆的两个焦点重合, 此时的图形就成了圆.

5. 总结:


焦点的位置	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
图形		
标准方程	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$	$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$
范围	$-a \leq x \leq a$ 且 $-b \leq y \leq b$	$-b \leq x \leq b$ 且 $-a \leq y \leq a$
顶点	$A_1(-a, 0), A_2(a, 0), B_1(0, -b), B_2(0, b)$	$A_1(0, -a), A_2(0, a), B_1(-b, 0), B_2(b, 0)$
轴长	短轴长为 $2b$, 长轴长为 $2a$	
焦点	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$	$F_1(0, -c), F_2(0, c)$
焦距	$ F_1F_2 = 2c$	
对称性	对称轴: x 轴和 y 轴, 对称中心: 原点	
离心率	$e = \frac{c}{a} (0 < e < 1)$	
a, b, c 的关系	$a^2 = b^2 + c^2$	

例题:

1. 判断下列结论中正确的序号是_____

- ① 平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离之和等于常数的点的轨迹是椭圆.
- ② 椭圆是轴对称图形, 也是中心对称图形.
- ③ $\frac{y^2}{m^2} + \frac{x^2}{n^2} = 1 (m \neq n)$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆.
- ④ 椭圆的离心率 e 越大, 椭圆就越圆.

2. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的一个焦点为 $(2,0)$, 则 C 的离心率为 ()
- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (D) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$



3. 嫦娥四号月球探测器于 2018 年 12 月 8 日搭载长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心发射, 12 月 12 日下午, 嫦娥四号顺利进入了以月球球心为一个焦点的椭圆形轨道, 如图中轨道③所示, 其近月点与月球表面距离为 100 公里, 远月点与月球表面距离为 400 公里, 已知月球的直径约为 3476 公里, 则椭圆的离心率为_____
4. 求满足下列条件的椭圆的标准方程.
- (1) 长轴长是短轴长的 2 倍, 且过点 $(2, -6)$
 - (2) 长轴长为 10, 离心率为 $\frac{3}{5}$
 - (3) 在 x 轴上的一个焦点与短轴两端点的连线互相垂直, 且焦距为 6 .
5. (1) 若椭圆 $5x^2 + ky^2 = 5$ 的一个焦点是 $(0,2)$, 求 k 的值;
- (2) 若椭圆 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{m} = 1$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 求实数 m 的值.

椭圆的第二定义

平面内到定点的距离和定直线的距离之比为定值 $e(0 < e < 1)$ 的点的轨迹为椭圆. 这个定点就是椭圆的一个焦点, 这条定直线叫做椭圆的准线, 而常数 $e(0 < e < 1)$ 是椭圆的离心率.

由椭圆的对称性可知, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 有两条准线: 与焦点 $F_1(-c, 0)$ 的对应的准线方程是 $x = -\frac{a^2}{c}$; 与焦点 $F_2(c, 0)$ 对应的准线方程是 $x = \frac{a^2}{c}$.

1. 已知动点 $M(x, y)$ 与定点 $F_1(-c, 0)$ 的距离和它到定直线 $l: x = -\frac{a^2}{c}$ 的距离之比为常数 $\frac{c}{a} (a > c > 0)$, 求动点 M 的轨迹.
 2. 设点 $M(m, n)$ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上的一点, r_1, r_2 分别是 M 与椭圆左右焦点 F_1, F_2 的距离, 试用椭圆离心率 e 和 M 的坐标表示 r_1, r_2 .
 3. 若椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 则该椭圆上的点到焦点距离的最大值为 ()
- (A) 3 (B) $2 + \sqrt{3}$ (C) 2 (D) $\sqrt{3} + 1$
4. 椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上不同三点 $A(x_1, y_1), B\left(4, \frac{9}{5}\right), C(x_2, y_2)$ 与焦点 $F(4, 0)$ 的距离依次构成等差数列, 则 $x_1 + x_2 =$ _____

5. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , C 上的 A, B 两点关于原点对称, $|FA| = 2|FB|$, 且 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} \leq \frac{4}{9}a^2$, 则 C 离心率的取值范围是_____.
6. 已知椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的右准线 l 与 x 轴相交于点 E , 过椭圆右焦点 F 的直线与椭圆相交于 A, B 两点, 点 C 在右准线 l 上, 且 $BC \parallel x$ 轴, 求证: 直线 AC 经过线段 EF 的中点.
7. 椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的上有两点 A, B , 点 B 在直线 $x = 4$ 上的射影是点 B' , 若直线 AB 过右焦点, 则直线 AB' 必定经过的定点坐标为_____.
8. 设点 AB 过椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点 F , 设其倾斜角为 θ , 试求 FA, FB
9. 过椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的左焦点作倾斜角为 60° 的直线, 直线与椭圆交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ _____.
10. 过椭圆 $3x^2 + 4y^2 = 48$ 的左焦点 F 引直线 l 交椭圆于 A, B 两点, 若弦 AB 的长为 $\frac{48}{7}$, 则直线 l 的斜率为_____.
11. 已知 F 是椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 的右焦点, 设直线 AB 过点 F 且与椭圆 C 相交于点 A, B , 则 $\frac{1}{|FA|} + \frac{1}{|FB|} =$ _____.

点和椭圆的位置关系

对于点 (x_0, y_0) 和椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

- ① $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} < 1 \iff$ 点在椭圆内
- ② $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1 \iff$ 点在椭圆上
- ③ $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} > 1 \iff$ 点在椭圆外

椭圆上点的三角换元: 对于椭圆 $\frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{n^2} = 1$, 其上的点 $P(x_0, y_0)$ 可表示为 $\begin{cases} x_0 = m\cos\theta \\ y_0 = n\sin\theta \end{cases}$, 此处三角换元的系数与椭圆的焦点位置无关, 且 θ 和 OP 倾斜角除特殊情况外, 不是同一个角.

例题:

1. 若直线 $mx + ny = 3$ 和圆 $x^2 + y^2 = 3$ 没有交点, 则过点 (m, n) 的直线与椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的交点有_____个.
2. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点为 F_1, F_2 , 直线 $y = kx (k > 0)$ 与 C 交于 M, N 两点 (M 在第一象限), 若 M, F_1, N, F_2 共圆, 则 C 的离心率 e 的取值范围是_____.
3. 已知 A, B, C 是椭圆 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上三个不同的点, $\triangle ABC$ 的重心为原点 O , 那么 $\triangle ABC$ 的面积是_____.

4. 已知 $A(0, 3)$ 和 $P\left(3, \frac{3}{2}\right)$ 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上两点.

(1) 求 C 的离心率

(2) 若过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B , 且 $\triangle ABP$ 的面积为 9, 求 l 的方程

直线和椭圆的位置关系

直线与椭圆的位置关系可以通过代数方法进行判断.

1. 联立: 把直线与椭圆的方程联立, 构成二元二次方程组

2. 消元: 消去未知数 x (或 y), 得到关于 y (或 x) 的一元二次方程 (二次项系数必不为 0)

3. 计算该一元二次方程的判别式 Δ , 并得出结论:

① $\Delta > 0 \iff$ 有两个公共点

② $\Delta = 0 \iff$ 有且只有一个公共点

③ $\Delta < 0 \iff$ 没有公共点

直线与圆锥曲线的位置关系问题, 一般都按照上述步骤处理, 并能进一步利用根与系数的关系和其他几何等量关系来解决一些问题.

弦长公式

已知 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 直线 AB 的斜率为 $k (k \neq 0)$, 则 $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{1 + k^2} |x_1 - x_2|$

例题:

1. 已知椭圆 C 的两个焦点分别是 $F_1(-1, 0)$ 、 $F_2(1, 0)$, 且椭圆 C 经过点 $\left(1, \frac{3}{2}\right)$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程

(2) 当实数 m 取何值时, 直线 $l: y = x + m$ 与椭圆 C 满足下列条件:

① 有两个公共点

② 只有一个公共点

③ 没有公共点

2. 已知 O 为坐标原点, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$, 且经过点 $P(\sqrt{6}, 1)$.

(1) 求椭圆 C 的方程

(2) 直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 直线 OA 的斜率为 k_1 , 直线 OB 的斜率为 k_2 , 且 $k_1 k_2 = -\frac{1}{3}$, 求 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ 的取值范围.

3. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的右焦点为 $(1, 0)$, 且经过点 $A(0, 1)$.

(1) 求椭圆 C 的方程

(2) 设 O 为原点, 直线 $l: y = kx + t (t \neq \pm 1)$ 与椭圆 C 交于两个不同点 P, Q , 直线 AP 与 x 轴交于点 M , 直线 AQ 与 x 轴交于点 N , 若 $|OM| \cdot |ON| = 2$, 求证: 直线 l 经过定点.

4. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的上顶点和两焦点构成的三角形为等腰直角三角形, 且面积为 2, 点 M 为椭圆 C 的右顶点.

(1) 求椭圆 C 的方程

(2) 若经过点 $P(t, 0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 实数 t 取何值时以 AB 为直径的圆恒过点 M ?

5. 已知 $A(2, 0)$ 和 $B\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上两点.

(1) 求椭圆 C 的离心率

(2) 过点 $(-1, 0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于 D, E 两点 (D, E 不在 x 轴上).

① 若 $\triangle ADE$ 的面积为 $\sqrt{5}$, 求直线 l 的方程

② 直线 AD 和 AE 分别与 y 轴交于 M, N 两点, 求证: 以 MN 为直径的圆被 x 轴截得的弦长为定值

6. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1 (a > \sqrt{5})$, $M(0, m) (m > 0)$, A 是 Γ 的右顶点.

(1) 若 Γ 的焦点 $(2, 0)$, 求离心率 e

(2) 若 $a = 4$, 且 Γ 上存在一点 P , 满足 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$, 求 m

(3) 已知 AM 的中垂线 l 的斜率为 2 , l 与 Γ 交于 C, D 两点, $\angle CMD$ 为钝角, 求 a 的取值范围.

7. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $\frac{1}{2}$, 长轴长为 4 .

(1) 求椭圆 C 的标准方程

(2) 已知直线 l 过定点 $E\left(\frac{1}{4}, 0\right)$, 若椭圆 C 上存在两点 A, B 关于直线 l 对称, 求直线 l 的斜率 k 的取值范围.

8. 求证:

(1) 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 在椭圆上点 $M(x_0, y_0)$ 处的切线为 $l: \frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$

(2) 过点 $M(x_0, y_0)$ (在椭圆外), 做椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的切线 l_1, l_2 , 切点为 A, B , 则直线 AB 的方程为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$

(3) 若 $M(x_0, y_0)$ 在椭圆内部, 则 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 与椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 相离.

9. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$, O 为坐标原点

(1) 求 Γ 的离心率 e

(2) 设点 $N(1, 0)$, 点 M 在 Γ 上, 求 $|MN|$ 的最大值和最小值

(3) 点 $T(2, 1)$, 点 P 在直线 $x + y = 3$ 上, 过点 P 且与 OT 平行的直线 l 与 Γ 交于 A, B 两点; 试探究: 是否存在常数 λ , 使得 $|\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}| = \lambda |\overrightarrow{PT}|^2$ 恒成立; 若存在, 求出该常数的值; 若不存在, 说明理由