

PROJEKT BLODSUKKER

Cecilie Horshauge

21. januar 2024

Hos raske mennesker reguleres blodsukkerkoncentrationen automatisk via leveren. Normalt ligger koncentrationen i intervallet 60-100 mg blodsukker pr. 100 ml blod. Hormonet insulin har den virkning, at det stimulerer cellernes optagelse af sukker fra blodet. Det følgende drejer sig om en forsøgsperson, der får en indsprøjtning af en bestemt dosis insulin.

Efter indsprøjtningen vil blodsukkerkoncentrationen ændre sig som funktion af den tid, der er forløbet efter indsprøjtningen. Det antages i det følgende, at denne funktion med god tilnærmelse kan beskrives på følgende form:

$$C(t) = 83 + 73 \cdot (a^t - b^t) \quad \text{mg pr 100 mL}$$

hvor t er målt i timer og $a = 0.1$, $b = 0.5$

Opgave A

Beskriv med ord hvorledes koncentrationen udvikler sig på kort, lidt længere og på helt langt sigt.

Løsning

Opgave B

Hvad er den laveste koncentration, som forsøgspersonen oplever?

Løsning

Først bestemmes $c'(t)$.

$$\begin{aligned} c'(t) &= (83 + 75 \cdot (a^t - b^t))' \\ &= (83)' + 75 \cdot ((a^t)' - (b^t)') \\ &= 0 + 75 \cdot (a^t \cdot \ln(t) - b^t \cdot \ln(t)) \\ &= 75 \cdot \ln(t) \cdot (a^t - b^t) \end{aligned}$$

Løsning med CAS

```
a := 0.1 : b := 0.5 :  
c(t) := 83 + 75 * (a^t - b^t) :  
t_lav := solve (c'(t) = 0) = 0.7459407764  
c(t_lav) = 51.74141940
```

Den laveste koncentration, som forsøgspersonen oplever, er 51.74 mg pr. 100 mL.


Opgave C

Hvornår falder koncentrationen hurtigst og hvornår stiger den hurtigst?

Løsning

Det største fald og den største stigning hos en funktion kan altid findes ved ekstremum, der i nogle tilfælde kan findes ved endepunkterne af funktionens afledte funktion.

Betragt først grafen for $c'(t)$.



Her bemærker vi et maksimum mellem 1 og 2 og at minimum der ser ud til at ligge i 0. Det er let at bestemme maksimum, vi kan blot benytte et CAS-værktøj til at isolere t i ligningen $c''(t) = 0$.

$\text{solve}(c''(t) = 0) = 1.491881553$

Lad os nu overbevise os selv om at minimum hos den afledte funktion kan findes ved $t = 0$.

$$c'(t) = -172.6938820 \cdot 0.1^t + 51.98603854 \cdot 0.5^t$$

Som t nærmer sig 0 vil både 0.1^t og 0.5^t nærme sig 1. Dog nærmer 0.5^t sig hurtigere. Første led er mest negativt når $t = 0$, og det bliver gradvist mere negativt som t nærmer sig 0. På samme måde bliver andet led også større som t går mod 0. Ledet kan dog ikke blive større end ca. 52, hvor første led bliver betydeligt mere negativt som t nærmer sig 0. Det giver derfor også mening at minimum må ligge i $t = 0$.

Koncentrationen falder altså hurtigst ved $t = 0$ og stiger hurtigst ved $t = 1.49$.

Opgave D

Hvornår vil funktionsværdien være inden for 1% fra sin asymptotiske værdi?

Løsning

Opgave E

Man kan føle et stærkt ubehag, hvis blodsukkerkoncentrationen falder til under 60 mg pr. 100 ml.

I hvilket tidsrum efter indsprøjtningen må forsøgspersonen være forberedt på ubehag?

Løsning