

# Projekt Kagedeling

MATEMATIK A

Cecilie Horshauge

28. april 2024

**A:**

*Opstil en rekursionsligning, der fastlægger udviklingen i antallet af stykker kage udover samuraimesterens.*

Reglerne for kagedeling er givet ved:

- Alle kagestykker halveres
- Samuraimesteren tildeles ét af stykkerne
- Denne proces gentages et passende antal gange.

**NB: Jeg antager at for hver gentagelse at samuraimesteren får et stykke kage.**

Rekursionsligningen  $y_{n+1} = 2 \cdot y_n - 1$  må lige netop være en passende rekursionsligning. Da antallet afhænger af antallet af stykker der var skåret lige inden  $y_n$  og ved  $y_{n+1}$  fordobles antallet af stykker ved at hvert kagestykke halveres. Der tages højde for samuraimesterens kagestykker ved at trække 1 fra.

Udviklingen i antal kagestykker udover samuraimesterens kan derfor beskrives med rekursionsligningen

$$y_{n+1} = 2 \cdot y_n - 1.$$

## B:

*Bestem ligningens fuldstændige løsning.*

Rekursionsligningen er inhomogen. Først vil samtlige løsninger bestemmes med udgangspunkt i sætning 3.

Jeg antager først at  $z_n$  er en løsning rekursionsligningen

$$y_{n+1} = 2 \cdot y_n - 1.$$

Dernæst gætter jeg på at  $z_n = c$ , altså at løsningen  $z_n$  er en konstant. Vi kan derfor lave denne manipulation af udtrykket og isolere for  $c$ .

$$z_{n+1} = 2 \cdot z_n - 1$$

$$c = 2 \cdot c - 1$$

$$c = 1$$

Som følge af sætning 3 bliver den fuldstændige løsning

$$y_n = 1 + k \cdot 2^n$$

**C:**

Bestem de partikulære løsninger med udgangspunkt i begyndelsesværdierne  $y_0 = 1$ ,  $y_0 = 2$ ,  $y_0 = 3$  samt  $y_0 = s$ .

$$\underline{y_0 = 1}$$

Da  $n = 0$  og  $y_0 = 1$  indsætter jeg i den fuldstændige løsning og isolerer for  $k$  og på den måde bestemmer den partikulære løsning med begyndelsesværdien  $y_0 = 1$ .

$$y_0 = 1 + k \cdot 2^0$$

$$1 = 1 + k \cdot 1$$

$$k = 0$$

og dermed bliver den partikulære løsning  $y_n = 1 + 0 \cdot 2^n$  altså blot  $y_n = 1$ .

$$\underline{y_0 = 2}$$

Samme metode benyttes.

$$y_0 = 1 + k \cdot 2^0$$

$$2 = 1 + k \cdot 1$$

$$k = 1$$

Den partikulære løsning bliver da  $y_n = 1 + 2^n$ .

$$\underline{y_0 = 3}$$

Samme metode benyttes.

$$y_0 = 1 + k \cdot 2^0$$

$$3 = 1 + k \cdot 1$$

$$k = 2$$

Den partikulære løsning bliver da  $y_n = 1 + 2 \cdot 2^n$ .

$$\underline{y_0 = s}$$

Samme metode benyttes.

$$y_0 = 1 + k \cdot 2^0$$

$$s = 1 + k \cdot 1$$

$$k = s - 1$$

Den partikulære løsning bliver da  $y_n = 1 + (s - 1) \cdot 2^n$ .

## D:

Opstil talrækkerne ud fra de partikulære løsninger med begyndelsesværdierne i sp. C og sammenlign svaret med rekursionsligningen fra sp. A.

Jeg udregner hver af talrækkerne ved brug af de partikulære løsninger. Man indsætter blot det  $n$  man ønsker at beregne for. Talrækkerne bliver som følger:

$$y_0 = 1, y_1 = 1, y_2 = 1, y_3 = 1 \dots$$

$$y_0 = 2, y_1 = 3, y_2 = 5, y_3 = 9 \dots$$

$$y_0 = 3, y_1 = 5, y_2 = 9, y_3 = 17 \dots$$

$$y_0 = s, y_1 = 2s - 1, y_2 = 4s - 3, y_3 = 8s - 7 \dots$$

De stemmer alle overens med rekursionsligningen  $y_{n+1} = 2y_n - 1$

## E:

Udvælg en funktionsforskrift og vis hvordan Newtons metode kan anvendes til at bestemme nulpunkt / nulpunkter.

Jeg vælger  $\ln(x)$  og bruger newtons metode til at bestemme nulpunkt for funktionen. Man tilnærmer sig værdien ved rekursivt at løse ligningen  $0 = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ . Den næste tilnærmede værdi  $x_{n+1} = N(x_n)$  findes ved

$$N(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

Jeg vælger mit gæt til at være 2. Dvs.  $x_0 = 2$  og jeg indsætter i  $N(x)$  jeg får da.

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 2 - \frac{\ln(2)}{\frac{1}{2}} = 2 - 2 \cdot \ln(2) = 0.613705639$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0.613705639 - \frac{\ln(0.613705639)}{\frac{1}{0.613705639}} = 0.9133412073$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = 0.9133412073 - \frac{\ln(0.9133412073)}{\frac{1}{0.9133412073}} = 0.9961317034$$

$$x_4 = x_3 - \frac{f(x_3)}{f'(x_3)} = 0.9961317034 - \frac{\ln(0.9961317034)}{\frac{1}{0.9961317034}} = 0.9999925085$$

$$x_5 = x_4 - \frac{f(x_4)}{f'(x_4)} = 0.9999925085 - \frac{\ln(0.9999925085)}{\frac{1}{0.9999925085}} = 1.0000000000$$

Sådan har jeg brugt Newtons metode til at bestemme nulpunkt for  $\ln(x)$ . Hvis jeg havde valgt et begyndelsesgæt ret meget over 2.6 ville  $x_1$  ligge uden for  $\ln$ 's definitionsområde og det ville ikke give mening. Nulpunktet blev bestemt til  $x = 1$  som forventet.

**F:**

*Udvælg en differentiaalligning og vis, hvordan Eulers metode kan anvendes til at bestemme punkter på løsningskurven.*