

{Logo Empresa}	LEGENDARY SEEDS S.A.S		
	LISTA DE CHEQUEO DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROCEDIMIENTO DE PROPAGACIÓN		VERSIÓN: 01
FECHA:	HORA:		
LOTE:	CULTIVAR:		
LICENCIA:	MODALIDAD:		
RESPONSABLE:			
ÍTEM	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Condiciones ambientales			
La temperatura del domo de germinación está dentro del rango óptimo (entre 15-35°C) para el proceso de enraizamiento.			
Hay una buena circulación de aire para evitar la acumulación de humedad y mantener un ambiente saludable para las plantas.			
Se ha verificado la intensidad y duración de la luz en las bombillas para garantizar un desarrollo saludable y evitar problemas de estrés lumínico.			
El pH del agua de riego está dentro del rango óptimo para la absorción de nutrientes (entre 5,5-7,5) y se verificó la homogeneidad en el caudal de los goteros.			
La EC del agua está dentro del rango óptimo para la absorción de nutrientes (entre 0.0 y 1).			
Sustrato y contenedores			
La EC del sustrato está dentro del rango óptimo para la absorción de nutrientes (aproximadamente 0.0 y 1,5).			
El pH del sustrato está dentro del rango óptimo para la absorción de nutrientes (aproximadamente 6-7).			
La retención de humedad del sustrato es óptima			
El suelo fue previamente desinfectado.			
Inspección del material vegetal			
La longitud promedio del esqueje es de 14cm aproximadamente y la homogeneidad en tamaño es >80%.			
El número promedio de hojas desplegadas es de 2.			
El esqueje tiene el apice en buen estado y las demás yemas apicales fueron retiradas.			
La intensidad del verde de la hoja es de verde claro a verde oscuro.			
El monitoreo de plagas y enfermedades evidencia un buen estado fitosanitario.			
El esqueje fue sembrado en el centro de la cavidad de la bandeja y su ubicación es vertical.			
Instalaciones y equipos			
Las instalaciones a las que ingresa el material vegetal están limpias y libres de suciedad, polvo, restos de plantas o cualquier otro material no deseado, teniendo en cuenta el procedimiento de desinfección de áreas.			
Todas las herramientas utilizadas en la siembra y equipos del área están limpios y fueron desinfectados antes de su uso.			
Higiene de personal			
Todos los trabajadores utilizan la ropa de trabajo adecuada, incluyendo guantes, bata, gorro, tapabocas, botas y se han desinfectado previamente las manos y el calzado.			
CONCEPTO Y FIRMA:			