出院傷口照護



國立成功大學醫學院附設醫院 關心您

傷口照護步驟

1. 洗手 以肥皂清潔雙手 並擦乾



傷口消毒

- (1) 以生理食鹽水將棉棒沾濕 由傷口往外作環狀擦拭5公 分。
- (2) 以優碘將棉棒沾濕由傷口 往外作環狀擦拭5公分,等 待2分鐘至乾燥,再用生食 鹽水洗淨。
- (3) 如果對優碘不會過敏者,則 不需使用生理食鹽水清洗。
- (4) 若傷口為藥膏塗抹者,則先 以生理食鹽水將傷口洗 淨,再將藥膏塗抹於患部。
- (5) 蓋上紗布(不要碰觸與傷口 直接接觸的紗布面),貼上紙 膠黏貼固定即可。



優碘以環狀消 毒傷口,由內而 外約五公分。

圖一




圖二

蓋上紗布或 防水敷料紙 膠黏貼固定。

圖三

傷口照護流程圖




優碘消毒

(等待2分鐘至乾燥)

用生理食鹽水 洗淨優碘

> 紗布覆蓋 紙膠固定

直接藥膏塗抹



傷口照護注意事項

- 1. 視傷口分泌物情況,每天換 藥。若已相當清潔乾燥,則 可2天换一次。
- 2. 保持紗布清潔與乾燥,若有 渗濕或是不小心弄髒情 形,則須趕快消毒傷口,更 換紗布。
- 3. 若傷口出現發炎症狀:變 紅、分泌物增加、壓痛、腫 脹、發燒,可能有感染象徵 時,請立即返院檢查。
- 4. 傷口癒合良好將於回診時 拆線,拆線後,傷口會以紙 膠布黏貼。
- 5. 拆線後傷口仍需保持乾 燥,需等3天後或遵照醫 師指示才可以碰水、沖澡。
- 用物準備

可至本院地下室一樓民生廣場或

一般藥局購買



□生理食鹽水 500C.C

□生理食鹽水 20C.C 數瓶 □水性優碘溶 液

□酒精性優碘

溶液

*紗布

□2X2 吋紗布

□3X3 吋紗布

□4X4 吋紗布



*棉棒 □沖洗棉棒

□□腔棉棒

□普通棉棒 □ENT 棉棒



□透氣紙膠 (3M)

□嬰幼兒膠

□6 吋彈性繃帶 □4 吋彈性繃帶

*繃帶

□4 吋彈性紗搽.

□6 叶彈性紗搽



製作單位:7A 製作日期:95.03

修訂日期:109.11

21-2-001