

7.3 非负数的和

命题

1. (7.3.1 上界推断?) 设 $\sum_{n=m}^{\infty} a_n$ 是一个非负实数的形式级数, 则这个级数是收敛的, 当且仅当存在一个实数 M 使得:

$$\sum_{n=m}^N a_n \leq M$$

对所有整数 $N \geq m$ 成立。

推论: (7.3.2 比较判别法) 设 $\sum_{n=m}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=m}^{\infty} b_n$ 是两个非负实数的形式级数, 且对任意 $n \geq m$ 均有 $|a_n| \leq b_n$, 则若有 $\sum_{n=m}^{\infty} b_n$ 收敛, 那么 $\sum_{n=m}^{\infty} a_n$ 是绝对收敛的, 并且有:

$$\left| \sum_{n=m}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=m}^{\infty} |a_n| \leq \sum_{n=m}^{\infty} b_n$$

(比较判别法中常使用几何级数 $\sum_{q=0}^{\infty} x^q$)

2. (7.3.3 几何级数) 设 x 是实数, 若 $|x| \geq 1$, 则级数 $\sum_{q=0}^{\infty} x^q$ 发散, 反之若 $|x| < 1$, 则级数 $\sum_{q=0}^{\infty} x^q$ 绝对收敛, 且有:

$$\sum_{q=0}^{\infty} x^q = \frac{1}{1-x}$$

3. (7.3.4 柯西准则) 设 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ 是一个递减的非负实数序列, 则级数是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的, 当且仅当级数:

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} = a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \dots$$

是收敛的。

4. (7.3.6 柯西准则相关?) 设 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ 是一个递减的非负实数序列, 则对任意的自然数 K , 有

$$S_{2^{K+1}-1} \leq T_K \leq 2S_{2^K}, \text{ 其中, } T_K = \sum_{k=0}^K 2^k a_{2^k}, S_N = \sum_{n=0}^N a_n.$$

(于是 $S_{2^{K+1}-1} = \sum_{n=0}^{2^{K+1}-1} a_n$, $2S_{2^K} = 2 \sum_{n=0}^{2^K} a_n$ 。该引理用于柯西准则的证明)

5. (7.3.7 调和级数与柯西准则?) 设 $q > 0$ 为有理数, 那么当 $q > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^q}$ 收敛; 当

$q \leq 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^q}$ 发散。

课后习题

7.3.1 利用命题7.3.1证明推论7.3.2

根据题设有对任意 $n \geq m$, $b_n \geq |a_n|$ 恒成立。我们取部分和 $S_N = \sum_{n=m}^{\infty} b_n$, $S'_N = \sum_{n=m}^{\infty} |a_n|$ 。

根据命题7.3.1, 有存在某个实数 M 使得对任意 $N \geq m$, $S_N \leq M$ 恒成立。

根据命题7.1.4(f)的内容, 我们又由对任意整数 $N \geq m$ 都有 $b_i \geq |a_i|$ 对任意 $m \leq i \leq N$ 成立可以得到 $S_N \geq S'_N$ 对任意 $N \geq m$ 都成立。于是结合前文有存在某个实数 M 使得对任意 $N \geq m$ 都有 $S'_N \leq S_N \leq M$ 恒成立, 于是根据命题7.3.1可以得到 $\sum_{n=m}^{\infty} a_n$ 绝对收敛。

现在已知三个级数均收敛, 于是有 $(S_N)_{N=m}^{\infty}$, $(S'_N)_{N=m}^{\infty}$ 收敛, 于是它们的极限也就是它们的上极限 (说下极限也可以), 于是运用比较原理, 由 $S_N \geq S'_N$ 对任意 $N \geq m$ 都成立我们可以得到:

$$\sum_{n=m}^{\infty} |a_n| \leq \sum_{n=m}^{\infty} b_n$$

又根据7.2.9绝对收敛审敛法的结论可以将上面结论升级为:

$$\left| \sum_{n=m}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=m}^{\infty} |a_n| \leq \sum_{n=m}^{\infty} b_n$$

于是命题得证。

7.3.2 证明引理 7.3.3 (提示: 对第一部分使用零判别法, 对于第二部分, 首先利用归纳法建立一个几何级数公式)

$$\sum_{n=0}^N x^n = \frac{(1 - x^{N+1})}{1 - x}$$

然后使用引理6.5.2)

7.3.3 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 是一个绝对收敛的实数级数, 并且满足 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| = 0$ 证明: 对任意自然数 n 都有 $a_n = 0$

为了下面的结论证明, 我们要证明一个辅助结论:

假设对于每个自然数 n 我们都指定一个实数 a_n , 那么 $S_N \leq S_M$ ($N, M \in \mathbb{N}$) 对任意 $M \geq N$ 都成立, 其中 $S_N = \sum_{n=0}^N |a_n|$ 。

对任意的自然数 N , 我们对 M 归纳证明:

当 $M = N$ 时:

此时显然有 $S_N \leq S_N = S_M$, 成立结论。

现假设在 $M = K$ 时成立结论, 对 $M = K + 1$ 时:

$$S_{K+1} = \sum_{n=0}^{K+1} |a_n| = \sum_{n=0}^K |a_n| + |a_{K+1}| = S_K + |a_{K+1}|$$

根据归纳假设, 我们有 $S_K \geq S_N$, 又有 $|a_{K+1}| \geq 0$, 于是 $S_K + |a_{K+1}| \geq S_N$, 即 $S_{K+1} \geq S_N$ 。

综上, 结论得证。

使用反证法证明:

不妨假设存在 $n_0 \geq 0$ 使得 $a_{n_0} = k \neq 0$ 并且对任意 $n < n_0$, $a_n = 0$ (即 a_{n_0} 是第一个非0项)

定义 $S_N = \sum_{n=0}^N |a_n|$, 于是可以计算得到部分和 $S_{n_0} = |a_{n_0}|$ 。

根据辅助结论, 我们始终有 $S_N \geq S_{n_0} = |a_{n_0}|$ 对任意 $N \geq n_0$ 恒成立。

此时根据题设有 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = 0$, 那么对于 $\varepsilon = \frac{|a_{n_0}|}{2}$, 应当存在一个自然数 n_1 使得 $n \geq n_1$ 时总有 $d(S_n, 0) \leq \frac{|a_{n_0}|}{2}$ 恒成立, 但是对任意 $n \geq \max(n_0, n_1)$ 我们又应该有 $d(S_n, 0) \geq |a_{n_0}|$, 这导出了矛盾。

于是假设错误, 题目结论得证。

本节相关跳转

[实分析 6.5 上极限、下极限和极限点](#)