

원주 3-2주차 진행 상황

JJJJJJ or G9000

진료내역(T30)의 34억행에서 수가코드에 G9000가 기입된 행

-> 1행 (G9010으로 기입)


명세서(T20)의 4억행에서 주상병,부상병,3상병,4상병,5상병 중 JJJJJJ가 기입된 행

-> 1행 (JJJJJ으로 기입)

R3272(신적출술[이식용]), R3275(신적출술[이식된것])

진료내역서(T30)의 34억행 중 R3272 or R3275가 기입된 대상

->12113명



-> 신적출술 코드가 대부분 신이식 환자에게 기입

Basic Characteristic

대상 : 16779명중, 건강검진 기록이 있는 사람 -> 16763명

-다장기 이식 환자 포함

-R3280이 처음 기입된 날과 V005 및 V084가 처음 기입된 날의 차이 고려

X

변수 :


-나이, 성별, 소득분위

-Hypertension, Secondary Hypertension, Diabet

-Cancer, Meta Cancer

-기저 투석 여부


나이



1.Min : 1 / Median : 47 / Max : 81

신이식을 받은 해당 연도의 건강검진이 없는 경우, 신이식 받은 연도를 고려해서 산출 (2명)

성별



1. 남자 : 9900명 (0.59%)
2. 여자 : 6863명 (0.41%)

소득분위


-신이식을 받은 연도에서 가장 가까운 과거의 자료

-16753명 중 879명이 NA -> 15874명

-소득분위가 NA인 879명 중 50%가 개인식별ID가 2000,000 이하

->개인식별 ID의 하위 3%가 NA의 50%를 차지함(행정상의 문제??)

소득분위




Min : 1 / 25% : 7 / Median : 13 / 75% : 17 / Max : 20

Hypertension

-R3280이 기입된 날 -3년 ~ R3280이 기입된 전날을 사용

-16763명 중, 15299명이 진단코드: I10-15가 2번이상 기입됨(청구번호 중복 고려)



고혈압 : 91%

비고혈압 : 9%


고혈압 : Min 3 / Md 52 / Max 81

비고혈압 : Min 1 / Md 45 / Max 78

Secondary Hypertension

-R3280이 기입된 날 -3년 ~ R3280이 기입된 전날을 사용

-16763명 중 2621명




Secondary Hypertension : 16%

정상군 : 84%

Diabete

-R3280이 기입된 날 -3년 ~ R3280이 기입된 전날을 사용

-16763명 중 4541명



Diabet : 27%

정상군 : 73%


Diabet : min 3/ Md 52 / Max 81

정상군 : min 1 / Md 45 / Max 78

Cancer

-R3280이 기입된 날 -3년 ~ R3280이 기입된 전날을 사용

-16763명 중 871명



Cancer : 5%

정상군 : 95%


Cancer : min 5/ Md 52 / Max 81

정상군 : min 1 / Md 47 / Max 79

Meta Cancer

-R3280이 기입된 날 -3년 ~ R3280이 기입된 전날을 사용

-16763명 중 37명



Meta Cancer : 0.02%

정상군 : 99%

Meta C : min 13/ Md 52 / Max 63

정상군 : min 1 / Md 47 / Max 81

투석 여부

-2002 ~ R3280이 기입된 전날

-V001이 2번 이상 기입된 자 중, 그 날짜 차이가 90일 이상 나는 사람

-> 9901명

(청구번호 중복 고려)

-V003이 2번 이상 기입된 자 중, 그 날짜 차이가 90일 이상 나는 사람

-> 3921명

(청구번호 중복 고려)

투석 여부

16763

