1.

(1)



(A(B(E(H)(I))(F(J)))(C)(D(G)))

(2)
深度为3, 高度为4

```
TreeHeight(T):
    if T == NULL:
        return 0
    if T.children == NULL:
        return 1
    maxHeight = 0
    for i in T.children:
        h = TreeHeight(i)  // 递归计算每个孩子的高度
        maxHeight = max(maxHeight, h)  // 更新最大高度
    return maxHeight + 1  // 返回最大高度加一
```

(3)

```
        A
       /
      B
     / \
    E   C
   / \   \
  H   F   D
  \   /   /
   I J   G
```

```
ForestToBinaryTree(F): \\F = [T_1,T_2,...T_n], 输入是树时即为 [T_1]
    空二叉树根节点 T
    F_1 = [T_11,T_12,...T_1m] \\ T_1除去根节点后的森林
    F_2 = [T_2,...T_n] \\ F除去T_1后的森林
    T->leftchild = ForestToBinaryTree(F_1)
    T->rightchild = ForestToBinaryTree(F_2)
    返回 T
```

2.

(1) $n \in \left[\frac{K^{L-1}-1}{K-1}+1, \frac{k^{L}-1}{k-1}\right]$
(2) 假设完全K叉树根节点编号为 1 , 则编号为N的节点的父节点编号为 $\left\lfloor \frac{N-2}{K} \right\rfloor + 1$
(3) 编号为N的节点的第 i 个子节点编号为 $K(N-1)+i$ (假如该点编号没有达到总节点数)

3.

归纳证明union生成的高度为 L 的树的节点数是 $\Omega(2^L)$的
对于一个高度为 $k+1$ 的树T,生成该树的过程中存在一步,使得合并的两个树高度都为 k, 设为A,B.由归纳假设,有

$$n(T) \geq n(A)+n(B) \geq 2 \min n(A)+n(B) \geq c \cdot 2^{k+1} = \Omega(2^{k+1})$$

k = 1的情形显然,因此存在常数 c, 使得 $n(T) \geq c \cdot 2^{L}$
从而有

$$L \leq \log n(T) - \log c = O(\log N)$$