

Esercizio Statistics: 19/04/2019

Il diametro dei tubi prodotti da una ditta è distribuito normalmente con media $\mu = 26$ e varianza $\sigma^2 = 43.1649$ indichiamo con $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ la corrispondente variabile casuale.

Servendosi dell'operazione di standardizzazione rispondere ai seguenti quesiti


- 1- Si vuole determinare la probabilità che un tubo abbia diametro inferiore a 31.5845. Qual'è il valore standardizzato corrispondente a 31.5845?

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{43.1649} = 6.57$$

$$c = 31.5845$$

$$X \sim N(\mu, \sigma) \text{ allora } Z = \frac{c - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$Z = \frac{31.5845 - 26}{6.57} = \frac{5.5845}{6.57} = \underline{0.85}$$



	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

Calcolare $P(X \leq 31.5845)$ attraverso standardizzazione

$$X \sim N(\mu, \sigma) \text{ allora } Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

$$Z = 0.85$$

$$\begin{aligned} Pr(X \leq 31.5848) &= Pr(Z \leq 0.85) = \underline{0.80233746} \rightarrow R \\ &= 0.8023 \rightarrow \text{Tabella: riga 0.8 colonna 0.05} \end{aligned}$$

3- Calcolare $P(X \geq 44.7245)$ attraverso standardizzazione e usando le tavole

$$X \sim N(\mu, \sigma) \text{ allora } Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

$$Z = \frac{44.7245 - 26}{6.57} = \frac{18.7245}{6.57} = 2.85$$

$$\begin{aligned} Pr(X \geq 44.7245) &= Pr(Z \geq 2.85) = 1 - Pr(Z \leq 2.85) \\ &= 1 - 0.9978 = \underline{0.0022} \\ &= 0.0021859615 \rightarrow R \end{aligned}$$

Tabella:
riga 2.8
colonna 0.05