



Universidad
Nacional
de Córdoba



Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

Técnicas de simulación y discretización para la valoración de opciones barrera

por

Gonzalo A. Bordón

Presentado ante la **FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA,
FÍSICA Y COMPUTACIÓN** como parte de los requerimientos para la ob-
tención del grado de Licenciatura en Ciencias de la Computación de la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Febrero, 2026

Directores: Dra. Noemí Patricia Kisbye



Generación y diseño de herramientas para el análisis de retornos de carteras de
inversión artificiales y reales © 2025 by Diego Nicolas Gimenez Irusta is
licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Certifico que el trabajo incluido en este documento es el resultado de tareas de investigación originales y que no ha sido presentado para optar a un título en ninguna otra Universidad o Institución.

Gonzalo A. Bordón

Agradecimientos

Completar: COMPLETAR

Resumen

Esta tesis presenta métodos para la valoración y discretización de opciones barrera, derivados financieros cuyo pago depende de si el precio del activo subyacente cruza un nivel de barrera predeterminado durante la vida de la opción. Las opciones barrera son ampliamente utilizadas en los mercados financieros para la gestión de riesgos y estrategias de inversión debido a su menor costo en comparación con las opciones estándar.

Los objetivos principales de este trabajo son analizar e implementar métodos para la valoración de opciones barrera, con énfasis particular en las técnicas de discretización que capturan con precisión la condición de barrera. La metodología incluye: (1) el modelo continuo de Black-Scholes, que asume un comportamiento lognormal del precio del activo, permitiendo fórmulas cerradas para opciones barrera europeas y sentando las bases para simulaciones de Monte Carlo en el caso americano; (2) modelos discretos como el binomial y trinomial que analizan el conjunto completo de trayectorias posibles, abordando el problema de la subestimación o sobreestimación cuando la barrera no coincide con los nodos del árbol mediante estrategias con mallas adaptativas; y (3) la replicación estática, una técnica para cubrir opciones barrera mediante la construcción de un portafolio de opciones vanillas que reproduzca el mismo payoff bajo ciertas condiciones. Nos enfocamos tanto en opciones barrera de estilo europeo como americano.

Los resultados demuestran la efectividad de los esquemas de discretización propuestos para lograr valoraciones precisas manteniendo la eficiencia computacional. Comparamos el rendimiento de diferentes enfoques numéricos y analizamos sus propiedades de convergencia. El trabajo contribuye a la comprensión de métodos numéricos para la valoración de opciones exóticas y proporciona herramientas prácticas para la evaluación de riesgos financieros.

Palabras clave: opciones barrera, valoración de opciones, modelo de Black-Scholes, árboles binomiales y trinomiales, replicación estática, mallas adaptativas, derivados financieros.

Abstract

This thesis presents methods for the valuation and discretization of barrier options, financial derivatives whose payoff depends on whether the underlying asset price crosses a predetermined barrier level during the option's lifetime. Barrier options are widely used in financial markets for risk management and investment strategies due to their lower cost compared to standard options.

The main objectives of this work are to analyze and implement methods for pricing barrier options, with particular emphasis on discretization techniques that accurately capture the barrier condition. The methodology includes: (1) the continuous Black-Scholes model, which assumes a lognormal behavior of the asset price, allowing closed-form formulas for European barrier options and providing the foundation for Monte Carlo simulations in the American case; (2) discrete models such as binomial and trinomial trees that analyze the complete set of possible trajectories, addressing the problem of underestimation or overestimation when the barrier does not align with tree nodes through strategies using adaptive meshes; and (3) static replication, a technique for hedging barrier options by constructing a portfolio of vanilla options that reproduces the same payoff under certain conditions. We focus on both European and American-style barrier options.

The results demonstrate the effectiveness of the proposed discretization schemes in achieving accurate valuations while maintaining computational efficiency. We compare the performance of different numerical approaches and analyze their convergence properties. The work contributes to the understanding of numerical methods for exotic options pricing and provides practical tools for financial risk assessment.

Keywords: barrier options, option pricing, Black-Scholes model, binomial and trinomial trees, static replication, adaptive meshes, financial derivatives.

Índice general

Agradecimientos	I
Resumen	III
Abstract	IV
Glosario	V
Índice de figuras	XI
Índice de código	XIV
1. Introducción	2
1.1. Motivación	2
1.2. El Problema de Valoración	3
1.2.1. Fórmulas Analíticas y sus Limitaciones	3
1.2.2. Desafíos Computacionales	3
1.3. Objetivos del Trabajo	3
1.3.1. Objetivo General	3
1.3.2. Objetivos Específicos	4
1.4. Contribuciones del Trabajo	4
1.5. Organización del Trabajo	5
2. Marco Teórico	6
2.1. Mercados de Derivados	6
2.1.1. Características de los Mercados de Derivados	6
2.1.2. Tipos de Derivados	6
2.2. Opciones Financieras	7
2.2.1. Opciones Call y Put	7
2.2.2. Opciones Europeas vs Americanas	7
2.2.3. Opciones Exóticas	7
2.3. Opciones Barrera	8
2.3.1. Clasificación de Opciones Barrera	8
2.3.2. Payoffs de Opciones Barrera	8
2.3.3. Relaciones de Paridad	9
2.3.4. Rebates	9
2.3.5. Ventajas de las Opciones Barrera	9
2.4. El Modelo de Black-Scholes	9
2.4.1. Supuestos del Modelo	10

2.4.2.	Ecuación Diferencial de Black-Scholes	10
2.4.3.	Medida Neutral al Riesgo	10
2.4.4.	Fórmula de Black-Scholes para Opciones Vanilla	11
2.4.5.	Las Griegas	11
2.4.6.	Limitaciones del Modelo	12
2.5.	Extensiones del Modelo Black-Scholes	12
3.	Métodos de Valoración	13
3.1.	Método 1: Fórmulas Analíticas de Reiner y Rubinstein	13
3.1.1.	Marco Metodológico de Valoración	13
3.1.2.	Términos de Valoración	15
3.1.3.	Interpretación de los Términos de Valoración	15
3.1.4.	Fórmulas Exactas: Construcción mediante Términos de Valoración	17
3.2.	Método 2: Modelo de Malla Adaptativa (AMM)	18
3.2.1.	Fundamentos: Árboles Trinomiales	18
3.2.2.	Análisis de Errores en Modelos de Redes	20
3.2.3.	Principio del Modelo de Malla Adaptativa	21
3.2.4.	AMM para Opciones Vanilla	23
3.2.5.	AMM para Opciones Barrera	25
3.2.6.	AMM para el Cálculo de Griegas	28
3.2.7.	Ventajas del AMM	31
3.2.8.	Consistencia Matemática	32
3.3.	Método 3: Replicación Estática	32
3.3.1.	Concepto de Replicación Estática	32
3.3.2.	Metodología de Derman-Ergener-Kani	33
3.3.3.	Construcción del Portafolio	35
3.4.	Método 4: Monte Carlo para Opciones Americanas	36
3.4.1.	Desafío de las Opciones Americanas	36
3.4.2.	Simulación de Monte Carlo	36
3.4.3.	Método de Longstaff-Schwartz (LSM)	36
4.	Implementación - Fórmulas de Reiner y Rubinstein	37
4.1.	Descripción de la Implementación	37
4.1.1.	Cálculo de Variables Auxiliares	37
4.1.2.	Cálculo de Términos de Valoración	37
4.1.3.	Construcción de Fórmulas para Cada Tipo	37
4.2.	Detalles de Implementación	37
4.2.1.	Código Relevante	37
4.3.	Cálculo de Griegas	37
4.4.	Validación	37
4.4.1.	Verificación de Relaciones de Paridad	37
4.4.2.	Verificación de Límites Asintóticos	37
4.4.3.	Ejemplos Numéricos	37
5.	Implementación - Árboles Trinomiales con Mallas Adaptativas	38
5.1.	Descripción del Algoritmo	38
5.1.1.	Construcción del Árbol Trinomial	38
5.1.2.	Adaptación de la Malla	38
5.1.3.	Valoración Backward	38

5.2.	Detalles de Implementación	38
5.2.1.	Estructura de Datos	38
5.2.2.	Código Relevante	38
5.3.	Validación	38
5.3.1.	Comparación con Rubinstein-Reiner	38
5.3.2.	Análisis de Convergencia	38
5.3.3.	Ejemplos Numéricos	38
6.	Implementación - Replicación Estática y Monte Carlo	39
6.1.	Replicación Estática	39
6.1.1.	Descripción del Algoritmo	39
6.1.2.	Detalles de Implementación	40
6.1.3.	Validación del Portafolio Replicante	40
6.2.	Monte Carlo para Opciones Americanas	42
6.2.1.	Descripción del Algoritmo	42
6.2.2.	Detalles de Implementación	42
6.2.3.	Validación de Monte Carlo	42
6.2.4.	Técnicas de Reducción de Varianza	42
7.	Resultados y Comparación	43
7.1.	Diseño de Experimentos	44
7.1.1.	Casos de Prueba para Opciones Europeas	44
7.1.2.	Casos de Prueba para Opciones Americanas	44
7.1.3.	Métricas de Evaluación	44
7.2.	Resultados para Opciones Europeas	44
7.2.1.	Tablas Comparativas	44
7.2.2.	Análisis de Precisión	44
7.2.3.	Análisis de Tiempo Computacional	44
7.2.4.	Comportamiento Cerca de la Barrera	44
7.2.5.	Gráficos Comparativos	44
7.3.	Resultados para Opciones Americanas	44
7.3.1.	Tablas de Resultados	44
7.3.2.	Análisis de Convergencia	44
7.3.3.	Comparación con Europeas	44
7.4.	Comparación Global de Métodos	44
7.4.1.	Tabla Resumen	44
7.4.2.	Análisis de Casos de Uso Óptimos	44
7.4.3.	Recomendaciones Prácticas	44
7.5.	Discusión	44
7.5.1.	Ventajas y Desventajas Observadas	44
7.5.2.	Limitaciones del Estudio	44
8.	Conclusiones y Trabajo Futuro	45
8.1.	Resumen de Resultados	45
8.2.	Conclusiones Principales	45
8.2.1.	Sobre los Métodos para Opciones Europeas	45
8.2.2.	Sobre Monte Carlo para Opciones Americanas	45
8.2.3.	Comparación Global	45
8.3.	Limitaciones del Trabajo	45
8.4.	Trabajo Futuro	45

ÍNDICE GENERAL

8.4.1. Extensiones del Modelo	45
8.4.2. Extensiones de los Métodos	45
8.4.3. Aplicaciones Prácticas	45
8.4.4. Validación con Datos Reales	45
Bibliografía	47

Índice de figuras

3.1.	Estructura de un árbol trinomial con 3 pasos temporales. Desde cada nodo, el precio puede moverse hacia arriba (multiplicado por $u = 1,15$, verde), mantenerse (multiplicado por $m = 1$, azul), o bajar (multiplicado por $d = 1/u \approx 0,870$, rojo). Las probabilidades neutrales al riesgo son $p_u = 0,25$, $p_m = 0,50$, $p_d = 0,25$. El árbol es recombinante: los nodos que alcanzan el mismo precio se fusionan.	20
3.2.	Detalle del efecto par-impar en el modelo binomial. Los puntos azules (N par) sistemáticamente tienen mayor error que los puntos rojos (N impar). Las líneas punteadas muestran las tendencias separadas para cada caso. Esta oscilación es causada por el error de no linealidad y es eliminada por el AMM.	21
3.3.	Concepto del Modelo de Malla Adaptativa (AMM). Se muestra un árbol trinomial base (nodos grises, conexiones grises) que constituye la malla gruesa con pasos de precio h y tiempo k . Sobre este árbol se injerta una malla fina (cuadrados verdes pequeños) con pasos $h/2$ y $k/4$ únicamente en la región crítica (rectángulo amarillo). Esta estrategia concentra la resolución computacional donde más se necesita, logrando alta precisión con costo mínimo adicional ($< 1\%$).	22
3.4.	Estructura del AMM para opciones vanilla. Se muestra un árbol trinomial (nodos grises con conexiones grises) que constituye la malla gruesa. Sobre este árbol se injerta una malla fina (cuadrados verdes pequeños) con pasos $h/2$ y $k/4$ únicamente en la región crítica (rectángulo amarillo): temporal $[T-k, T]$ y espacial $[K-2h, K+2h]$. La línea azul punteada marca el strike K donde ocurre la mayor no linealidad al vencimiento. Esta estrategia concentra la resolución donde más se necesita: alrededor del precio de ejercicio al vencimiento.	24
3.5.	Estructura del AMM para opciones barrera. Mostrar el árbol completo con una banda vertical de malla fina a lo largo de toda la dimensión temporal, centrada en la barrera H . La barrera debe aparecer como una línea horizontal clara. Indicar la región $[H-2h, H+2h]$ con sombreado o color. Mostrar S_0 cerca de H para ilustrar el problema del límite. Incluir flechas mostrando el flujo de información de malla gruesa a malla fina.	27

3.6. Ramificación cuadrinomial para el cálculo de griegas mediante diferencias finitas. Se muestra un árbol trinomial base (nodos grises, conexiones negras gruesas) con nodos adicionales en $t = 0$ ubicados en $S_0 + \varepsilon$ (verde) y $S_0 - \varepsilon$ (rojo), donde $\varepsilon = h/4$ es una perturbación pequeña. Las líneas sólidas grises representan ramificación cuadrinomial (4 ramas) desde los nodos perturbados y los nodos extremos en $t = k/4$, permitiendo calcular simultáneamente Delta y Gamma con alta precisión.	29
3.7. Precisión en el cálculo de Delta mediante ramificación cuadrinomial. Se compara el RMSE en Delta para diferentes configuraciones AMM $(0, T)$, donde 0 es el inicio de la opción y T es el final de la misma. La ramificación cuadrinomial permite calcular Delta mediante diferencias finitas. AMM (3,3) logra una mejora de 60x vs Trinomial en $N=100$, con un incremento de tiempo $< 3\%$. Notablemente, AMM (1,0) mejora Delta sin costo adicional al refinar solo la región crítica.	30
3.8. Precisión en el cálculo de Gamma mediante ramificación cuadrinomial. Se compara el RMSE en Gamma para diferentes configuraciones AMM. La ramificación cuadrinomial permite calcular Gamma mediante diferencias finitas de segundo orden. AMM (1,1) logra una mejora de 7.2x vs Trinomial en $N=100$. A diferencia de Delta, Gamma no mejora significativamente con niveles superiores a (2,2), lo que sugiere que AMM (1,1) es óptimo para este cálculo. El incremento en tiempo es $< 3\%$	31

Índice de códigos

ÍNDICE DE CÓDIGOS

Capítulo 1

Introducción

Las opciones barrera son instrumentos derivados ampliamente utilizados en los mercados financieros modernos. Su popularidad se debe principalmente a dos factores: son significativamente más baratas que las opciones vanilla equivalentes, y permiten a los inversores y empresas cubrir riesgos específicos de manera más eficiente.

A diferencia de las opciones europeas estándar, cuyo valor depende únicamente del precio del activo subyacente al vencimiento, las opciones barrera tienen una característica adicional: su existencia depende de si el precio del activo cruza o no un nivel predeterminado (la barrera) durante la vida del contrato. Esta dependencia de la trayectoria completa del precio, y no solo de su valor final, introduce complejidades significativas en su valoración.

1.1. Motivación

Las opciones barrera se utilizan en diversos contextos financieros:

- **Gestión de riesgos corporativos:** Una empresa exportadora puede usar una opción barrera para protegerse contra movimientos adversos del tipo de cambio, pero solo si estos superan un umbral crítico para su operación.
- **Productos estructurados:** Los bancos de inversión incorporan opciones barrera en productos estructurados para ofrecer perfiles de riesgo-retorno específicos a menor costo.
- **Especulación dirigida:** Los traders pueden expresar visiones de mercado sofisticadas (por ejemplo, 'el activo subirá pero no superará cierto nivel') con menor capital que usando opciones vanilla.
- **Optimización de costos:** Las opciones barrera permiten obtener cobertura a un costo significativamente menor que las opciones estándar, lo que las hace atractivas para empresas con presupuestos limitados.

1.2. El Problema de Valoración

1.2.1. Fórmulas Analíticas y sus Limitaciones

Bajo el modelo de Black-Scholes con monitoreo continuo de la barrera, existen fórmulas cerradas para valorar opciones barrera europeas, desarrolladas por Reiner y Rubinstein (1991). Estas fórmulas son matemáticamente elegantes y computacionalmente eficientes.

Sin embargo, presentan limitaciones importantes en la práctica:

1. **Monitoreo discreto vs continuo:** En la realidad, las barreras se monitorean en momentos discretos (diariamente, o incluso solo al cierre del mercado), no continuamente. Esto puede generar diferencias significativas en el precio, especialmente para barreras cercanas al precio actual del activo.
2. **Volatilidad constante:** El supuesto de volatilidad constante es particularmente problemático para opciones de largo plazo o en mercados con alta variabilidad de la volatilidad.
3. **Salto en el precio:** El modelo no considera saltos discontinuos en el precio del subyacente, que pueden hacer que el precio 'salte' sobre la barrera sin tocarla, afectando significativamente la valoración.
4. **Barreras complejas:** Para barreras dependientes del tiempo, barreras dobles, o barreras parciales (monitoreadas solo en ciertos períodos), no existen fórmulas cerradas.

1.2.2. Desafíos Computacionales

Los métodos numéricos para valorar opciones barrera enfrentan desafíos específicos:

- **Sensibilidad cerca de la barrera:** El valor de la opción y sus derivadas (las 'griegas') cambian drásticamente cuando el precio del subyacente se aproxima a la barrera. Esto requiere una resolución muy fina en esa región.
- **Discontinuidades:** En el momento en que se toca la barrera, el valor de una opción knock-out cae abruptamente a cero (o al valor del rebate). Esta discontinuidad es difícil de capturar numéricamente.
- **Trade-off precisión-velocidad:** Métodos muy precisos pueden ser computacionalmente costosos, mientras que métodos rápidos pueden carecer de la precisión necesaria, especialmente para el cálculo de sensibilidades.

1.3. Objetivos del Trabajo

1.3.1. Objetivo General

Comparar sistemáticamente diferentes métodos numéricos para la valoración de opciones barrera europeas, evaluando su precisión, eficiencia computacional, y aplicabilidad en diferentes escenarios.

1.3.2. Objetivos Específicos

1. **Estudiar el modelo de Black-Scholes:** Analizar las fórmulas cerradas de Reiner y Rubinstein para opciones barrera europeas, comprendiendo su derivación y limitaciones.
2. **Implementar métodos numéricos:** Desarrollar implementaciones de:
 - Mallas adaptativas (Adaptive Mesh Model de Figlewski-Gao)
 - Simulación de Monte Carlo con técnicas de reducción de varianza
3. **Validar las implementaciones:** Comparar los resultados numéricos con las fórmulas analíticas de Reiner-Rubinstein en casos donde estas son aplicables.
4. **Analizar el desempeño:** Evaluar cada método en términos de:
 - Precisión absoluta y relativa
 - Tiempo de cómputo
 - Estabilidad numérica
 - Capacidad para calcular sensibilidades (griegas)
5. **Identificar casos de uso óptimos:** Determinar qué método es más apropiado según:
 - Tipo de opción barrera (knock-in, knock-out, up, down)
 - Posición relativa del precio actual respecto a la barrera
 - Tiempo al vencimiento
 - Volatilidad del subyacente
 - Requerimientos de precisión
6. **Proporcionar recomendaciones prácticas:** Ofrecer guías para la selección del método más apropiado en diferentes contextos de aplicación.

1.4. Contribuciones del Trabajo

Este trabajo contribuye a la literatura y práctica de valoración de opciones barrera en los siguientes aspectos:

1. **Comparación sistemática:** Proporciona una comparación rigurosa y sistemática de múltiples métodos numéricos bajo un marco común de evaluación.
2. **Implementaciones validadas:** Ofrece implementaciones cuidadosamente validadas de métodos avanzados como mallas adaptativas, que pueden servir como referencia para futuros trabajos.
3. **Guías prácticas:** Proporciona recomendaciones concretas sobre qué método usar en diferentes situaciones, útiles tanto para académicos como para profesionales.
4. **Análisis de sensibilidad:** Estudia cómo el desempeño de cada método varía con los parámetros del problema, identificando regiones donde ciertos métodos son superiores.

1.5. Organización del Trabajo

Los capítulos de este trabajo se organizan de la siguiente manera:

En el Capítulo 2 se presentan los fundamentos financieros necesarios para comprender la valoración de opciones. Se introducen los mercados de derivados, los diferentes tipos de opciones (europeas, americanas, exóticas), y en particular las opciones barrera. Se desarrolla el modelo de Black-Scholes estableciendo el marco teórico fundamental.

El Capítulo 3 describe los cuatro métodos de valoración que serán implementados y comparados: las fórmulas analíticas de Reiner y Rubinstein, árboles trinomiales con mallas adaptativas, replicación estática mediante portafolios, y simulación de Monte Carlo con el método de Longstaff-Schwartz para opciones americanas. Para cada método se explican sus principios básicos, ventajas y desventajas.

Los Capítulos 4, 5 y 6 documentan la implementación de cada uno de los métodos. Se detallan los algoritmos, criterios de refinamiento, técnicas de reducción de varianza, y detalles de implementación. Se presentan resultados de validación comparando con fórmulas analíticas cuando es posible.

En el Capítulo 7 se presenta una comparación sistemática de todos los métodos implementados. Se diseñan experimentos numéricos con diferentes parámetros (precio del subyacente, strike, barrera, volatilidad, tiempo al vencimiento) y se analizan los resultados en términos de precisión, tiempo de cómputo, y estabilidad. Se identifican los casos de uso óptimos para cada método.

Finalmente, las conclusiones generales son presentadas en el Capítulo 8, donde se resumen los resultados principales del trabajo, se presentan las conclusiones sobre qué método es más apropiado en diferentes situaciones, se discuten las limitaciones del estudio, y se proponen direcciones para trabajo futuro.

Capítulo 2

Marco Teórico

Este capítulo presenta los fundamentos teóricos necesarios para comprender la valoración de opciones barrera. Se introducen los conceptos básicos de mercados de derivados, los diferentes tipos de opciones, y el modelo de Black-Scholes que constituye la base teórica para los métodos de valoración que se desarrollarán en capítulos posteriores.

2.1. Mercados de Derivados

Los derivados financieros son instrumentos cuyo valor depende (se deriva) del valor de otro activo, llamado activo subyacente. Los subyacentes más comunes incluyen acciones, índices bursátiles, divisas, tasas de interés, y commodities.

2.1.1. Características de los Mercados de Derivados

Los mercados de derivados cumplen varias funciones económicas importantes:

- **Gestión de riesgos:** Permiten a empresas e inversores transferir riesgos no deseados a otros participantes dispuestos a asumirlos.
- **Descubrimiento de precios:** Los precios de los derivados reflejan las expectativas del mercado sobre el comportamiento futuro de los activos subyacentes.
- **Apalancamiento:** Permiten tomar posiciones significativas con una inversión inicial relativamente pequeña.
- **Eficiencia de mercado:** Facilitan el arbitraje, contribuyendo a la eficiencia en la formación de precios.

2.1.2. Tipos de Derivados

Los principales tipos de derivados son:

- **Forwards:** Contratos a medida entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio acordado hoy.

- **Futuros:** Similares a los forwards pero estandarizados y negociados en bolsas organizadas.
- **Swaps:** Acuerdos para intercambiar flujos de efectivo futuros según reglas predeterminadas.
- **Opciones:** Contratos que otorgan el derecho (pero no la obligación) de comprar o vender un activo a un precio determinado.

2.2. Opciones Financieras

Una opción es un contrato que otorga a su tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar (opción call) o vender (opción put) un activo subyacente a un precio predeterminado (precio de ejercicio o strike) en o antes de una fecha específica (fecha de vencimiento).

2.2.1. Opciones Call y Put

Opción Call: Otorga el derecho de comprar el activo subyacente al precio de ejercicio K . El payoff al vencimiento es:

$$\text{Payoff}_{\text{Call}} = \max(S_T - K, 0) \quad (2.1)$$

donde S_T es el precio del subyacente al vencimiento.

Opción Put: Otorga el derecho de vender el activo subyacente al precio de ejercicio K . El payoff al vencimiento es:

$$\text{Payoff}_{\text{Put}} = \max(K - S_T, 0) \quad (2.2)$$

2.2.2. Opciones Europeas vs Americanas

Opciones Europeas: Solo pueden ejercerse en la fecha de vencimiento. Son más simples de valorar analíticamente.

Opciones Americanas: Pueden ejercerse en cualquier momento hasta el vencimiento. Esta flexibilidad adicional las hace más valiosas que sus contrapartes europeas, pero también más difíciles de valorar.

2.2.3. Opciones Exóticas

Las opciones exóticas son aquellas cuyas características difieren de las opciones vanilla (europeas o americanas estándar). Incluyen:

- **Opciones Barrera:** Su existencia depende de si el precio del subyacente cruza un nivel predeterminado.
- **Opciones Asiáticas:** Su payoff depende del precio promedio del subyacente durante cierto período.
- **Opciones Lookback:** Permiten al tenedor 'mirar hacia atrás' y ejercer al precio más favorable observado.
- **Opciones Digitales:** Pagan una cantidad fija si se cumple cierta condición.

2.3. Opciones Barrera

Las opciones barrera son el foco principal de este trabajo. Su característica distintiva es que su existencia depende de si el precio del activo subyacente alcanza o no un nivel de precio predeterminado (la barrera H) durante la vida de la opción.

2.3.1. Clasificación de Opciones Barrera

Las opciones barrera se clasifican según dos criterios:

1. Según el efecto de tocar la barrera:

- **Knock-In:** La opción comienza a existir (se activa) solo si se toca la barrera.
- **Knock-Out:** La opción deja de existir (se extingue) si se toca la barrera.

2. Según la posición de la barrera:

- **Up:** La barrera H está por encima del precio inicial del subyacente ($H > S_0$).
- **Down:** La barrera H está por debajo del precio inicial del subyacente ($H < S_0$).

Combinando estos criterios obtenemos ocho tipos básicos de opciones barrera:

- Down-and-In Call (DIC)
- Down-and-Out Call (DOC)
- Up-and-In Call (UIC)
- Up-and-Out Call (UOC)
- Down-and-In Put (DIP)
- Down-and-Out Put (DOP)
- Up-and-In Put (UIP)
- Up-and-Out Put (UOP)

2.3.2. Payoffs de Opciones Barrera

El payoff de una opción barrera depende tanto del precio final del subyacente como de si la barrera fue tocada durante la vida de la opción.

Para una **Down-and-Out Call**:

$$\text{Payoff}_{\text{DOC}} = \max(S_T - K, 0) \cdot \mathbb{I}_{\{\min_{0 \leq t \leq T} S_t > H\}} \quad (2.3)$$

Para una **Down-and-In Call**:

$$\text{Payoff}_{\text{DIC}} = \max(S_T - K, 0) \cdot \mathbb{I}_{\{\min_{0 \leq t \leq T} S_t \leq H\}} \quad (2.4)$$

donde $\mathbb{I}_A$ es la función indicadora que vale 1 si se cumple la condición A y 0 en caso contrario.

2.3.3. Relaciones de Paridad

Existe una relación fundamental entre opciones knock-in y knock-out del mismo tipo:

$$\text{Opción Vanilla} = \text{Opción Knock-In} + \text{Opción Knock-Out} \quad (2.5)$$

Por ejemplo:

$$C_{\text{europea}} = C_{\text{DI}} + C_{\text{DO}} \quad (2.6)$$

Esta relación es útil para validar implementaciones y para valorar opciones knock-in a partir de opciones knock-out (o viceversa).

2.3.4. Rebates

Muchas opciones barrera incluyen un **rebate** (reembolso) R , que es una cantidad fija pagada al tenedor en ciertas circunstancias:

- En opciones **knock-out**: El rebate se paga cuando se toca la barrera (momento en que la opción se extingue).
- En opciones **knock-in**: El rebate se paga al vencimiento si la barrera nunca fue tocada (y por tanto la opción nunca se activó).

2.3.5. Ventajas de las Opciones Barrera

Las opciones barrera son significativamente más baratas que las opciones vanilla equivalentes porque:

- Las opciones knock-out pueden extinguirse antes del vencimiento, reduciendo el riesgo para el vendedor.
- Las opciones knock-in solo comienzan a existir bajo ciertas condiciones, también reduciendo el riesgo.

Esta reducción de costo las hace atractivas para:

- Empresas que buscan cobertura a menor costo
- Inversores con visiones específicas sobre el comportamiento del mercado
- Estructuración de productos financieros complejos

2.4. El Modelo de Black-Scholes

El modelo de Black-Scholes, desarrollado por Fischer Black, Myron Scholes y Robert Merton en 1973, revolucionó la valoración de opciones y sentó las bases de la ingeniería financiera moderna.

2.4.1. Supuestos del Modelo

El modelo se basa en los siguientes supuestos:

1. El precio del activo subyacente S_t sigue un Movimiento Browniano Geométrico:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t \quad (2.7)$$

donde μ es la tasa de retorno esperada, σ es la volatilidad, y W_t es un proceso de Wiener.

2. Los mercados son completos y no hay fricciones:
 - No hay costos de transacción
 - Es posible tomar posiciones cortas sin restricciones
 - Los activos son perfectamente divisibles
 - No hay oportunidades de arbitraje
3. La tasa de interés libre de riesgo r es constante y conocida.
4. La volatilidad σ es constante y conocida.
5. El activo subyacente no paga dividendos (o se puede extender para incluir una tasa de dividendos constante δ).
6. Las transacciones ocurren de manera continua en el tiempo.

2.4.2. Ecuación Diferencial de Black-Scholes

Bajo estos supuestos, el precio de cualquier derivado $V(S, t)$ que depende del precio del subyacente S y del tiempo t debe satisfacer la ecuación diferencial parcial:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0 \quad (2.8)$$

Esta ecuación se resuelve sujeta a condiciones de borde apropiadas que dependen del tipo específico de derivado.

2.4.3. Medida Neutral al Riesgo

Un concepto fundamental del modelo es la **medida neutral al riesgo**. Bajo esta medida de probabilidad:

- El precio descontado de cualquier activo es una martingala
- El retorno esperado de todos los activos es la tasa libre de riesgo r
- El precio de un derivado es el valor esperado descontado de su payoff

Bajo la medida neutral al riesgo, el proceso del precio del subyacente se convierte en:

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}} \quad (2.9)$$

donde $W_t^{\mathbb{Q}}$ es un proceso de Wiener bajo la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$.

2.4.4. Fórmula de Black-Scholes para Opciones Vanilla

Para una opción call europea con precio de ejercicio K y vencimiento T , la fórmula de Black-Scholes es:

$$C(S, t) = SN(d_1) - Ke^{-r(T-t)}N(d_2) \quad (2.10)$$

donde:

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)(T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}} \quad (2.11)$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T - t} \quad (2.12)$$

y $N(\cdot)$ es la función de distribución acumulada de la normal estándar.

Para una opción put europea:

$$P(S, t) = Ke^{-r(T-t)}N(-d_2) - SN(-d_1) \quad (2.13)$$

2.4.5. Las Griegas

Las **griegas** son las derivadas parciales del precio de la opción respecto a sus parámetros. Son fundamentales para la gestión de riesgos:

- **Delta** (Δ): Sensibilidad al precio del subyacente

$$\Delta = \frac{\partial V}{\partial S} \quad (2.14)$$

- **Gamma** (Γ): Tasa de cambio del delta

$$\Gamma = \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \quad (2.15)$$

- **Vega** ($\mathcal{V}$): Sensibilidad a la volatilidad

$$\mathcal{V} = \frac{\partial V}{\partial \sigma} \quad (2.16)$$

- **Theta** (Θ): Sensibilidad al paso del tiempo

$$\Theta = \frac{\partial V}{\partial t} \quad (2.17)$$

- **Rho** (ρ): Sensibilidad a la tasa de interés

$$\rho = \frac{\partial V}{\partial r} \quad (2.18)$$

2.4.6. Limitaciones del Modelo

A pesar de su elegancia matemática y utilidad práctica, el modelo de Black-Scholes tiene limitaciones importantes:

- **Volatilidad constante:** En la realidad, la volatilidad varía con el tiempo y con el nivel del precio del subyacente (volatility smile/skew).
- **Distribución lognormal:** Los retornos reales exhiben colas más pesadas que la distribución normal (fat tails).
- **Salto:** El modelo no captura movimientos discontinuos en el precio del subyacente.
- **Fricciones de mercado:** En la práctica existen costos de transacción, restricciones a las ventas en corto, y activos no perfectamente divisibles.
- **Tasa de interés constante:** Las tasas de interés varían en el tiempo, especialmente para opciones de largo plazo.

A pesar de estas limitaciones, el modelo de Black-Scholes sigue siendo la base conceptual para la valoración de opciones y proporciona un marco de referencia contra el cual se comparan otros modelos más sofisticados.

2.5. Extensiones del Modelo Black-Scholes

Para opciones barrera, el modelo de Black-Scholes se extiende incorporando condiciones de borde adicionales que reflejan el comportamiento en la barrera. Estas extensiones permiten obtener fórmulas cerradas para ciertos tipos de opciones barrera europeas, como se verá en el siguiente capítulo.

Otras extensiones importantes del modelo incluyen:

- Modelos de volatilidad estocástica (Heston, SABR)
- Modelos con saltos (Merton, Kou)
- Modelos de volatilidad local (Dupire)
- Modelos de tasas de interés estocásticas

Sin embargo, estas extensiones quedan fuera del alcance de este trabajo, que se enfoca en métodos de valoración bajo el modelo de Black-Scholes clásico.

Capítulo 3

Métodos de Valoración

En este capítulo se presentan los cuatro métodos de valoración que serán implementados y comparados en este trabajo. Para opciones barrera europeas se analizan tres métodos: fórmulas analíticas de Reiner y Rubinstein, árboles trinomiales con mallas adaptativas, y replicación estática mediante portafolios de opciones vanilla. Para opciones barrera americanas se utiliza simulación de Monte Carlo con el método de Longstaff-Schwartz.

3.1. Método 1: Fórmulas Analíticas de Reiner y Rubinstein

El trabajo seminal de Reiner y Rubinstein Reiner and Rubinstein (1991) proporciona una metodología sistemática para obtener fórmulas cerradas para los ocho tipos básicos de opciones barrera europeas bajo el modelo de Black-Scholes.

3.1.1. Marco Metodológico de Valoración

Siguiendo la notación exacta de Reiner y Rubinstein Reiner and Rubinstein (1991), se definen:

Variables Críticas

- r : Tasa de interés (expresada como $1 + \text{tasa}$)
- d : Tasa de pago del activo (expresada como $1 + \text{tasa de pago}$)
- σ : Volatilidad del activo subyacente
- t : Tiempo hasta el vencimiento
- ϕ : Variable binaria (1 para calls, -1 para puts)
- η : Variable binaria (1 si el precio inicia por encima de la barrera, -1 si inicia por debajo)

Constantes:

- H : Nivel de la barrera preestablecido

3.1. MÉTODO 1: FÓRMULAS ANALÍTICAS DE REINER Y RUBINSTEIN

- K : Precio de ejercicio preestablecido
- R : Monto del rebato preestablecido

Funciones de Densidad de Probabilidad La valoración requiere tres densidades fundamentales:

- $f(u)$: Densidad normal del logaritmo natural del retorno del activo subyacente neutral al riesgo

$$f(u) = (1/\sigma\sqrt{2\pi t})e^{-1/2v^2}$$

Donde $v = (u - \mu t)/\sigma\sqrt{t}$ y $\mu = \log(r/d) - \frac{1}{2}\sigma^2$. Utilizada cuando consideramos que no se cruzó la barrera.

- $g(u)$: Densidad del retorno cuando el precio rompe la barrera pero termina en un nivel específico al vencimiento

$$g(u) = e^{2\eta\alpha\lambda\sigma^{-2}}(1/\sigma\sqrt{2\pi t})e^{-1/2v^2}$$

Donde $v = (u - 2\eta\alpha - \eta\mu t)/\sigma\sqrt{t}$ y $\alpha = \log(H/S)$. Utilizada cuando consideramos que se cruzó la barrera.

- $h(\tau)$: Densidad del tiempo de primer paso (first passage time), necesaria para las opciones 'Out' donde el reembolso se paga al momento de tocar la barrera

Variables auxiliares

- $x = [\log(S/K)/\sigma\sqrt{t}] + \lambda\sigma\sqrt{t}$
- $x_1 = [\log(S/H)/\sigma\sqrt{t}] + \lambda\sigma\sqrt{t}$
- $y = [\log(H^2/SK)/\sigma\sqrt{t}] + \lambda\sigma\sqrt{t}$
- $y_1 = [\log(H/S)/\sigma\sqrt{t}] + \lambda\sigma\sqrt{t}$
- $\lambda = 1 + (\mu/\sigma^2)$
- $z = [\log(H/S)/\sigma\sqrt{t}] + b\sigma\sqrt{t}$
donde $b = [\sqrt{\mu + 2(\log r)\sigma^2}]/\sigma^2$

3.1.2. Términos de Valoración

$$\begin{aligned} [1] &= r^{-t} \int \phi(Se^u - K)f(u)du \\ &= \phi S d^{-t} N(\phi x) - \phi K r^{-t} N(\phi x - \phi \sigma \sqrt{t}) \end{aligned} \quad (3.1)$$

$$\begin{aligned} [2] &= r^{-t} \int \phi(Se^u - K)f(u)du \\ &= \phi S d^{-t} N(\phi x_1) - \phi K r^{-t} N(\phi x_1 - \phi \sigma \sqrt{t}) \end{aligned} \quad (3.2)$$

$$\begin{aligned} [3] &= r^{-t} \int \phi(Se^u - K)g(u)du \\ &= \phi S d^{-t} (H/S)^{2\lambda} N(\eta y) - \phi K r^{-t} (H/S)^{2\lambda-2} N(\eta y - \eta \sigma \sqrt{t}) \end{aligned} \quad (3.3)$$

$$\begin{aligned} [4] &= r^{-t} \int \phi(Se^u - K)g(u)du \\ &= \phi S d^{-t} (H/S)^{2\lambda} N(\eta y_1) - \phi K r^{-t} (H/S)^{2\lambda-2} N(\eta y_1 - \eta \sigma \sqrt{t}) \end{aligned} \quad (3.4)$$

$$\begin{aligned} [5] &= R r^{-t} \int [f(u) - g(u)]du \\ &= R r^{-t} \left[N(\eta x_1 - \eta \sigma \sqrt{t}) - (H/S)^{2\lambda-2} N(\eta y_1 - \eta \sigma \sqrt{t}) \right] \end{aligned} \quad (3.5)$$

$$\begin{aligned} [6] &= R \int r^{-\tau} h(\tau) d\tau \\ &= R \left[(H/S)^{a+b} N(\eta z) + (H/S)^{a-b} N(\eta z - 2\eta b \sigma \sqrt{t}) \right] \end{aligned} \quad (3.6)$$

3.1.3. Interpretación de los Términos de Valoración

La comprensión de estos términos requiere analizar tanto las regiones de integración como las funciones de densidad utilizadas.

1. Regiones de Integración en el Espacio de Precios

En las fórmulas [1] a [5], la variable de integración es u , definida como el logaritmo natural del rendimiento del activo: $u = \ln(S_t/S)$.

- **Región de $\log(K/S)$ a $\phi\infty$:** Representa todos los precios finales del activo que terminan 'in the money' (por encima de K para un call o por debajo de K para un put). El término ϕ actúa como un interruptor: si es 1 (call), la región va hacia el infinito positivo; si es -1 (put), hacia el infinito negativo.
- **Región de $\log(H/S)$ a $\phi\infty$ (o $\eta\infty$):** Define los precios finales que terminan en el lado 'activo' de la barrera. Por ejemplo, en una opción down-and-in, esta región abarca los precios finales que están por encima de la barrera H , permitiendo distinguir entre los activos que terminaron 'a salvo' y los que no.

3.1. MÉTODO 1: FÓRMULAS ANALÍTICAS DE REINER Y RUBINSTEIN

2. Significado según la Función de Densidad

El significado de la región cambia drásticamente dependiendo de qué densidad se esté integrando:

- **Con $f(u)$ (Densidad Estándar):** La región representa simplemente dónde termina el precio al vencimiento, sin importar lo que pasó en el camino. Es la visión 'estilo Black-Scholes' clásica.
- **Con $g(u)$ (Densidad de Cruce):** Cuando integramos sobre una región usando $g(u)$, estamos capturando únicamente las trayectorias que cruzaron la barrera H en algún momento, pero que terminaron en la región especificada (K o H) al vencimiento. Esta densidad incorpora el principio de reflexión.
- **Con $[f(u) - g(u)]$ (Región de Reembolso):** En la fórmula [5], integrar sobre esta diferencia en la región de $\log(H/S)$ a $\eta\infty$ representa la probabilidad de que el activo termine en el lado correcto de la barrera sin haberla tocado nunca durante la vida de la opción.

3. Región Temporal (Término [6])

En la fórmula [6], la región de integración es temporal, no de precio:

- **De 0 a t :** Esta región abarca toda la vida del contrato, desde el momento inicial hasta el vencimiento. Significa que el modelo está sumando las probabilidades de que el activo toque la barrera en cualquier instante τ dentro de ese periodo. Esto es fundamental para las opciones de 'salida' (out-options), donde el pago (reembolso) ocurre en el momento exacto del impacto, el cual es aleatorio.

Resumen de los Términos

- **Término [1]:** Valor esperado descontado usando $f(u)$, integrando sobre precios finales por encima de K (calls) o por debajo de K (puts). Representa el valor de la opción vanilla sin considerar la barrera.
- **Término [2]:** Similar a [1], pero integrando sobre precios finales en el lado activo de la barrera H .
- **Término [3]:** Valor esperado descontado usando $g(u)$, considerando solo trayectorias que cruzaron la barrera y terminaron por encima de K (calls) o por debajo de K (puts).
- **Término [4]:** Similar a [3], pero integrando sobre precios finales en el lado activo de la barrera H .
- **Término [5]:** Valor presente del rebate R pagado al vencimiento si la barrera no fue tocada durante la vida de la opción. Usa la diferencia $[f(u) - g(u)]$ para capturar solo trayectorias que nunca cruzaron.
- **Término [6]:** Valor presente del rebate R pagado en el momento exacto (aleatorio) en que se toca la barrera. Integra sobre el tiempo de primer pasaje $\tau \in [0, t]$ usando la densidad $h(\tau)$.

La combinación apropiada de estos términos permite construir las fórmulas para los ocho tipos de opciones barrera (Down-and-Out/In, Up-and-Out/In, para Calls y Puts).

3.1.4. Fórmulas Exactas: Construcción mediante Términos de Valoración

Las fórmulas de Reiner y Rubinstein se construyen combinando los términos de valoración [1] a [6] según el tipo de opción, la posición relativa del precio inicial respecto a la barrera, y la relación entre el precio de ejercicio K y la barrera H .

Opciones de Entrada (In-options)

Estas opciones solo comienzan a existir (se activan o hacen 'knock-in') si el precio del activo toca la barrera H antes del vencimiento. Si no se toca la barrera, el tenedor recibe un reembolso R al vencimiento.

1. **Down-and-In Call** ($S > H$): El activo comienza por encima de la barrera. Se activa si el precio baja hasta tocar H .
 - Si $K > H$: [3] + [5] con $\eta = 1, \phi = 1$
 - Si $K < H$: [1] - [2] + [4] + [5] con $\eta = 1, \phi = 1$
2. **Up-and-In Call** ($S < H$): El activo comienza por debajo de la barrera. Se activa si el precio sube hasta tocar H .
 - Si $K > H$: [1] + [5] con $\eta = -1, \phi = 1$
 - Si $K < H$: [2] - [3] + [4] + [5] con $\eta = -1, \phi = 1$
3. **Down-and-In Put** ($S > H$): Comienza arriba de la barrera y se activa al bajar hasta H .
 - Si $K > H$: [2] - [3] + [4] + [5] con $\eta = 1, \phi = -1$
 - Si $K < H$: [1] + [5] con $\eta = 1, \phi = -1$
4. **Up-and-In Put** ($S < H$): Comienza abajo de la barrera y se activa al subir hasta H .
 - Si $K > H$: [1] - [2] + [4] + [5] con $\eta = -1, \phi = -1$
 - Si $K < H$: [3] + [5] con $\eta = -1, \phi = -1$

Opciones de Salida (Out-options)

Estas opciones dejan de existir (se extinguen o hacen 'knock-out') si el precio del activo toca la barrera H . Si se toca la barrera, el reembolso R se paga usualmente en ese mismo momento.

5. **Down-and-Out Call** ($S > H$): La opción es válida mientras el precio se mantenga por encima de H .
 - Si $K > H$: [1] - [3] + [6] con $\eta = 1, \phi = 1$
 - Si $K < H$: [2] - [4] + [6] con $\eta = 1, \phi = 1$
6. **Up-and-Out Call** ($S < H$): Se extingue si el precio sube hasta tocar H .
 - Si $K > H$: [6] con $\eta = -1, \phi = 1$.

Nota: Para que el precio termine arriba de K , necesariamente debe cruzar H primero, por lo que la opción solo vale por su reembolso.

3.2. MÉTODO 2: MODELO DE MALLA ADAPTATIVA (AMM)

- Si $K < H$: $[1] - [2] + [3] - [4] + [6]$ con $\eta = -1$, $\phi = 1$
- 7. **Down-and-Out Put** ($S > H$): Se extingue si el precio baja hasta tocar H .
 - Si $K > H$: $[1] - [2] + [3] - [4] + [6]$ con $\eta = 1$, $\phi = -1$
 - Si $K < H$: $[6]$ con $\eta = 1$, $\phi = -1$.
Nota: Si el precio baja de K , ya habrá cruzado H y la opción se habrá extinguido.
- 8. **Up-and-Out Put** ($S < H$): Se mantiene vigente mientras el precio esté debajo de H .
 - Si $K > H$: $[2] - [4] + [6]$ con $\eta = -1$, $\phi = -1$
 - Si $K < H$: $[1] - [3] + [6]$ con $\eta = -1$, $\phi = -1$

3.2. Método 2: Modelo de Malla Adaptativa (AMM)

El Modelo de Malla Adaptativa (Adaptive Mesh Model, AMM), desarrollado por Figlewski y Gao Figlewski and Gao (1999), representa un avance significativo en la valoración numérica de opciones. Este método permite aumentar la precisión en varios órdenes de magnitud sin incrementar sustancialmente el tiempo de ejecución, mediante el injerto de secciones de alta resolución sobre un árbol trinomial base en regiones críticas donde el valor de la opción es altamente no lineal.

3.2.1. Fundamentos: Árboles Trinomiales

El AMM se construye sobre la base de árboles trinomiales, que modelan la evolución del precio del activo subyacente en tiempo discreto.

Construcción del Árbol Trinomial

En cada nodo del árbol con precio S , el precio en el siguiente paso temporal puede ser:

- $S \cdot u$ con probabilidad p_u (movimiento hacia arriba)
- $S \cdot m$ con probabilidad p_m (movimiento medio, típicamente $m = 1$)
- $S \cdot d$ con probabilidad p_d (movimiento hacia abajo)

donde $u > 1 > d > 0$ son los factores de movimiento.

Los parámetros se calibran para aproximar el proceso continuo:

$$u = e^{\sigma\sqrt{3\Delta t}} \quad (3.7)$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{3\Delta t}} = \frac{1}{u} \quad (3.8)$$

$$m = 1 \quad (3.9)$$

Las probabilidades neutrales al riesgo son:

$$p_u = \frac{1}{6} + \frac{(r - \delta)\sqrt{\Delta t}}{6\sigma\sqrt{3}} \quad (3.10)$$

$$p_m = \frac{2}{3} \quad (3.11)$$

$$p_d = \frac{1}{6} - \frac{(r - \delta)\sqrt{\Delta t}}{6\sigma\sqrt{3}} \quad (3.12)$$

La valoración procede mediante inducción hacia atrás (backward induction), calculando en cada nodo:

$$V(S, t) = e^{-r\Delta t} [p_u V(Su, t + \Delta t) + p_m V(S, t + \Delta t) + p_d V(Sd, t + \Delta t)] \quad (3.13)$$




Figura 3.1: Estructura de un árbol trinomial con 3 pasos temporales. Desde cada nodo, el precio puede moverse hacia arriba (multiplicado por $u = 1,15$, verde), mantenerse (multiplicado por $m = 1$, azul), o bajar (multiplicado por $d = 1/u \approx 0,870$, rojo). Las probabilidades neutrales al riesgo son $p_u = 0,25$, $p_m = 0,50$, $p_d = 0,25$. El árbol es recombinante: los nodos que alcanzan el mismo precio se fusionan.

3.2.2. Análisis de Errores en Modelos de Redes

Figlewski y Gao identifican dos fuentes principales de error en los modelos de redes:

Error de Distribución

Surge porque el modelo intenta aproximar una distribución lognormal continua con una distribución discreta (binomial o trinomial). Aunque coincidan en media y varianza, persiste una discrepancia fundamental. Este error disminuye lentamente con el número de pasos.

3.2. MÉTODO 2: MODELO DE MALLA ADAPTATIVA (AMM)

Error de No Linealidad

Ocurre cuando el valor de la opción es altamente no lineal respecto al precio del activo subyacente, es decir, en áreas de alta Gamma. Ejemplos críticos:

- Alrededor del precio de ejercicio K al vencimiento (opciones vanilla)
- Cerca de la barrera H en cualquier momento (opciones barrera)
- En el precio inicial S_0 para el cálculo de griegas

En el modelo binomial, este error produce una convergencia “par-impar”, donde el error alterna valores significativamente distintos según el número de pasos sea par o impar. El AMM se enfoca específicamente en minimizar el error de no linealidad.




Figura 3.2: Detalle del efecto par-impar en el modelo binomial. Los puntos azules (N par) sistemáticamente tienen mayor error que los puntos rojos (N impar). Las líneas punteadas muestran las tendencias separadas para cada caso. Esta oscilación es causada por el error de no linealidad y es eliminada por el AMM.

3.2.3. Principio del Modelo de Malla Adaptativa

La premisa fundamental del AMM es que **no es necesario aumentar la resolución en todo el árbol**. En su lugar:

3.2. MÉTODO 2: MODELO DE MALLA ADAPTATIVA (AMM)

- Se utiliza una red gruesa (paso de precio h , paso de tiempo k) para la mayor parte del árbol
- Se aplica una resolución fina solo en regiones críticas donde la no linealidad es alta
- La malla fina típicamente usa pasos de precio $h/2$ y tiempo $k/4$

Esta estrategia permite lograr precisión comparable a un árbol uniforme muy fino, pero con una fracción del costo computacional.




Figura 3.3: Concepto del Modelo de Malla Adaptativa (AMM). Se muestra un árbol trinomial base (nodos grises, conexiones grises) que constituye la malla gruesa con pasos de precio h y tiempo k . Sobre este árbol se injerta una malla fina (cuadrados verdes pequeños) con pasos $h/2$ y $k/4$ únicamente en la región crítica (rectángulo amarillo). Esta estrategia concentra la resolución computacional donde más se necesita, logrando alta precisión con costo mínimo adicional ($< 1\%$).

3.2.4. AMM para Opciones Vanilla

Para opciones europeas o americanas estándar, la mayor no linealidad ocurre alrededor del precio de ejercicio K al vencimiento T .

Estructura

Se añade una malla fina con pasos de precio $h/2$ y tiempo $k/4$ solo en la región:

- Temporal: Entre $T - k$ y T (último paso temporal del árbol grueso)
- Espacial: Alrededor de K , típicamente $[K - 2h, K + 2h]$

3.2. MÉTODO 2: MODELO DE MALLA ADAPTATIVA (AMM)




Figura 3.4: Estructura del AMM para opciones vanilla. Se muestra un árbol trinomial (nodos grises con conexiones grises) que constituye la malla gruesa. Sobre este árbol se inserta una malla fina (cuadrados verdes pequeños) con pasos $h/2$ y $k/4$ únicamente en la región crítica (rectángulo amarillo): temporal $[T-k, T]$ y espacial $[K-2h, K+2h]$. La línea azul punteada marca el strike K donde ocurre la mayor no linealidad al vencimiento. Esta estrategia concentra la resolución donde más se necesita: alrededor del precio de ejercicio al vencimiento.

Eficiencia

En un árbol trinomial de 100 pasos, añadir un nivel de AMM aumenta los cálculos en menos del 0,4%. Un segundo nivel de refinamiento (AMM-2, con pasos $h/4$ y $k/16$) añade menos del 0,4% adicional.

Rendimiento

Según Figlewski y Gao, un modelo AMM-2 con solo 25 pasos de tiempo es más preciso que:

3.2. MÉTODO 2: MODELO DE MALLA ADAPTATIVA (AMM)

- Un modelo trinomial estándar de 250 pasos
- Un modelo binomial de 1000 pasos (que requiere 250 veces más tiempo de ejecución)

Basado en el análisis de Figlewski y Gao para un conjunto de prueba de 27 opciones put europeas:

Modelo	Pasos (N)	Nodos	Tiempo (s)	RMSE		
				Precio	Delta	Gamma
Binomial	25	351	0.0060	0.020841	0.005805	0.001594
Trinomial	25	676	0.0090	0.012025	0.003337	0.000428
AMM-1	25	716	0.0117	0.002812	0.003345	0.000539
AMM-2	25	756	0.0121	0.000615	0.003359	0.000548
Binomial	100	5,151	0.0451	0.004929	0.001470	0.000197
Trinomial	100	10,201	0.0941	0.002770	0.000846	0.000144
AMM-1	100	10,241	0.0961	0.000600	0.000845	0.000140
AMM-2	100	10,281	0.0982	0.000151	0.000854	0.000138
Binomial	250	31,626	0.2163	0.002214	0.000534	0.000073
Trinomial	250	63,001	0.5407	0.001360	0.000346	0.000061
AMM-1	250	63,041	0.5418	0.000245	0.000334	0.000056
AMM-2	250	63,081	0.5428	0.000057	0.000342	0.000056
Binomial	1000	501,501	3.0674	0.000448	0.000145	0.000020
Trinomial	1000	1,002,001	8.5623	0.000244	0.000079	0.000015
AMM-1	1000	1,002,041	8.5954	0.000056	0.000086	0.000014
AMM-2	1000	1,002,081	8.5854	0.000016	0.000085	0.000014

Tabla 3.1: Comparación detallada de rendimiento y precisión para valoración de opciones y cálculo de griegas. El AMM logra errores significativamente menores en precio, Delta y Gamma con un incremento mínimo en tiempo de ejecución (¡3 % vs trinomial estándar) y número de nodos (¡0.1 % adicional). Datos de Figlewski y Gao (1999).

3.2.5. AMM para Opciones Barrera

Las opciones barrera presentan un desafío particular: el error de no linealidad ocurre en cada punto del tiempo cuando el precio se acerca a la barrera H , no solo al vencimiento.

El Problema de Convergencia “Dentada”

La convergencia en modelos estándar es “dentada” porque la probabilidad de tocar la barrera salta discretamente cuando el número de pasos cambia el tamaño del paso de precio h . Si h es grande, el árbol puede “saltar sobre” la barrera sin detectarla correctamente.

El Problema del Límite

Cuando el precio inicial S_0 está muy cerca de la barrera H , un árbol trinomial estándar requiere que haya al menos un paso de precio entre S_0 y H . Esto

implica:

$$h = \frac{S_0(u - d)}{2} < |S_0 - H| \quad (3.14)$$

Si S_0 está extremadamente cerca de H (por ejemplo, a una distancia de $1/8$ de punto), esto puede obligar a usar miles de pasos de tiempo, haciendo el cálculo inmanejable.

Estructura AMM para Barreras

Se construye una malla fina junto a la barrera H :

- **Región espacial:** Banda alrededor de H , típicamente $[H - 2h, H + 2h]$
- **Región temporal:** Toda la vida de la opción (no solo cerca del vencimiento)
- **Flujo de información:** A diferencia del AMM para vanilla, aquí la información fluye de la malla gruesa hacia la malla fina para valorar la opción cuando S_0 está cerca de H

3.2. MÉTODO 2: MODELO DE MALLA ADAPTATIVA (AMM)




Figura 3.5: Estructura del AMM para opciones barrera. Mostrar el árbol completo con una banda vertical de malla fina a lo largo de toda la dimensión temporal, centrada en la barrera H . La barrera debe aparecer como una línea horizontal clara. Indicar la región $[H-2h, H+2h]$ con sombreado o color. Mostrar S_0 cerca de H para ilustrar el problema del límite. Incluir flechas mostrando el flujo de información de malla gruesa a malla fina.

Manejo de la Barrera

Para opciones knock-out:

- Si un nodo en la malla fina cruza la barrera H , su valor se establece en el rebate R
- La malla fina permite detectar el cruce con mucha mayor precisión que la malla gruesa

Para opciones knock-in, se usa la relación de paridad:

$$V_{KI} = V_{vanilla} - V_{KO} \quad (3.15)$$

Rendimiento

Mientras que un Modelo Trinomial Restringido (RTM) se vuelve inmanejable cuando S_0 se acerca extremadamente a la barrera, el AMM alcanza resultados precisos casi instantáneamente. Un AMM de 100 pasos puede ser más preciso que un RTM de 10,000 pasos que tarda 100 veces más.

3.2.6. AMM para el Cálculo de Griegas

La estimación de Delta (Δ) y Gamma (Γ) mediante perturbaciones pequeñas del precio inicial es ruidosa debido al error de no linealidad.

Extensión del Árbol

Una técnica común es extender el árbol un paso hacia atrás desde el tiempo 0 para obtener tres valores de opción y calcular derivadas numéricas. Sin embargo, esto usa un paso de precio h completo, que puede ser demasiado grande.

Ramificación Cuadrinomial

Para permitir perturbaciones menores ($\epsilon < h$) sin que los nodos de la malla fina se desvíen de la malla gruesa (lo que generaría probabilidades negativas), el AMM utiliza ramificación cuadrinomial (cuatro ramas) en los nodos de perturbación añadidos (ubicados en $X_0 \pm \epsilon$).

Esto permite calcular:

$$\Delta \approx \frac{V(S_0 + \epsilon) - V(S_0 - \epsilon)}{2\epsilon} \quad (3.16)$$

$$\Gamma \approx \frac{V(S_0 + \epsilon) - 2V(S_0) + V(S_0 - \epsilon)}{\epsilon^2} \quad (3.17)$$

con $\epsilon = h/2$ o incluso $\epsilon = h/4$.

3.2. MÉTODO 2: MODELO DE MALLA ADAPTATIVA (AMM)




Figura 3.6: Ramificación cuadrinomial para el cálculo de griegas mediante diferencias finitas. Se muestra un árbol trinomial base (nodos grises, conexiones negras gruesas) con nodos adicionales en $t = 0$ ubicados en $S_0 + \varepsilon$ (verde) y $S_0 - \varepsilon$ (rojo), donde $\varepsilon = h/4$ es una perturbación pequeña. Las líneas sólidas grises representan ramificación cuadrinomial (4 ramas) desde los nodos perturbados y los nodos extremos en $t = k/4$, permitiendo calcular simultáneamente Delta y Gamma con alta precisión.

Precisión

El uso de AMM reduce el Error Cuadrático Medio (RMSE) de:

- Delta: en aproximadamente $2/3$
- Gamma: en aproximadamente $1/2$

sin aumentar significativamente el tiempo de ejecución. Un AMM de 25 pasos es más preciso que un modelo trinomial estándar de 1000 pasos que tarda 500 veces más.

3.2. MÉTODO 2: MODELO DE MALLA ADAPTATIVA (AMM)

Precisión en el Cálculo de Delta: Trinomial vs AMM con Ramificación Cuadrinomial




Figura 3.7: Precisión en el cálculo de Delta mediante ramificación cuadrinomial. Se compara el RMSE en Delta para diferentes configuraciones AMM $(0, T)$, donde 0 es el inicio de la opción y T es el final de la misma. La ramificación cuadrinomial permite calcular Delta mediante diferencias finitas. AMM (3,3) logra una mejora de 60x vs Trinomial en $N=100$, con un incremento de tiempo $< 3\%$. Notablemente, AMM (1,0) mejora Delta sin costo adicional al refinar solo la región crítica.




Figura 3.8: Precisión en el cálculo de Gamma mediante ramificación cuadrinomial. Se compara el RMSE en Gamma para diferentes configuraciones AMM. La ramificación cuadrinomial permite calcular Gamma mediante diferencias finitas de segundo orden. AMM (1,1) logra una mejora de 7.2x vs Trinomial en $N=100$. A diferencia de Delta, Gamma no mejora significativamente con niveles superiores a (2,2), lo que sugiere que AMM (1,1) es óptimo para este cálculo. El incremento en tiempo es $< 3\%$.

3.2.7. Ventajas del AMM

- **Eficiencia extrema:** Aumenta la precisión en órdenes de magnitud con incremento mínimo en tiempo de ejecución
- **Escalabilidad:** Permite abordar problemas que son computacionalmente prohibitivos con métodos estándar
- **Flexibilidad:** Aplicable a opciones vanilla, barrera, y cálculo de griegas con estructuras específicas para cada caso
- **Convergencia mejorada:** Elimina el comportamiento “par-impar” y la convergencia “dentada” de los modelos estándar

- **Aplicaciones prácticas:** Especialmente valioso para cálculo de volatilidad implícita (que requiere múltiples valoraciones repetitivas) y opciones exóticas complejas

3.2.8. Consistencia Matemática

Figlewski y Gao proporcionan una prueba formal de convergencia, demostrando que a medida que el tamaño de los pasos de tiempo y precio tiende a cero, el valor de la opción obtenido por el AMM converge al valor teórico de tiempo continuo. Esta consistencia garantiza que el método no solo es eficiente, sino también matemáticamente riguroso.

3.3. Método 3: Replicación Estática

La replicación estática es un método desarrollado para cubrir o replicar el valor de una opción objetivo (frecuentemente una opción exótica) mediante la construcción de un portafolio compuesto por otras opciones, generalmente opciones estándar o “vanilla”. A diferencia de la cobertura dinámica, que requiere ajustes continuos en la posición del activo subyacente, este enfoque busca establecer un portafolio de cobertura con pesos fijos que no requiera ajustes posteriores durante la vida de la opción o dentro de un rango específico de precios y tiempos.

Esta técnica se fundamenta en los supuestos estándar de la teoría de valoración de opciones (como el modelo Black-Scholes), permitiendo descomponer teóricamente una opción exótica en un portafolio de opciones estándar, cuyos precios de mercado y bid-ask spreads suelen ser más transparentes y líquidos. Aunque una replicación perfecta teórica podría requerir un número infinito de opciones estándar, en la práctica es posible lograr una aproximación adecuada utilizando un número limitado de instrumentos.

3.3.1. Concepto de Replicación Estática

El concepto central de la replicación estática radica en igualar los flujos de caja y los valores de frontera de la opción objetivo utilizando un portafolio de instrumentos más simples.

La idea: replicación con un portafolio de opciones vanilla

La estrategia consiste en construir un portafolio de opciones estándar (calls y puts europeas con diferentes precios de ejercicio y vencimientos) que replique el valor de la opción exótica en sus fronteras. Por ejemplo, para una opción barrera up-and-out (que deja de existir si el precio del subyacente toca un nivel superior), el objetivo es crear un portafolio que tenga el mismo pago que la opción estándar al vencimiento (si no toca la barrera), pero cuyo valor neto sea cero si el precio del activo alcanza la barrera antes del vencimiento.

Esto se logra “anulando” el valor de la opción original en la barrera mediante la venta en corto de otras opciones que tengan valor positivo en ese mismo punto. De esta manera, el portafolio estático imita el comportamiento de “desaparición” de la opción barrera sin necesidad de vender la opción exótica en sí misma.

Fundamento teórico: ¿Por qué funciona?

La validez del método descansa en el Principio de Replicación Estática. Este principio establece que si dos portafolios tienen los mismos valores en todas las fronteras de una región determinada (precio del activo y tiempo) y satisfacen la misma ecuación diferencial (la ecuación backward o de Black-Scholes) dentro de dicha región, entonces deben tener el mismo valor en cualquier punto interior de esa región.

Por lo tanto, no es necesario igualar el valor de la opción en cada punto posible del futuro; basta con construir un portafolio que coincida con el valor de la opción objetivo en sus fronteras naturales (por ejemplo, al vencimiento y sobre la barrera de precio). Una vez que los valores en la frontera están alineados, la teoría de valoración por inducción hacia atrás (backward induction) garantiza que el valor actual y la sensibilidad del portafolio replicante serán iguales a los de la opción objetivo.

Ventajas frente a la cobertura dinámica

La principal ventaja de este método es que elimina la necesidad de rebalanceo continuo. La cobertura dinámica tradicional (Delta hedging) requiere ajustar las posiciones constantemente a medida que pasa el tiempo o cambia el precio del activo, lo cual presenta dos dificultades mayores:

1. El ajuste continuo es imposible en la práctica, y el rebalanceo discreto genera errores de cobertura.
2. Los costos de transacción asociados al ajuste frecuente pueden erosionar el margen de beneficio de la opción.

La replicación estática utiliza pesos fijos determinados al inicio, evitando estos costos y dificultades operativas. Además, es particularmente útil para opciones exóticas con alta “gamma” (como las opciones barrera cerca de su nivel de activación/desactivación), donde la cobertura dinámica se vuelve costosa e imprecisa debido a la necesidad de realizar grandes ajustes ante pequeños movimientos del mercado.

3.3.2. Metodología de Derman-Ergener-Kani

La metodología propuesta por Derman, Ergener y Kani (Derman et al. (1994)) se basa en la construcción sistemática de un portafolio de cobertura que iguala el valor de la opción objetivo en una serie de puntos discretos sobre su frontera (espacio y tiempo). El enfoque fundamental es recursivo: comienza igualando el pago al vencimiento y retrocede en el tiempo para ajustar los valores en la barrera, aprovechando que el valor de la opción exótica es conocido en dichas fronteras (por ejemplo, cero en una opción knock-out o un valor de reembolso específico).

Construcción del Portafolio y Selección de Strikes

La construcción del portafolio replicante se realiza paso a paso, asegurando que la adición de nuevas opciones para corregir el valor en un punto de la frontera no altere la replicación ya lograda en puntos anteriores o regiones interiores. Para

3.3. MÉTODO 3: REPLICACIÓN ESTÁTICA

lograr esto, la selección de los precios de ejercicio (strikes) es crítica y sigue reglas estrictas dependiendo de la ubicación de la frontera respecto al precio actual del activo:

- **Frontera de Vencimiento:** Se inicia replicando el pago final de la opción objetivo (t_{exp}) utilizando una combinación de opciones vanilla (calls o puts) con diferentes strikes que vencen en esa fecha. Esto constituye el portafolio inicial.
- **Fronteras Superiores (por encima del precio actual):** Para ajustar el valor del portafolio en una barrera superior en tiempos anteriores al vencimiento ($t < t_{exp}$), se deben utilizar opciones de compra (calls) con strikes iguales o superiores al nivel de la barrera ($K \geq B$). Esto garantiza que dichas opciones expiren *out-of-the-money* si el precio del activo se mantiene por debajo de la barrera, evitando así generar flujos de caja no deseados dentro de la región de replicación.
- **Fronteras Inferiores (por debajo del precio actual):** De manera análoga, para ajustar el valor en una barrera inferior, se deben utilizar opciones de venta (puts) con strikes iguales o inferiores al nivel de la barrera ($K \leq B$). Al igual que en el caso anterior, estas opciones no tendrán valor al vencimiento si el precio se mantiene por encima de la frontera inferior, preservando la integridad de la replicación interior.

Cálculo de Pesos y Procedimiento Recursivo

Una vez seleccionados los instrumentos adecuados, los pesos (cantidad de opciones a comprar o vender) se calculan mediante un proceso iterativo hacia atrás en el tiempo. Si dividimos el tiempo hasta el vencimiento en intervalos discretos $t_1, t_2, \dots, t_{exp}$, el procedimiento es el siguiente:

1. **Ajuste al Vencimiento (t_{exp}):** Se seleccionan opciones estándar que igualen el pago de la opción objetivo al vencimiento. Por ejemplo, para una opción up-and-out call que no ha tocado la barrera, esto equivale simplemente a una call estándar con el mismo strike que la opción exótica.
2. **Retroceso al paso anterior (t_{n-1}):** Se calcula el valor teórico del portafolio replicante existente en el punto de la frontera correspondiente al tiempo t_{n-1} (por ejemplo, en la barrera B). Generalmente, este valor no coincidirá con el valor de la opción objetivo (que suele ser cero en el caso de opciones *knock-out*).
3. **Cálculo del Peso de Corrección:** Para eliminar esta discrepancia, se añade una nueva posición en una opción estándar que venza en t_{exp} (o en el tiempo correspondiente a la frontera, dependiendo de la implementación exacta). El peso (w) de esta nueva opción se calcula para que su valor compense exactamente el error del portafolio en ese punto:

$$w = -\frac{V_{portafolio}(B, t_{n-1}) - V_{objetivo}(B, t_{n-1})}{V_{nueva_opcion}(B, t_{n-1})} \quad (3.18)$$

Donde $V_{portafolio}$ es el valor acumulado de las opciones añadidas en pasos previos y V_{nueva_opcion} es el valor de la opción utilizada para el ajuste.

3.3. MÉTODO 3: REPLICACIÓN ESTÁTICA

4. **Iteración:** Este proceso se repite para $t_{n-2}, t_{n-3}, \dots, t_1$, añadiendo en cada paso opciones adicionales que corrijan el valor en la frontera sin afectar los puntos ya ajustados en el futuro (gracias a la selección de strikes descrita anteriormente).

Teóricamente, si se utilizara un número infinito de opciones para cubrir todos los puntos de la frontera, la replicación sería exacta. En la práctica, se utiliza un número finito de opciones para igualar el valor en puntos discretos, lo que proporciona una aproximación robusta cuyo error disminuye al aumentar la cantidad de instrumentos de cobertura.

3.3.3. Construcción del Portafolio

La construcción práctica del portafolio replicante sigue un proceso sistemático que transforma la frontera continua de la opción exótica en un conjunto discreto de puntos de control. Este proceso requiere una selección cuidadosa de los instrumentos vanilla para garantizar que la corrección del valor en un punto de la frontera no introduzca flujos de caja no deseados en regiones ya cubiertas.

Selección de Opciones Vanilla

La regla fundamental para elegir los instrumentos de cobertura es asegurar que estos no tengan valor intrínseco dentro de la región válida de la opción objetivo (es decir, antes de que se toque la barrera). Según Derman, Ergener y Kani, la selección se realiza en función de la ubicación de la frontera respecto al precio actual del activo:

- **Frontera de Vencimiento (t_{exp}):** Para replicar el pago final de la opción, se pueden utilizar tanto opciones call como put de cualquier precio de ejercicio (K) conveniente, combinándolas para igualar el perfil de pago de la opción objetivo al vencimiento.
- **Fronteras Superiores ($S > S_{actual}$):** Para ajustar el valor en una barrera superior (como en una opción *up-and-out*), se deben utilizar exclusivamente opciones de compra (**calls**) con precios de ejercicio iguales o superiores al nivel de la barrera ($K \geq B$). Esto asegura que, si el precio del activo se mantiene por debajo de la barrera, estas opciones expiren *out-of-the-money* (sin valor), preservando así la replicación lograda en el interior de la región.
- **Fronteras Inferiores ($S < S_{actual}$):** De manera análoga, para replicar condiciones en una frontera inferior (como en una opción *down-and-out*), se deben emplear opciones de venta (**puts**) con precios de ejercicio iguales o inferiores al nivel de la barrera ($K \leq B$). Estas opciones no generarán flujos de caja si el precio del activo se mantiene por encima de la frontera inferior.

Determinación de los Pesos

Una vez seleccionados los instrumentos, los pesos (cantidad de opciones a comprar o vender) se determinan mediante un proceso recursivo hacia atrás en el tiempo. El objetivo es “anular” la discrepancia entre el valor del portafolio

3.4. MÉTODO 4: MONTE CARLO PARA OPCIONES AMERICANAS

acumulado y el valor de la opción objetivo en puntos discretos de la frontera. El cálculo matemático para el peso α_i de una nueva opción que se añade en el paso i para corregir el valor en el tiempo t_i y precio B_i se define formalmente como:

$$\alpha_i = \frac{\xi_{i-1} - V_{portafolio}(B_{i-1}, t_{i-1})}{C(B_{i-1}, t_{i-1})} \quad (3.19)$$

Donde:

- ξ_{i-1} es el valor conocido de la opción objetivo en la frontera (usualmente cero para opciones knock-out o un valor de reembolso específico).
- $V_{portafolio}$ es el valor teórico acumulado de todas las opciones estándar añadidas en pasos anteriores (vencimientos futuros ya cubiertos).
- $C(B_{i-1}, t_{i-1})$ es el valor de la nueva opción estándar utilizada para el ajuste en ese punto de la frontera

En términos prácticos, si el portafolio actual tiene un valor positivo en una barrera donde la opción objetivo vale cero, el peso α_i será negativo, indicando que se debe tomar una posición short en la nueva opción para cancelar dicho valor.

Aproximación de la Barrera

Dado que en el mundo real los precios de las acciones son continuos, una replicación estática perfecta requeriría un número infinito de opciones estándar para cubrir cada punto posible de la frontera. Sin embargo, la metodología permite una aproximación robusta mediante la discretización de la frontera:

1. **Puntos de anclaje:** Se selecciona un conjunto limitado de puntos de tiempo y precio sobre la barrera (por ejemplo, cada mes o cada semana) donde se forzará la igualdad de valores.
2. **Convergencia:** A medida que se aumenta el número de opciones utilizadas en el portafolio replicante (disminuyendo el intervalo de tiempo entre los puntos de ajuste), el “error de replicación” o mismatch en los puntos intermedios disminuye significativamente.

Por ejemplo, los autores demuestran que al pasar de un portafolio de 6 opciones (ajuste bimestral) a uno de 24 opciones (ajuste quincenal) para replicar una opción up-and-out a un año, el error de valor teórico se reduce drásticamente, logrando que el comportamiento del portafolio replicante sea casi indistinguible del de la opción exótica objetivo.

3.4. Método 4: Monte Carlo para Opciones Americanas

3.4.1. Desafío de las Opciones Americanas

3.4.2. Simulación de Monte Carlo

3.4.3. Método de Longstaff-Schwartz (LSM)

Capítulo 4

Implementación - Fórmulas de Reiner y Rubinstein

4.1. Descripción de la Implementación

4.1.1. Cálculo de Variables Auxiliares

4.1.2. Cálculo de Términos de Valoración

4.1.3. Construcción de Fórmulas para Cada Tipo

4.2. Detalles de Implementación

4.2.1. Código Relevante

4.3. Cálculo de Griegas

4.4. Validación

4.4.1. Verificación de Relaciones de Paridad

4.4.2. Verificación de Límites Asintóticos

4.4.3. Ejemplos Numéricos

Capítulo 5

Implementación - Árboles Trinomiales con Mallas Adaptativas

5.1. Descripción del Algoritmo

5.1.1. Construcción del Árbol Trinomial

5.1.2. Adaptación de la Malla

5.1.3. Valoración Backward

5.2. Detalles de Implementación

5.2.1. Estructura de Datos

5.2.2. Código Relevante

5.3. Validación

5.3.1. Comparación con Rubinstein-Reiner

5.3.2. Análisis de Convergencia

5.3.3. Ejemplos Numéricos

Capítulo 6

Implementación - Replicación Estática y Monte Carlo

6.1. Replicación Estática

En esta sección se detalla el procedimiento computacional utilizado para implementar la metodología de replicación estática descrita teóricamente en el capítulo 3. El objetivo es construir un portafolio de opciones estándar cuyos valores en la frontera coincidan con los de una opción barrera objetivo.

6.1.1. Descripción del Algoritmo

El algoritmo implementado se basa en un proceso recursivo de “inducción hacia atrás” (backward induction), discretizando el tiempo de vida de la opción en N intervalos.

Selección de Strikes

Para garantizar que los instrumentos de cobertura no generen flujos de caja no deseados dentro de la región de validación, la selección de los precios de ejercicio (K) se automatiza siguiendo las reglas de frontera de Derman-Ergener-Kani:

- Para la frontera de vencimiento ($t = T$): Se utilizan opciones con el mismo strike que la opción original para replicar el payoff estándar.
- Para barreras superiores ($B > S_0$): Se seleccionan opciones Call con $K = B$. Esto asegura que si $S < B$, la opción expira out-of-the-money y no altera el valor del portafolio.
- Para barreras inferiores ($B < S_0$): Se seleccionan opciones Put con $K = B$.

Cálculo de Pesos

El algoritmo calcula los pesos (w_i o α_i) iterando desde el vencimiento hacia el presente. Sea t_i los puntos discretos en el tiempo donde se ajusta la frontera:

1. Inicialización ($t_N = T$): Se establece el portafolio inicial igualando el pago de la opción al vencimiento. 2. Bucle Recursivo ($i = N - 1, \dots, 1$):

- Se calcula el valor del portafolio acumulado (V_{port}) en el punto de la barrera (B, t_i) .
- Se calcula el valor teórico de la opción objetivo (V_{target}) en ese mismo punto (generalmente 0 para knock-out o el valor del rebate).
- Se determina el peso de la nueva opción de ajuste (C_{ajuste}) mediante la fórmula discreta derivada del principio de replicación:

$$\alpha_i = \frac{V_{target}(B, t_i) - V_{port}(B, t_i)}{C_{ajuste}(B, t_i)} \quad (6.1)$$

Esta ecuación asegura que el error de valor en la frontera sea cero en el tiempo t_i .

6.1.2. Detalles de Implementación

Para la ejecución del modelo se asumen las condiciones estándar de Black-Scholes (volatilidad constante σ , tasa libre de riesgo r y dividendos d). La implementación requiere definir la granularidad de la discretización temporal, la cual afecta directamente la precisión de la réplica.

La frontera continua se aproxima mediante un conjunto finito de puntos de control (B, t_k) . En la práctica, esto implica que el portafolio solo garantiza la igualdad de valor exactamente en estos puntos. Si el activo subyacente toca la barrera entre dos puntos de control, existe un error de discretización teórico. Asimismo, el modelo asume que, al tocarse la barrera, el portafolio estático se liquida para cubrir la obligación o eliminar la posición, un proceso teóricamente libre de costos si la replicación es perfecta.

6.1.3. Validación del Portafolio Replicante

Para validar la eficacia del algoritmo, se compara el valor del portafolio estático resultante contra el valor teórico analítico de la opción objetivo (calculado mediante fórmulas cerradas estándar, como Rubinstein-Reiner para opciones barrera).

Comparación y Análisis de Convergencia

El análisis demuestra que la calidad de la replicación depende críticamente del número de instrumentos de cobertura utilizados (frecuencia de ajuste en la frontera).

Basado en los resultados de Derman et al., se observa que:

- Replicación de baja frecuencia (6 opciones): Al ajustar la frontera cada 2 meses (6 puntos de contacto), el desajuste (mismatch) entre el portafolio

y la opción objetivo puede ser significativo, alcanzando errores cercanos al 19 % del valor de la opción en regiones próximas a la barrera y cercanas al vencimiento.

- Replicación de alta frecuencia (24 opciones): Al aumentar la discretización a ajustes quincenales (24 puntos), el error de valor disminuye drásticamente. El perfil de valor del portafolio replicante converge hacia el de la opción barrera teórica, reduciendo el desajuste a niveles marginales (aprox. 0.10 en valor monetario frente a un valor objetivo de 2.00).

Esto confirma que, aunque una réplica perfecta requeriría infinitas opciones, una aproximación con un número finito (ej. 24) logra una convergencia robusta para fines prácticos.

Ejemplos Numéricos

Consideremos una opción Up-and-Out Call con los siguientes parámetros: $S_0 = 100$, Strike $K = 100$, Barrera $B = 120$, Vencimiento $T = 1$ año, Volatilidad $\sigma = 15\%$, $r = 5\%$.

1. Valor Objetivo: El valor teórico de esta opción es 1.913.
2. Portafolio (6 ajustes): Construido con 1 Call estándar ($K = 100$) y 6 Calls ($K = 120$) con vencimientos bimestrales.
 - El valor resultante del portafolio es 2,284.
 - Error: 0,37 (aprox. 19 %). El error se concentra principalmente cerca de la barrera cuando falta poco tiempo para el vencimiento.
3. Portafolio (24 ajustes): Construido con ajustes cada 0.5 meses.
 - El valor resultante del portafolio es 2,01.
 - Error: 0,10 (aprox. 5 %). La superficie de valor del portafolio es casi indistinguible de la opción objetivo.

Estos resultados validan que el método de replicación estática permite descomponer una opción exótica compleja en una suma lineal de opciones vanilla, facilitando su valoración y cobertura sin necesidad de rebalanceo dinámico continuo.

6.2. Monte Carlo para Opciones Americanas

6.2.1. Descripción del Algoritmo

Generación de Trayectorias

Monitoreo de Barrera

Método de Longstaff-Schwartz

6.2.2. Detalles de Implementación

Código Relevante

6.2.3. Validación de Monte Carlo

Análisis de Convergencia

Intervalos de Confianza

Ejemplos Numéricos

6.2.4. Técnicas de Reducción de Varianza

Capítulo 7

Resultados y Comparación

7.1. Diseño de Experimentos

- 7.1.1. Casos de Prueba para Opciones Europeas
- 7.1.2. Casos de Prueba para Opciones Americanas
- 7.1.3. Métricas de Evaluación

7.2. Resultados para Opciones Europeas

- 7.2.1. Tablas Comparativas
- 7.2.2. Análisis de Precisión
- 7.2.3. Análisis de Tiempo Computacional
- 7.2.4. Comportamiento Cerca de la Barrera
- 7.2.5. Gráficos Comparativos

7.3. Resultados para Opciones Americanas

- 7.3.1. Tablas de Resultados
- 7.3.2. Análisis de Convergencia
- 7.3.3. Comparación con Europeas

7.4. Comparación Global de Métodos

- 7.4.1. Tabla Resumen
- 7.4.2. Análisis de Casos de Uso Óptimos
- 7.4.3. Recomendaciones Prácticas

7.5. Discusión

- 7.5.1. Ventajas y Desventajas Observadas
- 7.5.2. Limitaciones del Estudio

Capítulo 8

Conclusiones y Trabajo Futuro

8.1. Resumen de Resultados

8.2. Conclusiones Principales

8.2.1. Sobre los Métodos para Opciones Europeas

8.2.2. Sobre Monte Carlo para Opciones Americanas

8.2.3. Comparación Global

8.3. Limitaciones del Trabajo

8.4. Trabajo Futuro

8.4.1. Extensiones del Modelo

8.4.2. Extensiones de los Métodos

8.4.3. Aplicaciones Prácticas

8.4.4. Validación con Datos Reales

Bibliografía

- Derman, E., Ergener, D., and Kani, I. (1994). Static replication of barrier options. *The Journal of Derivatives*, 2(2):78–95.
- Figlewski, S. and Gao, B. (1999). The adaptive mesh model: a new approach to efficient option pricing. *The Journal of Financial Engineering*, 8:211–241.
- Reiner, E. and Rubinstein, M. (1991). Breaking down barrier options. *Risk*, 4(8):28–35.