

24-1 DSL 정규 세션

기초과제 1 통계적 사고



- ☑ 본 과제는 「통계학입문」, 「통계방법론」, 「선형대수」 및 「수리통계학(1)」 일부에 상응하는 내용의 복습을 돕기 위해 기획되었습니다. 평가를 위한 것이 아니므로, 주어진 힌트(👉)를 적극 활용하시고 학회원 간 토론, Slack 의 질의응답을 활용하시어 해결해주시시오. 단, 답안 표절은 금지합니다.
- ☑ 서술형 문제는 ✍, 코딩 문제는 © 으로 표기가 되어 있습니다. 각 문제에서 요구하는 방법에 맞게 해결하며, 서술형 문제들은 따로 작성하시어 pdf 로 제출해주시고 코드 문제들은 ipynb 파일에 답안을 작성하시어 제출해주시시오.
- ☑ 1/18 (목) 23 시 59 분까지 Github 에 PDF 파일과 ipynb 파일을 모두 제출해주시시오. Github 에 제출하는 방법을 모르다면 학술부장 혹은 Slack 의 질의응답을 활용해주시오.
- ☑ 참고 도서 :
통계학입문(3 판, 강상욱 외), Introduction to Mathematical Statistics(8 판, Hogg et.al.)

문제 1 Central Limit Theorem

중심극한정리는 확률변수의 합 형태 (Sum of Random Variables) 의 극한분포를 손쉽게 구할 수 있도록 해 주기에 통계학에서 가장 자주 사용하는 정리입니다. 이 문제에서는 중심극한정리의 정의와 그 활용에 대해 짚어보겠습니다.

1-1 ✍ : 중심극한정리(Central Limit Theorem)의 정의를 서술하시오.

- 👉 통계학입문 (3 판) 7 장 참고
- 👉 Hogg(8 판) 4 장 2 절, 5 장 3 절 참고

1-2 ✍ : 중심극한정리가 통계적 추론 중 “구간추정”에서 어떻게 유용한지 서술하시오.

- 👉 Hogg(8 판) 4 장 2 절

1-3 © : .ipynb 파일에서 $Unif(0,1)$ 의 분포에 대해서 중심극한정리가 적용되는 예시가 있습니다. 코드를 참조하면서 지수분포인 $Exp(2)$ 분포에 대해서 중심극한정리가 적용되는 모습을 보이시오.

문제 2 Linear Algebra

선형대수학은 머신러닝을 위한 수학 중에서 가장 중요한 요소 중 하나이며, 이 중에서 가장 중요한 것 중에서 하나는 바로 SVD (Singular Value Decomposition, 특이값 분해) 입니다. 이것을 알기 위해서 고유값과 고유벡터를 활용한 Diagonalization 에 대해서 먼저 알아본 다음에 SVD 를 사용하며 실제로 이미지를 압축하면서 적용시켜보겠습니다.

2-1 ✎ : Diagonalization 의 정의가 다음과 같이 주어졌습니다.

Diagonalization 이란 정방행렬(A) 를 Eigenvalue, Eigenvector 를 통해서 대각행렬 (D) 를 만드는 것이며, 즉 $D = P^{-1} A P$ 를 통해서 대각행렬 (D) 를 찾는 것입니다.

조건들 : 1.) A 는 정방행렬 (Square Matrix) 이다. 2.) $A(n \times n)$ 는 n 개의 독립인 고유벡터를 가지고 있다.

- 1.) A 에 대한 고유벡터들을 찾으며, 이것을 각각 P_1, P_2, \dots, P_n 으로 놓는다
- 2.) $P = [P_1, P_2, \dots, P_n]$ 매트릭스를 만든다
- 3.) $P^{-1} A P$ 를 구하면 다음과 같은 형태가 나오게 된다

$$P^{-1} A P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} = D$$

만약에 A 가 대칭 (Symmetric) 행렬이면 다음과 같은 꼴이 나오게 됩니다.

$$A = P D P^T$$

다음과 같은 정방행렬에 Diagonalization 을 적용시켜서 나오게 되는 대각행렬을 쓰시오.

a) $\begin{bmatrix} 6 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

2-2 ✎ : SVD 의 정의가 다음과 같이 주어졌습니다.

SVD 란 Diagonalization 과는 달리 모든 행렬 (A) 에 대해서 사용이 가능합니다.

- 1.) $A^T A$, $A A^T$ 행렬들을 만듭니다. 이것은 항상 대칭 (Symmetric) 행렬이 됩니다.
- 2.) $A^T A = V D V^T$, $A A^T = U D' U^T$ 으로 대각화를 진행을 하고 나서 정규직교화까지 하게 된다면 U 와 V 를 얻게 됩니다.
- 3.) 여기에서 0 이 아닌 고유값들이 내림차순으로 나열된 것이 바로 D 가 되며, 이것은 바로 Σ 행렬의 대칭 원소들이 됩니다.
- 4.) 결국 $A = U \Sigma V^T$ 의 관계를 가지기 때문에 위에서 구한 U 와 V 를 대입시키면 되며 Σ 도 3.) 에서 구했던 걸로 대입을 하면 됩니다.

참고 자료 :

- <https://www.youtube.com/watch?v=rziHzFk5JyU>
- <https://www.youtube.com/watch?v=HeGdlgB8450> (이것을 참조해서 문제를 풀으시면 됩니다)
- https://angeloyeo.github.io/2019/08/01/SVD.html#google_vignette

다음과 같은 행렬에 SVD 를 적용시켜서 나오게 되는 Σ 행렬을 구하시오.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2-3 © : .ipynb 파일에서는 SVD (Singular Value Decomposition, 특이값-분해) 를 실제로 이미지 압축을 위해서 활용하는 예시를 보여주고 있습니다. 해당 코드를 본 뒤에 새로운 사진에 대해서 원본에 비해서 적은 용량을 차지하면서도 원본에 대한 정보를 유지해주는 차원 수가 무엇인지 알아봅시오.

문제 3 Student's Theorem

스튜던트 정리는 통계적 추정에서 필요한 정리 중 하나로, 표본평균과 표본분산이 어떤 분포를 갖는지 알려줍니다. 이 문제에서는 스튜던트 정리의 내용을 어떻게 수식적으로 유도할 수 있는지 짚어보겠습니다.

스튜던트 정리는 다음과 같이 총 4 개의 내용으로 구성되어 있습니다.

- ① $\bar{X} \approx N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$
- ② 표본평균 \bar{X} 와 표본분산 s^2 은 서로 독립이다.
- ③ $(n - 1)S^2/\sigma^2$ 는 $\chi^2(n - 1)$ 분포를 따른다.
- ④ $T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t(n - 1)$

3-1 ✎ : ③에 있는 내용을 증명하시오.

✎ Hogg(8 판) 3 장 6 절 참고

✎ 무작위표본 X_1, \dots, X_n 이 독립적으로 동일하게 (independently and identically distributed) 평균이 μ 이고 분산이 σ^2 인 정규분포를 따를 때, 자유도가 n 인 카이 제곱 분포를 따르는 새로운 확률변수 V 를 아래와 같이 두어 증명에 활용할 수 있습니다.

$$V = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$

3-2 ✎ : ④에 있는 내용을 증명하시오.

✎ Hogg(8 판) 3 장 6 절 참고

✎ t 분포의 정의에 따르면, 표준정규분포를 따르는 확률변수와 카이제곱분포를 따르는 확률변수를 이용하 여 t 분포를 유도할 수 있습니다.

문제 4 통계적 방법론

t 검정은 모집단이 정규분포를 따르지만 모표준편차를 모를 때, 모평균에 대한 가설검정 방법입니다. 대개 두 집단의 모평균이 서로 차이가 있는지 파악하고자 할 때 사용하며, 표본평균의 차이와 표준편차의 비율을 확인하여 통계적 결론을 도출합니다. ANOVA Test의 경우 집단이 2개보다 많을 때에 모평균이 서로 차이가 있는지 파악하고자 할 때 사용되며, 이것은 코드로만 살피겠습니다.

4-1 ✎ : 어떤 학우가 DSL 학회원(동문 포함)의 평균 키가 DSL 학회원이 아닌 사람의 평균 키보다 크다는 주장을 하여, 실제로 그러한지 통계적 검정을 수행하려고 합니다. 며칠간 표본을 수집한 결과 다음의 결과를 얻었다고 합니다.

표본 수 : 210 명

측정에 응한 DSL 학회원들의 평균 키 : 173.5cm / 표준편차 : 7.05cm

측정에 응한, DSL 학회원이 아닌 사람들의 평균 키 : 171.4cm / 표준편차 : 7.05cm

a) ✎ 귀무가설과 대립가설을 설정하시오.

b) ✎ 유의수준 5%에서의 가설검정을 수행하고 결론을 도출하시오.

👉 통계학입문(3 판) 7 장 참고

👉 어떤 검정통계량이 어떤 분포를 따르는지, 언제 귀무가설을 기각하는지 정해야 합니다.

4-2 © : 또 다른 학우가 다른 학회인 ESC의 키들도 포함이 된다고 알려주었으며, 새로운 데이터를 heights.csv 파일에 저장해놓았다고 합니다. 이 학우는 학회마다의 평균 키가 똑같다는 주장을 하고 있으며, 해당 학우가 준 데이터를 통해서 이 주장을 검정하려고 합니다.

a) ✎ 귀무가설과 대립가설을 설정하시오.

b) © 파이썬의 scipy.stats를 활용해서 유의수준 5%에서의 가설검정을 수행하고 결론을 도출하시오. 결론은 .ipynb 파일에 쓰셔도 괜찮습니다.

👉 One-way Anova Test를 활용해서 사용하는 문제입니다.

👉 활용해야 될 함수는 scipy.stats.f_oneway입니다.

Reference

- 통계학입문(3 판, 강상욱 외)
- Introduction to Mathematical Statistics(8 판, Hogg et.al)
- 23-2 기초과제 1 (9 기 이상균)

Data Science Lab

담당자 : 학술부(신재우)
jaewoo356@gmail.com