

## 2η Σειρά Ασκήσεων

Παναγιώτης Σαββαΐδουλος Α.Μ.: el20096

$$a = AM \bmod 10 + 1 = 6 + 1 = 7$$

$$2.1) \quad x_1(t) = \sin(20\pi t) \frac{\cos(300\pi t)}{\pi t} = \sin(140\pi t) \frac{\cos(300\pi t)}{\pi t}$$

$$x_2(t) = 2 \frac{\sin(500\pi t)}{\pi t}$$


$$x_1(t) = 2 \sin(140\pi t) \cos(300\pi t) \cdot \frac{1}{2\pi t} =$$

$$= \left[ \sin(140\pi t + 300\pi t) + \sin(140\pi t - 300\pi t) \right] \cdot \frac{1}{2\pi t} =$$

$$= \frac{\sin 440\pi t}{2\pi t} - \frac{\sin 160\pi t}{2\pi t}$$


$$X_1(\omega) = F[x_1(t)] = \frac{1}{2} F\left[\frac{\sin 440\pi t}{\pi t}\right] - \frac{1}{2} F\left[\frac{\sin 160\pi t}{\pi t}\right]$$

$$X_1(\omega) = \begin{cases} 0, & \omega \in (-\infty, -440\pi) \cup (-160\pi, 160\pi) \cup (440\pi, +\infty) \\ \frac{1}{2}, & \omega \in (-440\pi, -160\pi) \cup (160\pi, 440\pi) \end{cases}$$



$$X_2(\omega) = F[x_2(t)] = 2F\left[\frac{\sin(500\pi t)}{\pi t}\right] =$$

$$= \begin{cases} 0, & \omega \in (-\infty, -500\pi) \cup (500\pi, +\infty) \\ 2, & -500\pi < \omega < 500\pi \end{cases}$$




a)  $x_1(t) + x_2(t)$

$$X_a(\omega) = F[x_1(t) + x_2(t)] = F[x_1(t)] + F[x_2(t)] =$$

$$= X_1(\omega) + X_2(\omega) =$$

$$\begin{cases} 0, & \omega \in (-\infty, -500\pi) \cup (500\pi, +\infty) \\ 2, & \omega \in (-500\pi, -160\pi) \cup (-160\pi, 160\pi) \cup (160\pi, 500\pi) \\ \frac{5}{2}, & \omega \in (-160\pi, -160\pi) \cup (160\pi, 160\pi) \end{cases}$$



$$\omega = 1000\pi \Rightarrow \omega_s \geq \omega \Rightarrow \frac{\omega}{T_s} \leq \omega \Rightarrow T_s < \frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi}{1000\pi} = 10^{-3} \text{ s}$$

b)  $x_3(t) = x_1^3(t) = x_1(t) \cdot x_1^2(t)$

$$x_1^2(t) \Rightarrow F[x_1^2(t)] = X_1(\omega) * X_1(\omega),$$

$$\omega_{x_2} = \omega_{x_1} + \omega_{x_1} = 880\pi + 880\pi = 1760\pi$$

$$X_3(\omega) = X_1(\omega) * F[x_1^2(t)],$$

$$\omega = \omega_{x_1} + \omega_{x_2} = 880\pi + 1760\pi = 2640\pi$$

$$\omega_s > 2\omega \Rightarrow \frac{2\pi}{T_s} > 2\omega \Rightarrow T_s < \frac{2640\pi}{\pi} = 2640_s$$

$$\gamma) x_8(t) = x_1(t) * x_2(t)$$

$$X_8(\omega) = X_1(\omega) \cdot X_2(\omega)$$

$$\omega = \min\{\omega_1, \omega_2\} = \{880\pi, 1000\pi\} = 880\pi$$

$$\omega_s > 2\omega \Rightarrow \frac{2\pi}{T_s} > 2 \cdot 880\pi \Rightarrow T_s < 880_s$$

$$\delta) x_5(t) = x_1(t) \cdot [x_2(t)]^2 + [x_1(t)]^2 * x_2(t)$$

$$X_5(\omega) = F[x_1(t) \cdot [x_2(t)]^2] + F[[x_1(t)]^2 * x_2(t)]$$

$$\omega = \max\{\omega_1 + 2\omega_2, \min\{2\omega_1, \omega_2\}\} =$$

$$= \max\{880\pi + 2000\pi, \min\{1760\pi, 1000\pi\}\} =$$

$$= \max\{2880\pi, 1000\pi\} = 2880\pi$$

$$\omega_s > 2\omega \Rightarrow \frac{2\pi}{T_s} > 2\omega \Rightarrow T_s < 2880_s$$

$$2.3) \omega_s = (2 + 7 \bmod 3) \omega_n = (2 + 1) \omega_n = 3 \omega_n$$

$$a) y_d[n] = \frac{x[n-1] - 2x[n] + x[n+1]}{4} = \frac{1}{4} x[n-1] - \frac{1}{2} x[n] + \frac{1}{4} x[n+1]$$

$$Y_d[0] = \frac{1}{4} e^{-j0} X_d[0] - \frac{1}{2} X_d[0] + \frac{1}{4} e^{j0} X_d[0] \Rightarrow$$

$$\frac{Y_d[0]}{X_d[0]} = \frac{1}{2} \left( \frac{e^{-j0} + e^{j0}}{2} - 1 \right) = \frac{1}{2} (\cos 0 - 1)$$

$$H_d[0] = \frac{1}{2} (\cos 0 - 1)$$

$$h_d[n] = F^{-1}[H_d[0]] = \frac{1}{4} F^{-1}[e^{-j0} + e^{j0}] - \frac{1}{2} F^{-1}[1] =$$

$$= \frac{1}{4} \delta[n-1] + \frac{1}{4} \delta[n+1] - \frac{1}{2} \delta[n] =$$


$$= \frac{\delta[n-1] - 2\delta[n] + \delta[n+1]}{4}$$

$$b) x_c(t) = \frac{\sin(\omega_m t)}{\pi t}, \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T_s} \Rightarrow T_s = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{2\pi}{3\omega_m}$$


$$x_p(t) = x_c(t) \cdot p(t) = \frac{\sin(\omega_m t)}{\pi t} \sum_n \delta(t - nT)$$

$$X_p[\omega] = X_c(\omega) * F \left[ \sum_n \delta(t - nT_s) \right] = X_c * \left[ \frac{1}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - m\omega_s) \right] =$$


$$= \frac{1}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} X_c(\omega - m\omega_s) = \frac{3\omega_m}{2\pi} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} X_c(\omega - m\omega_s)$$




$$X_d\left(\frac{\omega}{T_s}\right) = X_p\left(\frac{\omega}{T_s}\right) = X_p\left(\frac{3\omega_m}{2\pi} \cdot \frac{\omega}{T_s}\right)$$



$$\begin{aligned} Y_d[\omega] &= \frac{1}{4} e^{j\omega} X_d[\omega] - \frac{1}{2} X_d[\omega] + \frac{1}{4} e^{-j\omega} X_d[\omega] = \\ &= \frac{X_d[\omega]}{2} \left( \frac{e^{-j\omega} + e^{j\omega}}{2} - 1 \right) = \frac{X_d[\omega]}{2} (\cos \omega - 1) \end{aligned}$$




$$Y_d[\underline{0}] = Y_p\left(\frac{0}{T_s}\right) \Rightarrow Y_p(\omega) = Y_d[\omega T_s] = Y_d\left[\omega \cdot \frac{2\pi}{3\omega_H}\right]$$



$$H_r(\omega) = \begin{cases} T, & |\omega| < \frac{\omega_s}{2} = \frac{3\omega_H}{2} \\ 0, & |\omega| > \frac{\omega_s}{2} = \frac{3\omega_H}{2} \end{cases}$$

$$Y_c(\omega) = Y_p(\omega) \cdot H_r(\omega) = \begin{cases} \frac{2\pi}{3\omega_H} \cdot Y_p(\omega), & |\omega| < \frac{3\omega_H}{2} \\ 0, & |\omega| > \frac{3\omega_H}{2} \end{cases}$$



$$\begin{aligned} 8) H_c(\omega) &= \frac{Y_c(\omega)}{X_c(\omega)} = \frac{Y_p(\omega) \cdot H_r(\omega)}{X_c(\omega)} = \frac{Y_d(\omega T_s) H_r(\omega)}{X_c(\omega)} = \\ &= \frac{X_d(\omega T_s) H_d(\omega T_s) H_r(\omega)}{X_c(\omega)} = \frac{X_p(\omega) H_d(\omega T_s) H_r(\omega)}{X_c(\omega)} = \frac{H_d(\omega T_s) \cdot X_c(\omega)}{X_c(\omega)} = H_d(\omega T_s) \end{aligned}$$

Eno für  $H_c(\omega) = \begin{cases} H_d(\omega T_s) & , |\omega| \leq \frac{\pi}{T_s} = \frac{\pi}{\frac{2\pi}{3\omega_M}} = \frac{3\omega_M}{2} \Rightarrow \\ 0 & , |\omega| > \frac{3\omega_M}{2} \end{cases}$

$$H_c(\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left( \cos\left(\frac{2\pi}{3} \cdot \frac{\omega}{\omega_M}\right) - 1 \right) & , |\omega| \leq \frac{3\omega_M}{2} \\ 0 & , |\omega| > \frac{3\omega_M}{2} \end{cases}$$

2.4) a)  $x_1[n] = 7^n \sin[\pi(n+1)/3] \cos[\pi(n+1)/6] u[n] =$

$$= \frac{7^n}{2} \cdot \left( \sin \frac{\pi}{2}(n+1) + \sin \frac{\pi}{6}(n+1) \right) u[n] =$$

$$= \frac{7^n}{2} \left[ \frac{e^{j\frac{\pi}{2}(n+1)} - e^{-j\frac{\pi}{2}(n+1)}}{2j} + \frac{e^{j\frac{\pi}{6}(n+1)} - e^{-j\frac{\pi}{6}(n+1)}}{2j} \right] u[n] =$$

$$= \frac{7^n}{4} \left( \cancel{j} e^{j\frac{\pi}{2}n} + \cancel{j} e^{-j\frac{\pi}{2}n} + \frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{1}{2}\right) e^{j\frac{\pi}{6}n} - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2}\right) e^{-j\frac{\pi}{6}n}}{j} \right) u[n] =$$

$$= \frac{7^n}{4} \left( e^{j\frac{\pi}{2}n} + e^{-j\frac{\pi}{2}n} + \frac{\sqrt{3}}{2j} (e^{j\frac{\pi}{6}n} - e^{-j\frac{\pi}{6}n}) + \frac{1}{2} (e^{j\frac{\pi}{6}n} + e^{-j\frac{\pi}{6}n}) \right) u[n]$$

$$= \frac{7^n}{4} \left( 2\cos \frac{\pi}{2}n + \sqrt{3}\sin \frac{\pi}{6}n + \cos \frac{\pi}{6}n \right) u[n] =$$

$$= \frac{1}{2} 7^n \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) u[n] + \frac{\sqrt{3}}{4} 7^n \sin\left(\frac{\pi}{6}n\right) u[n] + \frac{1}{4} 7^n \cos\left(\frac{\pi}{6}n\right) u[n]$$

$$X_1(z) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - [7\cos \frac{\pi}{2}]z^{-1}}{1 - 2[7\cos \frac{\pi}{2}]z^{-1} + 7^2 z^{-2}} + \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{[7\sin \frac{\pi}{6}]z^{-1}}{1 - [2 \cdot 7\cos \frac{\pi}{6}]z^{-1} + 7^2 z^{-2}} +$$



$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{4} \cdot \frac{1 - [7 \cos \frac{\pi}{6}] z^{-1}}{1 - [2 \cdot 7 \cos \frac{\pi}{6}] z^{-1} + 7^2 z^{-2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + (\frac{7}{z})^2} + \frac{\sqrt{3}}{4z} \cdot \frac{\frac{7}{z}}{1 - 7\sqrt{3} z^{-1} + (\frac{7}{z})^2} + \\
& + \frac{1}{4} \cdot \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2z}}{1 - \frac{7\sqrt{3}}{z} + (\frac{7}{z})^2} = \frac{z^2}{2(z^2 + 7^2)} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{7z}{z^2 - 7\sqrt{3}z + 7^2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{\frac{z^2 - 7\sqrt{3}}{z}}{\frac{z^2 - 7\sqrt{3}z + 7^2}{z^2}} = \\
& = \frac{z^2}{2(z^2 + 7^2)} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{7z}{z^2 - 7\sqrt{3}z + 7^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{z(z^2 - 7\sqrt{3})}{z^2 - 7\sqrt{3}z + 7^2} = \\
& = \frac{z^2}{2(z^2 + 7^2)} + \frac{7\sqrt{3} + z^2 - 7\sqrt{3}}{2(z^2 - 7\sqrt{3}z + 7^2)} = z^2 \cdot \frac{z^2 + 7^2 - 7\sqrt{3} + z^2 + 2 \cdot 7^2}{2(z^2 + 7^2)(z^2 - 7\sqrt{3}z + 7^2)} = \\
& = z^2 \cdot \frac{3z^2 - 7\sqrt{3}z + 3 \cdot 7^2}{2(z^2 + 7^2)(z^2 - 7\sqrt{3}z + 7^2)} = z^2 \cdot \frac{3z^2 - 7\sqrt{3}z + 147}{2(z^2 + 49)(z^2 - 7\sqrt{3}z + 49)}, |z| > 7
\end{aligned}$$

$$b) x_2[n] = n 7^{-|n|} = n 7^{-n} u[n] + n 7^n u[-n]$$

$$X_2(z) = Z[x_2[n]] = Z[n 7^{-n} u[n]] + Z[n 7^n u[-n]] =$$

$$= Z\left[n \left(\frac{1}{7}\right)^n u[n]\right] - \underbrace{Z\left[-n \left(\frac{1}{7}\right)^n u[-n]\right]}_{\text{χρονική αντιστροφή}} =$$

$$= \frac{\frac{1}{7} \cdot z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{7} z^{-1}\right)^2} - \frac{\frac{1}{7} (z^{-1})^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{7} (z^{-1})^{-1}\right)^2} = \frac{\frac{1}{7z}}{\left(1 - \frac{1}{7z}\right)^2} - \frac{\frac{z}{7}}{\left(1 - \frac{z}{7}\right)^2} =$$

$$= \frac{\frac{1}{7z}}{\frac{(7z-1)^2}{(7z)^2}} - \frac{\frac{z}{7}}{\frac{(7-z)^2}{7^2}} = \frac{7z}{(7z-1)^2} - \frac{7z}{(7-z)^2} =$$

$$= 7z \cdot \frac{(7-z-7z+1)(7-z+7z-1)}{(7-z)^2(7z-1)^2} = 7z \cdot \frac{(7+1)(1-z)(7-1)(1+z)}{(7-z)^2(7z-1)^2} = 7z \cdot \frac{48(1-z^2)}{(7-z)^2(7z-1)^2} =$$

$$= \frac{336z(1-z^2)}{(7-z)^2(7z-1)^2}, |z| > \frac{1}{7}, \quad \left|\frac{1}{z}\right| > \frac{1}{7} \Rightarrow |z| < 7$$

Also  $\frac{1}{7} < |z| < 7$

$$\begin{aligned} 8) \quad x_3[n] &= \frac{n}{7^n} \sin\left[\frac{\pi n}{3} + \frac{\pi}{4}\right] u[n] = \\ &= \frac{n}{7^n} \left[ \sin\left(\frac{\pi n}{3}\right) \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi n}{3}\right) \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right] u[n] = \\ &= \frac{n}{7^n} \left[ \frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(\frac{\pi n}{3}\right) + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos\left(\frac{\pi n}{3}\right) \right] u[n] = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[ \frac{n}{7^n} \left( \sin\left(\frac{\pi n}{3}\right) + \cos\left(\frac{\pi n}{3}\right) \right) \right] u[n] = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[ n(7^{-1})^n \sin\left(\frac{\pi n}{3}\right) u[n] + n(7^{-1})^n \cos\left(\frac{\pi n}{3}\right) u[n] \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X_3(z) &= \frac{\sqrt{2}}{2} Z \left[ n(7^{-1})^n \sin\left(\frac{\pi n}{3}\right) u[n] + n(7^{-1})^n \cos\left(\frac{\pi n}{3}\right) u[n] \right] = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[ -z \frac{d}{dz} \left[ \frac{(7^{-1})^n \sin\left(\frac{\pi n}{3}\right) u[n]}{dz} \right] - z \frac{d}{dz} \left[ \frac{(7^{-1})^n \cos\left(\frac{\pi n}{3}\right) u[n]}{dz} \right] \right] = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[ -z \cdot \frac{d}{dz} \left( \frac{7^{-1} \sin\frac{\pi}{3} z^{-1}}{1 - 2 \cdot 7^{-1} \cos\frac{\pi}{3} z^{-1} + 7^{-2} z^{-2}} \right) - z \frac{d}{dz} \left( \frac{1 - 7^{-1} \cos\frac{\pi}{3} z^{-1}}{1 - 2 \cdot 7^{-1} \cos\frac{\pi}{3} z^{-1} + 7^{-2} z^{-2}} \right) \right] = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[ -z \frac{d}{dz} \left( \frac{\frac{\sqrt{3}}{2 \cdot 7 \cdot z}}{1 - \frac{1}{7z} + \frac{1}{7^2 z^2}} \right) - z \frac{d}{dz} \left( \frac{1 - \frac{1}{2 \cdot 7 \cdot z}}{1 - \frac{1}{7z} + \frac{1}{7^2 z^2}} \right) \right] = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[ -z \frac{d}{dz} \left( \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 7z}{49z^2 - 7z + 1} \right) - z \frac{d}{dz} \left( \frac{\frac{14z-1}{2 \cdot 7z}}{\frac{7^2 z^2 - 7z + 1}{7^2 z^2}} \right) \right] = \end{aligned}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[ -z \frac{d}{dz} \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{7z}{49z^2 - 7z + 1} \right) - z \frac{d}{dz} \left( \frac{1}{2} \cdot \frac{7z(14z-1)}{49z^2 - 7z + 1} \right) \right] =$$

$$= -\frac{7\sqrt{2}}{4} \left[ \sqrt{3} z \cdot \frac{49z^2 - 7z + 1 - z(98z - 7)}{(49z^2 - 7z + 1)^2} + \right. \\ \left. + z \cdot \frac{(28z-1)(49z^2 - 7z + 1) - (14z^2 - 1)(98z - 7)}{(49z^2 - 7z + 1)^2} \right] =$$

$$= -\frac{7\sqrt{2}}{4} \cdot z \left[ \sqrt{3} \frac{-49z^2 + 1}{(49z^2 - 7z + 1)^2} + \right. \\ \left. + \frac{\cancel{4 \cdot 7^3 z^3} - 4 \cdot 7^2 z^2 + 4 \cdot 7z - 7^2 z^2 + 7z - 1 - \cancel{4 \cdot 7^3 z^3} + 2 \cdot 7^2 z^2 + 2 \cdot 7z - 7}{(49z^2 - 7z + 1)} \right] =$$

$$= -\frac{7\sqrt{2}}{4} z \cdot \frac{-49\sqrt{3}z^2 + \sqrt{3} - 147z^2 + 133z - 8}{(49z^2 - 7z + 1)} =$$

$$= \frac{7\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{156z^3 - 133z^2 + (8 - \sqrt{3})z}{(49z^2 - 7z + 1)} \quad , |z| > \frac{1}{7}$$

$$d) \quad x_4[n] = \begin{cases} 7^n & , n < 0 \Rightarrow n \leq -1 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^n & , n = 0, 2, 4, \dots \\ \left(\frac{1}{3}\right)^n & , n = 1, 3, 5, \dots \end{cases}$$

$$x_4[n] = 7^n u[-n-1] + \left(\frac{1}{2}\right)^n \frac{\cos(n\pi) + 1}{2} u[n] + \left(\frac{1}{3}\right)^n \left[ \frac{\cos(n\pi) + 1}{2} - \cos(n\pi) \right] u[n] = \\ = 7^n u[-n-1] + \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot \frac{\cos(n\pi) + 1}{2} u[n] + \left(\frac{1}{3}\right)^n \cdot \frac{1 - \cos(n\pi)}{2} u[n] =$$

$$= -(-7^n u[-n-1]) + \left(\frac{1}{2}\right)^n \frac{\cos(n\pi) + 1}{2} u[n] + \left(\frac{1}{3}\right)^n \cdot \frac{1 - \cos(n\pi)}{2} u[n] =$$

$$= -(-7^n u[-n-1]) + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos(n\pi) u[n] + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] +$$

$$+ \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n \cos(n\pi) u[n]$$

$$X_4(z) = -Z[-7^n u[-n-1]] + \frac{1}{2} Z\left[\left(\frac{1}{2}\right)^n \cos(n\pi) u[n]\right] + \frac{1}{2} Z\left[\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]\right] +$$

$$+ \frac{1}{2} Z\left[\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]\right] - \frac{1}{2} Z\left[\left(\frac{1}{3}\right)^n \cos(n\pi) u[n]\right] =$$

$$= -\frac{1}{1-7z^{-1}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \frac{1}{2} \cos n \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cdot \frac{1}{2} \cos n \cdot z^{-1} + \frac{1}{4} z^{-2}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{3} z^{-1}} -$$

$$- \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \frac{1}{3} \cos n z^{-1}}{1 - 2 \cdot \frac{1}{3} \cos n z^{-1} + \frac{1}{9} z^{-2}} = -\frac{z}{z-7} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{2z+1}{2z}}{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4z^2}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2z}{2z-1} +$$

$$+ \frac{1}{2} \cdot \frac{3z}{3z-1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{3z+1}{3z}}{1 + \frac{2}{3z} + \frac{1}{9z^2}} =$$

$$= \frac{z}{7-z} + \frac{z(2z+1)}{4z^2+4z+1} + \frac{z}{2z-1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3z}{3z-1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3z(3z+1)}{9z^2+6z+1} =$$

$$= \frac{z}{7-z} + \frac{z}{2z+1} + \frac{z}{2z-1} + \frac{1}{2} \left( \frac{3z}{3z-1} - \frac{3z}{3z+1} \right) =$$

$$= \frac{z}{7-z} + z \cdot \frac{2z-1+2z+1}{4z^2-1} + \frac{3z}{2} \left( \frac{3z+1-3z-1}{9z^2-1} \right) =$$

$$= \frac{z}{7-z} + \frac{4z^2}{4z^2-1} + \frac{3z}{9z^2-1}, \quad |z| < 7 \text{ and } |z| > \frac{1}{2} \text{ and } |z| > \frac{1}{3} \Rightarrow$$

$$\boxed{\frac{1}{2} < |z| < 7}$$

2.5) a)  $X_1(z) = \frac{z-3}{z^2-2z+2}$ ,  $x_1[n]$  airtazı

$$X_1(z) = \frac{z-3}{z^2-2\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\sqrt{2}z+(\sqrt{2})^2}$$

$$\phi = \frac{\pi}{4}, r = \sqrt{2} \quad x[n] = (\sqrt{2})^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)u[n]$$

$$X(z) = \frac{1 - \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} z^{-1} + (\sqrt{2})^2 \cdot z^{-2}} = \frac{\frac{z-1}{z}}{\frac{z^2-2z+2}{z^2}} = \frac{z^2-z}{z^2-2z+2} =$$

$$= \frac{z^2-2z+2+z-2}{z^2-2z+2} = 1 + \frac{z-2}{z^2-2z+2}$$

$$x[n] = (\sqrt{2})^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)u[n]$$

$$X(z) = \frac{\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} z^{-1}}{1 - 2 \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} z^{-1} + 2z^{-2}} = \frac{z^{-1}}{\frac{z^2-2z+2}{z^2}} = \frac{z}{z^2-2z+2}$$

$$\frac{z-3}{z^2-2z+2} = a \left( 1 + \frac{z-2}{z^2-2z+2} \right) + b \cdot \frac{z}{z^2-2z+2} + \gamma \Rightarrow$$

$$z-3 = a z^2 - 2az + 2a + a z - 2a + b z + \gamma z^2 - 2\gamma z + 2\gamma \Rightarrow$$

$$z-3 = (a+\gamma)z^2 + (b-a-2\gamma)z + 2\gamma$$

$$a+\gamma=0 \Rightarrow, \quad 2\gamma=-3 \Rightarrow, \quad b-a-2\gamma=1 \Rightarrow$$

$$a=-\gamma=\frac{3}{2} \quad \gamma=-\frac{3}{2} \quad b=2\gamma+a+1=-3+\frac{3}{2}+1=-\frac{1}{2}$$

logu xparhikimzas:

Apa  $x_1[n] = \frac{3}{2}(\sqrt{2})^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)u[n] - \frac{1}{2}(\sqrt{2})^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)u[n] - \frac{3}{2}\delta[n]$

b)  $X_2(z) = \frac{z + 2z^{-1}}{z^2 + 4}, |z| > 2$

$$X_2(z) = \frac{z^{-1} + 2z^{-3}}{1 + 4z^{-2}} = \frac{z^{-1}}{1 + 4z^{-2}} + \frac{2z^{-3}}{1 + 4z^{-2}} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2z^{-1}}{1 + 4z^{-2}} + \frac{2z^{-1}}{1 + 4z^{-2}} \cdot z^{-2}, \quad \frac{0}{2} = \frac{\pi}{2}, r=2, m=2$$

$$x_2[n] = \frac{1}{2} \cdot 2^n \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)u[n] + 2^n \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)u[n] * \delta[n-2] =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2^n \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)u[n] + 2^{n-2} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}(n-2)\right)u[n-2] =$$

$$= 2^{n-1} \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)u[n] - 2^{n-2} \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)u[n-2] =$$

$$= 2^{n-1} \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) \left[ u[n] - \frac{u[n-2]}{2} \right] =$$

$$= 2^{n-1} \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) \cdot \frac{2u[n] - u[n-2]}{2} =$$

$$= 2^{n-2} \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) (2u[n] - u[n-2])$$

γ)  $X_3(z) = \frac{7z^2 + 4z}{z^3 + z^2 - 4z - 4}, |z| < 1$

$$X_3(z) = \frac{7z^2 + 4z}{z^2(z+1) - 4(z+1)} = \frac{7z^2 + 4z}{(z+1)(z-2)(z+2)}$$

$$\frac{7z^2+4z}{(z+1)(z+2)(z-2)} = \frac{A}{z+1} + \frac{B}{z+2} + \frac{\Gamma}{z-2} \Rightarrow$$

$$7z^2+4z = A(z^2-4) + B(z+1)(z-2) + \Gamma(z+1)(z+2) \Rightarrow$$

$$7z^2+4z = Az^2 - 4A + Bz^2 - Bz - 2B + \Gamma z^2 + 3\Gamma z + 2\Gamma \Rightarrow$$

$$7z^2+4z = (A+B+\Gamma)z^2 + (3\Gamma-B)z + 2\Gamma-4A-2B$$

$$A+B+\Gamma=0 \Rightarrow A+2-3A+2-A=0 \Rightarrow \boxed{A = 4/3}$$

$$3\Gamma-B=4 \Rightarrow B=3\Gamma-4 \Rightarrow B=6A+3B-4 \Rightarrow 2B=4-6A \Rightarrow$$

$$2\Gamma-4A-2B=0 \Rightarrow \Gamma=2A+B=2A+2-3A=2-A \quad B=2-3A$$

$$\boxed{\begin{matrix} B=2-4=-2 \\ \Gamma=2/3 \end{matrix}}$$

$$X_3(z) = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{z+1} - 2 \cdot \frac{1}{z+2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{z-2} =$$

$$= \frac{4}{3} \cdot \frac{z^{-1}}{1+z^{-1}} - 2 \cdot \frac{z^{-1}}{1+2z^{-1}} + \frac{2}{3} \cdot \frac{z^{-1}}{1-2z^{-1}} =$$

$$= \frac{4}{3} \left( 1 - \frac{1}{1+z^{-1}} \right) - \left( 1 - \frac{1}{1+2z^{-1}} \right) + \frac{1}{3} \left( -1 + \frac{1}{1-2z^{-1}} \right) =$$

$$= \frac{4}{3} - \cancel{1} - \frac{1}{3} - \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{1+z^{-1}} + \frac{1}{1+2z^{-1}} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-2z^{-1}}$$

$$x_3[n] = -\frac{4}{3} \left( -(-1)^n u[-n-1] \right) - (-2)^n u[-n-1] + \frac{1}{3} 2^n u[-n-1] =$$

$$= \frac{4(-1)^n - 3(-2)^n + 2^n}{3} \cdot u[-n-1]$$

Therefore,  $|z| < |-1| = 1$  and  $|z| < |-2| = 2$  and  $|z| < |2| = 2$   
 $\forall \rho_a \quad |z| < 1$

$$d) X_4(z) = \frac{z^3(5z+1)}{(z+1)(z^2-z-3)}, \quad 1 < |z| < 3$$

$$X_4(z) = \frac{5z^4 + z^3}{z^3 - z^2 - 5z - 3} \quad \begin{array}{r} \cancel{5z^4} + z^3 + 0z^2 + 0z + 0 \\ - \cancel{5z^4} + 5z^3 + 25z^2 + 15z \\ \hline 6z^3 + 25z^2 + 15z \\ - \cancel{6z^3} + 6z^2 + 30z + 18 \\ \hline 31z^2 + 45z + 18 \end{array} \quad \begin{array}{r} z^3 - z^2 - 5z - 3 \\ 5z + 6 \end{array}$$

$$X_4(z) = \frac{(5z+6)(z^3-z^2-5z-3)}{z^3-z^2-5z-3} + \frac{31z^2+45z+18}{z^3-z^2-5z-3} = 5z+6 + \frac{31z^2+45z+18}{(z+1)^2(z-3)}$$

$$\frac{31z^2+45z+18}{(z+1)^2(z-3)} = \frac{A}{z+1} + \frac{B}{(z+1)^2} + \frac{\Gamma}{z-3} \Rightarrow$$

$$31z^2+45z+18 = Az^2 - 2Az - 3A + Bz - 3B + \Gamma z^2 + 2\Gamma z + \Gamma \Rightarrow$$

$$31z^2 + 45z + 18 = (A + \Gamma)z^2 + (B + 2\Gamma - 2A)z - 3A - 3B + \Gamma$$

$$A + \Gamma = 31 \Rightarrow \Gamma = 31 - A$$

$$\left. \begin{array}{l} B + 2(\Gamma - A) = 45 \Rightarrow B + 2(31 - 2A) = 45 \Rightarrow 4A = B + 62 - 45 = B + 17 \\ \Gamma - 3(A + B) = 18 \Rightarrow 31 - A - 3A - 3B = 18 \Rightarrow 4A = -3B + 13 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$B + 17 = -3B + 13 \Rightarrow 4B = -4 \Rightarrow \boxed{B = -1}$$

$$A = \frac{-1 + 17}{4} = \frac{16}{4} = \boxed{4}$$

$$\Gamma = 31 - 4 = \boxed{27}$$



$$X_4(z) = 5z + 6 + \frac{4}{z+1} - \frac{1}{(z+1)^2} + \frac{27}{z-3} =$$

$$= 5z^{-(-1)} + 6 + \frac{4}{z-(-1)} + \frac{-1}{(z-(-1))^2} + 27 \cdot \frac{z^{-1}}{1-3z^{-1}} =$$

$$= 5z^{-(-1)} + 6 + \frac{4}{z-(-1)} + \frac{-1}{(z-(-1))^2} + 9 \cdot \left( -1 + \frac{1}{1-3z^{-1}} \right) =$$

$$= 5z^{-(-1)} - 3 + \frac{4}{z-(-1)} + \frac{-1}{(z-(-1))^2} + 9 \cdot \frac{1}{1-3z^{-1}}$$

$$x_4[n] = 5\delta[n+1] - 3\delta[n] + 4(-1)^{n-1}u[n-1] + (n-1)(-1)^{n-1}u[n-1] -$$

$$- 9 \cdot 3^n u[-n-1] =$$

$$= 5\delta[n+1] - 3\delta[n] + (n+3)(-1)^{n-1}u[n-1] - 3^{n+2}u[-n-1]$$

$$\text{Region of convergence } \left. \begin{array}{l} |z| > |-1| = 1 \\ |z| < |3| = 3 \end{array} \right\} \Rightarrow 1 < |z| < 3$$

$$2.7) x[n] = \delta[n] + 2\delta[n-2]$$

$$a) X[k] = \sum_{n=0}^5 x[n] e^{-j\frac{2\pi}{6}kn} =$$

$$= \sum_{n=0}^4 e^{-j\frac{2\pi}{6}kn} (\delta[n] + 2\delta[n-2]) =$$

$$= 1 + 0 + 2e^{-j\frac{4\pi}{6}k} + 0 + 0 + 0 = 1 + 2e^{-j\frac{2\pi}{3}k}$$

$$X[0] = 1 + 2 = 3$$

$$X[1] = 1 + 2e^{-j\frac{2\pi}{3}} = 1 + 2\left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -j\sqrt{3}$$

$$X[2] = 1 + 2e^{-j\frac{4\pi}{3}} = 1 + 2\left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = j\sqrt{3}$$

$$X[3] = 1 + 2e^{-j2\pi} = 1 + 2 = 3$$

$$X[4] = 1 + 2e^{-j\frac{8\pi}{3}} = 1 + 2e^{-j\frac{2\pi}{3}} = -j\sqrt{3}$$

$$X[5] = 1 + 2e^{-j\frac{10\pi}{3}} = 1 + 2e^{-j\frac{4\pi}{3}} = j\sqrt{3}$$

$$b) Z[k] = e^{j\frac{k2\pi}{6}} \cdot X[k] = e^{j\frac{k2\pi}{6}} \left[ 1 + 2e^{-j\frac{4\pi}{6}k} \right] =$$

$$= e^{j\frac{2\pi k}{6}} + 2e^{-j\frac{2\pi k}{6}}$$

$$z[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} z[k] e^{j\frac{2\pi}{N}kn} =$$

$$= \frac{1}{6} \sum_{k=0}^5 \left[ e^{j\frac{2\pi k}{6}} + 2e^{-j\frac{2\pi k}{6}} \right] e^{j\frac{2\pi k}{6}n} =$$


$$= \frac{1}{6} \sum_{k=0}^5 \left[ e^{j\frac{\pi k}{3}} + 2e^{-j\frac{\pi k}{3}} \right] e^{j\frac{\pi k}{3}n} =$$

$$= \frac{1}{6} \left[ 3 + (e^{j\frac{\pi}{3}} + 2e^{-j\frac{\pi}{3}})e^{j\frac{\pi}{3}n} + (e^{j\frac{2\pi}{3}} + 2e^{-j\frac{2\pi}{3}})e^{j\frac{2\pi}{3}n} + \right. \\ \left. + (e^{j\pi} + 2e^{-j\pi})e^{j\pi n} + (e^{j\frac{4\pi}{3}} + 2e^{-j\frac{4\pi}{3}})e^{j\frac{4\pi}{3}n} + (e^{j\frac{5\pi}{3}} + 2e^{-j\frac{5\pi}{3}})e^{j\frac{5\pi}{3}n} \right] =$$

$$= \frac{1}{6} \left[ 3 + \left( \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} + 2\frac{1}{2} - 2j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) e^{j\frac{\pi}{3}n} + \left( -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} - 2\frac{1}{2} - j2\frac{\sqrt{3}}{2} \right) e^{j\frac{2\pi}{3}n} + \right. \\ \left. + (-1-2)(-1)^n + \left( -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} - 2\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 \right) e^{j\frac{4\pi}{3}n} + \left( \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} + 2\frac{1}{2} + 2j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) e^{j\frac{5\pi}{3}n} \right] =$$

$$= \frac{1}{6} \left[ 3(1+(-1)^{n+1}) + \left( \frac{3}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) e^{j\frac{\pi}{3}n} - \left( \frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) e^{j\frac{2\pi}{3}n} + \left( \frac{3}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) (-1)^{n+1} e^{j\frac{\pi}{3}n} + \right. \\ \left. - \left( \frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) (-1)^{n+1} e^{j\frac{2\pi}{3}n} \right] = \frac{1}{6} \left[ 3(1+(-1)^{n+1}) + \left( \frac{3}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) e^{j\frac{\pi}{3}n} (1+(-1)^n) - \right. \\ \left. - \left( \frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) e^{j\frac{2\pi}{3}n} (1+(-1)^{n+1}) \right] = \frac{(1+(-1)^{n+1})}{6} \left[ 3 + \left( \frac{3}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) e^{j\frac{\pi}{3}n} - \left( \frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) e^{j\frac{2\pi}{3}n} \right]$$

8)



$$h[n] = \delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3] + \delta[n-4] + \delta[n-5]$$

$$H[k] = \sum_{n=0}^{N-1} h[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} =$$

$$= \sum_{n=0}^5 (\delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3] + \delta[n-4] + \delta[n-5]) e^{-j\frac{\pi}{3}kn} =$$

$$= e^{-j\pi k} + e^{-j\frac{2\pi}{3}k} + e^{-j\pi k} + e^{-j\frac{4\pi}{3}k} + e^{-j\frac{5\pi}{3}k} =$$

$$H[0] = 5, H[1] = e^{-j\frac{\pi}{3}} + e^{j\frac{\pi}{3}} + e^{-j\frac{2\pi}{3}} + e^{j\frac{2\pi}{3}} + e^{-j\pi} = 1 - 1 - 1 = -1$$

$$H[2] = e^{-j\frac{2\pi}{3}} - e^{-j\frac{\pi}{3}} + e^{-j2\pi} + e^{-j\frac{2\pi}{3}} - e^{-j\frac{\pi}{3}} = 2(e^{-j\frac{2\pi}{3}} - e^{-j\frac{\pi}{3}}) + 1 = 2(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}) + 1 = -1$$

$$H[3] = e^{-j\pi} + e^{-j2\pi} + e^{-j3\pi} + e^{-j4\pi} + e^{-j5\pi} = -1 + 1 - 1 + 1 - 1 = -1$$

$$H[4] = -e^{-j\frac{\pi}{3}} + e^{-j\frac{2\pi}{3}} + e^{-j4\pi} - e^{-j\frac{\pi}{3}} + e^{-j\frac{2\pi}{3}} = 2(e^{-j\frac{2\pi}{3}} - e^{-j\frac{\pi}{3}}) + 1 = -1$$

$$H[5] = e^{j\frac{2\pi}{3}} + e^{j\frac{\pi}{3}} + e^{-j5\pi} + e^{j\frac{2\pi}{3}} + e^{j\frac{\pi}{3}} = \frac{2 \cdot 1}{2} - \frac{2 \cdot 1}{2} - 1 = -1$$

$$F[k] = X[k] \cdot H[k]$$

$$F[0] = 3 \cdot 5 = 15$$

$$F[3] = 3 \cdot (-1) = -3$$

$$F[1] = -j\sqrt{3} \cdot (-1) = j\sqrt{3}$$

$$F[4] = -j\sqrt{3} \cdot (-1) = j\sqrt{3}$$

$$F[2] = j\sqrt{3} \cdot (-1) = -j\sqrt{3}$$

$$F[5] = j\sqrt{3} \cdot (-1) = -j\sqrt{3}$$

$$f[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} F[k] e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \frac{1}{6} \sum_{k=0}^5 F[k] e^{j\frac{\pi}{3}kn} =$$

$$= \frac{1}{6} [15 + j\sqrt{3} e^{j\frac{\pi}{3}n} - j\sqrt{3} e^{j\frac{2\pi}{3}n} - 3e^{j\pi n} + j\sqrt{3} e^{j\frac{4\pi}{3}n} - j\sqrt{3} e^{j\frac{5\pi}{3}n}] =$$

$$= \frac{1}{6} [15 + 3(-1)^{n+1} + j\sqrt{3} (e^{j\frac{\pi}{3}n} + e^{j\pi n} e^{j\frac{\pi}{3}n} - e^{j\frac{2\pi}{3}n} - e^{j\pi n} e^{j\frac{2\pi}{3}n})] =$$

$$= \frac{1}{6} [15 + 3(-1)^{n+1} + j\sqrt{3} (e^{j\frac{\pi}{3}n} (1 + (-1)^n) - e^{j\frac{2\pi}{3}n} (1 + (-1)^n))] =$$

$$= \frac{1}{6} [3(5 + (-1)^{n+1}) + j\sqrt{3} (1 + (-1)^n) (e^{j\frac{\pi}{3}n} - e^{j\frac{2\pi}{3}n})]$$

$$f[0] = \frac{1}{6} [3 \cdot 4 + j2\sqrt{3} \cdot (1 - 1)] = 2$$

$$f[1] = \frac{1}{6} [3 \cdot 6 + j\sqrt{3} \cdot 0] = 3$$

$$f[2] = \frac{1}{6} [3 \cdot 4 + j2\sqrt{3} (e^{j\frac{2\pi}{3}} - e^{j\frac{4\pi}{3}})] = 2 + j\frac{\sqrt{3}}{3} \left( -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) =$$

$$= 2 - \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{3} = 1$$

$$f[3] = \frac{1}{6} [3 \cdot 6 + j\sqrt{3} \cdot 0] = 3$$

$$f[4] = \frac{1}{6} [3 \cdot 4 + j2\sqrt{3} (e^{j\frac{4\pi}{3}} - e^{j\frac{8\pi}{3}})] = 2 + j\frac{\sqrt{3}}{3} \left( -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) =$$

$$= 2 + \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{3} = 3$$

$$f[5] = \frac{1}{6} [3 \cdot 6 + j\sqrt{3} \cdot 0] = 3$$

$$d) G[k] = X[k]H[k] \Rightarrow g[n] = x[n] \otimes h[n]$$

$$g[n] = x[n] \otimes h[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m] h[n-m]_N =$$

$$= \sum_{m=0}^7 x[m] h[n-m]_8 =$$

$$h[n] = \begin{cases} 1, & n=1,2,3,4,5 \\ 0, & \text{all other} \end{cases}$$

$$g[0] = \sum_{m=0}^7 x[m] h[-m] = 0$$

$$g[1] = \sum_{m=0}^7 x[m] h[1-m] = x[0] = 1$$

$$g[2] = \sum_{m=0}^7 x[m] h[2-m] = x[0] + x[1] = 1 + 0 = 1$$


$$g[3] = \sum_{m=0}^7 x[m] h[3-m] = x[0] + x[1] + x[2] = 1 + 0 + 2 = 3$$

$$g[4] = \sum_{m=0}^7 x[m] h[4-m] = x[0] + x[1] + x[2] + x[3] = 1 + 0 + 2 + 0 = 3$$

$$g[5] = \sum_{m=0}^7 x[m] h[5-m] = x[0] + \cancel{x[1]} + x[2] + \cancel{x[3]} + \cancel{x[4]} = 3$$

$$g[6] = \sum_{m=0}^7 x[m] h[6-m] = \cancel{x[0]} + x[2] + \cancel{x[3]} + \cancel{x[4]} + \cancel{x[5]} = 2$$

$$g[7] = \sum_{m=0}^7 x[m] h[7-m] = x[2] + \cancel{x[3]} + \cancel{x[4]} + \cancel{x[5]} + \cancel{x[6]} = 2$$



$$\begin{aligned} \varepsilon) \quad y[n] &= x[n] * h[n] = (\delta[n] + 2\delta[n-2]) * (u[n-1] - u[n-6]) = \\ &= \delta[n] * u[n-1] - \delta[n] * u[n-6] + 2\delta[n-2] * u[n-1] - 2\delta[n-2] * u[n-6] = \\ &= u[n-1] - u[n-6] + 2u[n-3] - 2u[n-8] = \\ &= \delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3] + \delta[n-4] + \delta[n-5] + 2(\delta[n-3] + \delta[n-4] + \\ &\quad + \delta[n-5] + \delta[n-6] + \delta[n-7]) = \\ &= \delta[n-1] + \delta[n-2] + 3\delta[n-3] + 3\delta[n-4] + 3\delta[n-5] + 2\delta[n-6] + 2\delta[n-7] \end{aligned}$$

$$y[n] \equiv g[n] \neq f[n]$$