



CONFÉRENCE INTERAFRICAINNE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE **C.I.P.R.E.S**

TABLEAUX DE LA LISTE DES MALADIES PROFESSIONNELLES HARMONISEE DE LA ZONE CIPRES



CONTRÔLE - ASSISTANCE - FORMATION - HARMONISATION

Bien gérer pour mieux assurer

TABLEAUX DE LA LISTE DES MALADIES PROFESSIONNELLES HARMONISEE DE LA ZONE CIPRES

PREAMBULE

Au lendemain de leur accession à l'indépendance dans les années 60, la quasi-totalité des pays d'Afrique francophone de l'ouest et du centre, se sont dotés de législations propres en matière de prévoyance sociale, inspirées pour la plupart, du modèle français mais ayant pour fondement les Conventions n° 102 et n° 121 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), qui fixent respectivement, les normes minimales d'un système de sécurité sociale et les différentes prestations à servir en cas d'Accident du Travail ou de Maladies Professionnelles.

Les organismes mis en place, pour gérer les régimes de prévoyance sociale dans les Etats membres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), se sont vu confier la gestion d'au moins une des branches suivantes : les branches des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles, ainsi que de Vieillesse, d'Invalidité et de Décès.

Si le cadre juridique des branches des prestations familiales et des prestations de vieillesse, d'Invalidité et de décès a connu, dans certains pays, des réformes généralement paramétriques au fil du temps, celui des risques professionnels au contraire, demeure dans une léthargie au sein de la grande majorité des pays, notamment en ce qui concerne la liste des maladies professionnelles dont l'actualisation et/ou l'enrichissement sont à peine perceptibles. Il en résulte que nombre de maladies à caractère professionnel ou contractées pendant ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle, n'ouvrent pas droit à la prise en charge par tous les Organismes de Prévoyance Sociale, du fait de leur absence dans les listes officielles des maladies arrêtées.

Par ailleurs, les rapports des différentes missions d'audit et de contrôle des organismes membres de la CIPRES sur les branches de prestations sociales gérées, ont régulièrement pointé du doigt cette situation et ont particulièrement relevé plusieurs insuffisances dans le cadre de la gestion des risques professionnels, notamment :

- la caducité et le caractère très restreint des listes des maladies professionnelles ou listes de référence
- l'absence ou insuffisance des textes réglementaires dans certains pays ;
- la disparité des listes des maladies professionnelles au sein des Etats membres de la CIPRES ;
- l'absence quasi générale d'actualisation régulière des textes et des listes régissant les maladies professionnelles au regard des mutations environnementales, économiques et sociales ;
- l'absence de dispositifs de reconnaissance de maladies à caractère professionnel ;
- l'inadaptation des principes et règles régissant la réparation des victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- la faiblesse du taux de redistribution des cotisations sociales de la branche des Risques Professionnels.

De ces insuffisances, on peut s'interroger sur la dimension des conséquences de la non prise en charge des victimes de maladies non désignées dans les tableaux. Et, ces conséquences qui peuvent être d'ordres humain, social ou économique tant pour la victime, sa famille que pour son pays constituent une préoccupation majeure pour la CIPRES.

Aussi, en 2010, les Etats membres de la CIPRES se sont lancés dans un vaste projet novateur d'actualisation et d'harmonisation des textes de base, en vue de renforcer le cadre régissant la gestion des risques professionnels et d'améliorer les conditions de prise en charge des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans l'espace CIPRES.

A cet effet, un Comité restreint d'Experts constitué des Inspecteurs du Travail relevant de la tutelle, des Médecins-Conseil, des Médecins du Travail et des Responsables en charge de la gestion des risques professionnels au sein des Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) des Etats membres de la CIPRES a été mis en place. Sous la supervision du Secrétaire Exécutif de la CIPRES, **Monsieur Innocent MAKOUNBOU**, ce comité a été chargé d'élaborer la liste actualisée des maladies professionnelles ainsi que le barème de référence pour l'indemnisation des séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles harmonisés de la zone CIPRES.

La liste des maladies professionnelles actualisée et harmonisée de référence CIPRES s'est inspirée pour l'essentiel, de celles des textes de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ainsi que des listes existantes au sein des organismes de prévoyance sociale de la zone CIPRES.

A l'issue d'un processus laborieux, le projet de liste actualisée et harmonisée des maladies professionnelles a été adopté par le Conseil des Ministres de tutelle de la prévoyance sociale des Etats membres de la CIPRES lors de la 26ème session ordinaire tenue à Genève (Suisse), en juin 2018, en marge des Assemblées annuelles de l'OIT.

La Décision n° 521/CM/CIPRES du 1^{er} juin 2018 a été prise à cet effet pour son application effective dans les Etats membres de la Conférence.

Si l'adoption des tableaux de la liste des maladies professionnelles marque le couronnement de plusieurs années de travail ardu, elle ouvre également de nouvelles perspectives et se positionne comme un facteur de motivation et d'incitation à poursuivre sur d'autres projets en cours.

Comme toute œuvre humaine, cet outil est perfectible et nous restons ouverts aux contributions pertinentes éventuelles de tous en vue de son renforcement.

La CIPRES remercie tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage, à divers titres ; il s'agit notamment de :

- Docteur BABYLAS NDIAYE Marième Marianne, Médecin-Conseil National de Caisse de Sécurité Sociale du Sénégal ;
- Docteur TOURE Abou Médecin-Conseil National de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Côte d'Ivoire ;
- Docteur ELLA ASSA Christiane Yvonne, Directeur Général Adjoint de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Gabon ;
- Docteur HAÏDARA Alpha Youssouf, Médecin-Conseil de l'Institut National de Prévoyance Sociale du Mali ;
- Docteur WAMBA Guillaume, Médecin-Conseil National de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du Cameroun ;
- Docteur BADJINA MOUDOUA Firmine, Médecin-Conseil de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Gabon ;
- Docteur MATALI Edgard, Médecin-Conseil de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Congo ;
- Docteur AWUME Komi Edem, Médecin-Conseil de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Togo ;
- Docteur FAYE LABO Rokhaya, Médecin-Conseil de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Niger ;

Messieurs :

- DAGA Jean Versir, Directeur des Prestations de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Bénin ;
- NGOMO MENIE Romaric, Directeur des Prestations Techniques de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Gabon
- SORRO Rodrigue José, Chef de service des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Centrafrique ;
- ZOUNGRANA Martin, Ingénieur Sécurité et Hygiène Industrielles, Inspecteur du Travail de la Direction Générale de la Protection Sociale du Burkina Faso ;

Pour le compte du Secrétariat Exécutif de la CIPRES, les Inspecteurs régionaux:

Madame

OUATTARA ADJARATOU Djiré ;

Messieurs

SYNG YABE Barnabas ; MBAMA Fidèle ; NGUEBEMANDJI Robert.

INTRODUCTION

L'actualisation et l'harmonisation de la liste des maladies professionnelles des Etats membres de la CIPRES sont réalisées conformément à la recommandation n°25, relative aux dispositions applicables à la gestion technique des branches dans les Organismes de Prévoyance Sociale de la CIPRES, adoptée par le Conseil des Ministres de tutelle de la Prévoyance Sociale en février 2005.

En effet, l'application du principe général en matière de réparation des risques professionnels, selon lequel, est considérée comme maladie professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées audit tableau, oblige à l'actualisation régulière de la liste des maladies professionnelles pour tenir compte des évolutions scientifiques continues dans ce domaine.

Le travail du Comité restreint prévu à cet effet a permis l'adoption de la liste des maladies professionnelles actualisée et harmonisée des Etats membres de la CIPRES.

Cette liste vient assurément combler les grandes insuffisances préjudiciables aux assurés sociaux victimes des maladies à caractère professionnel, constatées au sein des Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres. La mise à jour périodique de cette liste, telle que prévue par les dispositions de l'article 182 de la Recommandation n°25, sera autant importante en ce sens qu'elle comblera le retard constaté dans la révision régulière des tableaux de maladies professionnelles par chaque Etat membre de la CIPRES.

Cette liste est mise à la disposition des Etats membres en vue de sa mise en application par les organismes en charge de la gestion des risques professionnels.

1. CLASSIFICATION DES TABLEAUX SELON LES TYPES D'AGENTS CAUSALS

(Chimiques, Physiques, Biologiques-Infectieux-Parasitaires et Autres)

1.1. Groupe des pathologies d'origine chimique

	Réf CIPRES	Réf BIT	AGENTS CAUSALS/PATHOLOGIES	Pages
Tableau n°1	1.1.1	3.1.1	L'amiante	14
Tableau n°2	1.1.2	1.1.41	Les amines aliphatiques, alicycliques	15
Tableau n°3	1.1.3	1.1.41	Les amines aromatiques et leurs dérivés hydroxylés, halogénés, nitrosés, nitrés et sulfonés	16
Tableau n°4	1.1.4	1.1.23	Les aminoglycosides	17
Tableau n°5	1.1.5	1.1.20	L'antimoine et ses dérivés	17
Tableau n°6	1.1.6	1.1.6	L'arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés	18
Tableau n°7	1.1.7	1.1.1	Le béryllium et ses composés toxiques	19
Tableau n°8	1.1.8	1.1.12	Le Benzène et ses composés	19
Tableau n°9	1.1.9	1.1.13	Les nitrés et chloronitrés des carbures benzéniques	20
Tableau n°10	1.1.10	1.1.23	Les bétalactamines	21
Tableau n°11	1.1.11	1.1.2	Le cadmium et ses composés toxiques	21
Tableau n°12	1.1.12	1.1.41	Le tétrachlorure de carbone	22
Tableau n°13	1.1.13	1.1.23	La chlorpromazine	22
Tableau n°14	1.1.14	1.1.4	L'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins	23
Tableau n°15	1.1.15	1.1.41	Le ciment	24
Tableau n°16	1.1.16	1.1.41	Le cobalt et ses composés	24
Tableau n°17	1.1.17	2.1.6	Le coton (byssinose)	25
Tableau n°18	1.1.18	1.1.35	Les isocyanates organiques	26
Tableau n°19	1.1.19	1.1.10	Le disulfure de carbone	26
Tableau n°20	1.1.20	1.1.41	Les enzymes	27
Tableau n°21	1.1.21	1.1.41	Le tétrachloréthane	27
Tableau n°22	1.1.22	1.1.9	Le fluor et ses composés toxiques	28
Tableau n°23	1.1.23	1.1.41	L'aldéhyde formique et ses polymères	28
Tableau n°24	1.1.24	1.1.41	Le fluorure double de glucinium et de sodium	28
Tableau n°25	1.1.25	1.1.15	Les nitrés des glycols et du glycérol	29
Tableau n°26	1.1.26	1.1.41	L'halothane	29
Tableau n°27	1.1.27	1.1.21	L'hexane	29
Tableau n°28	1.1.28	1.1.41	Les goudrons de houille, brais de houille et huiles anthracéniques	29
Tableau n°29	1.1.29	1.1.11	Les hydrocarbures aliphatiques	32
Tableau n°30	1.1.30	1.1.11	Les hydrocarbures aromatiques	33
Tableau n°31	1.1.31	1.1.41	L'hydrogène arsénié	34
Tableau n°32	1.1.32	1.1.39	Le latex	34
Tableau n°33	1.1.33	1.1.41	Les lubrifiants et les fluides de refroidissement	35
Tableau n°34	1.1.34	1.1.5	Le manganèse et ses composés toxiques	36
Tableau n°35	1.1.35	1.1.7	Le mercure et ses composés toxiques	36
Tableau n°36	1.1.36	1.1.41	Le bromure de méthylène	38
Tableau n°37	1.1.37	1.1.41	Le chlorure de méthyle	38

	Réf CIPRES	Réf BIT	AGENTS CAUSALS/PATHOLOGIES	Pages
Tableau n°38	1.1.38	1.1.14	La nitroglycérine et les autres esters de l'acide nitrique	39
Tableau n°39	1.1.39	1.1.36	Les organophosphorés et les carbamates	39
Tableau n°40	1.1.40	1.1.41	L'oxyde de carbone	40
Tableau n°41	1.1.41	1.1.41	Le pétrole	40
Tableau n°42	1.1.42	1.1.13	Les nitrés du phénol	42
Tableau n°43	1.1.43	1.1.41	La phénylhydrazine	43
Tableau n°44	1.1.44	1.1.3	Les phosphates, pyrophosphates	43
Tableau n°45	1.1.45	1.1. 3	Le phosphore et le sesquisulfure de phosphore	44
Tableau n°46	1.1.46	1.1.8	Le plomb et ses composés	44
Tableau n°47	1.1.47	2.1.5	Les poussières des métaux durs	45
Tableau n°48	1.1.48	1.1.41	Les résines époxydiques et leurs constituants	46
Tableau n°49	1.1.49	1.1.27	Le sélénium et ses dérivés minéraux	46
Tableau n°50	1.1.50	2.1.1	La silice libre	47
Tableau n°51	1.1.51	1.1.41	Le chlorure de sodium dans les mines de sels et leurs dépendances	48
Tableau n°52	1.1.52	1.1.36	Le thiophosphate de diéthyle et paranitrophényle	48
Tableau n°53	1.1.53	3.1.7	Le chlorure de vinyle	48

1.2. Groupe de pathologies d'origine physique

	Réf CIPRES	Réf BIT	AGENTS CAUSALS/PATHOLOGIES	Pages
Tableau n°54	1.2.1	1.2.1	Le Bruit	49
Tableau n°55	1.2.2	1.2.3	La pression en milieu hyperbare et hypobare	51
Tableau n°56	1.2.3	1.2.4	Les Rayonnements ionisants	52
Tableau n°57	1.2.4	1.2.6	Les Rayonnements thermiques	52
Tableau n°58	1.2.5	1.2.5	Les Rayons X, les substances radioactives naturelles et artificielles	53
Tableau n°59	1.2.6	1.2.6	La Haute température	53
Tableau n°60	1.2.7	1.2.2	Les Vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils, objets	54

1.3 Groupe de pathologies d'origine biologique - infectieuse - Parasitaire

	Réf CIPRES	Réf BIT	AGENTS CAUSALS/PATHOLOGIES	Pages
Tableau n°61	1.3.1	1.3.11	Les Amibes	55
Tableau n°62	1.3.2	1.3.9	L'Ankylostomose professionnelle	55
Tableau n°63	1.3.3	1.3.5	Les Bacilles tuberculeux	56
Tableau n°64	1.3.4	1.3.1	Les Brucelloses professionnelles	57
Tableau n°65	1.3.5	1.3.7	Le Charbon professionnel	58
Tableau n°66	1.3.6	1.3.9	Le Foin moisi ou les produits végétaux moisiss	58
Tableau n°67	1.3.7	1.3.2	Les Hépatites virales professionnelles	59
Tableau n°68	1.3.8	1.3.9	Les Maladies professionnelles contractées en milieu hospitalier et de laboratoire	61
Tableau n°69	1.3.9	2.2.4	Les Kératoconjunctivites virales d'origine professionnelle	63
Tableau n°70	1.3.10	1.3.8	Les Leptospiroses professionnelles	63
Tableau n°71	1.3.11	1.3.9	Les Mycoses cutanées d'origine professionnelle	64
Tableau n°72	1.3.12	1.3.9	L'Onchocercose professionnelle	64
Tableau n°73	1.3.13	1.3.9	Les Pasteurelloses	65
Tableau n°74	1.3.14	1.3.9	La Poliomyélite professionnelle	65
Tableau n°75	1.3.15	1.2.7	Les Poussières aviaires	65
Tableau n°76	1.3.16	1.3.9	La Rage professionnelle	66
Tableau n°77	1.3.17	1.3.8	La Spirochétose ictéro-hémorragique professionnelle	66
Tableau n°78	1.3.18	1.3.9	Le Streptococcus	68
Tableau n°79	1.3.19	1.1.23	La Streptomycine et ses sels	68
Tableau n°80	1.3.20	1.3.4	Le Tétanos professionnel	69
Tableau n°81	1.3.21	1.3.9	La Tularemie professionnelle	69

2. PATHOLOGIES PROFESSIONNELLES AFFECTANT DES FONCTIONS ET ORGANES CIBLES

2.1. Pathologies de l'appareil respiratoire

	Réf CIPRES	Réf BIT	AGENTS CAUSALS/PATHOLOGIES	Pages
Tableau n°82	2.1.1	3.1.14	Le Mécanisme allergique	70
Tableau n°83	2.1.2	2.1.8	Les Poussières de bois	72
Tableau n°84	2.1.3	2.1.7	Les Rhinites et Asthmes professionnels	73
Tableau n°85	2.1.4	2.1.4	Les Sidéroses professionnelles	75

2.2. Pathologies de la peau

	Réf CIPRES	Réf BIT	AGENTS CAUSALS/PATHOLOGIES	Pages
Tableau n°86	2.2.1	2.2.1	Les Eczémas de contact allergique	76

2.3. Troubles musculo-squelettiques

	Réf CIPRES	Réf BIT	AGENTS CAUSALS/PATHOLOGIES	Pages
Tableau n°87	2.3.1	2.3.8	Troubles Musculo-Squelettiques (T M S)	77

3. Autres Agents

	Réf CIPRES	Réf BIT	AGENTS CAUSALS/PATHOLOGIES	Pages
Tableau n°88	3.1	4.1	Nystagmus professionnel	78

TABLEAUX DE REFERENCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES

1. CLASSIFICATION DES TABLEAUX SELON LES TYPES D'AGENTS CAUSALS

(Chimiques, Physiques, Biologiques-Infectieux-Parasitaires et Autres)

Tableau n° 1: L'Amiante

DESIGNATION DES MALADIES	DELAÏ DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------------	--

A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. <i>Complications</i> : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. B. Lésions pleurales bénignes : avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : - Pleurésie exsudative ; - Plaques pleurales plus ou moins calcifiées bilatérales, pariétales, diaphragmatiques ou médiastinales ; - Plaques péricardiques - Epaissements pleuraux bilatéraux, avec ou sans irrégularités diaphragmatiques. C. Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées. D. Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde E. Autres tumeurs pleurales primitives.	35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans) 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) 40 ans 40 ans 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) 40 ans 40 ans	Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiantes, notamment : - Extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. - Manipulation et utilisation de l'amiantes brut dans les opérations de fabrication suivantes : - Amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiantes - enduit ; feuilles et joints en amiantes ; garnitures de friction contenant de l'amiantes ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiantes et isolants. Travaux de cardage, filage tissage d'amiantes et confection de produits contenant de l'amiantes. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiantes : amiantes projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiantes ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiantes, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiantes. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiantes. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiantes.
---	---	--

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 1(suite): L'Amiante

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
F.Cancer broncho-pulmonaire Cancer broncho-pulmonaire primitif.	35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)	LISTE LIMITATIVE Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpage et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

Tableau n° 2 : Les Amines aliphatiques et alicycliques

(Affections provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques, éthanolamines ou l'isophoronédiamine)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Dermites eczématiformes confirmées par des tests épicutanés ou par la récurrence à une nouvelle exposition Rhinite récidivante en cas de nouvelle exposition au risque confirmée par un test Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.	15 jours 7 jours 7 jours	Préparation, emploi et manipulation des amines aliphatiques, alicycliques ou des éthanolamines ou de produits en contenant à l'état libre ou de l'isophoronediamine.

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 3 : Les Amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés hydroxylés, halogénés, nitrosés nitrés et sulfonés
(Affections professionnelles provoquées par les amines aromatiques, leurs sels, leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés, sulfonés, les produits qui en contiennent à l'état libre et par la nitroso-dibutylamine et ses sels).

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------	--

A – Dermites eczématiformes récidivantes après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test positif au produit manipulé.	15 jours	A- Utilisation des amines aromatiques, de leurs sels, de leurs dérivés et des produits qui en contiennent à l'état libre, tels que matières colorantes, produits pharmaceutiques, agents de conservation (caoutchouc, élastomères, plastomères), catalyseurs de polymérisation, graisses et huiles minérales.
Asthme ou Hyper réactivité bronchique confirmés par tests ou par épreuves fonctionnelles respiratoires, récidivant après nouvelle exposition.	7 jours	
B- Lésions primitives de l'épithélium vésical confirmées par examen histo-pathologique ou cyto-pathologique : - Lésions malignes ; - Tumeurs bénignes.	30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)	B- Fabrication, emploi manipulation exposant à des produits comportant l'apparition à l'état libre des substances limitativement énumérées ci-après : - 4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ; - 4,4diaminobiphényle et sels (benzidine) ; - 2-naphtylamine et sels ; - 4,4-méthylène bis (2 chloroaniline) et sels (MBOCA dite MOCA).
C- Lésions primitives de l'épithélium vésical confirmées par examen histo-pathologique ou cyto-pathologique : - Lésions malignes ; - Tumeurs bénignes.	30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)	C- Fabrication, emploi manipulation exposant à des produits comportant l'apparition à l'état libre des substances limitativement énumérées ci-après : - 3,3diméthoxybenzidine et sels (o.dianisidine) ; - 3,3diméthylbenzidine et sels (o.tolidine) ; - 2-méthyl aniline et sels (o.toluidine) ; - 4,4méthylène dis (2 – méthylaniline) et ses sels (ditolylbase) ; Para chloro ortho toluidine et sels ; Auramide (qualité technique) ; Colorants dérivés de la benzidine : direct black 38, direct blue 6, direct Brown 95 ; N.Nitroso-dibutylamine et ses sels
D–Troubles neurologiques à type de somnolence, narcose, coma.	3 jours	
Cyanose, subictère.	10 jours	
Hémoglobininurie lorsque ces maladies comportent une hémolyse et une méthémoglobinémie (en dehors des cas considérés comme accidents du travail).	10 jours	
Dermites irritatives	7 jours	D- Préparation, emploi, manipulation des amines aromatiques, de leurs sels, de leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrosés, nitrés et sulfonés.

Tableau n° 4 : Les Aminoglycosides

(Maladies professionnelles engendrées par les aminoglycosides, notamment par la streptomycine, la néomycine et leurs sels.)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Lésions eczématiformes récidivantes en cas de nouvelle exposition ou confirmées par un test épicutané.	15 jours	Travaux comportant la manipulation ou l'emploi d'aminoglycosides, notamment la streptomycine, la néomycine et leurs sels.

Tableau n° 5 : L'Antimoine et ses dérivés

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Stibiose : pneumopathie caractérisée par des signes radiographiques spécifiques accompagnés ou non de troubles tels que toux, expectoration, dyspnée.	5 ans	Travaux exposant à l'inhalation de poussières, fumées ou vapeur d'antimoine, notamment :
Lésions eczématiformes récidivantes en cas de nouvelle exposition au risque	15 jours	- travaux de forage, d'abattage, d'extraction des minerais renfermant de l'antimoine - concassage, broyage, tamisage, manipulation de minerais renfermant de l'antimoine - travaux de purification, grillage, réduction thermique et oxydation de minerais ou de substances renfermant l'antimoine - brassage et ensachage d'oxyde d'antimoine

Tableau n°6 : L'Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A – Affections professionnelles provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux a. Intoxication aiguë : - Insuffisance circulatoire, trouble du rythme, arrêt circulatoire ; - Vomissement, diarrhée, syndrome de cytolyse hépatique ; - Encéphalopathie ; - Troubles de l'hémostase ; - Dyspnée aiguë.	7 jours	LISTE INDICATIVE Tous travaux exposant à la manipulation ou à l'inhalation d'arsenic ou de ses composés minéraux, notamment : - traitement pyro-métallurgique de minerais arsenicaux ; - traitement pyro-métallurgique de métaux non ferreux arsenicaux ; - fabrication ou emploi de pesticides arsenicaux ; - emploi de composés minéraux arsenicaux dans le travail du cuir, en verrerie, en électronique.
b. Effets caustiques : - Dermite de contact orthoergique, plaies arsenicales ; - Stomatite, rhinite, ulcération ou perforation de la cloison nasale. - Conjonctivite, kératite, blépharite.	7 jours	
c. Intoxication subaiguë : - Polynévrites ; - Mélanodermie ; - Dyskératoses palmo-plantaires.	90 jours	
d. Affections cancéreuses : - Dyskératose lenticulaire en disque (maladie de Bowen) - Epithélioma cutané primitif ; - Angiosarcome du foie	40 ans	LISTE LIMITATIVE Travaux de pyro-métallurgie exposant à l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales.
B – Cancer bronchique provoqué par l'inhalation de poussières et de vapeurs arsenicales - Cancer bronchique primitif.	40 ans	Travaux de fabrication et de conditionnement de l'anhydride arsénieux. Fabrication de pesticides arsenicaux à partir de composés inorganiques pulvérulents de l'arsenic.

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 7 : Le béryllium et ses composés toxiques

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Manifestations locales - Conjonctivites aiguës ou récidivantes. - Dermites aiguës ou récidivantes.	5 jours 5 jours	Travaux exposant au béryllium et à ses composés notamment : - broyage et traitement du minerai de béryllium (béryl) ;
B. Manifestations générales Broncho-pneumopathie aiguë ou subaiguë diffuse avec apparition retardée de signes radiologiques le plus souvent discrets.	30 jours	- fabrication et usinage du béryllium, de ses alliages et de ses combinaisons ;
Fibrose pulmonaire diffuse avec signes radiologiques, troubles fonctionnels et signes généraux (amaigrissement, fatigue), confirmée par des épreuves fonctionnelles respiratoires, y compris les complications cardiaques (insuffisance ventriculaire droite) et les complications pleuropulmonaires secondaires (pneumothorax spontané).	25 ans	- fabrication et utilisation de poudres à base de sels de béryllium destinées au revêtement intérieur des tubes à fluorescence

Tableau n° 8 : Le benzolisme professionnel et affections provoquées

(Affections professionnelles provoquées par le benzène, le toluène, le xylène et tous les produits en renfermant.)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------	--

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 8(suite) : Le benzolisme professionnel et affections provoquées

(Affections professionnelles provoquées par le benzène, le toluène, le xylène et tous les produits en renfermant.)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
B – Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, toluène, xylène et les produits en renfermant Troubles gastro-intestinaux apyrétiques accompagnés de vomissements à répétition.	7 jours	- production, manipulation et emploi des dissolutions de caoutchouc naturel ou synthétique, ou des solvants d'avivage contenant du benzène ; - autres emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage et comme décapant, dissolvant ou diluant ; - opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu comme agent d'extraction, d'élution, de séparation, d'imprégnation, d'agglomération, de nettoyage, de concentration, et comme décapant, dissolvant, diluant ; - emploi du benzène comme déshydratant des alcools et autres substances liquides ou solides ; - emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de laboratoire
C- Manifestations aiguës (coma, convulsions) en dehors des cas considérés comme accidents du travail	7 jours	

Tableau n° 9 : Les nitrés et chloronitrés des carbures benzéniques

(Intoxications professionnelles par les dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Manifestations consécutives à l'intoxication subaiguë ou chronique (cyanose, anémie, subictère).	1 an	Préparation, emploi, manipulation des dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques, notamment : - fabrication des dérivés nitrés et chloronitrés du benzène et de ses homologues ; - fabrication des dérivés aminés (aniline et homologues) et de certaines matières colorantes ; - préparation et manipulation d'explosifs. Sont exclues les opérations effectuées à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale.
Accidents aigus (coma) en dehors des cas considérés comme accidents du travail.	30 jours	
Dermites chroniques ou récidivantes causées par les dérivés chloro-nitrés	30 jours	

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 10 : Les bêtalactamines

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Lésions eczématiformes récidivantes en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par un test épicutané	15 jours	Travaux comportant la préparation ou l'emploi des bêtalactamines (notamment pénicillines et leurs sels) ou des céphalosporines notamment : - travaux de conditionnement - application de traitements.
Rhinite récidivante en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test	7 jours	
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test	7 jours	

Tableau n° 11 : Le Cadmium et ses composés toxiques

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Broncho-pneumopathie aigue.	5 jours	LISTE INDICATIVE Extraction, préparation, emploi du cadmium, de ses alliages et de ses composés, notamment : - Préparation du cadmium par « voie sèche » ou électrométallurgique du zinc - Découpage au chalumeau ou soudure de pièces cadmiées Soudure avec alliage de cadmium Fabrication d'accumulateurs au nickel-cadmium Fabrication de pigments cadmifères, pour peinture, émaux, matières plastiques.
Troubles gastro-intestinaux aigus, avec nausée, vomissements ou diarrhées.	3 jours	
Néphropathie avec protéinurie.	2 ans	
Ostéomalacie avec ou sans fractures spontanées, accompagnée ou non de manifestations douloureuses, radiologiquement confirmée.	12 ans	
Cancer broncho pulmonaire primitif	40ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)	LISTE LIMITATIVE liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : - fabrication d'accumulateurs et de piles électriques au nickel- cadmium - récupération de matières métalliques recyclables

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 12 : Le tétrachlorure de carbone

(Intoxication professionnelle par le tétrachlorure de carbone)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Néphrite aiguë ou subaiguë avec albuminurie, cylindrurie et azotémie progressive.	30 jours	Préparation, emploi, manipulation du tétrachlorure de carbone ou des produits en renfermant, notamment : - emploi du tétrachlorure de carbone comme dissolvant, en particulier pour l'extraction des matières grasses et pour la teinture dégraissage. - remplissage et utilisation des extincteurs au tétrachlorure du carbone.
Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérigène ou non.	30 jours	
Ictère par hépatite , initialement apyrétique	30 jours	
Dermites chroniques ou récidivantes.	7 jours	
Troubles neurologiques aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail.	3 jours	

Tableau n° 13 : La chlorpromazine

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Lésions eczématiformes récidivantes en cas de nouvelle exposition ou confirmées par test épicutané	15 jours	Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de la chlorpromazine, notamment : - travaux de conditionnement de la chlorpromazine ; - application des traitements à la chlorpromazine.
Conjonctivite aiguë bilatérale	7 jours	

Tableau n° 14 : L'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins

(Affections professionnelles provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins ou alcalino terreux ainsi que par le chromate de zinc et le sulfate de chrome)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A – Affections provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome Ulcérations nasales. Ulcérations cutanées et dermites eczématiformes chroniques ou récidivantes.	 30 jours 30 jours	LISTE INDICATIVE Préparation, emploi, manipulation de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins, du chromate de zinc et du sulfate de chrome, notamment : - fabrication de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins ; - fabrication de pigments (jaune de chrome, etc) au moyen de chromates ou bichromates alcalins ; - emploi de bichromates alcalins dans le vernissage d'ébénisterie ; - emploi des chromates ou bichromates alcalins comme mordants en teinture ; - tannage au chrome ; - préparation, par procédés photomécaniques, de clichés pour impression ; - chromage électrolytique des métaux.
B – Affections respiratoires provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins Rhinite récidivante en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.	 7 jours 7 jours	LISTE LIMITATIVE Chromage électrolytique des métaux ; Fabrication, manipulation, emploi de chromates et bichromates alcalins

C – Affections cancéreuses provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins ou alcalino terreux et par le chromate de zinc		LISTE LIMITATIVE
Cancer broncho-pulmonaire primitif	30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)	Fabrication et conditionnement de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins. Fabrication du chromate de zinc
Cancer des cavités nasales	30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)	

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 15 : Le ciment

(Affections causées par les ciments : aluminosilicates de calcium)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
- Ulcérations, dermites primitives, pyodermes, dermites eczématiformes.	30 jours	- Fabrication, concassage, broyage, ensachage et transport des ciments.
- Blépharite	30 jours	- Fabrication, à l'aide de ciments, de matériaux agglomérés et d'objets moulés.
- Conjonctivite	30 jours	- Emploi des ciments dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics
- Fibrose interstitielle pulmonaire diffuse non régressive, d'apparence primitive. Cette affection doit être confirmée par un examen radiographique ou par tomodensitométrie en coupes millimétriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent.	35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 10 ans)	

Tableau n° 16 : Le cobalt et ses composés

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------	--

A- Lésions eczématiformes récidivantes en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par un test épicutané positif spécifique	15 jours	A- LISTE INDICATIVE Préparation, emploi et manipulation du cobalt et de ses composés.
Rhinite récidivante en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test spécifique	7 jours	
Asthme ou dyspnée asthmatiforme objectivé (e) par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test spécifique	7 jours	
Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique	1 an	
B-Syndrome respiratoire irritatif à type de toux et de dyspnée récidivant après nouvelle exposition au risque.	15 jours	
Broncho-alvéolite aiguë ou subaiguë avec signes généraux.	30 jours	B- LISTE LIMITATIVE - Fabrication et transformation des carbures métalliques frittés - Affutage d'outils ou pièces en carbure métalliques frittés - Fabrication et transformations des super alliages à base de cobalt - Rechargement et affûtage d'outils et pièces en superalliage à base de cobalt - Technique de soudage et de métallisation utilisant des superalliages à base de cobalt.
Fibrose pulmonaire diffuse avec signes radiologiques et troubles fonctionnels confirmés par l'exploration fonctionnelle respiratoire et ses complications : - Infection pulmonaire - Insuffisance ventriculaire droite	20 ans (sous réserve d'une exposition de 5 ans)	

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 16(suite) : Le cobalt et ses composés

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
C- Cancer broncho-pulmonaire primitif	35 ans (sous réserve d'une exposition de 5 ans minimum)	C- LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX Travaux exposant à l'inhalation associée de poussières de cobalt et de carbure de tungstène dans la fabrication des carbures métalliques à un stade avant frittage (mélange de poudres, compression, rectification et usinage du préfritté)

Tableau n° 17 : Le coton (byssinose)

(Affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A : Syndrome respiratoire obstructif aigu caractérisé par une oppression thoracique survenant habituellement après une interruption d'exposition au risque d'au moins 36 heures après la reprise de l'exposition au risque (byssinose et affections apparentées) Le caractère obstructif de ce syndrome doit être confirmé par des explorations fonctionnelles respiratoires pratiquées au moment de la reprise de l'exposition au risque et six à huit heures après B : Broncho-pneumopathie chronique obstructive consécutive à des épisodes respiratoires obstructifs aigus caractérisés cliniquement comme ci-dessus et répétitifs. Cette broncho-pneumopathie doit être confirmée par des explorations fonctionnelles respiratoires avec un volume expiratoire maximal par seconde (V.E.M.S) abaissé d'au moins 40% par rapport à la valeur moyenne théorique.	7 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) 5 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)	Travaux exposant à l'inhalation de poussières coton, lin, chanvre, sisal, dans les ateliers de : A- Teillage, B- Ouvraison C- Battage, D- Cardage, E- Etirage, F- Peignage, G- Bambrochage, H- Filage, I- Bobinage, J- Retordage, K- Ourdissage. Travaux identiques à ceux visés en A sous réserve qu'ils ne soient pas réalisés dans des ateliers où s'effectue uniquement le filage à bout libre (procédé dit « open end »).

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 18 : Les Isocyanates organiques

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Blépharo-conjonctivite récidivante	3 jours	Travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques, notamment : - fabrication et application de vernis et laques de polyuréthanes, fabrication de fibres synthétiques - préparation de mousses polyuréthanes et application de ces mousses à l'état liquide - fabrication et utilisation des colles à base de polyuréthanes - fabrication et manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques.
Rhinite récidivante en cas de nouvelle exposition au risque confirmée par test	7 jours	
Syndrome bronchique récidivant	7 jours	
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque confirmé par test	7 jours	
Lésions eczématiformes récidivantes en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.	15 jours	

Tableau n° 19 : Le disulfure de carbone

(Sulfocarbonisme professionnel)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------	--

Syndrome aigu neuro-digestif se manifestant par vomissements, gastralgies violentes, diarrhée avec délire et céphalée intense	30 jours	Préparation, manipulation, emploi du sulfure de carbone et des produits en renfermant, notamment la fabrication du sulfure de carbone et de ses dérivés ;
Troubles psychiques aigus avec confusion mentale, délire onirique		Préparation de la viscosse et toutes fabrications utilisant la régénération de la cellulose par décomposition de la viscosse, telles que fabrication de textiles artificiels et de pellicules cellulosiques ;
Troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et impulsions morbides		
Polynévrites et névrites, quel qu'en soit le degré, avec troubles des réactions électriques (notamment chronaximétriques)	1 an	Extraction du soufre, vulcanisation à froid du caoutchouc au moyen de dissolution de soufre ou de chlorure de soufre dans le sulfure de carbone ;
Névrite optique		Préparation et emploi des dissolutions du caoutchouc dans le sulfure de carbone ;
		Emploi du sulfure de carbone dissolvant de la gutta-percha, des résines, des cires, des matières grasses, des huiles essentielles et autres substances.

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 20 : Les Enzymes

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Lésions eczématiformes récidivantes en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par un test épicutané	15 jours	Préparation, manipulation des enzymes et des produits en renfermant notamment : O- extraction et purification des enzymes d'origine animale (trypsine) végétale (broméline, papaïne, ficine), bactérienne et fongique (préparés à partir des <i>Bacillus subtilis</i> , <i>aspergillus</i> , <i>orysae</i>) P- fabrication et conditionnement de détergent renferment des enzymes.
Ulcérations cutanées	7 jours	
Conjonctivite aigue bilatérale récidivante en cas de nouvelle exposition ou confirmée par test	7 jours	
Rhinite récidivante en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test	7 jours	
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test	7 jours	

Tableau n° 21 : Le tétrachloréthane

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Névrite ou polynévrite	30 jours	Préparation, emploi, manipulation du tétrachloréthane ou des produits en renfermant, notamment :
Ictère par hépatite , initialement apyrétique.	30 jours	
Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérogène ou non.	30 jours	Utilisation comme matière première dans l'industrie chimique, en particulier pour la fabrication du trichloréthylène ; Emploi comme dissolvant, en particulier de l'acétate de cellulose.
Dermites chroniques ou récidivantes.	7 jours	
Troubles neurologiques aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail	3 jours	

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 22 : Le Fluor et ses composés

DESIGNATION DES MALADIES	DELAÏ DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Manifestations locales aiguës - Dermites ; - Brûlures chimiques ; - Conjonctivites ; - Manifestations irritatives des voies aériennes supérieures ; Broncho-pneumopathies aiguës, œdème aigu du poumon ;	5 jours	Tous travaux mettant en contact avec le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux, notamment : - fabrication et manipulation des fluorures inorganiques ; - électrometallurgie de l'aluminium ; - fabrication des fluorocarbones ; - fabrication des superphosphates.
B. Manifestations chroniques Syndrome ostéoligamentaire douloureux ou non, comportant nécessairement une ostéocondensation diffuse et associé à des calcifications des ligaments sacro sciatiques ou des membranes interosseuses, radio cubitale ou obturatrice.	10 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 8 ans)	

Tableau n° 23 : L'Aldéhyde formique et ses polymères

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Ulcérations cutanées	7 jours	Préparation, emploi et manipulation de l'aldéhyde formique de ses solutions (formol) et de ses polymères, notamment : - fabrication de substances chimiques à partir de l'aldéhyde formique ; - fabrication de matières plastiques à base de formol - travaux de collage exécutés avec des matières plastiques renfermant un excès de formol - opération de désinfection Apprêtage de peaux ou de tissus.
Lésions eczématiformes récidivantes en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané	15 jours	
Rhinite récidivante en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test	7 jours	
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque confirmé par test.	7 jours	

Tableau n° 24 : Le Fluorure double de glucinium et de sodium

DESIGNATION DES MALADIES	DELAÏ DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------	--

Conjonctivites aiguës ou récidivantes	3 jours	Préparation, emploi et manipulation de fluorure de glucinium et de sodium, notamment :
Dermites aiguës ou récidivantes	3 jours	
		- fabrication du glucinium, de ses nium (béryl). - fabrication du glucinium, de ses alliages et de ses combinaisons

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 25 : Les nitrés des glycols et du glycérol

(Maladie résultant de l'exposition aux dérivés nitrés des glycols et du glycérol)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Douleurs précordiales à type d'angine de poitrine ; ischémie myocardique aigue , infarctus du myocarde survenant au cours d'une période de quatre jours suivant un arrêt de l'exposition à l'agent toxique	4 jours	Fabrication et conditionnement de la nitroglycérine et du nitroglycerol dans l'industrie des explosifs.

Tableau n° 26 : L'Halothane

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Hépatite ayant récidivé après nouvelle exposition et confirmée par des tests biochimiques, après exclusion d'une autre étiologie	15 jours	Activités exposant à l'halothane notamment en salles d'opération et d'accouchement.

Tableau n° 27 : L'Hexane

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Polynévrites avec trouble des réactions électriques	30 jours	Travaux de collage, notamment sur cuir ou matelas plastique avec des produits contenant de l'hexane

Tableau n° 28 : Les Goudrons de houille, brais de houille et huiles anthracéniques

(Affections professionnelles provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, comprenant les fractions de distillation dites « phénoliques », « naphthaléniques », « acénaphthéniques », « anthracéniques », et « chryséniques »), les brais de houille et les suies de combustion du charbon.)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES

A – Affections cutanées ou affections des muqueuses bénignes. - Dermites eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque. - Dermites photo-toxiques. - Conjonctivites photo-toxiques	7 jours	A- LISTE INDICATIVE Préparation, emploi et manipulation des goudrons, huiles et brais de houille et des produits en contenant, notamment dans : - Les cokeries ; - Les installations de distillations de goudrons de houille ; - La fabrication d'agglomérés de houille ; - La fabrication et l'utilisation de pâtes et revêtements carbonés notamment lors
--	-----------------------	--

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 28(suite) : Les Goudrons de houille, brais de houille et huiles anthracéniques
(Affections professionnelles provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, comprenant les fractions de distillation dites « phénoliques », « naphtaléniques », « acénaphténiques », « anthracéniques », et « chryséniques »), les brais de houille et les suies de combustion du charbon.)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------	--

A – Affections cutanées ou affections des muqueuses bénignes. - Dermites eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque. - Dermites photo-toxiques. - Conjonctivites photo-toxiques	7 jours	de la fabrication de l'aluminium selon le procédé à anode continue ; - La fabrication d'électrodes de carbone et de graphite ; - La fabrication de carbure et de siliciure de calcium ; - La sidérurgie, lors de l'utilisation des masses de bouchage ; - Les fonderies, lors des travaux de moulage et de noyautage, de coulée et de décochage ; - Les travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et de cheminées ; - Les travaux routiers ; - Le bâtiment, lors des travaux d'étanchéité, de revêtement de toitures ou terrasses et d'application de peintures au brai ou au goudron ; - L'imprégnation de briques réfractaires.
B – Affections cutanées malignes Epithélioma primitif de la peau	20 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)	B- LISTE LIMITATIVE Travaux comportant la manipulation et l'emploi des goudrons, huiles et brais de houille. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et de cheminées exposant aux suies de combustion du charbon.
C - Cancer broncho-pulmonaire primitif	30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)	C- LISTE LIMITATIVE Travaux du personnel de cokerie directement affecté à la marche et à l'entretien des fours. Travaux exposant habituellement à l'inhalation ou à la manipulation des produits précités : - dans les usines à gaz ; - lors de la fabrication de l'aluminium par électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg). Travaux de pose de joints à base de brais de houille Travaux de coulée en fonderie de fonte ou d'acier mettant en œuvre des « sables au noir » incorporant des brais ou des « noirs minéraux ».

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 28(suite) : Les Goudrons de houille, brais de houille et huiles anthracéniques

(Affections professionnelles provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, comprenant les fractions de distillation dites « phénoliques », « naphthaléniques », « acénaphténiques », « anthracéniques », et « chryséniques »), les brais de houille et les suies de combustion du charbon.)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
D -Tumeurs bénignes ou malignes de la vessie	30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)	Travaux de ramonage et d'entretien de chaudière et foyers à charbon et de leur cheminée ou conduits d'évacuation. Travaux comportant l'emploi et la manipulation des produits précités lors de la fabrication de l'aluminium par électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg). D- LISTE LIMITATIVE Travaux du personnel de cokerie directement affecté à la marche et à l'entretien des fours. La fabrication et l'utilisation de pâtes et revêtements carbonés notamment lors de la fabrication de l'aluminium selon le procédé à anode continue ; Travaux de ramonage et d'entretien de chaudière et foyers à charbon et de leur cheminée ou conduits d'évacuation.

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 29 : Les hydrocarbures aliphatiques

(Affections professionnelles provoquées par les dérivés halogénés suivants des hydrocarbures aliphatiques : Dichlorométhane (chlorure de méthylène), trichlorométhane (chloroforme), tribromométhane (bromoforme). Dichloro-1-2 éthane, trichloro-1-1-1-éthane (méthylchloroforme), dichloro-1-1-éthylène (dichloréthylène asymétrique), -dichloro-1-2-éthylène (dichloréthylène symétrique), trichloréthylène, tétrachloréthylène, perchloréthylène), dichloro-1-2-propane, chloropropylène (chlorure d'allyle), chloro-2-butadiène -1-3 (chloroprène))

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Troubles neurologiques aigus : - Syndrome ébrieux pouvant aller jusqu'à des manifestations psychiques délirantes ; - Syndrome narcotique pouvant aller jusqu'au coma avec ou sans convulsions ; - Névrite optique ; - Névrite trigéminal.	7 jours	Préparation, emploi, manipulation des produits précités (ou des préparations en contenant), notamment comme solvants ou matières premières dans l'industrie chimique, ainsi que dans les travaux ci-après : extraction des substances naturelles, décapage, dégraissage des pièces métalliques, des os, peaux et cuirs et nettoyage des vêtements et tissus
B. Troubles neurologiques chroniques : Syndrome associant troubles de l'équilibre, de la vigilance, de la mémoire.	90 jours	Préparation et application des peintures et vernis, des dissolutions et enduits de caoutchouc
C. Troubles cutanéomuqueux aigus : Dermo-épidermite aiguë irritative ou eczématiforme récidivant après nouvelle exposition au risque ; Conjonctivite aiguë	7 jours	Fabrication de polymères de synthèse [chloro-2-butadiène-1-3, dichloro-1-1-éthylène (dichloréthylène asymétrique)].
D. Troubles cutanéomuqueux chroniques : - Dermo-épidermite chronique irritative ou eczématiforme récidivant après nouvelle exposition au risque ; - Conjonctivite chronique	15 jours	Préparation et emploi du dibromo-1-2-éthane, en particulier dans la préparation des carburants.
E. Troubles hépatorénaux - Hépatite cytolytique, ictérique ou non, initialement apyrétique ; - Insuffisance rénale aiguë	7 jours	
F. Troubles cardio-respiratoires - Œdème pulmonaire ; - Troubles du rythme ventriculaire avec - possibilité de collapsus cardio-vasculaire.	7 jours	
G. Troubles digestifs Syndrome cholériforme apyrétique	7 jours	

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 30 : Les hydrocarbures aromatiques

(Affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Acné	30 jours	Préparation, emploi, manipulation, des chloronaphtalènes et des produits renfermant, notamment : - fabrication des chloronaphtalènes ; - fabrication de vernis, enduits, produits d'entretien, pâtes à polir, etc. à base de chloronaphtalènes ; - emploi des chloronaphtalènes comme isolants électriques en particulier dans la fabrication des condensateurs ; - préparation et emploi de lubrifiants de remplacement contenant des chloronaphtalènes.
Troubles neurologiques aigus causés par le mono chlorobenzène et le monobromobenzène.	7 jours	Préparation, emploi, manipulation des polychlorophényles, notamment : - emploi des polychlorophényles comme isolants électriques dans la fabrication et l'entretien des transformateurs et des condensateurs ; - emploi des polychlorophényles dans les systèmes caloporteurs et les systèmes hydrauliques.
Porphyrie cutanée tardive , causée par l'hexachlorobenzène, caractérisée par des lésions bulleuses favorisées par l'exposition au soleil et s'accompagnant d'élévation des uroporphyrines dans les urines.	60 jours	Préparation, emploi, manipulation des polybromobiphényles comme ignifugeants. Préparation, emploi, manipulation du chlorobenzène et du bromobenzène ou des produits en renfermant, notamment : - emploi du chlorobenzène comme agent de dégraissage, comme solvant de pesticides ou comme intermédiaire de synthèse. - emploi du bromobenzène comme agent de synthèse Préparation, emploi, manipulation de l'hexa chlorobenzène, notamment : - emploi de l'hexa chlorobenzène comme fongicide ; - manipulation de l'hexa chlorobenzène résiduel dans la synthèse des solvants chlorés.

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 31 : L'Hydrogène arsénié

(Intoxication professionnelle par l'hydrogène arsénié)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Hémoglobinurie.	15 jours	Travaux exposant aux émanations d'hydrogène arsénié, notamment : - traitement des minerais arsenicaux ; - préparation et emploi des arséniures métalliques ; - décapage des métaux ; détartrage des chaudières ; - gonflement des ballons avec de l'hydrogène impur.
Ictère avec hémolyse.	15 jours	
Néphrite azotémique.	30 jours	
Accidents aigus (coma), en dehors des cas considérés comme accidents du travail	3 jours	

Tableau n° 32 : Le latex

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Urticaire de contact ayant récidivé après nouvelle exposition au risque ou confirmé par un test	7 jours	Préparation, emploi et manipulation du latex naturel et des produits en renfermant, notamment : - production et traitement de latex naturel - fabrication et utilisation d'objets en latex naturel
Rhinite, Asthme, conjonctivite bilatérale ayant récidivé après nouvelle exposition au risque ou confirmé par test	7 jours	
Réactions allergiques systémiques telles que : urticaire géant, œdème de Quincke, choc anaphylactique, survenus à l'occasion d'une exposition au latex	3 jours	
Lésions eczématiformes ayant récidivé après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif	15 jours	

Groupe des pathologies d’origine chimique

Tableau n° 33 : Les lubrifiants et les fluides de refroidissement

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------------	--

A – Affections cutanées cancéreuses provoquées par les dérivés du pétrole	30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 10 ans)	Travaux d'usinage par enlèvement ou déformation de matière ou travaux de traitement des métaux et alliages comportant l'emploi d'huile minérale.
Epithéliomas primitifs de la peau		Travaux comportant la manipulation et l'emploi d'extraits aromatiques pétroliers utilisés notamment comme huiles d'extension, d'ensimage, de démoulage, à l'exclusion des polymérisas et des élastomères contenant des huiles d'extension
		Travaux de ramonage et de nettoyage de chaudières et de cheminées exposant aux suies de combustion de produits pétroliers.
B – Affections cutanées et respiratoires provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse	7 jours	Manipulation et emploi de ces huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse lors des travaux suivants :
Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail imprégnées d'huile ou de fluide).		Tournage, décolletage, fraisage, perçage, alésage, taraudage, filetage, sciage, rectification et, d'une façon générale, tous travaux d'usinage mécanique des métaux comportant l'emploi de ces produits :
Dermatoses d'irritation récidivantes après nouvelle exposition au risque.		Tréfilage, forgeage, laminage, trempe à l'huile dans l'industrie métallurgique ;
Dermites eczématiformes , récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test cutané positif au produit	15 jours	Travaux d'entretien, de réparation et de mise au point mécanique comportant l'emploi d'huiles de moteurs, d'huiles utilisées comme composants de fluides hydrauliques, de fluides hydrauliques et autres lubrifiants ;
Granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire;	1 mois	Travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage du béton ;
Insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire confirmé médicalement ou à une pneumopathie dont la relation avec l'huile minérale ou la paraffine est confirmée par la présence au sein des macrophages alvéolaires de vacuoles intra-cytoplasmiques prenant les colorations usuelles des lipides.	6 mois	Travaux comportant la pulvérisation d'huile minérale ; Travaux comportant l'emploi d'huiles d'extension dans l'industrie du caoutchouc, d'huiles d'ensimage de fibres textiles ou de fibres minérales, d'huiles de démoulage et d'encre grasses dans l'imprimerie. Travaux comportant la pulvérisation d'huiles minérales Travaux de paraffinage et travaux exposant à l'inhalation de brouillards d'huile minérale

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 34 : Le Manganèse et ses composés toxiques

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Syndrome neurologique de type parkinsonien.	1 an	Extraction, concassage, broyage, tamisage, ensachage et mélange à l'état sec du bioxyde de manganèse, notamment dans la fabrication des piles électriques. Emploi du bioxyde de manganèse pour le vieillissement des tuiles. Emploi du bioxyde de manganèse pour la fabrication du verre. Broyage et ensachage des scories Thomas renfermant du bioxyde de manganèse.

Tableau n° 35 : Le Mercure et ses composés toxiques

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------	--

Encéphalopathie aiguë	10 jours	Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du mercure, de ses amalgames, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment : distillation du mercure et récupération du mercure par distillation de résidus industriels ;
Tremblement intentionnel.	1 an	
Ataxie cérébelleuse.	1 an	
Stomatite.	30 jours	
Coliques et diarrhées	15 jours	Fabrication et réparation de thermomètres, baromètres, manomètre, pompes ou trompes à mercure.
Néphrite azotémique.	1 an	
Lésions eczématiformes récidivantes en cas de nouvelle exposition ou confirmées par un test épicutané.	15 jours	Emploi du mercure ou de ses composés dans la construction électrique, notamment : emploi des pompes ou trompes à mercure dans la fabrication des lampes à incandescence, lampes radiophoniques, ampoules radiographiques ; Fabrication et réparation de redresseurs de courant ou de lampes à vapeurs de mercure ; Emploi du mercure comme conducteur dans l'appareillage électrique ; Préparation du zinc amalgamé pour les piles électriques ; Fabrication et réparation d'accumulateurs électriques au mercure.

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 35(suite) : Le Mercure et ses composés toxiques

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Encéphalopathie aiguë	10 jours	Emploi du mercure et de ses composés dans l'industrie chimique, notamment :
Tremblement intentionnel.	1 an	Emploi du mercure ou de ses composés comme agents catalytique ;
Ataxie cérébelleuse.	1 an	Electrolyse avec cathode de mercure au chlorure de sodium ou autres sels.
Stomatite.	30 jours	Fabrication des composés du mercure.
Coliques et diarrhées	15 jours	Préparation, conditionnement et application de spécialités pharmaceutiques ou phyto-pharmaceutiques contenant du mercure ou des composés du mercure.
Néphrite azotémique.	1 an	Travail des peaux au moyen de sel de mercure, notamment : - secrétage des peaux par le nitrate acide de mercure, feutrage des poils sécrétés, naturalisation d'animaux au moyen de sels de mercure. - dorure, argenture, étamage, bronzage, damasquinage à l'aide de mercure ou de sels de mercure.
Lésions eczématiformes récidivantes en cas de nouvelle exposition ou confirmées par un test épicutané.	15 jours	Fabrication et emploi d'amorces au fulminate de mercure. Autres applications et traitements par le mercure

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 36 : Le bromure de méthylène

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Troubles encéphalo-médullaires : - Tremblements intentionnels ; - Myoclonies ; - Crises épileptiformes ; - Ataxies ; - Aphasie et dysarthrie ; - Accès confusionnels - Anxiété pantophobique ; - Dépression mélancolique ; - Coma	7 jours	Préparation, manipulation, emploi du bromure de méthyle ou des produits en renfermant, notamment : - préparation du bromure de méthyle ; - préparation de produits chimiques pharmaceutiques au moyen du bromure de méthyle ;
Troubles oculaires : - Amaurose ou amblyopie ; - Diplopie.	7 jours	Remplissage et utilisation des extincteurs au bromure de méthyle;
Troubles auriculaires : - Hyperacousie ; - Vertiges et troubles labyrinthiques. - Accidents aigus (en dehors des cas considérés comme accidents du travail)	7 jours	Emploi du bromure de méthyle comme agent de désinsectisation et de dératisation.

Tableau n° 37 : Le chlorure de méthyle

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Vertiges Amnésie Amblyopie Ataxie Manifestations aiguës (coma, délire) en dehors des cas considérés comme accidents du travail.	7 jours	Préparation, emploi et manipulation du chlorure de méthyle, notamment, la réparation des appareils frigorifiques.

Tableau n° 38 : La nitroglycérine et les autres esters de l'acide nitrique

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Intoxication aiguë : - Phénomènes nerveux, nausées, excitation générale et sexuelle, insomnies, paralysies, troubles cardio-vasculaires ; - Céphalées graves associées à l'un des troubles précédents.	6 mois 1 an	Tous travaux comportant l'exposition à l'action des glycols, de la nitroglycérine ou leurs dérivés ; et notamment : - Fabrication de la nitroglycérine, du fulminate de mercure ; - Fabrication d'explosifs.
Intoxication Chronique : - Ulcérations des extrémités digitales ; - Peau sèche avec formation de crevasses, troubles digestifs, tremblements, névralgies associées à l'un des troubles précédents	3 jours	

Tableau n° 39 : Les organophosphorés et les carbamates

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
1-Troubles digestifs : crampes abdominales hyper salivation, nausées ou vomissements diarrhée. 2- Troubles respiratoires : dyspnée asthmatiforme œdème broncho alvéolaire. 3- Troubles nerveux : céphalées, vertiges, confusion mentale accompagnée de myosis. 4- Troubles généraux et vasculaires : asthénie, bradycardie et hypotension, amblyopie. Le diagnostic sera confirmé, le cas échéant par un abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et de l'acétylcholinestérase des globules rouges, à l'exception des affections professionnelles provoquées par les carbamates. 5-Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l'acétylcholinestérase des globules rouges.	3 jours	Toute préparation ou manipulation des phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyles, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organophosphorés anticholinestésiques ainsi que des phosphoramides et carbamates hétérocycliques anticholinestésiques.

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 40 : L'oxyde de carbone

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Syndrome associant céphalées, asthénie, vertiges, nausées, confirmé par la présence dans le sang d'un taux d'oxyde de carbone supérieur à 1.5 millilitre pour 100 millilitres de sang.	30 jours	Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone provenant d'origines diverses, notamment des foyers industriels, de gazogènes, d'appareils de chauffage ou de moteurs à allumage commandé. Sont exclus les travaux effectués dans les locaux comportant des installations de ventilation telles que la teneur en oxyde de carbone vérifiée à hauteur des voies respiratoires est de façon habituelle, inférieure à 50 cm ³ par mètre cube, lorsque ces installations sont maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées au moins une fois par an par un organisme agréé.

Tableau n° 41 : Le pétrole

Affections professionnelles provoquées par les dérivés suivants du pétrole (extraits aromatiques, huiles minérales utilisées à haute température dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, suies de combustion des produits pétroliers) et les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A – Affections cutanées cancéreuses provoquées par les dérivés du pétrole Epithélioma primitif de la peau	30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 10 ans)	Travaux d'usinage par enlèvement ou déformation de matière ou travaux de traitement des métaux et alliages comportant l'emploi d'huile minérale. Travaux comportant la manipulation et l'emploi d'extraits aromatiques pétroliers utilisés notamment comme huiles d'extension, d'ensimage, de démoulage, à l'exclusion des polymérisats et des élastomères contenant des huiles d'extension Travaux de ramonage et de nettoyage de chaudières et de cheminées exposant aux suies de combustion de produits pétroliers.

Tableau n° 41 (suite) : Le pétrole

Affections professionnelles provoquées par les dérivés suivants du pétrole (extraits aromatiques, huiles minérales utilisées à haute température dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, suies de combustion des produits pétroliers) et les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
B – Affections cutanées et respiratoires provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse		Manipulation et emploi de ces huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse lors des travaux suivants :
Papulo-pustules multiples et leurs complications furoncleuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail imprégnées d'huile ou de fluide).	7 jours	- tournage, décolletage, fraisage, perçage, alésage, taraudage, filetage, sciage, rectification et, d'une façon générale, tous travaux d'usinage mécanique des métaux comportant l'emploi de ces produits :
Dermatoses d'irritation récidivantes après nouvelle exposition au risque.	7 jours	- tréfilage, forgeage, laminage, trempe à l'huile dans l'industrie métallurgique.
Dermites eczématiformes , récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test cutané positif au produit	15 jours	Travaux d'entretien, de réparation et de mise au point mécanique comportant l'emploi d'huiles de moteurs, d'huiles utilisées comme composants de fluides hydrauliques, de fluides hydrauliques et autres lubrifiants ; Travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage du béton ; Travaux comportant la pulvérisation d'huile minérale ;
Granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire	1 mois	Travaux comportant l'emploi d'huiles d'extension dans l'industrie du caoutchouc, d'huiles d'ensimage de fibres textiles ou de fibres minérales, d'huiles de démoulage et d'encre grasses dans l'imprimerie.
Insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire confirmé médicalement ou à une pneumopathie dont la relation avec l'huile minérale ou la paraffine est confirmée par la présence au sein des macrophages alvéolaires de vacuoles intra-cytoplasmiques prenant les colorations usuelles des lipides.	6 mois	Travaux comportant la pulvérisation d'huiles minérales. Travaux de paraffinage et travaux exposant à l'inhalation de brouillards d'huile minérale.

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 42 : Les dérivés nitrés du phénol

Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésol, dinosèbe), par le pentachlorophénol, les pentachlorophénates et par les dérivés halogénés de l'hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A – Intoxication suraiguë avec hyperthermie, œdème pulmonaire, éventuellement atteinte hépatique, rénale et myocardique.	3 jours	Préparation, emploi, manipulation des dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésol, dinosèbe, leurs homologues et leurs sels), notamment :
B – Intoxication aiguë ou subaiguë avec asthénie, amaigrissement rapide, hypersudation suivie d'hyperthermie avec gêne respiratoire.	7 jours	- fabrication des produits précités ; - fabrication de matières colorantes au moyen des produits précités ; - préparation et manipulation d'explosifs renfermant l'un ou l'autre des produits précités ;
C - Manifestation digestive (douleurs abdominales, vomissements, diarrhées) associées à la présence du toxique ou de ses métabolites dans le sang ou les urines.	7 jours	- travaux de désherbage utilisant les produits précités ; - travaux antiparasitaires entraînant la manipulation de ces produits précités.
D - Irritation des voies aériennes supérieures et conjonctivites.	7 jours	Préparation, emploi, manipulation des dérivés halogénés de l'hydroxybenzonitrile, notamment :
E – Dermites irritatives	7 jours	- fabrication des produits précités ; - fabrication et conditionnement des pesticides en contenant.
F – Syndrome biologique caractérisé par la Neutropénie franche (moins de 1 000 polynucléaires neutrophiles par mm ³) liée à des préparations associant du pentachlorophénol, ses homologues ou ses sels à du lindane.	90 jours	Préparation, manipulation, emploi du pentachlorophénol, des pentachlorophénates ainsi que des produits les renfermant, au cours des travaux ci-après : - trempage du bois ; - empilage du bois fraîchement trempé ; - pulvérisation du produit ; - préparation des peintures en contenant ; - lutte contre les xylophages ; - traitement des charpentes en place par des préparations associant du pentachlorophénol, ses homologues et ses sels, à du lindane.

Tableau n° 43 : La phénylhydrazine

DESIGNATION DES MALADIES	DELAÏ DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Lésions eczématiformes récidivantes en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.	15 jours	Préparation, emploi, manipulation de la phénylhydrazine
Anémie de type hémolytique	30 jours	
Rhinite récidivante en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.	7 jours	
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.	7 jours	

Tableau n° 44 : Les phosphates, pyrophosphates

(Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organophosphorés ainsi que par les phosphoramides et carbamates hétérocycliques anticholinestérasiques)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAÏ DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Troubles digestifs : crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements, diarrhée. B. Troubles respiratoires : Hyper réactivité bronchique, œdème broncho-alvéolaire. C. Troubles nerveux : céphalées, vertiges, confusion mentale accompagnée de myosis. D. Troubles généraux et vasculaires : asthénie, bradycardie et hypotension, amblyopie. Le diagnostic sera confirmé dans tous les cas (A, B, C, D) par un abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et de l'acétylcholinestérase des globules rouges, à l'exception des affections professionnelles provoquées par les carbamates. E. Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l'acétylcholinestérase des globules rouges.	3 jours	Toute préparation ou manipulation des phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que des phosphoramides et carbamates hétérocycliques anticholinestérasiques.

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 45 : Le phosphore et le sesquisulfure de phosphore

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Dermites aiguës, chroniques ou récidivantes au sesquisulfure de phosphore (phosphorides)	30 jours	Manipulation et emploi du sesquisulfure de phosphore, notamment dans les usines fabricant ce produit et dans les manufactures d'allumettes.

Tableau n° 46 : Le plomb et ses composés

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES

A - Manifestations aiguës et subaiguës : Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 g/100 ml chez l'homme et 12 g/100 ml chez la femme) Syndrome douloureux abdominal paroxystique apyrétique avec état sub-occlusif (coliques de plomb habituellement accompagné d'une crise hypertensive). Encéphalopathie aiguë. Pour toutes les manifestations aiguës et subaiguës, l'exposition au plomb doit être caractérisée par une plombémie supérieure à 40 microgrammes par 100 ml de sang et les signes cliniques associés à un taux d'acide delta aminolévulinique urinaire supérieur à 15 milligrammes/g de créatinine ou à un taux de protoporphyrine érythrocytaire sanguine supérieur à 20 microgramme d'hémoglobine et pour l'anémie à un taux de ferritine normal ou élevé. B – Manifestations chroniques : Neuropathies périphériques et/ou syndrome de sclérose latérale amyotrophique ne s'aggravant pas après l'arrêt de l'exposition. Troubles neurologiques organiques à type d'altération des fonctions cognitives, dont l'organicité est confirmée, après exclusion des manifestations chroniques de la maladie alcoolique, par des méthodes objectives. Neuropathies périphériques Troubles endocriniens	3 mois 30 jours 30 jours 3 ans 1 an 3 ans	Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du plomb, de ses minerais, de ses alliages, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant. Récupération du vieux plomb. Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.
---	---	--

Tableau n° 46(suite) : Le plomb et ses composés

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Insuffisance rénale chronique. Pour toutes les manifestations chroniques, l'exposition au plomb doit être caractérisée par une plombémie antérieure supérieure à 80 microgrammes/ 100 ml ou, à défaut, par des perturbations biologiques spécifiques d'une exposition antérieure au plomb. Hypertension Artérielle (HTA), Effets sur la santé de la reproduction et le développement du fœtus Effets cancérigènes	10 ans	Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du plomb, de ses minerais, de ses alliages, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant. Récupération du vieux plomb. Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.
C – Syndrome biologique associant deux anomalies : ■ D'une part, atteinte biologique comprenant soit un taux d'acide delta aminolévulinique urinaire supérieur à 15 milligrammes/g de créatinine, soit un taux de protoporphyrine érythrocytaire supérieur à 20 microgrammes/g d'hémoglobine. ■ D'autre part, plombémie supérieure à 80 microgramme/100 ml de sang. Le syndrome biologique doit être confirmé par la répétition des deux examens retenus, pratiqués dans un intervalle rapproché par un laboratoire agréé	30 jours	

Tableau n° 47 : Les poussières des métaux durs

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------	--

A. Sidérose : affection pulmonaire chronique caractérisée radiologiquement par un semis d'images punctiformes pouvant être accompagnées d'opacités massives et se manifestant par des troubles fonctionnels (notamment dyspnée bronchorrhée, toux) confirmés par des investigations de l'appareil respiratoire. Complication cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée. B. Autres complications de la sidérose : cancer broncho-pulmonaire primitif.	15 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 2 ans) 40 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans)	LISTE INDICATIVE A. Travaux exposant à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxydes de fer, notamment : extraction, broyage, concassage et traitement des minerais de fer et de l'ocre et travaux de sidérurgie, de tôlerie et de soudage. LISTE LIMITATIVE B. Travaux effectués dans les mines de fer.
---	--	---

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 48 : Les résines époxydiques et leurs constituants

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Lésions eczématiformes récidivantes en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par un test épicutané.	15 jours	Préparation des résines époxydiques. Emploi des résines époxydiques : - fabrication des stratifiées ; - fabrication et utilisation de colles vernis, peintures à base de résines époxydiques.

Tableau n° 49 : Le sélénium et ses dérivés minéraux

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Atteintes des voies aériennes Œdème pulmonaire Brûlures et irritations cutanées Brûlures oculaires et conjonctivite	5 jours	Emploi de sels de sélénium dans l'industrie métallurgique et l'électronique Utilisation de pigments contenant du sélénium Fabrication et emploi d'additifs alimentaires contenant du sélénium Travaux de laboratoire faisant intervenir le sélénium comme réactif chimique Fabrication de produits contenant des dérivés du sélénium dans les industries de cosmétologie, de phytopharmacie, de photographie et de photocopie.

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 50 : La silice libre
(Pneumoconioses consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------	--

A -Silicose, pneumoconiose du houilleur, schistose, talcose, kaolinose, graphitose et autres pneumoconioses provoquées par ces poussières ; ces affections sont caractérisées par des signes radiographiques spécifiques, qu'ils s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels. Complications de ces affections : a. Complication cardiaque ; Insuffisance ventriculaire droite caractérisée. b. Complications pleuropulmonaires : Tuberculose ou autre mycobactériose surajoutée et caractérisée ; Nécrose cavitaires aseptique ; Aspergillose intra cavitaires confirmée par la sérologie c. Complications non spécifiques Pneumothorax spontané Suppuration broncho-pulmonaire subaiguë ou chronique ; Insuffisance respiratoire aiguë nécessitant des soins intensifs en milieu spécialisé.	15 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans).	1. Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice libre, notamment ; 2. Travaux de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice libre ; 3. Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice libre ; 4. Taille et polissage de roches renfermant de la silice libre ; 5. Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice libre ; 6. Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice libre ; 7. Travaux dans les mines de houille ; 8. Extraction, refonte, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ; 9. Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ; 10. Extraction, broyage, conditionnement du talc ; 11. Utilisation du talc comme lubrifiant ou comme charge dans l'apprêt du papier, dans certaines peintures, dans la préparation de poudre cosmétique, dans les mélanges de caoutchouterie ; 12. Fabrication de carborundum, du verre, de la porcelaine, de la faïence et autres produits céramiques, des produits réfractaires ; 13. Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables, décochage, ébarbage et dessablage ; 14. Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice libre ; 15. Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable ; 16. Travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ; 17. Manipulation, broyage, conditionnement, usinage, utilisation du graphite, notamment comme réfractaire, fabrication d'électrodes.
B – Sclérodémie systématisée progressive	15 ans (sous réserve d'une durée minimale de 10 ans)	
C- Fibrose interstitielle pulmonaire diffuse non régressive d'apparence primitive. Cette affection devra être confirmée soit par un examen radiographique ou par une tomodensitométrie en coupe millimétrique, soit par preuve anatomo-pathologie. Complications de cette affection : insuffisance respiratoire chronique caractérisée et cœur pulmonaire chronique.	30 ans (durée minimale d'exposition de 10 ans)	
D- Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique : - Cancer broncho-pulmonaires primitif - Lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).	30 ans (durée minimale d'exposition de 5 ans)	

Groupe des pathologies d'origine chimique

Tableau n° 51 : Le chlorure de sodium dans les mines de sels et leurs dépendances

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Lésions nasales : - Ulcérations ; - Perforation Ulcérations cutanées	30 jours	Travaux effectués au contact du sel pulvérulent Travaux exécutés au contact du sel pulvérulent ou au contact des saumures

Tableau n° 52 : Le thiophosphate de diethyle et paranitrophenyl

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Troubles digestifs aigus ou subaigus : crampes abdominales, hyper salivation, nausées ou vomissements Troubles généraux et vasculaires aigus ou subaigus : céphalées et vertiges, faiblesse, bradycardie et hypotension, amblyopie. Troubles respiratoires d'œdèmes broncho alvéolaire aigus, dyspnée, expectoration, râles sous-crépitant bilatéraux Troubles nerveux aigus : état stuporeux, diminution des réflexes, tressaillements musculaires, myosis	3 jours	Travaux exposant au thiophosphate de diethyle et paranitrophenyle notamment : préparation du thiophosphate de diethyle et paranitrophenyle Préparation et manipulation dans les établissements industriels ou commerciaux de produits à base de thiophosphate de diethyle et paranitrophenyle

Tableau n° 53 : Le chlorure de vinyle

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------	--

Troubles angioneurotiques des doigts et des orteils	5 ans	Travaux exposant à l'action du chlorure de vinyle monomère, notamment les travaux exécutés dans les ateliers de polymérisation.
Ostéolyse des phalanges unguéales des mains confirmée radiologiquement.	3 ans	
Angiosarcome.	30 ans	
Syndrome d'hypertension portale spécifique : - soit avec varices œsophagiennes, splénomégalie et thrombocytopénie, - soit avec fibrose ou dysplasie des cellules endothéliales	30 ans	

1.2. Groupe de pathologies d'origine physique

Tableau n° 54 : Affections professionnelles provoquées par le bruit

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------	--

Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible. Ce déficit est évalué par une audiométrie effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie doit être tonale liminaire et vocale et faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels, calculé en faisant la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.	1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).	Travaux exposant aux bruits lésionnels provoqués par : - les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : - le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisailage, le tronçonnage ; - l'ébarbage, le meulage, le polissage, le grugeage par procédé arc-air, la métallisation ; - le câblage, le toronnage et le bobinage de fils d'acier ; - l'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques ; - la manutention mécanisée de récipients métalliques ; - les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage ; - le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles ; - la mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1 320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW ; - l'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs ; - l'utilisation de pistolets de scellement ;
--	---	---

Groupe de pathologies d'origine physique

Tableau n° 54(suite) : Affections professionnelles provoquées par le bruit

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible. Ce déficit est évalué par une audiométrie effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie doit être tonale liminaire et vocale et faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels, calculé en faisant la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.	1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).	j. le broyage, le concassage, le criblage, le sciage et l'usinage de pierres et de produits minéraux ; k. les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation ; l. l'abattage, le tronçonnage et l'ébranchage mécaniques des arbres ; m. l'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, cloueuses ; n. l'utilisation d'engins de chantier : boteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains ; o. le broyage, l'injection et l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc ; p. le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique ; q. la fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton ; r. l'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton ; s. les essais et la réparation en milieu industriel des appareils de sonorisation ; t. les travaux de moulage sur machines à secousses et de décochage sur grilles vibrantes ; u. la fusion en four industriel par arcs électriques ; v. les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports ; w. l'exposition à la composante audible dans les travaux de soudage par ultrasons des matières plastiques. x. Standardiste

Tableau n° 55 : La pression (en milieu hyperbare /hypobare)

Affections provoquées par des travaux effectués en milieu hyperbare

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Lésions provoquées par des travaux dans un Milieu Hyperbare Ostéonécrose avec ou sans atteinte articulaire intéressant l'épaule, la hanche et le genou, confirmée par l'aspect radiologique des lésions. Syndrome vertigineux confirmé par épreuve labyrinthique. Otite moyenne subaiguë ou chronique. Hypoacousie par lésion cochléaire irréversible, s'accompagnant ou non de troubles labyrinthiques et ne s'aggravant pas après arrêt d'exposition au risque. Le diagnostic sera confirmé par une audiométrie tonale et vocale effectuée de six mois à un an après la première constatation.	20 ans 3 mois 3 mois 1 an	Travaux effectués par les tubistes Travaux effectués par les scaphandriers. Travaux effectués par les plongeurs munis ou non d'appareils respiratoires individuels. Interventions en milieu hyperbare.
B. Lésions provoquées par des travaux dans un Milieu Hypobare Otites moyennes subaiguës Otites moyennes chroniques Lésions de l'oreille interne Le diagnostic dans tous les cas doit être confirmé par des examens cliniques et audiométriques spécifiques	6 mois 1 an 1 an	Travaux effectués en service aérien.

Groupe de pathologies d'origine physique

Tableau n° 56 : Affections provoquées par les rayonnements ionisants

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation aiguë.	30 jours	Tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire, notamment : - Extraction et traitement des minerais radioactifs ; - Préparation des substances radioactives ; - Préparation et application de produits luminescents radifères ; - Recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ; - Fabrication d'appareils pour radiothérapie et d'appareils à rayons X ; - Travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux ; - Travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus.
Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation chronique.	1 an	
Blépharite ou conjonctivite.	7 jours	
Kératite.	1 an	
Cataracte. Radiodermites	10 ans	
aiguës Radiodermites	60 jours	
chroniques	10 ans	
Radio-épithélite aiguë des muqueuses.	60 jours	
Radiolésions chroniques des muqueuses	5 ans	
Radionécrose osseuse.	30 ans	
Leucémies.	30 ans	
Cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation.	30 ans	
Lymphomes, sarcome osseux	50 ans	

Tableau n° 57 : Les rayonnements thermiques

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------	--

Tableau n° 58 : Les rayons X, les substances radioactives naturelles et artificielles

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Blépharite ou conjonctivite	7 jours	Tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire, notamment : - extraction et traitement des minerais radioactifs. - préparation des substances radioactives. - préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs. - préparation et application de produits luminescents radifères. - recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires. Fabrication d'appareils pour radiumthérapie et d'appareils à rayons X. Travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux. Travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus.
Radio dermites aiguës	60 jours	
Radio épithélite aiguës des muqueuses	60 jours	
Kératite	1 an	
Anémie progressive légère du type hypoplasique ou aplastique	1 an	
Syndrome hémorragique	1 an	
Leucopénie avec neutropénie	1 an	
Leucoses	1 an	
Anémie progressive grave du type hypoplasique ou aplasique	3 ans	
Radio lésions chroniques des muqueuses	5 ans	
Cataracte	10 ans	
Etats leucémoïdes	10 ans	
Radiodermites chroniques	10 ans	
Cancer broncho-pulmonaire par inhalation	10 ans	
Sarcome osseux	50 ans	

Tableau n° 59 : La haute température

Affections professionnelles provoquées par le travail à haute température

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Crampes musculaires avec sueurs profuses, oligurie et chlorure urinaire égal ou inférieur à 5g/l	3 jours	Tous travaux effectués dans les mines de potasse exposant à une température résultante égale ou supérieure à 28°.

Groupe de pathologies d'origine physique

Tableau n° 60 : Les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils, objets

(Affections professionnelles provoquées par l'emploi de marteaux pneumatiques et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
- A - Affections ostéo-articulaires confirmés par des examens radiographiques : - arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéophytoses ; - ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck). - ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Köhler). Troubles angioneurotiques de la main, prédominant à l'index et au médus, pouvant s'accompagner de crampes de la main et de troubles prolongés de la sensibilité et confirmés par des épreuves fonctionnelles objectivant le phénomène de Raynaud.	5 ans 1 an 1 an 1 an	Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par : a) Les machines-outils tenues à la main, notamment : - les machines percutantes, telles que les marteaux piqueurs, les burineurs, les bouchardeuses et les fouloirs ; - les machines roto percutantes, telles que les marteaux perforateurs, les perceuses à percussion et les clés à choc ; - les machines rotatives, telles que les polisseuses, les meuleuses, les scies à chaîne, les tronçonneuses et les débroussailleuses ; - les machines alternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses. b) Les outils tenus à la main associés à certaines machines précitées, notamment dans des travaux de burinage ; c) Les objets tenus à la main en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre.
- B - Atteinte vasculaire cubito-palmaire en règle unilatérale (syndrome du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de Raynaud ou des manifestations ischémiques des doigts confirmée par l'artériographie objectivant un anévrisme ou une thrombose de l'artère cubitale ou de l'arcade palmaire superficielle.	1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 5ans)	Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants : - travaux de martelage, tels que travaux de forge, tôlerie, chaudronnerie et travail du cuir ; - travaux de terrassement et de démolition ; - utilisation de pistolets de scellements ; - utilisation de cloueuses et de riveteuses. Travaux exposant habituellement à l'utilisation du talon de la main en percussion directe itérative sur un plan fixe ou aux chocs transmis à l'éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant.

Groupe de pathologies d'origine physique

Tableau n° 61 : Les amibes

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Manifestation aiguës de l'amibiase, notamment hépatite amibienne , confirmées par la présence d'amibes du type <i>Entamoeba histolytica</i> ou de kystes amibiens dans les selles ou par les résultats positifs d'une méthode immunologique reconnue par l'OMS.	3 mois	Travaux effectués même à titre occasionnel, dans les laboratoires de bactériologie ou de parasitologie. Travaux comportant le transport avec manipulation de produits pathologiques. Travaux mettant en contact avec les prélèvements de produits pathologiques et travaux impliqués par l'élimination des selles contaminantes ; accomplis en milieu d'hospitalisation.

Tableau n° 62 : Ankylostomose professionnelle

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Anémie , confirmée par la présence de plus de 200 œufs d'ankylostome par centimètre cube de selles, un nombre de globules rouges égal ou inférieur à 3 500 000 par millimètre cube et un taux d'hémoglobine inférieur à 70 %.	3 mois	Travaux souterrains effectués à des températures égales ou supérieures à 20°C.

Groupe de pathologies d'origine physique

Tableau n° 63 : Bacilles tuberculeux

(Affections professionnelles dues aux bacilles tuberculeux)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
- A - Tuberculose cutanée ou sous-cutanée. Tuberculose ganglionnaire. Synovite. Ostéo-arthrite. (A défaut de preuve bactériologique, le diagnostic devra s'appuyer sur des examens anatomopathologiques ou d'imagerie, ou à défaut, par traitement d'épreuve spécifique)	6 mois 6 mois 1 an 1 an	Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux porteurs de bacilles tuberculeux ou exécutés dans des installations où ont séjourné de tels animaux. Travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, les charcuteries, les triperies ou boyauderies, les entreprises d'équarrissage. Manipulation ou traitement du sang, des glandes, des os, des cornes, des cuirs verts. Soins vétérinaires. Travaux de laboratoire de biologie. Travaux de laboratoire de bactériologie. Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien, de service ou des services sociaux mettant le personnel au contact de produits contaminés ou de malades dont les examens bactériologiques ont été positifs.
- B - Tuberculose pleurale. Tuberculose pulmonaire. (A défaut de preuve bactériologique, le diagnostic devra s'appuyer sur des examens anatomopathologiques ou d'imagerie, ou à défaut, par traitement d'épreuve spécifique)	6 mois 6 mois	

Tableau n° 64 : Brucelloses professionnelles

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Brucellose aiguë avec septicémie : Tableau de fièvre ondulante sudoro-algique ; Tableau pseudo-grippal ; Tableau pseudo-typhoïdique.	2 mois	Travaux exposant au contact avec des caprins, ovins, bovins, porcins, avec leurs produits ou leurs déjections ;
Brucellose subaiguë avec focalisation : Mono arthrite aiguë fébrile, polyarthrite ; Bronchite, pneumopathie ; Réaction neuro-méningée ; Formes hépato-spléniques subaiguës	2 mois	Travaux exécutés dans les laboratoires servant au diagnostic de la brucellose, à la préparation des antigènes brucellien ou des vaccins antibrucellien, ainsi que dans les laboratoires vétérinaires.
Brucellose chronique : Arthrite séreuse ou suppurée, ostéo-arthrite, ostéite, spondylodiscite, sacrocoxite ; Orchite, épididymite, prostatite, salpingite ; Bronchite, pneumopathie, pleurésie sérofibrineuse ou purulente ; Hépatite ; Anémie, purpura, hémorragie, adénopathie ; Néphrite ; Endocardite, phlébite ; Réaction méningée, méningite, arachnoïdite, méningo-encéphalite, myélite, névrite radiculaire ; Manifestations cutanées d'allergie. Manifestations psychopathologiques : Asthénie profonde associée ou non à un syndrome dépressif.	1 an	
NOTA : l'origine brucellienne des manifestations aiguës ou subaiguës est démontrée par l'isolement du germe, ou par les résultats combinés de deux réactions sérologiques utilisées par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) quelque soit leur taux. Les manifestations chroniques de la brucellose doivent être associées à une intradermo-réaction positive à un allergène brucellien avec ou sans réaction sérologique positive.		

Groupe de pathologies d'origine physique

Tableau n° 65 : Charbon professionnel

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Pustule maligne. Œdème malin. Charbon gastro-intestinal. Charbon pulmonaire. (En dehors des cas considérés comme accidents du travail.)	30 jours	Travaux susceptibles de mettre les ouvriers en contact avec des animaux atteints d'infection charbonneuse ou avec des cadavres de ces animaux. Changement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux ou des débris d'animaux.

Tableau n° 66 : Le foin moisi ou les produits végétaux moisiss

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
- Pneumopathies professionnelles aiguës ou subaiguës lorsqu'il y a un syndrome respiratoire (dyspnée, toux, expectoration) ou signes généraux (fièvre, amaigrissement) et des anticorps précipitants dans le sérum contre les moisissures responsables (au moins un arc de précipitation à l'immunoélectrophorèse).	30 jours	Tous travaux agricoles entraînant l'exposition aux poussières de foin moisi ou de particules végétales moisiss.
- Pneumopathies chroniques : fibrose interstitielle pulmonaire confirmée par l'exploration fonctionnelle respiratoire et les signes radiologiques (miliaire ou réticulo-micro-nodulation) et des symptômes respiratoires généraux et immunologiques.	3 ans	
- Complications cardiaques des pneumopathies chroniques : hyposystolie ou asystolie par insuffisance ventriculaire droite.	10 ans	

Groupe de pathologies d'origine physique

Tableau n° 67 : Hépatites virales professionnelles

(Infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAÏ DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------------	--

- A - Hépatites virales transmises par voie orale : a) Hépatites à virus A : - Hépatite fulminante. - Hépatite aiguë ou subaiguë. - Formes à rechutes. Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par une sérologie traduisant une infection en cours par le virus A. b) Hépatite à virus E : - Hépatite fulminante. - Hépatite aiguë ou subaiguë. Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la détection du virus E traduisant une infection en cours.	40 jours 60 jours 60 jours 40 jours 60 jours	Travaux comportant des actes de soins, d'hygiène, d'entretien, d'analyses de biologie médicale, susceptibles d'exposer aux produits biologiques d'origine humaine et aux produits contaminés par eux. Travaux comportant des actes de soins et d'hygiène corporels, de soutien dans des crèches, garderies, institutions sociales et médico-sociales recevant des enfants et des adultes handicapés. Travaux exposant au contact d'eaux usées lors de l'installation, l'exploitation et l'entretien des réseaux d'assainissement, de stations d'épuration. Travaux exposant au contact d'eaux usées dans les établissements de bains, de douches, dans les piscines, dans les établissements thermaux. Travaux exposant au contact d'eaux usées dans les cuisines de restauration collective.
- B - Hépatites virales transmises par le sang, ses dérivés et tout autre liquide biologique ou tissu humains. a) Hépatites à virus B (en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) : - Hépatite fulminante. - Hépatite aiguë avec ou sans manifestations ictériques. - Manifestations extrahépatiques dues à l'infection aiguë par le virus B : urticaire, érythème noueux, acrodermatite papuleuse, syndrome de Raynaud, vascularites, polyarthrite, néphropathie glomérulaire, anémie hémolytique. - Hépatite chronique active ou non. Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimique et par la présence de marqueurs du virus B témoignant d'une affection en cours.	40 jours 180 jours 180 jours 2 ans	Travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux, effectués dans les : - Établissements généraux ou spécialisés de soins, d'hospitalisation, d'hébergement, de cure, de prévention, d'hygiène. - Laboratoires d'analyses de biologie médicale, d'anatomie et de cytologie pathologiques. - Établissements de transfusions sanguines. - Services de prélèvements d'organes, de greffons. - Services médicaux d'urgence et d'aide médicale urgente. - Services de secours et de sécurité : pompiers, secouristes, sauveteurs, ambulanciers, policiers, personnel pénitentiaire. - Services de ramassage, traitement, récupération de déchets médicaux, d'ordures ménagères. - Services de soins funéraires et morgues.

Groupe de pathologies d'origine physique

Tableau n° 67(suite) : Hépatites virales professionnelles

(Infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAÏ DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------------	--

- Manifestations extra hépatiques dues à l'infection chronique par le virus B : - vascularite dont périartérite noueuse, néphropathie glomérulaire membrano-proliférative. - Cirrhose. - Carcinome hépato-cellulaire. L'étiologie de ces pathologies : manifestations extra-hépatiques, cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection chronique à virus B ou d'un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus. b) Co-infection d'une hépatite B par le virus D: - Hépatite fulminante. - Hépatite aiguë. - Hépatite chronique active. L'étiologie doit être confirmée par la présence de marqueurs traduisant une infection en cours par le virus D. c) Hépatites à virus C (en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) : - Hépatite aiguë avec ou sans manifestations cliniques. - Hépatite chronique active ou non. Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection en cours. - Manifestations extra-hépatiques dues à l'infection chronique par le virus C : - o Associées à une cryoglobulinémie mixte essentielle : purpura, vascularites, neuropathies périphériques, syndrome sec, polyarthrite, néphropathie membranoproliférative. - o Hors de la présence d'une cryo-globulinémie: porphyrie cutanée tardive, lichen plan, urticaire. - Cirrhose. - Carcinome hépato-cellulaire. L'étiologie de ces pathologies : manifestations extra-hépatiques, cirrhose, carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par une sérologie traduisant une hépatite chronique à virus C ou un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.	10 ans 20 ans 30 ans 40 jours 180 jours 2 ans 180 jrs 20 ans 20 ans 20 ans	Travaux comportant des actes de soins, d'hygiène, d'entretien, d'analyses de biologie médicale, susceptibles d'exposer aux produits biologiques d'origine humaine et aux produits contaminés par eux. Travaux comportant des actes de soins et d'hygiène corporels, de soutien dans des crèches, garderies, institutions sociales et médico-sociales recevant des enfants et des adultes handicapés. Travaux exposant au contact d'eaux usées lors de l'installation, l'exploitation et l'entretien des réseaux d'assainissement, de stations d'épuration. Travaux exposant au contact d'eaux usées dans les établissements de bains, de douches, dans les piscines, dans les établissements thermaux. Travaux exposant au contact d'eaux usées dans les cuisines de restauration collective. Travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux, effectués dans les : - Établissements généraux ou spécialisés de soins, d'hospitalisation, d'hébergement, de cure, de prévention, d'hygiène. - Laboratoires d'analyses de biologie médicale, d'anatomie et de cytologie pathologiques. - Établissements de transfusions sanguines. - Services de prélèvements d'organes, de greffons. - Services médicaux d'urgence et d'aide médicale urgente. - Services de secours et de sécurité : pompiers, secouristes, sauveteurs, ambulanciers, policiers, personnel pénitentiaire. - Services de ramassage, traitement, récupération de déchets médicaux, d'ordures ménagères. - Services de soins funéraires et morgues.
---	--	---

Groupe de pathologies d'origine physique

**Tableau n° 68 : Les Maladies professionnelles contractées en milieu de soins
et de laboratoire**

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------------	--

A- Infections dues aux staphylocoques Manifestations cliniques de staphylococcie : - septicémie - atteinte viscérale - panaris Avec mise en évidence du germe et typage du staphylocoque	10 jours	Tous travaux accomplis par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire ; de service, d'entretien ou de services sociaux mettant au contact d'un réservoir de staphylocoques.
B- Infections dues aux Pseudomonas aeruginosa - septicémie; - localisations viscérales; cutanéomuqueuses et oculaires. Avec mise en évidence du germe et typage du Pseudomonas aeruginosa	15 jours	Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant au contact d'un réservoir de Pseudomonas aeruginosa.
C- Infections dues aux entérobactéries Septicémie confirmée par hémoculture.	15 jours	Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant au contact d'un réservoir d'entérobactéries
D- Infection due aux pneumocoques Manifestation cliniques de pneumococcie : - pneumonie; - bronchopneumonie; - septicémie; - méningite purulente Confirmées par isolement bactériologique du germe ou par les résultats positifs d'une recherche des antigènes solubles.	10 jours	Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant au contact d'un réservoir de Pneumocoques.
E- Infection due aux streptocoques beta hémolytiques Manifestation cliniques de streptococcie : - otite compliquée; - érysipèle; - bronchopneumonie; - endocardite; - glomérulonéphrite aigue Confirmées par mise en évidence de streptocoque beta hémolytique du groupe A.	15 jours 15 jours 15 jours 60 jours 30 jours	Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant au contact d'un réservoir de streptocoques beta hémolytiques
F- Infections dues aux méningocoques - méningite - conjonctivite Confirmées par mise en évidence de Nesseria méningitidis	10 jours	Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant au contact d'un réservoir de Méningocoques.
G- Fièvre typhoïde et paratyphoïde A et B Confirmée par une coproculture, une hémoculture mettant en cause la salmonelle et par le sérodiagnostic de Widal.	21 jours	Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant au contact d'un réservoir de Salmonelles

Groupe de pathologies d'origine physique

Tableau n° 68(suite) : Les Maladies professionnelles contractées en milieu de soins et de laboratoire

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
H- Dysenterie bacillaire Confirmées par la mise en évidence de shigelles dans la coproculture et la séroconversion	15 jours	Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant au contact d'un réservoir de Shigelles.
I- Choléra Confirmées bactériologiquement par la coproculture	7 jours	
J- Fièvres hémorragiques (lassa, Ébola, Marburg- Congo Crimée) Confirmées par la mise en évidence du virus et/ou la présence d'anticorps spécifiques à taux significatif.	21 jours	Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant au contact d'un réservoir de Vibrions cholériques
K- Infections dues aux gonocoques - gonococcie cutanée - complications articulaires Confirmées par la mise en évidence bactériologique du germe	10 jours	Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service d'hospitalisation et le personnel de laboratoire de virologie mettant au contact des virus
L- Syphilis Tréponématose primaire cutanée confirmées par la mise en évidence du tréponème et par la sérologie	10 semaines	Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant au contact de malades infectés
M- Infections à herpes virus varicellae Varicelle et ses complications - complication de la phase aigüe : septicémie, encéphalite, neuropathie, purpura thrombopénique, pneumopathie spécifique, varicelle grave généralisée; - complications dues à l'infection chronique par le virus : zona et ses manifestations cutanée, auriculaire, ophtalmique, méningée, neurologique périphérique, algie post-zostériennes chez une personne ayant été atteinte antérieurement d'une varicelle.	21 jours	Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant au contact de malades infectés Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant en contact avec des malades présentant une varicelle ou un zona.
N- Gale Parasitose à sarcopte scabei avec prurit et éventuellement surinfection des atteintes cutanées dues au parasite. En dehors d'un contexte épidémique, l'affection devra être confirmée par l'identification des sarcoptes.	7 jours	Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien ou de services sociaux mettant en contact direct avec des porteurs de cette scabiose.

Groupe de pathologies d'origine physique

Tableau n° 69 : Les Kératoconjunctivites virales d'origine professionnelle

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Kératite nummulaire sous-épithéliale. B. Kératite superficielle ulcéreuse avec conjonctivite associée C. Conjonctivite hémorragique D. Conjonctivite œdémateuse avec chémosis E. Conjonctivite folliculaire avec ou sans participation cornéenne.	21 jours	Travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d'entretien, mettant au contact direct ou indirect de malades porteurs de ces affections.

Tableau n° 70 : Leptospiroses professionnelles

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES

A – Toutes leptospiroses confirmées par un examen de laboratoire spécifique (identification du germe ou sérodiagnostic d'agglutination, à un taux considéré comme significatif) B – Spirochétose à tiques 1. Manifestations primaires : Erythème migrant de Lipschutz, avec ou sans signes généraux 2. Manifestations secondaires Troubles neurologiques : - Méningite lymphocytaire, parfois isolée, ou associée à ; - Douleurs radiculaires - Troubles de la sensibilité ; - Atteinte des nerfs périphériques et crâniens (syndrome de Garin-Bujadoux-Bannwarth) Troubles cardiaques : - Troubles de la conduction - Péricardite Troubles articulaires : - Oligoarthrites régressives ; 3. Manifestations tertiaires - Encéphalomyélite progressive ; - Dermatite chronique atrophiante ; - Arthrite chronique destructrice ; Pour toutes ces affections, le diagnostic doit être confirmé par un sérodiagnostic spécifique.	21 jours 1 mois 6 mois 10 ans	Travaux exposant au contact d'eaux souillées ou effectués dans des lieux susceptibles d'être souillés par des déjections d'animaux porteurs de germes. Travaux exposant au contact avec ces animaux ou leurs déjections. Travaux effectués dans les mines et carrières (travaux de fond), les tranchées, les tunnels, les galeries, les égouts, les caves, les chais et les souterrains. Travaux d'aménagement et d'entretien des cours d'eau. Travaux de drainage. Travaux dans les cimenteries. Travaux effectués dans les abattoirs, les tueries particulières, les boucheries, les chantiers d'équarrissage. Travaux effectués dans les cuisines, les fabriques de conserves de viande ou de poisson, les poissonneries. Travaux effectués dans les laiteries, les fromageries. Travaux effectués dans les brasseries. Gardiennage, entretien et réfection des piscines et des parcs aquatiques, surveillance des nageurs Travaux exécutés sur les bateaux et les péniches. Travaux effectués en forêt de manière habituelle.
---	---	--

Groupe de pathologies d'origine physique

Tableau n° 71 : Mycoses cutanées d'origine professionnelle

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
La nature mycosique de l'affection doit être confirmée par examen direct et culture A. Mycoses de la peau glabre Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses, circonscrites B. Mycoses du cuir chevelu Plaques squameuses du cuir chevelu supportant un mélange de cheveux sains et de cheveux cassés courts, accompagnés quelques fois d'une folliculite suppurée (kerion) C. Mycoses des orteils Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses avec fissuration des plis interdigitaux, ou aspect blanc nacré, épaissi de l'épiderme digital ou interdigital, accompagné ou non de décollement, de fissures épidermiques. Ces lésions peuvent atteindre un ou plusieurs orteils ; s'accompagner éventuellement d'onyxis (généralement du gros orteil)	30 jours 30 jours 30 jours	Travaux en contact des mammifères exécutés dans les abattoirs, les chantiers d'équarrissage, les ménageries, les élevages, les animaleries, les garderies d'animaux, les laboratoires où sont utilisés des animaux d'expérience, Travaux de soins et de toilettage Travaux exécutés dans les brasseries et les laiteries Maladies désignées en C Travaux exécutés dans les bains et piscines : surveillance de baignade, les établissements de rééducation Activités sportives exercées à titre professionnel Travaux en mines souterraines, chantiers du bâtiment, chantier des travaux publics, éboueur.

Tableau n° 72 : Onchocercose professionnelle

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Prurit intense avec lésions de grattage. Kystes avec présence de microfilaries. Lésions oculaires (kératite pouvant aller jusqu'à l'opacification cornéenne avec cécité. Iritis – troubles des humeurs de l'œil – lésions du fond d'œil.	6 mois	Implantation de chantiers dans une zone d'endémicité onchocercarienne. Visite périodique sur le chantier.

Groupe de pathologies d'origine physique

Tableau n° 73 : Les Pasteurelloses

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Manifestations cliniques aiguës de pasteurelloses par inoculation (en dehors des cas considérés comme accidents du travail)	8 jours	Travaux de soins, d'abattage, d'équarrissage, ou de laboratoire exposant à l'inoculation de germes à partir d'animaux.
Manifestations locorégionales tardives. Toutes ces manifestations doivent être confirmées par un examen de laboratoire spécifique ou une intra dermo-réaction.	6 mois	

Tableau n° 74 : La Poliomyélite professionnelle

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Toutes les manifestations de la poliomyélite antérieure aiguë	30 jours	Travaux exposant au contact de malades atteints de poliomyélite antérieure aiguë ou produits biologiques contaminés. Tous travaux tels que manutention, entretien, lavage, stérilisation mettant le personnel en contact avec le matériel ou le linge utilisés dans les services où sont effectués les travaux ci-dessus.

Tableau n° 75 : Les Poussières aviaires

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES

Groupe de pathologies d'origine physique

Tableau n° 76 : La Rage professionnelle

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Toutes les manifestations de la rage	6 mois	Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux ou des personnes atteints ou suspects de rage ou avec leurs dépouilles.
Affection imputables à la séro ou vaccinologie antirabique	2 mois	Travaux de laboratoire de diagnostic de la rage.

Tableau n° 77 : La Spirochétose ictéro-hémorragique professionnelle

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------	--

- A - Toute manifestation clinique de leptospirose provoquée par <i>Leptospira interrogans</i>. La maladie doit être confirmée par identification du germe ou à l'aide d'un sérodiagnostic d'agglutination, à un taux considéré comme significatif.	21 jours	- A - Travaux suivants exposant à des animaux susceptibles d'être porteurs de germe et effectués notamment au contact d'eau ou dans des lieux humides, susceptibles d'être souillés par les déjections de ces animaux : - Travaux effectués dans les mines, carrières (travaux au fond), les tranchées, les tunnels, les galeries, les souterrains ; travaux du génie ; - Travaux effectués dans les égouts, les caves, les chais ; - Travaux d'entretien des cours d'eau, canaux, marais, étangs et lacs, bassins de réserve et de lagunage ; - Travaux d'entretien et de surveillance des parcs aquatiques et stations d'épuration ; - Travaux de drainage, de curage des fossés, de pose de canalisation d'eau ou d'égout, d'entretien et vidange des fosses et citernes de récupération de déchets organiques ; - Travaux effectués dans les laiteries, les fromageries, les poissonneries, les cuisines, les fabriques de conserves alimentaires, les brasseries, les fabriques d'aliments du bétail ; - Travaux effectués dans les abattoirs, les chantiers d'équarrissage, travaux de récupération et exploitation du cinquième quartier des animaux de boucherie ;
---	------------------------	--

Groupe de pathologies d'origine physique

Tableau n° 77(suite) : La Spirochétose ictéro-hémorragique professionnelle

DESIGNATION DES MALADIES	DELAÏ DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------------	--

- B - Les manifestations cliniques suivantes de borréliose de Lyme : 1. Manifestation primaire : érythème migrant de Lipschutz, avec ou sans signes généraux 2. Manifestations secondaires Troubles neurologiques : méningite lymphocytaire, parfois isolée ou associée à : - douleurs radiculaires ; - troubles de la sensibilité ; - atteinte des nerfs périphériques et crâniens (syndrome de Garin-Bujadoux-Bannwarth). Troubles cardiaques : troubles de la conduction ; Péricardite. Troubles articulaires : Oligoarthrite régressive. 3. Manifestations tertiaires Encéphalo-myélite progressive. Dermatite chronique atrophiante. Arthrite chronique destructive. Pour les manifestations secondaires et tertiaires, le diagnostic doit être confirmé par une sérologie, à un taux considéré comme significatif pour un des sous-groupes génomiques de <i>Borrelia burgdorferi</i>.	30 jours 6 mois 10 ans	- Travaux exécutés sur les bateaux, les péniches, les installations portuaires ; travaux de marins et dockers ; - Travaux de dératisation et de destruction des rongeurs inféodés au milieu aquatique ; - Travaux de soins aux animaux vertébrés ; - Travaux dans les laboratoires de bactériologie ou de parasitologie ; - Travaux piscicoles de production et d'élevage ; - Travaux d'encadrement d'activité en milieu aquatique naturel (exception faite du domaine maritime) : activités nautiques, halieutiques, subaquatiques ; - Travaux d'assistance, de secours et de sauvetage en milieu aquatique naturel (exception faite du domaine maritime) ; - Travaux de culture de la banane, travaux de coupe de cannes à sucre. - B - Travaux suivants exposant à la bactérie infestant des hôtes vecteurs (tiques du genre ixodes) ou des hôtes réservoirs (vertébrés sauvages ou domestiques) et effectués sur toute zone présentant un couvert végétal tel que forêt, bois, bocage, steppe ou lande : expertise agricole et foncière, arpentage et levé de plan ; pose et entretien des lignes électriques, téléphoniques, des réseaux de gaz, d'eau d'assainissement ; construction et entretien des voies de circulation. Travaux de soins aux animaux vertébrés. Travaux mettant au contact de l'agent pathogène ou de son vecteur dans les laboratoires de bactériologie et de parasitologie.
---	--	---

Groupe de pathologies d'origine physique

Tableau n° 78 : Le Streptococcus

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Méningite purulente avec bactériémie, accompagnée le plus souvent d'une atteinte cochléo-vestibulaire : surdité de perception uni ou bilatérale, avec acouphènes et troubles de l'équilibre (vertiges et ataxie).	25 jours	Travaux exposant au contact de porcs, de leur viande, carcasses, os abats ou sang. Dans les élevages de porcs, les abattoirs, les entreprises d'équarrissage, les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, cuisines, entreprises de transport de porc ou viande de porc.
Atteinte cochléo-vestibulaire aigue et ses complications cochléaires (troubles de l'audition irréversibles)	25 jours	Travaux d'inspection de viande de porc, travaux vétérinaires, travaux de laboratoire au contact de porc.
Septicémie isolée , tableau de coagulopathie intra vasculaire disséminée	25 jours	Travaux de l'industrie alimentaire avec fabrication d'aliments à base de viande de porc.
Arthrite inflammatoire ou septique	25 jours	
Endophtalmie, uvéite	25 jours	
Myocardite	25 jours	
Pneumonie, paralysie faciale.	25 jours	
Endocardite	60 jours	
Dans tous les cas, il est nécessaire de mettre en évidence le streptococcus suis et procéder à son typage		

Tableau n° 79 : La streptomycine et ses sels

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Lésions eczémateuses des doigts Dermatoses oculo-palpébrales Ces affections doivent être confirmées par l'application d'un ou plusieurs tests cutanés à la streptomycine ou ses sels	1 mois (sous réserve d'un délai d'expiration à la streptomycine et à ses sels d'au moins 1 mois.)	Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de streptomycine ou de ses sels notamment : Travaux de conditionnement de la streptomycine ou de ses sels

Groupe de pathologies d'origine physique

Tableau n° 80 : Le Tétanos professionnel

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Tétanos en dehors des cas consécutifs à un accident du travail	30 jours	Travaux effectués dans les égouts Travaux agricoles exposant au bacille tétanique Travaux industriels exposant au bacille tétanique Autres travaux exposant au bacille tétanique

Tableau n° 81 : La Tularémie professionnelle

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Syndrome pouvant revêtir l'aspect en tout ou partie d'une des grandes formes cliniques (brachiale, oculaire, pharyngée, pulmonaire ou typhoïde), soit un aspect atypique. Dans tous les cas, le diagnostic sera authentifié par un examen sérologique spécifique.	15 jours	Travaux de garde-chasse et gardes forestiers exposant notamment au contact des léporidés sauvages. Travaux d'élevage, abattage, transport, manipulation et vente de léporidés, de petits rongeurs et d'animaux à fourrure Transport et manipulation de peaux ; Travaux de laboratoire exposant au contact des léporidés et des petits rongeurs.

Maladies de l'appareil respiratoire

2. MALADIES PROFESSIONNELLES AFFECTANT DES FONCTIONS, ORGANES CIBLES ET AUTRES AGENTS

2.1. Maladies de l'appareil respiratoire

Tableau n° 82 : Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique

DESIGNATION DES MALADIES	DE LAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
70E LA LISTE DES MALADIES PROFESSIONNELLES HARMONISEE DE LA ZONE CIPRES		

- A - Rhinite, asthme ou dyspnée asthmatiforme confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition. Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique. - B - Syndrome respiratoire fébrile avec dyspnée, toux, expectoration, récidivant après nouvelle exposition au risque dont l'étiologie est confirmée par la présence dans le sérum d'anticorps précipitants permettant d'identifier l'agent pathogène correspondant au produit responsable. Fibrose pulmonaire avec signes radiographiques et troubles respiratoires confirmés par l'exploration fonctionnelle lorsqu'il y a des signes immunologiques significatifs	7 jours 1 an 30 jours 1 an	Élevage et manipulation d'animaux (y compris la préparation et le conditionnement d'arthropodes et de leurs larves). Travail en présence de toute protéine en aérosol. Préparation et manipulation des fourrures et feutres naturels. Emploi de plumes et duvets. Broyage des grains de céréales alimentaires, ensachage et utilisations de farines. Préparation et manipulation des substances d'origine végétale suivantes : ipéca, quinine, henné, ricin, résidus d'extraction des huiles de ricin, pollens et spores, notamment de lycopodes. Ouverture des balles, cardage, peignage, filature et tissage de textiles d'origine végétale (notamment coton, jute, sisal, kapok, chanvre, lin). Travaux comportant l'emploi de gommes végétales pulvérisées (arabique, adragante, psyllium, karaya notamment). Préparation et manipulation du tabac. Manipulation du café vert et du soja. Manipulation ou emploi des macrolides, notamment spiramycine et oléandomycine. Préparation, emploi, manipulation de produits contenant de la séricine. Travaux exposant aux sulfites, aux bisulfites ou aux persulfates alcalins. Préparation, emploi, manipulation de chloroplatinates et pentoxyde de vanadium, notamment dans la fabrication des catalyseurs. Travaux exposant à l'inhalation d'anhydrides d'acides volatils, notamment anhydrides phtaliques, trimellitiques, tétrachlorophtaliques, hexahydrophthaliques, himiques, maléiques.
---	--	--

Tableau n° 82(suite) : Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------	--

- A - Rhinite, asthme ou dyspnée asthmatiforme confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition. Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique. - B - Syndrome respiratoire fébrile avec dyspnée, toux, expectoration, récidivant après nouvelle exposition au risque dont l'étiologie est confirmée par la présence dans le sérum d'anticorps précipitants permettant d'identifier l'agent pathogène correspondant au produit responsable. Fibrose pulmonaire avec signes radiographiques et troubles respiratoires confirmés par l'exploration fonctionnelle lorsqu'il y a des signes immunologiques significatifs	7 jours 1 an 30 jours 1 an	Manipulation de gypsophile (<i>gypsophila paniculata</i>). Travaux exposant à la colphane chauffée, notamment lors de la soudure en électronique. Travaux exposant à des émanations de produits de pyrolyse du chlorure de polyvinyle notamment dans sa soudure thermique. Travaux exposant à l'azodicarbonamide notamment dans l'industrie des plastiques et du caoutchouc. Préparation et mise en oeuvre de colorants réactifs, notamment à hétérocycles halogénés, acryloylamines ou vinylsulfones. Préparation et utilisation de colles au cyanoacrylate. Élevage et manipulation d'animaux y compris la préparation et le conditionnement d'arthropodes. Préparation et manipulation des fourrures. Affinage des fromages. Broyage des grains de céréales alimentaires, ensachage et utilisation des farines. Opérations de préparation dans les filatures de coton : ouverture des balles, cardage, peignage. Manipulation du café vert. Travaux exposant aux poussières de résidus de canne à sucre (bagasse). Travaux exposant à l'inhalation de particules microbiennes ou mycéliennes dans les laboratoires de bactériologie et les locaux à caractère industriel dont l'atmosphère est climatisée ou humidifiée lorsque l'absence de pollution par micro-organismes du système d'humidification n'est pas établie par des contrôles réguliers. Travaux exposant à l'inhalation d'anhydrides d'acides volatils, notamment anhydrides phtaliques, trimellitiques, tétrachlorophtaliques hexahydrophthaliques, himiques.
---	--	---

Tableau n° 83 : Les poussières de bois

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
- A - Dermites eczématiformes ou érythémateuses ; conjonctivites ; rhinites ; asthme ou hyper réactivité bronchique confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition. Syndrome respiratoire avec dyspnée, toux expectoration, récidivant après nouvelle exposition au risque, dont l'étiologie professionnelle est confirmée par la présence dans le sérum d'anticorps précipitants permettant d'identifier l'agent pathogène correspondant au produit responsable. Fibrose pulmonaire avec signes radiologiques et troubles respiratoires confirmés par l'exploration fonctionnelle respiratoire.	15 jours 30 jours 1 an	- A - Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.
- B - Cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face.	40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)	- B - Travaux exposant à l'inhalation des poussières de bois, notamment : - Travaux d'usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage ; - Travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois.

Tableau n° 84 : Les rhinites et asthmes professionnels

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------	--

Rhinite récidivante en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test	7 jours	1. Travail en présence de toute protéine en aérosol
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test	7 jours	2. Elevage et manipulation d'animaux (y compris la préparation et le conditionnement d'arthropodes et leurs larves)
Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique	1 an	3. Utilisation et conditionnement de carmin et poudres d'insectes.
		4. Préparation, emploi et manipulation des fourrures et feutres naturels
		5. Préparation et manipulation de produits contenant de la séricine
		6. Emploi de plumes et duvets
		7. Travaux exposant aux résidus d'extraction des huiles, notamment de ricin et d'ambrette.
		8. Broyage des grains de céréales alimentaires, ensachage ; utilisation de farines
		9. Préparation et manipulation de substances d'origine végétale suivante : ipéca, quinine, henné ; pollens et spores, notamment de lycopode.
		10. Ouverture des balles, cardage, peignage, filature et tissage de textile d'origine végétale (notamment coton, sisal, kapok, chanvre, lin)
		11. Travaux comportant l'emploi de gommes végétales : pulvérisées (arabique, adragante, psyllium ; karaya notamment)
		12. Préparation et manipulation du tabac
		13. Manipulation du café vert et du soja
		14. Exposition à des poussières végétales, notamment asparagées, légumineuses, papilionacées, ombellifères, labiées, solanacées, pyrèthres.
		15. Manipulation de gypsophile (gypsophila paniculata)
		16. Manipulation ou emploi des macrolides (notamment spiromycine et oléandomycine), de médicaments et de leurs précurseurs, notamment : glycols, salbutamol, pipérazine, cimétidine, hydralazine ; hydralazine de l'acide nicotinique (isoniazide), chlorure d'acide de la phényl glycine, tétracyclines, alpha-méthyl-dopa

Tableau n° 84(suite) : Les rhinites et asthmes professionnels

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------	--

Rhinite récidivante en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test	7 jours	17. Travaux exposant aux sulfites, bisulfites ou persulfates alcalins
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test	7 jours	18. Préparation emploi et manipulation de chloroplatinates pentaoxyde de vanadium, notamment dans la fabrication de catalyseurs.
Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique	1 an	19. Travaux exposant à l'inhalation d'anhydrides d'acides volatils, notamment anhydrides maleique, phtalique, trimellitique, tétrachlorophtalique, hexahydrophthalique, himique 20. Fabrication, manipulation et utilisation de fongicides notamment les phtalmilide et tetrachlorophtalonitrile 21. Travaux exposant à la colophane chauffée, notamment de la soudure en électronique 22. Travaux exposant à des émanations de produits de pyrolyse du chlorure de polyvinyle (notamment dans la soudure thermique), fréon, polyéthylène, propylène. 23. Travaux exposant à l'azodiacarbonamide, notamment dans l'industrie des plastiques et du caoutchouc et au styrène, isophoronediamine, aziridine polyfonctionnelle, triglycidyl isocyanurate 24. Préparation et mise en œuvre de colorants, notamment à hétérocycles, halogénés, acryloamines ou vinyl-sulfones, pipéridinyl triazine, ninhydrine. 25. Préparation et utilisation de colles au cyanoacrylate 26. Travaux exposant à des émanations de glutaraldéhyde 27. Travaux exposant à des émanations d'oxyde d'éthylène notamment lors de la stérilisation 28. Travaux de désinfection et de stérilisation exposant à des émanations de : chlorexidine, exachlorophène, benzisothiazoline-3 one et ses dérivés, organo-mercuriels, ammonium quaternaires et leurs dérivés, notamment le benzalkonium, et le chlorure de lauryl dimethylbenzylammonium

Tableau n° 84(suite) : Les rhinites et asthmes professionnels

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Rhinite récidivante en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test	7 jours	29. Fabrication et utilisation de détergents, notamment l'isononanoyl, oxybenzene sulfonate de sodium
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test	7 jours	30. Fabrication et conditionnement de chloramine-T. 31. Fabrication et utilisation de tétrazène
Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique	1 an	32. Synthèse des polypeptides exposant notamment au dicyclohexyl carbodimide, 4 methyl-morpholine, dichlorobenzene sulfonate. 33. Travaux de reprographie exposant notamment aux sels de diazonium ou à l'hydroquinone 34. Travaux exposant aux dérivés aminés des produits chlorés tels que la chloramine dans les piscines.

Tableau n° 85 : Les Sidéroses professionnelles

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l'association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé au moins de 40% par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu.	35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)	Travaux effectués au fond des mines de fer et travaux de concassage exposant à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer, notamment extraction, broyage et traitement des minerais de fer.

Maladies de la peau

2.2. Maladies de la peau

Tableau n° 86 : Les eczémas de contact allergique

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
--------------------------	--------------------------	--

Lésions eczématiformes récidivantes en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé	15 jours	Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : - AGENTS CHIMIQUES • Acide chloroplatinique • Chloroplatinates alcalins • Cobalt et ses dérivés • Persulfates alcalins • Thioglycolate d'ammonium • Épichlorhydrine • Hypochlorites alcalins • Ammoniums quaternaires et leurs sels, notamment dans les agents détergents cationiques • Dodecyl-aminocethyl glycine • Insecticides organochlorés • Phénothiazines • Pipérazine • Mercapto-benzothiazole • Sulfure de tétraméthyl-thiurame • Acide mercapto-propionique et ses dérivés • N-isopropyl N'phenylparaphénylène-diamine et ses dérivés • Hydroquinone et ses dérivés • Dithiocarbamates • Sels de diazonium, notamment chlorure de thylaminobenzene 3-one • Dérivés de la thiourée • Acrylate et méthacrylates • Résines dérivées du para-tert-butylphénol et du para-tert-butylcatéchol • Dicyclohexylcarbodiimide • Glutaraldehyde - PRODUITS VEGETAUX OU D'ORIGINE VEGETALE • Produits d'extraction du pin, notamment essence de térébenthine, colophane et ses dérivés • Baume du Pérou • Urushiol (laque de Chine) • Plantes contenant des lactones sesquiterpéniques (notamment artichaut, arnica, chrysanthème ; camomille, laurier noble, saussurea, frullania, bois de tulipier, armoise, dahlia) • Primevère • Tulipe • Alliacé (notamment ail et oignon) • Farine de céréales
---	------------------------	--

2.3. Troubles Musculo-Squelettiques

Tableau n° 87 : Les Troubles Musculo-Squelettiques (T M S)

(Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
- A - Epaule Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle.	7 jours 90 jours	Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.
- B - Coude Epicondylite.	7 jours	Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination.
Epitrochléite.	7 jours	
Hygromas : - hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude.	7 jours	Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de supination et pronosupination.
hygroma chronique des bourses séreuses.	90 jours	Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécrânienne (compression du nerf cubital)	90 jours	Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
		Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.

- C - Poignet – Main et doigt Tendinite. Ténosynovite. Syndrome du canal carpien. Syndrome de la loge de Guyon.	7 jours 7 jours 30 jours 30 jours	Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
---	---	---

Troubles Musculo-Squelettiques

Tableau n° 87 (suite) : Les Troubles Musculo-Squelettiques (T M S)

(Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail)

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
- D - Genou Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe. Hygromas : - hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du genou ; - hygroma chronique des bourses séreuses. Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne. Tendinite de la patte d'oie.	7 jours 7 jours 90 jours 7 jours 7 jours	Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée. Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou. Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou. Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongée du genou. Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongée du genou.
- E - Cheville et ped Tendinite achilléenne.	7 jours	Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.
- F- Rachis lombo-sacré Sciatique lombaire par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Sciatique crurale par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.	6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)	Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station debout prolongée.

3. AUTRES AGENTS**Tableau n° 88 : Nystagmus professionnel**

DESIGNATION DES MALADIES	DELAI DE PRISE EN CHARGE	LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Nystagmus	1 an	Travaux exécutés dans les mines

CONFÉRENCE INTERAFRICAINNE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE

Hanoukopé - Avenue Kléber DADJO, BP 1228 Lomé-Togo

Fax : +228 22 21 41 89 - Tél. : +228 22 21 17 94/ 22 21 20 45/ 22 21 20 85

Email : cipres@lacipres.org - Site web : www.lacipres.org

Les Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) de la zone CIPRES

CNSS Bénin - CNSS Burkina - CARFO Burkina - CNPS Cameroun - CNSS Centrafrique - CNSPS des Comores- CNSS Congo - IPS CNPS Côte d'Ivoire IPS
CGRAE Côte d'Ivoire CNSS Gabon - CNAMGS Gabon - CPPF Gabon - INPS Guinée-Bissau - INSESO Guinée Equatoriale - CNaPS Madagascar INPS Mali -
CANAM Mali - CMSS Mali - CNSS Niger - CNSS RD Congo - CSS Sénégal - IPRES Sénégal - CNPS T