

修論ゼミ

須賀勇貴

茨城大学大学院 理工学研究科 量子線科学専攻 2 年

2023 年 7 月 20 日

1 4.2 WW^T におけるスピン相関

2 4.3 磁化と特異値分解 (SVD)

3 4.4 固有値スペクトルと W に格納された情報

1 4.2 WW^T におけるスピン相関

2 4.3 磁化と特異値分解 (SVD)

3 4.4 固有値スペクトルと W に格納された情報

4.2 WW^T におけるスピン相関





Figure 12: Elements of WW^T when the hidden layer has 16 (left), 100 (center), 400 (right) neurons.

図 12 は TypeV の RBM での行列 WW^T (100×100) の各要素の値をプロットしたもの

$$(\sigma_{1,1}, \sigma_{1,2}, \dots, \sigma_{1,L}, \sigma_{2,1}, \dots, \sigma_{2,L}, \sigma_{3,1}, \dots, \sigma_{L,L})$$

\Downarrow

$$(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_L, \sigma_{L+1}, \dots, \sigma_{2L}, \sigma_{2L+1}, \dots, \sigma_{LL})$$



4.2 WW^T におけるスピン相関




Figure 12: Elements of WW^T when the hidden layer has 16 (left), 100 (center), 400 (right) neurons.

図からわかること


- どの場合も対角成分の値は大きい
- $N_h = 400$, $N_h = 100$ の時は対角行列に近い
- $N_h = 16 < 100$ の時, 非対角成分にも大きな値が存在

⇒ $N_h = 16$ の時の WW^T は入力配位のスピン相関を反映しているに違いない!!

4.2 WW^T におけるスピン相関

図からわかること

- WW^T の相関は高温でより急速に減少
⇒RBM は相関距離 (クラスターのサイズ) を正確に学習している
- TypeV は $T=2$ と $T=3$ の間
⇒TypeV の RBM は T_c 付近の配位と似た特徴を取得した



1 4.2 WW^T におけるスピン相関

2 4.3 磁化と特異値分解 (SVD)

3 4.4 固有値スペクトルと W に格納された情報

4.3 磁化と特異値分解 (SVD)

WW^\top の固有値, 固有ベクトルをそれぞれ λ_a, u_a ($a = 1, \dots, N_h$) とする


$$WW^\top u_a = \lambda_a u_a$$

入力の配位ベクトル $v^{(0)}$ は固有値ベクトルを使って $v^{(0)} = \sum_a c_a u_a$ (規格化条件: $\sum_a (c_a)^2 = 1$) のように分解することができるので

$$\begin{aligned} v^{(0)\top} WW^\top v^{(0)\top} &= \left(\sum_a c_a u_a \right)^\top WW^\top \left(\sum_a c_a u_a \right) \\ &= \left(\sum_a c_a u_a \right)^\top \left(\sum_a c_a \lambda_a u_a \right) \\ &= \sum_a \sum_{a'} c_a c_{a'} \lambda_{a'} (u_a)^\top u_{a'} \\ &= \sum_a c_a^2 \lambda_a \end{aligned}$$





$\Rightarrow v^{(0)}$ が WW^\top の固有値の要素を多く含んでいれば $v^{(0)\top} WW^\top v^{(0)\top}$ の値が大きくなる

4.3 磁化と特異値分解 (SVD)



- 臨界点付近で大きな変化 (イジングモデルの磁化を思わせる)

4.3 磁化と特異値分解 (SVD)



4.3 磁化と特異値分解 (SVD)

図 15 から分かること

- N_h が大きい時と小さいとで臨界点付近での値の変化量が異なる
→ この違いが図 6 と図 9 の RBM フローの違いを引き起こす原因?
- H_h が大きいときは高温の時も値が大きい
→ N_h が大きい RBM は高温における特徴をより多く学習しているのではないか?

これは第 3.2 節の 2 番目の予想に他ならず、これは、4.2 章のスピン相関の振舞いで裏付けられている!!!

1 4.2 WW^T におけるスピン相関

2 4.3 磁化と特異値分解 (SVD)

3 4.4 固有値スペクトルと W に格納された情報

4.4 固有値スペクトルと W に格納された情報

4.4 固有値スペクトルと W に格納された情報