

《计算机辅助几何设计》作业1

1. 证明题

1.1. 证明：一条空间Bezier曲线为平面曲线的充要条件是其控制顶点共面

充分性：

控制顶点共面，则存在两个不共线的共面向量 \mathbf{u} 和 \mathbf{v} 使得

$$\mathbf{p}_i = \alpha_i \mathbf{u} + \beta_i \mathbf{v}$$

所以Bezier曲线表示为：

$$\begin{aligned} \mathbf{f}(t) &= \sum_{i=1}^n b_i(t) \mathbf{p}_i \\ &= \sum_{i=1}^n b_i(t) (\alpha_i \mathbf{u} + \beta_i \mathbf{v}) \\ &= \mathbf{u} \sum_{i=1}^n b_i(t) \alpha_i + \mathbf{v} \sum_{i=1}^n b_i(t) \beta_i \\ &= \alpha' \mathbf{u} + \beta' \mathbf{v} \end{aligned}$$

故 $\mathbf{f}(t)$ 与 \mathbf{u} 、 \mathbf{v} 共面，即为平面曲线

必要性：

假设控制顶点不共面，且空间Bezier曲线为平面曲线，则有

$$\mathbf{f}(t) = \alpha' \mathbf{u} + \beta' \mathbf{v}$$

且

$$\mathbf{p}_i = \alpha_i \mathbf{u} + \beta_i \mathbf{v} + \gamma_i \mathbf{w}$$

其中， \mathbf{u} ， \mathbf{v} 与 \mathbf{w} 不共面， α_i ， β_i 和 γ_i 均不恒为0，Bezier曲线的基函数和形式为：

$$\begin{aligned} \mathbf{f}(t) &= \sum_{i=1}^n b_i(t) \mathbf{p}_i \\ &= \sum_{i=1}^n b_i(t) (\alpha_i \mathbf{u} + \beta_i \mathbf{v} + \gamma_i \mathbf{w}) \\ &= \sum_{i=1}^n b_i(t) \alpha_i \mathbf{u} + \sum_{i=1}^n b_i(t) \beta_i \mathbf{v} + \sum_{i=1}^n b_i(t) \gamma_i \mathbf{w} \end{aligned}$$

欲使Bezier曲线为平面曲线，则应有

$$\sum_{i=1}^n b_i(t) \gamma_i = 0$$

而 $b_i(t)$ 不恒为0，故 $\gamma_i \equiv 0$ ，即 $\mathbf{p}_i = \alpha_i \mathbf{u} + \beta_i \mathbf{v}$ ，因此控制点依然共面

综上所述，一条空间Bezier曲线为平面曲线的充要条件是其控制顶点共面

1.2. 证明：一条Bezier曲线的弧长不大于其控制多边形的周长

设Bezier曲线方程为 $\mathbf{f}(t)$ ，曲线弧长为 L ，多边形周长为 C ，则Bezier曲线弧长为：

$$\begin{aligned}
L &= \int_0^1 \|\mathbf{f}'(t)\| dt \\
&= \int_0^1 \left\| n \sum_{i=0}^{n-1} B_i^{(n-1)}(t) (\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i) \right\| dt \\
&\leq n \sum_{i=0}^{n-1} \|\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i\| \cdot \int_0^1 B_i^{(n-1)}(t) dt
\end{aligned}$$

由Bernstein基函数的导数性质

$$\frac{d}{dt} B_i^{(n)}(t) = n \left[B_{i-1}^{(n-1)}(t) - B_i^{(n-1)}(t) \right]$$

0到1积分有：

$$B_i^{(n)}(1) - B_i^{(n)}(0) = n \left[\int_0^1 B_{i-1}^{(n-1)}(t) dt - \int_0^1 B_i^{(n-1)}(t) dt \right] = 0$$

以此类推有：

$$\int_0^1 B_0^{(n-1)}(t) dt = \int_0^1 B_1^{(n-1)}(t) dt = \cdots = \int_0^1 B_{n-1}^{(n-1)}(t) dt = \frac{1}{n}$$

故

$$L \leq \sum_{i=0}^{n-1} \|\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i\| = C$$

证毕

1.3 圆弧不能用Bezier曲线精确表示

假设Bezier曲线能够精确表示圆，设圆心为 \mathbf{c} ，半径为 R ，则对相应Bezier曲线 $\mathbf{f}(t)$ ，有

$$\|\mathbf{f}(t) - \mathbf{c}\| = R$$

其中，

$$\mathbf{f}(t) = \sum_{i=1}^n B_i^n(t) \mathbf{p}_i$$

$$B_i^n(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}$$

Bernstein基函数为多项式函数，故 $\|\mathbf{f}(t) - \mathbf{c}\| \neq \text{const}$ ，假设不成立


因此，圆弧不能用Bezier曲线精确表示

1.4. 试求 n 次Bezier曲线及其控制点首末顶点与原点所围成的区域（如下图灰色区域）的面积（用控制顶点的坐标表达）

设Bezier曲线方程为 $\mathbf{f}(t) = \sum_{i=1}^n B_i^n(t) \mathbf{p}_i$

$$\begin{aligned}
S &= \int_0^1 \mathbf{f}(t) \times \mathbf{f}'(t) dt \\
&= \int_0^1 \left(\sum_{i=0}^n B_i^n(t) \mathbf{p}_i \right) \times \left(n \sum_{i=0}^{n-1} B_i^{n-1}(t) (\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i) \right) dt \\
&= n \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{n-1} \mathbf{p}_i \times (\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i) \int_0^1 B_i^n(t) B_j^{n-1}(t) dt \\
&= n \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{n-1} \mathbf{p}_i \times (\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i) C_n^i C_{n-1}^j \int_0^1 t^{i+j} (1-t)^{2n-1-(i+j)} dt \\
&= n \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{n-1} \mathbf{p}_i \times (\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i) \frac{C_n^i C_{n-1}^j}{C_{2n-1}^{i+j}} \int_0^1 C_{2n-1}^{i+j} t^{i+j} (1-t)^{2n-1-(i+j)} dt \\
&= n \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{n-1} \mathbf{p}_i \times (\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i) \frac{C_n^i C_{n-1}^j}{C_{2n-1}^{i+j}} \int_0^1 B_{i+j}^{2n-1} dt \\
&= \frac{1}{2} \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^{n-1} \frac{C_n^i C_{n-1}^j}{C_{2n-1}^{i+j}} \mathbf{p}_i \times (\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i)
\end{aligned}$$

2. 程序说明



- 鼠标左键单击空白处添加控制点
- 鼠标左键单击已有控制点选定点
- 键盘 delete 按键删除选定控制点