

# 《简明线性代数》习题参考答案

作者: txbb

## 第二章 行列式

### 习题 2.1 n 元排列

1. 求下列各个排列的逆序数, 并且指出它们的奇偶性:

(1) 315462

解: 统计每个元素前比它大的元素个数 (或后方比它小的元素个数):

- 3 后面比 3 小的有: 1, 2 (2 个)
- 1 后面比 1 小的有: 无 (0 个)
- 5 后面比 5 小的有: 4, 2 (2 个)
- 4 后面比 4 小的有: 2 (1 个)
- 6 后面比 6 小的有: 2 (1 个)
- 2 后面无 (0 个)

逆序数  $\tau = 2 + 0 + 2 + 1 + 1 + 0 = 6$ 。该排列为偶排列。

(2) 365412

解:

- 3 后有 1, 2 (2 个)
- 6 后有 5, 4, 1, 2 (4 个)
- 5 后有 4, 1, 2 (3 个)
- 4 后有 1, 2 (2 个)
- 1 后无 (0 个)

逆序数  $\tau = 2 + 4 + 3 + 2 + 0 = 11$ 。该排列为奇排列。

## (3) 654321

解：这是自然顺序 123456 的逆序排列。 $n = 6$ ，逆序数  $\tau = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$ 。该排列为奇排列。

## (4) 7654321

解：这是自然顺序的逆序排列。 $n = 7$ ，逆序数  $\tau = \frac{7 \times 6}{2} = 21$ 。该排列为奇排列。

## (5) 87654321

解：这是自然顺序的逆序排列。 $n = 8$ ，逆序数  $\tau = \frac{8 \times 7}{2} = 28$ 。该排列为偶排列。

## (6) 987654321

解：这是自然顺序的逆序排列。 $n = 9$ ，逆序数  $\tau = \frac{9 \times 8}{2} = 36$ 。该排列为偶排列。

## (7) 123456789

解：这是自然排列（标准排列）。逆序数  $\tau = 0$ 。该排列为偶排列。

## (8) 518394267

解：统计逆序数：

- 5: 1, 3, 4, 2 (4 个)
- 1: (0 个)
- 8: 3, 4, 2, 6, 7 (5 个)
- 3: 2 (1 个)
- 9: 4, 2, 6, 7 (4 个)
- 4: 2 (1 个)
- 2: (0 个)
- 6: (0 个)

逆序数  $\tau = 4 + 0 + 5 + 1 + 4 + 1 + 0 + 0 = 15$ 。该排列为奇排列。

## (9) 518694237

解：统计逆序数：

- 5: 1, 4, 2, 3 (4 个)
- 1: (0 个)
- 8: 6, 4, 2, 3, 7 (5 个)

- 6: 4, 2, 3 (3 个)
- 9: 4, 2, 3, 7 (4 个)
- 4: 2, 3 (2 个)
- 2: (0 个)
- 3: (0 个)

逆序数  $\tau = 4 + 0 + 5 + 3 + 4 + 2 = 18$ 。该排列为偶排列。

## 2. 求下列 $n$ 元排列的逆序数:

(1)  $(n-1)(n-2)\cdots 21n$

**解:** 该排列前  $n-1$  个元素是  $n-1, n-2, \dots, 1$ , 即 1 到  $n-1$  的逆序排列, 其逆序数为  $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ 。最后一个元素  $n$  是最大的, 排在最后, 不与前面的任何元素构成逆序。故总逆序数为:

$$\tau = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$$

(2)  $23\cdots(n-1)n1$

**解:** 元素 1 位于最后一位, 它比前面的  $2, 3, \dots, n$  这  $n-1$  个数都小, 因此构成  $n-1$  个逆序。前面的  $2, 3, \dots, n$  自身是自然顺序, 逆序数为 0。故总逆序数为:

$$\tau = n - 1$$

## 3. 写出把排列 315462 变成排列 123456 的那些对换。

**解:** 我们可以通过逐步归位的方法进行对换 (方法不唯一):

1. 当前: 3 1 5 4 6 2。目标首位是 1, 交换 3 和 1:

$$3\ 1\ 5\ 4\ 6\ 2 \xrightarrow{(3,1)} 1\ 3\ 5\ 4\ 6\ 2$$

2. 第二位目标是 2, 2 在最后, 交换 3 和 2:

$$1\ 3\ 5\ 4\ 6\ 2 \xrightarrow{(3,2)} 1\ 2\ 5\ 4\ 6\ 3$$

3. 第三位目标是 3, 3 在最后, 交换 5 和 3:

$$1\ 2\ 5\ 4\ 6\ 3 \xrightarrow{(5,3)} 1\ 2\ \mathbf{3}\ 4\ 6\ 5$$

4. 第四位是 4, 已归位。

5. 第五位目标是 5, 交换 6 和 5:

$$1\ 2\ 3\ 4\ 6\ 5 \xrightarrow{(6,5)} 1\ 2\ 3\ 4\ \mathbf{5}\ \mathbf{6}$$

所作对换为:  $(1, 3), (2, 3), (3, 5), (5, 6)$  (答案不唯一, 但必定是偶数次)。

4. 求  $n$  元排列  $n(n-1)\cdots 321$  的逆序数, 并且讨论它的奇偶性。

解: 这是  $1, 2, \dots, n$  的完全逆序排列。逆序数为:

$$\tau = (n-1) + (n-2) + \cdots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$$

奇偶性讨论:

- 当  $n \equiv 0$  或  $1 \pmod{4}$  时,  $\frac{n(n-1)}{2}$  为偶数, 是偶排列。
- 当  $n \equiv 2$  或  $3 \pmod{4}$  时,  $\frac{n(n-1)}{2}$  为奇数, 是奇排列。

5. 如果  $n$  元排列  $j_1 j_2 \cdots j_{n-1} j_n$  的逆序数为  $r$ , 求  $n$  元排列  $j_n j_{n-1} \cdots j_2 j_1$  的逆序数。

解: 在  $n$  个元素的所有  $\frac{n(n-1)}{2}$  个元素对中, 任意一对  $(a, b)$  在原排列中要么构成逆序, 要么构成顺序。当排列倒序后 (即变成  $j_n \cdots j_1$ ), 原先的顺序对变为逆序对, 原先的逆序对变为顺序对。设原排列逆序数为  $r$ , 则顺序对数为  $N - r$ , 其中  $N = \frac{n(n-1)}{2}$ 。倒序后, 原先的顺序对全部转化为逆序对。故新排列的逆序数为:

$$\tau' = \frac{n(n-1)}{2} - r$$

6. 计算下列 2 阶行列式:

(1)  $\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$  解: 原式  $= 3 \times 2 - (-1) \times 5 = 6 + 5 = 11$ 。

$$(2) \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \quad \text{解: 原式} = 0 \times 4 - 0 \times 1 = 0.$$

$$(3) \begin{vmatrix} -2 & 5 \\ 4 & -10 \end{vmatrix} \quad \text{解: 原式} = (-2) \times (-10) - 5 \times 4 = 20 - 20 = 0.$$

---

7. 利用 2 阶行列式, 判断下述二元一次方程组是否有惟一解? 并且当有惟一解时, 求出这个解。

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 = 7 \\ 5x_1 + 4x_2 = 6 \end{cases}$$

解: 计算系数行列式  $D$ :

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 2 \times 4 - (-3) \times 5 = 8 + 15 = 23$$

因为  $D = 23 \neq 0$ , 所以该方程组有惟一解。

利用克拉默法则 (Cramer's Rule) 求解:

$$D_1 = \begin{vmatrix} 7 & -3 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} = 7 \times 4 - (-3) \times 6 = 28 + 18 = 46$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 2 \times 6 - 7 \times 5 = 12 - 35 = -23$$

故解为:

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{46}{23} = 2, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{-23}{23} = -1$$

即方程组的解为  $\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = -1 \end{cases}$ 。

习题 2.2  $n$  阶行列式的定义

## 1. 按定义计算下列行列式:

(1)

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a_{14} \\ 0 & 0 & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

**解:** 根据行列式的定义, 每一行必须取不同列的元素。

- 第 1 行只能取第 4 列的  $a_{14}$  (其余为 0)。
- 第 2 行只能取第 3 列的  $a_{23}$  (第 4 列已被占, 其余为 0)。
- 第 3 行只能取第 2 列的  $a_{32}$  (第 3、4 列已被占, 其余为 0)。
- 第 4 行只能取第 1 列的  $a_{41}$ 。

所取元素为  $a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}$ , 列标排列为 4321。该排列的逆序数  $\tau(4321) = 3 + 2 + 1 + 0 = 6$  (偶数)。

**故原式**  $= a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}$ 。

(2)

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 0 & \cdots & a_2 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n-1} & \cdots & 0 & 0 \\ a_n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

**解:** 这是副对角线行列式。非零项为  $a_1a_2\cdots a_n$ 。列标排列为  $n, n-1, \cdots, 2, 1$ 。该排列的逆序数为  $\tau = (n-1) + (n-2) + \cdots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$ 。

**故原式**  $= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_1a_2\cdots a_n$ 。

(3)

$$\begin{vmatrix} 0 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{n-1} \\ b_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

**解：**每行取非零元素，得到的项为  $b_1 b_2 \cdots b_{n-1} b_n$ 。对应的列标排列为： $2, 3, \cdots, n, 1$ 。计算逆序数：

- 元素  $2, 3, \dots, n$  之间不构成逆序。
- 最后一位是  $1$ ，它比前面的  $n-1$  个数都小，构成  $n-1$  个逆序。

总逆序数  $\tau = n-1$ 。

$$\text{故原式} = (-1)^{n-1} b_1 b_2 \cdots b_n。$$

(4)

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a_2 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_n \end{vmatrix}$$

**解：**该行列式可视为  $n$  阶行列式。非零项为  $a_1 a_2 \cdots a_{n-1} a_n$ 。列标排列为： $n-1, n-2, \cdots, 1, n$ 。

- 前  $n-1$  个元素是  $1$  到  $n-1$  的逆序排列，逆序数为  $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ 。
- 最后一个元素  $n$  大于前面所有元素，不产生逆序。

总逆序数  $\tau = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$ 。

$$\text{故原式} = (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} a_1 a_2 \cdots a_n。$$

(5)

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 8 & 0 & 0 \\ 4 & 9 & 0 & 7 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}$$

**解：**利用行列式定义，选取不同行不同列的非零元素乘积。

- 第 1 行必取 1 (第 4 列);
- 第 2 行必取 2 (第 3 列);
- 第 5 行必取 5 (第 5 列);
- 剩下第 3 行和第 4 行，列 1 和列 2 可选。
- 第 3 行若取 8 (第 3 列) 则冲突，故必取 3 (第 2 列);
- 第 4 行若取 9 (第 2 列) 或 7 (第 4 列) 均冲突，故必取 4 (第 1 列)。

非零项为  $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$ 。列标排列为 4, 3, 2, 1, 5。逆序数计算：

- 4: 后有 3, 2, 1 (3 个)
- 3: 后有 2, 1 (2 个)
- 2: 后有 1 (1 个)
- 1, 5: (0 个)

$\tau = 6$  (偶数)。

**故原式**  $= 120$ 。

## 2. 计算下列 3 阶行列式：

(1)

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 6 \end{vmatrix}$$



解：利用对角线法则：

$$\begin{aligned}\text{原式} &= 1 \cdot 5 \cdot 6 + 4 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 \cdot 1 - (2 \cdot 5 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 4 \cdot 3 \cdot 6) \\ &= 30 + 8 + 6 - (20 + 1 + 72) \\ &= 44 - 93 = -49\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & 4 & 6 \end{vmatrix}$$

解：

$$\begin{aligned}\text{原式} &= 2 \cdot 1 \cdot 6 + (-1)(-2) \cdot 1 + 5 \cdot 3 \cdot 4 - (5 \cdot 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 \cdot 6 + 2(-2) \cdot 4) \\ &= 12 + 2 + 60 - (5 - 18 - 16) \\ &= 74 - (-29) = 103\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix}$$

解：这是一个上三角形行列式，其值等于主对角线元素的乘积。

$$\text{故原式} = a_{11}a_{22}a_{33}。$$

(4)

$$\begin{vmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & a_2 \\ 0 & b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

解：按第一行展开（见 2.4 方法，对角线法则也可简单求得）：

$$\text{原式} = c \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = c(a_1b_2 - a_2b_1)$$

\*3. 用行列式定义计算：

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \\ c_1 & c_2 & 0 & 0 & 0 \\ d_1 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ e_1 & e_2 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

**解：**观察行列式的最后三行（第 3, 4, 5 行）。这三行的非零元素只集中在第 1 列和第 2 列。根据行列式的定义，展开式的每一项是从每一行取一个不同列的元素的乘积。我们需要从第 3, 4, 5 行分别取元素，且这些元素的列标必须互不相同。然而，这三行的非零元素只能提供 2 个可用的列标（列 1 和列 2）。而要在 2 个可用的列中选出 3 个不同的列是不可能的。因此，在行列式的所有展开项中，至少有一个因子必为 0。

**故该行列式的值为 0。**

---

#### 4. $n$ 阶行列式的反对角线上 $n$ 个元素的乘积一定带负号吗？

**解：**不一定。

$n$  阶行列式反对角线上的元素乘积项为  $a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$ 。对应的列标排列为  $n, n-1, \cdots, 2, 1$ 。该排列的逆序数为  $\tau = \frac{n(n-1)}{2}$ 。该项的符号由  $(-1)^\tau$  决定。

- 当  $n = 2$  时， $\tau = 1$ ，符号为负（-）。
- 当  $n = 3$  时， $\tau = 3$ ，符号为负（-）。
- 当  $n = 4$  时， $\tau = 6$ ，符号为正（+）。
- 当  $n = 5$  时， $\tau = 10$ ，符号为正（+）。

一般来说：

- 若  $n \equiv 0$  或  $1 \pmod{4}$ ， $\frac{n(n-1)}{2}$  为偶数，带正号。
- 若  $n \equiv 2$  或  $3 \pmod{4}$ ， $\frac{n(n-1)}{2}$  为奇数，带负号。

## 习题 2.3 行列式的性质

## 1. 计算下列行列式:

(1)

$$\begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 196 & 203 & 199 \end{vmatrix}$$

**解:** 先提取第二行的公因子 2, 然后利用第三行的大数与上方行的关系简化。我们观察到  $196 = 200 - 4$ ,  $203 = 200 + 3$ ,  $199 = 200 - 1$ 。利用第二列:  $C_2 - 600C_3$  会太繁琐。直接观察行变换:  $R_3 - 100R_2 = (196 - 200, 203 - 200, 199 - 200) = (-4, 3, -1)$ 。

$$\text{原式} = 2 \begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 196 & 203 & 199 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 - 100R_2} 2 \begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & -1 \end{vmatrix}$$

利用第二行消元第一行和第三行:

$$\xrightarrow[\begin{smallmatrix} R_3 + 4R_2 \\ R_1 - 5R_2 \end{smallmatrix}]{2} \begin{vmatrix} 0 & -6 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 7 & 3 \end{vmatrix}$$

按第一列展开:

$$= 2 \times 1 \times (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -6 & -2 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = -2(-18 - (-14)) = -2(-4) = 8$$

(2)

$$\begin{vmatrix} -1 & 203 & 1/3 \\ 3 & 298 & 1/2 \\ 5 & 399 & 2/3 \end{vmatrix}$$

**解:** 观察第二列元素接近 200, 300, 400 的整数倍。第三列乘以 600 即可得到 200, 300, 400。作列变换  $C_2 - 600C_3$ :

- $203 - 600 \times \frac{1}{3} = 203 - 200 = 3$
- $298 - 600 \times \frac{1}{2} = 298 - 300 = -2$
- $399 - 600 \times \frac{2}{3} = 399 - 400 = -1$

$$\text{原式} = \begin{vmatrix} -1 & 3 & 1/3 \\ 3 & -2 & 1/2 \\ 5 & -1 & 2/3 \end{vmatrix}$$

提取第三列的公因子  $\frac{1}{6}$  (为了处理整数):

$$= \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & 3 \\ 5 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

利用第一行消元:

$$\xrightarrow[R_3+5R_1]{R_2+3R_1} \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 7 & 9 \\ 0 & 14 & 14 \end{vmatrix}$$

按第一列展开:

$$= \frac{1}{6} \times (-1) \times \begin{vmatrix} 7 & 9 \\ 14 & 14 \end{vmatrix} = -\frac{1}{6} (7 \times 14 - 9 \times 14) = -\frac{1}{6} \times 14 \times (-2) = \frac{28}{6} = \frac{14}{3}$$

(3)

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ -4 & -1 & 0 & -5 \\ 2 & 3 & -1 & -6 \\ 3 & 3 & -4 & 1 \end{vmatrix}$$

**解:** 利用  $a_{11} = 1$  将第一列其他元素化为 0。

$$\xrightarrow[R_3-2R_1, R_4-3R_1]{R_2+4R_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & -1 & -12 & 3 \\ 0 & 3 & 5 & -10 \\ 0 & 3 & 5 & -5 \end{vmatrix}$$

按第一列展开, 得到 3 阶行列式。观察到第 3 行与第 4 行前两个元素相同, 作  $R_3 - R_2$  (指新矩阵的行):

$$= 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & -12 & 3 \\ 3 & 5 & -10 \\ 3 & 5 & -5 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3-R_2} \begin{vmatrix} -1 & -12 & 3 \\ 3 & 5 & -10 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}$$

按第 3 行展开:

$$= 5 \times (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} -1 & -12 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 5(-5 - (-36)) = 5 \times 31 = 155$$

(4)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

**解：**各行元素之和均为  $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ 。将第 2, 3, 4 列加到第 1 列上，并提取公因子 10：

$$\xrightarrow{C_1+C_2+C_3+C_4} \begin{vmatrix} 10 & 2 & 3 & 4 \\ 10 & 3 & 4 & 1 \\ 10 & 4 & 1 & 2 \\ 10 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

将第 1 行分别从第 2, 3, 4 行中减去：

$$\xrightarrow{R_i-R_1} 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

按第一列展开：

$$= 10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

观察第 3 行与第 1 行的关系，作  $R_3 + R_1$ ：

$$\xrightarrow{R_3+R_1} 10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{vmatrix}$$

按第 3 行展开：

$$= 10 \times (-4) \times (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -40(-2 - 2) = -40(-4) = 160$$

2. 计算下列  $n$  阶行列式：

(1)

$$D = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a \end{vmatrix}$$

解：各列加到第 1 列上（每行元素之和为  $a+n-1$ ）：

$$D \xrightarrow{\sum C_i \rightarrow C_1} \begin{vmatrix} a+n-1 & 1 & \cdots & 1 \\ a+n-1 & a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a+n-1 & 1 & \cdots & a \end{vmatrix} = (a+n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & a \end{vmatrix}$$

将第 1 行分别从其余各行减去  $R_i - R_1$ ：

$$= (a+n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a-1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a-1 \end{vmatrix}$$

这是一个上三角形行列式，故

$$D = (a+n-1)(a-1)^{n-1}$$

(2)

$$D = \begin{vmatrix} a_1 - b & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 - b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n - b \end{vmatrix}$$

解：从第 1 行到第  $n-1$  行，分别减去第  $n$  行： $R_i - R_n$  ( $i = 1, \dots, n-1$ )。

- 第 1 行变： $(-b, 0, \dots, 0, b)$
- 第 2 行变： $(0, -b, \dots, 0, b)$
- ...

$$D = \begin{vmatrix} -b & 0 & \cdots & 0 & b \\ 0 & -b & \cdots & 0 & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -b & b \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n - b \end{vmatrix}$$

将第 1 列到第  $n-1$  列全部加到第  $n$  列上:

- 第  $n$  列的前  $n-1$  个元素变为:  $b + (-b) = 0$ 。
- 第  $n$  列的最后一个元素变为:  $(a_n - b) + a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} = \sum_{i=1}^n a_i - b$ 。

$$D = \begin{vmatrix} -b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -b & 0 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & \sum a_i - b \end{vmatrix}$$

这是一个下三角形行列式 (或对角形), 故

$$D = (-b)^{n-1} \left( \sum_{i=1}^n a_i - b \right)$$

### 3. 证明 (也可参考书中例 3 做法):

(1)

$$\begin{vmatrix} a_1 - b_1 & b_1 - c_1 & c_1 - a_1 \\ a_2 - b_2 & b_2 - c_2 & c_2 - a_2 \\ a_3 - b_3 & b_3 - c_3 & c_3 - a_3 \end{vmatrix} = 0$$

证: 记该行列式的列向量为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 。观察各列之和:

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \begin{pmatrix} (a_1 - b_1) + (b_1 - c_1) + (c_1 - a_1) \\ (a_2 - b_2) + (b_2 - c_2) + (c_2 - a_2) \\ (a_3 - b_3) + (b_3 - c_3) + (c_3 - a_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

即三列线性相关 ( $C_1 + C_2 + C_3 = 0$ ), 故行列式的值为 0。得证。

(2)

$$\begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & a_1 + b_3 \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & a_2 + b_3 \\ a_3 + b_1 & a_3 + b_2 & a_3 + b_3 \end{vmatrix} = 0$$

证: 作列变换:  $C_2 - C_1$  和  $C_3 - C_1$ 。

$$\text{左式} = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & b_2 - b_1 & b_3 - b_1 \\ a_2 + b_1 & b_2 - b_1 & b_3 - b_1 \\ a_3 + b_1 & b_2 - b_1 & b_3 - b_1 \end{vmatrix}$$

观察变换后的第 2 列和第 3 列：第 2 列元素均为  $b_2 - b_1$ ；第 3 列元素均为  $b_3 - b_1$ 。若  $b_2 - b_1 = 0$  或  $b_3 - b_1 = 0$ ，则有零列，行列式为 0。若均不为 0，则第 2 列与第 3 列成比例（比例系数为  $\frac{b_2-b_1}{b_3-b_1}$ ），两列线性相关。故行列式的值为 0。得证。

**\*4. 计算下列  $n$  阶行列式：**

(1)

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ b_2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_3 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

**解：**我们要消去第 1 列中除  $a_1$  以外的元素  $b_i$ 。利用第  $i$  行 ( $i = 2, \dots, n$ ) 的对角元 1，将第 1 列的  $b_i$  消去。具体操作： $C_1 - b_2C_2 - b_3C_3 - \cdots - b_nC_n$ 。第 1 列第 1 行的元素变为：

$$a_1 - (a_2b_2 + a_3b_3 + \cdots + a_nb_n) = a_1 - \sum_{k=2}^n a_kb_k$$

第 1 列其余元素变为： $b_i - 1 \cdot b_i = 0$ 。变换后的行列式为下三角矩阵（实际上除第一行外是单位矩阵）：

$$D = \begin{vmatrix} a_1 - \sum_{k=2}^n a_kb_k & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = a_1 - \sum_{k=2}^n a_kb_k$$

(2)

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - a_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix}$$

其中  $a_i \neq 0$ 。

**解：**利用初等行变换将行列式化简。



第一步：将第 1 行分别从第 2 行、第 3 行、 $\cdots$ 、第  $n$  行中减去（即  $r_i - r_1$ ，其中  $i = 2, \dots, n$ ）。目的是利用第一行的  $x_j$  消去下方各行的  $x_j$ 。

- 第 1 列变为： $x_1 - (x_1 - a_1) = a_1$
- 第  $i$  列 ( $i \neq 1$ ) 对角线上变为： $(x_i - a_i) - x_i = -a_i$
- 其他位置变为： $x_j - x_j = 0$

变换后的行列式为：

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ a_1 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix}$$

这是一个“爪形”行列式（或箭头形）。为了计算它，我们可以利用第 2 行到第  $n$  行的非零元素  $(-a_2, -a_3, \dots, -a_n)$  将第 1 行的  $x_2, x_3, \dots, x_n$  消为 0。

第二步：作行变换  $r_1 + \frac{x_2}{a_2}r_2 + \frac{x_3}{a_3}r_3 + \cdots + \frac{x_n}{a_n}r_n$ 。（题目已知  $a_i \neq 0$ ，故可以作分母）。

- 第 1 行第  $j$  列 ( $j \geq 2$ ) 变为： $x_j + \frac{x_j}{a_j}(-a_j) = 0$ 。
- 第 1 行第 1 列变为：

$$(x_1 - a_1) + \frac{x_2}{a_2}a_1 + \frac{x_3}{a_3}a_1 + \cdots + \frac{x_n}{a_n}a_1 = x_1 - a_1 + a_1 \sum_{k=2}^n \frac{x_k}{a_k}$$

提取  $-a_1$  公因子整理：

$$= -a_1 \left( 1 - \frac{x_1}{a_1} - \sum_{k=2}^n \frac{x_k}{a_k} \right) = -a_1 \left( 1 - \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{a_k} \right)$$

此时行列式变为：

$$D_n = \begin{vmatrix} -a_1(1 - \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{a_k}) & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix}$$

按第一行展开，得到一个下三角形行列式：

$$\begin{aligned}
 D_n &= \left[ -a_1 \left( 1 - \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{a_k} \right) \right] \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} -a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix} \\
 &= \left[ -a_1 \left( 1 - \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{a_k} \right) \right] \cdot ((-a_2)(-a_3) \cdots (-a_n)) \\
 &= (-a_1)(-a_2) \cdots (-a_n) \left( 1 - \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{a_k} \right) \\
 &= (-1)^n a_1 a_2 \cdots a_n \left( 1 - \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{a_i} \right)
 \end{aligned}$$

注：如果将括号展开，结果也可以写成：

$$D_n = (-1)^n \left( \prod_{i=1}^n a_i - \sum_{j=1}^n \left( x_j \prod_{k \neq j} a_k \right) \right)$$

## 习题 2.4 行列式按一行(列)展开

## 1. 计算下列行列式:

(1)

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 \\ 2 & -5 & 1 & -3 \\ 4 & 1 & -2 & 6 \\ -3 & 2 & 7 & 1 \end{vmatrix}$$

解: 利用第 1 行消去第 1 列的其他元素:  $R_2 - 2R_1, R_3 - 4R_1, R_4 + 3R_1$ 。

$$D \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & -11 \\ 0 & 9 & -2 & -10 \\ 0 & -4 & 7 & 13 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} -1 & 1 & -11 \\ 9 & -2 & -10 \\ -4 & 7 & 13 \end{vmatrix}$$

利用第 1 行消去第 1 列的其他元素:  $R_2 + 9R_1, R_3 - 4R_1$ 。

$$\begin{aligned} &= \begin{vmatrix} -1 & 1 & -11 \\ 0 & 7 & -109 \\ 0 & 3 & 57 \end{vmatrix} = (-1) \begin{vmatrix} 7 & -109 \\ 3 & 57 \end{vmatrix} \\ &= -(7 \times 57 - (-109) \times 3) = -(399 + 327) = -726 \end{aligned}$$

(2)

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -4 & -3 & 5 \\ -3 & 1 & 4 & -2 \\ 7 & 2 & 5 & 3 \\ 4 & -3 & -2 & 6 \end{vmatrix}$$

解: 选取  $a_{22} = 1$  作为主元, 消去第 2 列的其他元素:  $R_1 + 4R_2, R_3 - 2R_2, R_4 + 3R_2$ 。

$$D \rightarrow \begin{vmatrix} -10 & 0 & 13 & -3 \\ -3 & 1 & 4 & -2 \\ 13 & 0 & -3 & 7 \\ -5 & 0 & 10 & 0 \end{vmatrix} = 1 \times (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -10 & 13 & -3 \\ 13 & -3 & 7 \\ -5 & 10 & 0 \end{vmatrix}$$

提取第 3 行的  $-5$ :

$$= -5 \begin{vmatrix} -10 & 13 & -3 \\ 13 & -3 & 7 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

利用  $R_3$  消元:  $R_1 + 10R_3, R_2 - 13R_3$ 。

$$\begin{aligned}
 &= -5 \begin{vmatrix} 0 & -7 & -3 \\ 0 & 23 & 7 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = -5 \times 1 \times (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -7 & -3 \\ 23 & 7 \end{vmatrix} \\
 &= -5(-49 - (-69)) = -5(20) = -100
 \end{aligned}$$

(3)

$$D = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 5 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda - 5 \end{vmatrix}$$

**解:** 观察发现  $C_2$  与  $C_3$  对应元素相加有规律, 或直接做行变换  $R_2 + R_3$ 。

$$\xrightarrow{R_2+R_3} \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 2 \\ 0 & \lambda - 1 & \lambda - 1 \\ 2 & 4 & \lambda - 5 \end{vmatrix}$$

提取第 2 行公因子  $(\lambda - 1)$ :

$$= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & \lambda - 5 \end{vmatrix}$$

$C_3 - C_2$ :

$$= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & \lambda - 9 \end{vmatrix}$$

按第 2 行展开:

$$\begin{aligned}
 &= (\lambda - 1) \times 1 \times (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 4 \\ 2 & \lambda - 9 \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda - 1)((\lambda - 2)(\lambda - 9) - 8) = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 11\lambda + 18 - 8) \\
 &= (\lambda - 1)(\lambda^2 - 11\lambda + 10) = (\lambda - 1)(\lambda - 1)(\lambda - 10) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 10)
 \end{aligned}$$

(4)

$$D = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -3 & -2 \\ -1 & \lambda - 8 & -2 \\ 2 & 14 & \lambda + 3 \end{vmatrix}$$

**解：**为了避免直接展开产生高次项，利用  $a_{21} = -1$  消元。作行变换  $R_1 + (\lambda - 2)R_2$  以及  $R_3 + 2R_2$ ：

1.  $R_1$  变为：

- 第 1 列： $(\lambda - 2) + (\lambda - 2)(-1) = 0$
- 第 2 列： $-3 + (\lambda - 2)(\lambda - 8) = -3 + (\lambda^2 - 10\lambda + 16) = \lambda^2 - 10\lambda + 13$
- 第 3 列： $-2 + (\lambda - 2)(-2) = -2 - 2\lambda + 4 = -2(\lambda - 1)$

2.  $R_3$  变为：

- 第 1 列： $2 + 2(-1) = 0$
- 第 2 列： $14 + 2(\lambda - 8) = 14 + 2\lambda - 16 = 2(\lambda - 1)$
- 第 3 列： $(\lambda + 3) + 2(-2) = \lambda - 1$

得到新行列式并按第 1 列展开：

$$D = \begin{vmatrix} 0 & \lambda^2 - 10\lambda + 13 & -2(\lambda - 1) \\ -1 & \lambda - 8 & -2 \\ 0 & 2(\lambda - 1) & \lambda - 1 \end{vmatrix} = -(-1) \begin{vmatrix} \lambda^2 - 10\lambda + 13 & -2(\lambda - 1) \\ 2(\lambda - 1) & \lambda - 1 \end{vmatrix}$$

仅提取第 2 行的公因子  $(\lambda - 1)$ ：

$$= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda^2 - 10\lambda + 13 & -2(\lambda - 1) \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$

计算 2 阶行列式：

$$\begin{aligned} D &= (\lambda - 1) [1 \cdot (\lambda^2 - 10\lambda + 13) - 2 \cdot (-2(\lambda - 1))] \\ &= (\lambda - 1) [\lambda^2 - 10\lambda + 13 + 4(\lambda - 1)] \\ &= (\lambda - 1)(\lambda^2 - 10\lambda + 13 + 4\lambda - 4) \\ &= (\lambda - 1)(\lambda^2 - 6\lambda + 9) \\ &= (\lambda - 1)(\lambda - 3)^2 \end{aligned}$$

2. 计算  $n$  阶行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 1-n \end{vmatrix}$$

**解：**观察发现，从第 2 行开始，每一行的行和均为 0（例如第 2 行  $1 + (-1) = 0$ ，第 3 行  $2 + (-2) = 0$ ，第  $n$  行  $(n-1) + (1-n) = 0$ ）。将第 2 列、第 3 列、 $\cdots$ 、第  $n$  列全部加到第 1 列上： $C_1 + \sum_{j=2}^n C_j$ 。

- 第 1 行第 1 列变为： $\sum_{i=1}^n a_i$ 。
- 第  $i$  行 ( $i \geq 2$ ) 第 1 列变为：0。

$$D_n = \begin{vmatrix} \sum a_i & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-n \end{vmatrix}$$

按第 1 列展开，得到对角矩阵：

$$D_n = \left( \sum_{i=1}^n a_i \right) \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & -2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1-n \end{vmatrix}$$

这是一个下三角行列式，对角线元素为  $-1, -2, \cdots, -(n-1)$ 。

$$D_n = \left( \sum_{i=1}^n a_i \right) \cdot [(-1) \cdot (-2) \cdots (-(n-1))]$$

$$D_n = (-1)^{n-1} (n-1)! \sum_{i=1}^n a_i$$

### 3. 计算 $n$ 阶行列式 ( $n \geq 2$ )

$$V = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

**解：**这是经典的**范德蒙德 (Vandermonde) 行列式**。根据范德蒙德行列式的公式：

$$V = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

4. 用数学归纳法证明：对一切  $n \geq 2$ ，有

$$D_n = \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & x & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & x & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & x + a_{n-1} \end{vmatrix} = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$$

证：(1) 当  $n = 2$  时：

$$D_2 = \begin{vmatrix} x & a_0 \\ -1 & x + a_1 \end{vmatrix} = x(x + a_1) - (-1)a_0 = x^2 + a_1x + a_0$$

结论成立。

(2) 假设对  $n-1$  阶行列式结论成立，即  $D_{n-1}(a_0, \dots, x + a_{n-2}) = x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_0$ 。现考虑  $n$  阶行列式，按第 1 列展开：

$$D_n = x \cdot (-1)^{1+1} M_{11} + (-1) \cdot (-1)^{2+1} M_{21} = xM_{11} + M_{21}$$

其中  $M_{11}$  是删去第 1 行第 1 列后的  $n-1$  阶行列式：

$$M_{11} = \begin{vmatrix} x & 0 & \cdots & a_1 \\ -1 & x & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x + a_{n-1} \end{vmatrix}$$

观察发现  $M_{11}$  的结构与原命题形式完全一致，只是常数项下标变为  $a_1$  到  $a_{n-1}$ 。根据归纳假设：

$$M_{11} = x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_2x + a_1$$

对于  $M_{21}$ ，删去第 2 行第 1 列：

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & x & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & x + a_{n-1} \end{vmatrix}$$

按第 1 行展开, 只有最后一个元素  $a_0$  非零:

$$M_{21} = a_0 \cdot (-1)^{1+(n-1)} \begin{vmatrix} -1 & x & \cdots \\ 0 & -1 & \cdots \\ \vdots & & \ddots \end{vmatrix}$$

这是一个上三角行列式, 对角线元素为  $-1$  (共  $n-2$  个)。  $M_{21} = a_0(-1)^n(-1)^{n-2} = a_0(-1)^{2n-2} = a_0$ 。

综上:

$$D_n = x(x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_1) + a_0 = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$$

证毕。

### 5. 计算 $n$ 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

**解:** 按第 1 行展开:

$$D_n = 2D_{n-1} - (-1) \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 & \cdots \\ 0 & 2 & -1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \end{vmatrix}_{n-1}$$

第二个行列式按第 1 列展开得  $(-1)D_{n-2}$ 。故递推公式为:

$$D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}$$

特征方程为  $r^2 - 2r + 1 = 0 \implies (r-1)^2 = 0$ 。通解形式为  $D_n = c_1 + c_2n$ 。计算初

值:  $D_1 = 2$ ;  $D_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3$ 。代入通解:  $\begin{cases} c_1 + c_2 = 2 \\ c_1 + 2c_2 = 3 \end{cases} \implies c_2 = 1, c_1 = 1$ 。故  $D_n = n + 1$ 。



6. 计算  $n$  阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 2a & a^2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2a & a^2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2a \end{vmatrix}$$

解：按第 1 行展开：

$$D_n = 2aD_{n-1} - a^2 \begin{vmatrix} 1 & a^2 & 0 & \cdots \\ 0 & 2a & a^2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \end{vmatrix}_{n-1}$$

第二个行列式按第 1 列展开得  $1 \cdot D_{n-2}$ 。递推式： $D_n = 2aD_{n-1} - a^2D_{n-2}$ 。特征方程： $r^2 - 2ar + a^2 = 0 \implies (r - a)^2 = 0$ 。通解： $D_n = (c_1 + c_2n)a^n$ 。初值： $D_1 = 2a = (c_1 + c_2)a \implies c_1 + c_2 = 2$ 。 $D_2 = 4a^2 - a^2 = 3a^2 = (c_1 + 2c_2)a^2 \implies c_1 + 2c_2 = 3$ 。解得  $c_2 = 1, c_1 = 1$ 。故  $D_n = (n+1)a^n$ 。

## \*7. 解方程

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ x^2 & a_1^2 & \cdots & a_{n-1}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x^{n-1} & a_1^{n-1} & \cdots & a_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix} = 0, \quad \text{其中 } a_1, \cdots, a_{n-1} \text{ 是两两不同的数.}$$

解：该行列式是  $n$  阶范德蒙德行列式，变量为  $x, a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}$ 。

$$D = \left[ \prod_{1 \leq j < i \leq n-1} (a_i - a_j) \right] \cdot \prod_{k=1}^{n-1} (a_k - x)$$

或者写成标准形式 ( $x$  是第 1 个变量)：

$$D = \left[ \prod_{1 \leq i < j \leq n-1} (a_j - a_i) \right] \cdot (a_1 - x)(a_2 - x) \cdots (a_{n-1} - x)$$

题目给定  $a_i$  两两不同，故常数部分  $\prod (a_j - a_i) \neq 0$ 。要使行列式为 0，必须有：

$$(a_1 - x)(a_2 - x) \cdots (a_{n-1} - x) = 0$$

故方程的解为： $x = a_1, x = a_2, \cdots, x = a_{n-1}$ 。

\*8. 计算  $n$  阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n-1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & n \end{vmatrix}$$

解：利用第 2 行全是 2 的特点，将第 2 行分别从其余各行减去： $R_i - R_2$  ( $i \neq 2$ )。

- $R_1 - R_2 = (1 - 2, 0, 0, \cdots, 0) = (-1, 0, 0, \cdots, 0)$
- $R_3 - R_2 = (0, 0, 1, \cdots, 0)$
- $R_k - R_2 = (0, 0, 0, \cdots, k - 2, \cdots, 0)$  (第  $k$  个位置)
- $R_n - R_2 = (0, 0, 0, \cdots, 0, n - 2)$

变换后的行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n-2 \end{vmatrix}$$

按第 1 行展开：

$$= (-1) \times \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-2 \end{vmatrix}$$

这是一个上三角行列式，对角线元素为  $2, 1, 2, 3, \cdots, n-2$ 。

故  $D_n = (-1) \times 2(n-2)! = -2(n-2)!$ 。

注：此公式适用于  $n \geq 3$ 。当  $n = 2$  时，直接计算得  $-2$ ；公式得  $-2(0)! = -2$ ，亦成立。

### 习题 2.5 克莱姆法则

1. 判断下述线性方程组有无解？有多少解？

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 9x_3 = b_1 \\ x_1 + 8x_2 + 27x_3 = b_2 \\ x_1 + 16x_2 + 81x_3 = b_3 \end{cases}$$

解：计算系数行列式  $D$ ：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 1 & 8 & 27 \\ 1 & 16 & 81 \end{vmatrix}$$

该行列式第二列元素为  $2^2, 2^3, 2^4$ , 第三列元素为  $3^2, 3^3, 3^4$ 。作行变换  $R_2 - R_1, R_3 - R_1$ :

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 0 & 4 & 18 \\ 0 & 12 & 72 \end{vmatrix} = 1 \cdot (4 \times 72 - 12 \times 18) = 288 - 216 = 72$$

因为  $D = 72 \neq 0$ ，根据克莱姆法则，该方程组有惟一解。

2. 判断下述线性方程组有无解？有多少解？

[illegible]

其中  $a_1, a_2, \dots, a_n$  是两两不同的非零数。

**解:** 计算系数行列式  $D$ 。第  $j$  列的元素为  $a_j^2, a_j^3, \dots, a_j^{n+1}$ 。从第  $j$  列提取公因子  $a_j^2$ :

$$D = \begin{vmatrix} a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ a_1^3 & a_2^3 & \cdots & a_n^3 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n+1} & a_2^{n+1} & \cdots & a_n^{n+1} \end{vmatrix} = (a_1^2 a_2^2 \cdots a_n^2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

右边是范德蒙德行列式, 故:

$$D = \left( \prod_{i=1}^n a_i^2 \right) \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j)$$

已知  $a_i$  为非零数, 故  $\prod a_i^2 \neq 0$ ; 已知  $a_i$  两两不同, 故  $\prod(a_i - a_j) \neq 0$ 。因此  $D \neq 0$ 。根据克莱姆法则, 该方程组有惟一解。

3. 当  $\lambda$  取什么值时, 下述齐次线性方程组有非零解?

$$\begin{cases} (\lambda - 2)x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0 \\ -x_1 + (\lambda - 8)x_2 - 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + 14x_2 + (\lambda + 3)x_3 = 0 \end{cases}$$

解: 齐次线性方程组有非零解的充要条件是系数行列式  $D = 0$ 。

$$D = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -3 & -2 \\ -1 & \lambda - 8 & -2 \\ 2 & 14 & \lambda + 3 \end{vmatrix}$$

$R_3 + 2R_2$  消元:

$$\xrightarrow{R_3+2R_2} \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -3 & -2 \\ -1 & \lambda - 8 & -2 \\ 0 & 2\lambda - 2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -3 & -2 \\ -1 & \lambda - 8 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$C_2 - 2C_3$ :

$$\begin{aligned} &\xrightarrow{C_2-2C_3} (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & -2 \\ -1 & \lambda - 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 \\ -1 & \lambda - 4 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)((\lambda - 2)(\lambda - 4) + 1) = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 6\lambda + 9) = (\lambda - 1)(\lambda - 3)^2 \end{aligned}$$

令  $D = 0$ , 解得  $\lambda = 1$  或  $\lambda = 3$ 。

答: 当  $\lambda = 1$  或  $\lambda = 3$  时, 方程组有非零解。

4. 当  $a, b$  取什么值时, 下述齐次线性方程组有非零解?

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

解: 系数行列式  $D$  为:

$$D = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 2b & 1 \end{vmatrix}$$

利用第 3 行减去第 2 行  $R_3 - R_2$ :

$$D = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ 0 & b & 0 \end{vmatrix}$$

按第 3 行展开:

$$= -b \begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -b(a-1)$$

方程组有非零解  $\iff D=0$ 。即  $-b(a-1)=0 \implies b=0$  或  $a=1$ 。

**答: 当  $b=0$  或  $a=1$  时, 方程组有非零解。**

---

5. 当  $a, b$  取什么值时, 下述线性方程组有惟一解?

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

**解:** 系数行列式  $D$  与上一题相同:  $D = -b(a-1)$ 。方程组有惟一解的充要条件是  $D \neq 0$ 。即  $b \neq 0$  且  $a \neq 1$ 。

**答: 当  $b \neq 0$  且  $a \neq 1$  时, 方程组有惟一解。**

---

\*6. 对于第 5 题中的线性方程组, 当  $a, b$  为何值时, 方程组无解? 当  $a, b$  为何值时, 方程组有无穷多个解?

**解:** 由上题可知, 当  $D=0$  即  $b=0$  或  $a=1$  时, 方程组无解或有无穷多解。

**情形 1: 当  $b=0$  时**

方程组变为:

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_3 = 2 \end{cases}$$

后两个方程  $x_1 + x_3 = 1$  与  $x_1 + x_3 = 2$  矛盾, 故此时方程组无解。

**情形 2: 当  $a=1$  且  $b \neq 0$  时**

增广矩阵为:

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & b & 1 & 1 \\ 1 & 2b & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

进行行变换  $R_2 - R_1, R_3 - R_1$ :

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & b-1 & 0 & -1 \\ 0 & 2b-1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由第 3 行得:  $(2b-1)x_2 = 0$ 。由第 2 行得:  $(b-1)x_2 = -1$ 。

1. 若  $b = 1$ , 第 2 行变为  $0 = -1$ , 矛盾, **无解**。
2. 若  $b \neq 1$ , 由第 2 行得  $x_2 = \frac{-1}{b-1}$ 。代入第 3 行方程:  $(2b-1) \cdot \frac{-1}{b-1} = 0 \implies 2b-1 = 0 \implies b = \frac{1}{2}$ 。
  - 如果  $b \neq \frac{1}{2}$ , 则出现矛盾, **无解**。
  - 如果  $b = \frac{1}{2}$ , 则方程相容。此时  $x_2 = \frac{-1}{1/2-1} = 2$ 。代入第 1 行:  $x_1 + 2 + x_3 = 2 \implies x_1 + x_3 = 0$ , 有**无穷多解**。

综上所述:

- 当  $b = 0$  或  $(a = 1 \text{ 且 } b \neq \frac{1}{2})$  时, **方程组无解**。
- 当  $a = 1$  且  $b = \frac{1}{2}$  时, **方程组有无穷多个解**。

**\*7. 讨论下述线性方程组何时有惟一解? 有无穷多个解? 无解?**

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

**解:** 系数行列式  $D = -b(a-1)$ 。

(1) **惟一解:** 当  $D \neq 0$ , 即  $b \neq 0$  且  $a \neq 1$  时, 方程组有惟一解。

(2) **无穷多解或无解:**

- 当  $b = 0$  时：方程组变为：

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_3 = 1 \end{cases}$$

后两个方程相同，等价于  $x_1 + x_3 = 1$ 。

- 若  $a = 1$ ，方程组为  $x_1 + x_2 + x_3 = 2, x_1 + x_3 = 1 \implies x_2 = 1$ ，有无穷多解。
- 若  $a \neq 1$ ，方程组为  $ax_1 + x_2 + x_3 = 2, x_1 + x_3 = 1 \implies (a-1)x_1 + x_2 = 1$ ，仍有无穷多解（秩为 2，变量 3）。

故只要  $b = 0$ ，**方程组有无穷多个解**。

- 当  $a = 1$  且  $b \neq 0$  时：方程组为：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 & (1) \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 1 & (2) \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 1 & (3) \end{cases}$$

(3) - (2) 得：  $bx_2 = 0$ 。因  $b \neq 0$ ，故  $x_2 = 0$ 。将  $x_2 = 0$  代入 (2) 得  $x_1 + x_3 = 1$ 。将  $x_2 = 0$  代入 (1) 得  $x_1 + x_3 = 2$ 。矛盾，此时**方程组无解**。

**总结：**

- 当  $b \neq 0$  且  $a \neq 1$  时，有**惟一解**。
- 当  $b = 0$  时，有**无穷多个解**。
- 当  $a = 1$  且  $b \neq 0$  时，**无解**。

## 习题 2.6 行列式按 $k$ 行 (列) 展开

### 1. 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 37 & 85 & 1 & 2 & 0 \\ 29 & 73 & 0 & 3 & 4 \\ 19 & 67 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

**解：**这是一个分块行列式。观察行列式的右上角是一个  $2 \times 3$  的零矩阵。我们将行列式分块如下：

$$D = \begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix}$$

其中  $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$  为  $2 \times 2$  矩阵,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$  为  $3 \times 3$  矩阵。根据 Laplace 定理, -1 项的指数是偶数, 故  $D = \det(A) \cdot \det(B)$ 。

计算  $\det(A)$ :

$$\det(A) = 2 \times 4 - 3 \times (-1) = 8 + 3 = 11$$

计算  $\det(B)$  (按第 1 列展开):

$$\det(B) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1(6 - 0) + 1(8 - 0) = 6 + 8 = 14$$

故原行列式的值为:

$$D = 11 \times 14 = 154$$

### 2. 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & c_{11} & \cdots & c_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & c_{k1} & \cdots & c_{kr} \\ 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}$$



**解：**该行列式具有如下分块形式：

$$D = \begin{vmatrix} A_{k \times k} & C_{k \times r} \\ O_{r \times k} & B_{r \times r} \end{vmatrix}$$

这是一个分块上三角形行列式。根据行列式的性质，其值等于对角线上两个子块行列式的乘积（可参考例 1）。

**故**  $D = \det(A) \cdot \det(B)$ 。

### \*3. 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{k1} & \cdots & a_{kk} \\ b_{11} & \cdots & b_{1r} & c_{11} & \cdots & c_{1k} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} & c_{r1} & \cdots & c_{rk} \end{vmatrix}$$

**解：**根据题目给出的下标，行列式的左上角  $O$  是  $k \times r$  的零矩阵，右上角  $A$  是  $k \times k$  的矩阵，左下角  $B$  是  $r \times r$  的矩阵，右下角  $C$  是  $r \times k$  的矩阵。即：

$$D = \begin{vmatrix} O_{k \times r} & A_{k \times k} \\ B_{r \times r} & C_{r \times k} \end{vmatrix}$$

为了利用分块对角阵的结论，我们需要交换列的位置。将后  $k$  列（即包含  $A$  和  $C$  的列）整体移到前  $r$  列的左边。这相当于进行了  $r \times k$  次相邻列的交换。交换后的行列式变为：

$$D' = \begin{vmatrix} A_{k \times k} & O_{k \times r} \\ C_{r \times k} & B_{r \times r} \end{vmatrix}$$

此时  $D' = \det(A) \cdot \det(B)$ 。由于  $D' = (-1)^{rk} D$ ，所以  $D = (-1)^{rk} D'$ 。

**故**  $D = (-1)^{rk} \det(A) \det(B)$ 。

### \*4. 设 $|A|$ 是关于 $1, 2, \dots, n$ 这 $n$ 个数的范德蒙行列式。计算：

$$(1) A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n-1 \\ 2, 3, \dots, n \end{pmatrix}; \quad (2) A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n-1 \\ 1, 3, \dots, n \end{pmatrix}.$$

**解：**设  $V(x_1, x_2, \dots, x_m)$  表示关于  $x_1, \dots, x_m$  的  $m$  阶范德蒙行列式，其值为  $\prod_{1 \leq j < i \leq m} (x_i - x_j)$ 。特别地，当  $x_k = k$  时， $V(1, 2, \dots, m) = \prod_{k=1}^{m-1} k!$ 。

(1) 子式  $M_1 = A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n-1 \\ 2, 3, \dots, n \end{pmatrix}$  选取了前  $n-1$  行 (对应幂次  $0, 1, \dots, n-2$ ) 和第 2 到  $n$  列 (对应变量  $2, 3, \dots, n$ )。故  $M_1$  是关于  $2, 3, \dots, n$  的范德蒙行列式:

$$M_1 = V(2, 3, \dots, n) = \prod_{2 \leq j < i \leq n} (i - j)$$

令  $u = j - 1, v = i - 1$ , 则  $1 \leq u < v \leq n - 1$ , 且  $i - j = v - u$ 。

$$M_1 = \prod_{1 \leq u < v \leq n-1} (v - u) = V(1, 2, \dots, n-1)$$

根据范德蒙行列式数值公式:

$$M_1 = \prod_{k=1}^{(n-1)-1} k! = \prod_{k=1}^{n-2} k!$$

(2) 子式  $M_2 = A \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n-1 \\ 1, 3, \dots, n \end{pmatrix}$  选取了前  $n-1$  行和列  $1, 3, \dots, n$ 。故  $M_2$  是关于  $1, 3, 4, \dots, n$  的范德蒙行列式:

$$M_2 = V(1, 3, 4, \dots, n)$$

我们将  $M_2$  与  $M_1 = V(2, 3, 4, \dots, n)$  进行比较。在  $M_1$  中, 涉及第一个参数 2 的因子乘积为:

$$P_1 = (3-2)(4-2)\cdots(n-2) = 1 \times 2 \times \cdots \times (n-2) = (n-2)!$$

在  $M_2$  中, 涉及第一个参数 1 的因子乘积为:

$$P_2 = (3-1)(4-1)\cdots(n-1) = 2 \times 3 \times \cdots \times (n-1) = (n-1)!$$

其余因子 (即  $3, 4, \dots, n$  之间的差) 在  $M_1$  和  $M_2$  中完全相同。因此:

$$\frac{M_2}{M_1} = \frac{P_2}{P_1} = \frac{(n-1)!}{(n-2)!} = n-1$$

即:

$$M_2 = (n-1)M_1 = (n-1) \prod_{k=1}^{n-2} k!$$