

De Bramensprinkhaan, een soort die voornamelijk in warme en vochtige omgevingen voorkomt, vertoont seizoensgebonden gedrag dat sterk afhankelijk is van temperatuur en voedselbeschikbaarheid. In de winter zijn de omstandigheden vaak ongunstig voor deze insecten; de lagere temperaturen en beperkte voedselbronnen leiden tot een afname van hun activiteit. Tijdens de wintermaanden kunnen veel sprinkhanen in een soort van diapauze gaan, een rusttoestand die hen helpt te overleven in ongunstige omstandigheden. Hierdoor zijn ze minder zichtbaar en worden ze ook minder vaak waargenomen.

In de zomer daarentegen, wanneer de temperaturen stijgen en er voldoende voedsel beschikbaar is, komen de Bramensprinkhanen in grote aantallen tevoorschijn. De warme temperaturen bevorderen hun voortplanting en groei, wat resulteert in een toename van hun populatie. Bovendien zijn de zomerse omstandigheden ideaal voor hun levenscyclus, waardoor ze actiever zijn en gemakkelijker te observeren. De combinatie van een overvloed aan voedsel en gunstige weersomstandigheden maakt de zomer het ideale seizoen voor de Bramensprinkhaan. Dit verklaart waarom ze in deze periode vaker worden waargenomen dan in de winter.