

Lidské rasy


středa 17. září 2025

8:03

- skupiny lidí, kt. spojuje dlouhodobý společný vývoj
- mají shodné rasej. znaky
- genetické studie 20. stol. vyvrátily existenci biogeneticky odlišných ras

Historie

- dříve přetvární rozdílů mezi jednotlivými rasami
- 1735-1759 - Linne klasifikoval živ. formy a začal chovat mezi primáty
- H. americanus, africanus, europaeus, asiaticus
- 19.-20. stol. - popularizace antropometrie - vědní disciplína se zabývá měřeními, popisem, rozlorem těla a jeho částí



- zvyšuje se zastoupení přechodných a smíšených typů
 - mestice
 - europoidní + mongoloidní
 - mulat
 - europoidní + ekvatoriální
 - zambo
 - mongoloidní + ekvatoriální

	mongoloidní	ekvatoriální	europoidní
vlas	- rovné a hrubší - kruhovitý průřez - vyrůstají kolmo	- vlnité a kudrnaté - vyrůstají šikmo - ledvinovitý průřez	- orální průřez - vyrůstají šikmo
oči	- epikantus (záhyb horního víčka)	- spíše tmavé oči kulovitého tvaru	- různé
nos	- široký a plochý	- široký	- úzký a dlouhý
rt	- plnější? (trojité oblady)	- plnější rt	- úžší rt

Proporce a stavba těla

Allenovo pravidlo - teplejší oblasti → delší končetiny (lepší odvod tepla)
- chladnější → kratší končetiny

Bergmannovo prav. - v chladnějších oblastech robustnější postava
- v trop. štíhlejší

Co ovlivňuje

- teplota, vlhkost vzduchu, n. m. v.
- adaptace
- genetický drift
- migrace a mísení