Exercicis

Exercici 1

Considerant las cadenes següents sobre $\{0, 1\}$:

$$x = 00011$$

 $y = 011000$
 $z = 01010$

obtenir el resultat de les operacions següents:

$$Pref(x), Suf(y), Seg(z), Pref(Pref(x)), Pref(Suf(z))$$

Exercici 2

Considerant els llenguatges següents sobre $\{0, 1\}$:

$$L_{1} = \{0, 01, 001\}$$

$$L_{2} = \{\lambda, 01, 0011\}$$

$$L_{3} = \{0x : x \in \{0, 1\}^{*}\}$$

$$L_{4} = \{x0 : x \in \{0, 1\}^{*}\}$$

$$L_{5} = \{x \in \{0, 1\}^{*} : |x|_{0} = |x|_{1}\}$$

- (a) Enumereu les primeres 10 cadenes en ordre canònic (lexicogràfic) de L_3
- (b) Enumereu les primeres 10 cadenes en ordre canònic (lexicogràfic) de L_4
- (c) Enumereu les primeres 10 cadenes en ordre canònic (lexicogràfic) de L_5

Exercici 3

Considerant els llenguatges definits en l'Exercici 2, obteniu una descripció per als llenguatges resultat de les operacions següents:

- (a) $L_1 \cup L_2, L_1 \cup L_3, L_2 \cup L_3, L_3 \cup L_4$
- (b) $L_1 \cap L_2, L_1 \cap L_3, L_1 \cap L_4, L_2 \cap L_4, L_3 \cap L_4$
- (c) $\overline{L_3}$, $\overline{L_5}$
- (d) $L_1 L_2, L_2 L_3, L_2 L_4, L_3 L_4$
- (e) $L_1 \triangle L_2, L_1 \triangle L_3, L_3 \triangle L_4$
- (f) $L_1L_2, L_4L_3, L_2L_3, L_3L_4, L_1^2, L_5^2, L_2^3, L_3^5$
- (g) $L_1^*, L_4^*, L_1^+, L_3^+, L_5^*$
- (h) L_2^R, L_3^R, L_5^R
- (i) $Pref(L_1), Pref(L_4), Pref(L_3), Seg(L_1), Seg(L_4), Suf(L_2)$
- (j) $0^{-1}L_1, 0^{-1}L_2, 0^{-1}L_3, 0^{-1}L_4, 1^{-1}L_1, 1^{-1}L_3, 1^{-1}L_4, (01)^{-1}L_1$

(k) $(01)^{-1}L_3, (01)^{-1}L_4$

Els llenguatges L_3 i L_4 es poden expressar com:

$$L_3 = \{0\}\{0,1\}^*$$

$$L_4 = \{0, 1\}^* \{0\}$$

Nota: Utilitzeu les propietats del quocient per la dreta

Exercici 4

Considerant els llenguatges de l'Exercici 2 i els homomorfismes següents:

$$\begin{array}{ll} h: \{0,1\} \rightarrow \{a,b,c\}^* & g: \{a,b,c\} \rightarrow \{0,1\}^* & f: \{0,1\} \rightarrow \{0,1\}^* \\ \begin{cases} h(0) = a \\ h(1) = bc \end{cases} & \begin{cases} g(a) = 01 \\ g(b) = 10 \\ g(c) = \lambda \end{cases} & \begin{cases} f(0) = 0 \\ f(1) = 011 \end{cases}$$

obteniu una descripció per als llenguatges resultat de les operacions següents

- (a) $h(L_1), h(L_2), h(L_3), h(L_4)$
- (b) $g^{-1}(L_1), g^{-1}(L_2), g^{-1}(L_3), g^{-1}(L_4)$
- (c) $f(L_1), f(L_2), f(L_3), f^{-1}(L_1), f^{-1}(L_2), f^{-1}(L_3), f^{-1}(L_4)$