

DEPARTAMENT DE MATEMÀTICA APLICADA (E.I)

AMA - Convocatòria de Gener

18-01-2010

Duració prevista: 3h

1.- BLOC I - Primer parcial (ut1 i ut2)

a) (1.0p) Siga $z = \frac{1-xi}{x+i}$ i $w = \sqrt{3} + i$ dos nombres complexos, on $x \in \mathbb{R}$. Escriu z en forma binomial, multiplica el resultat per w i escriu el producte en forma polar.

b) (0.5p) Troba els valors de $x \in \mathbb{R}$ tals que $\left| 5|x-2| - 4 \right| \leq 11$

c) (1.5p) Considera la successió definida per

$$\begin{cases} a_{n+2} - 3a_{n+1} + 2a_n = 0 \\ a_1 = 2, a_2 = 4 \end{cases}$$

c1) (0.2p) Troba el valor de a_5

c2) (1.0p) Resol la recurrència per a trobar a_n explícitament.

c3) (0.3p) Compara els ordres de magnitud de $\{a_n\}$ i de $\{b_n\} = \{1 + 2 + \dots + n\}$

a) $z = \frac{1-xi}{x+i} = \frac{(1-xi)(x-i)}{(x+i)(x-i)} = \frac{x-x^2i-i-x}{x^2+1} = \frac{-x^2-1}{x^2+1} \cdot i = \frac{-(x^2+1)}{x^2+1} \cdot i$

Així, $z \cdot w = (-i) \cdot (\sqrt{3} + i) = 1 - i \cdot \sqrt{3}$ amb mòdul 2 y argument $-\frac{\pi}{3}$. En conseqüència,

$$z \cdot w = 2 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \cdot \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right) = 2_{(-\frac{\pi}{3})}$$

b) $\left| 5|x-2| - 4 \right| \leq 11 \Leftrightarrow -11 \leq 5|x-2| - 4 \leq 11 \Leftrightarrow -7 \leq 5|x-2| \leq 15$

La primera desigualtat es satisfà sempre, així que la solució és la de la segona desigualtat

$$5|x-2| \leq 15 \Leftrightarrow |x-2| \leq 3 \Leftrightarrow -3 \leq x-2 \leq 3 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 5 \Leftrightarrow x \in [-1, 5]$$

c1) Donat que $a_1 = 2$ i $a_2 = 4$, tindrem

$$\begin{aligned} a_3 - 3a_2 + 2a_1 &= 0 \Rightarrow a_3 - 3 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 0 \Rightarrow a_3 = 8 \\ a_4 - 3a_3 + 2a_2 &= 0 \Rightarrow a_4 - 3 \cdot 8 + 2 \cdot 4 = 0 \Rightarrow a_4 = 12 \\ a_5 - 3a_4 + 2a_3 &= 0 \Rightarrow a_5 - 3 \cdot 12 + 2 \cdot 8 = 0 \Rightarrow a_5 = 32 \end{aligned}$$

c2) L'equació característica associada a la recurrència és

$$r^2 - 3r + 2 = 0$$

amb dues arrels real simples $r_1 = 1$ i $r_2 = 2$.

La recurrència correspon al primer cas i la solució general ve donada per

$$a_n = C_1 + C_2 \cdot 2^n$$

Aplicant ara les condicions inicials, trobem

$$\begin{array}{lcl} \text{per a } n = 1 & ; & a_1 = C_1 + 2C_2 = 2 \\ \text{per a } n = 2 & ; & a_2 = C_1 + 4C_2 = 4 \end{array}$$

d'on, resolent el sistema, $C_1 = 0$ i $C_2 = 1$. D'ací:

$$a_n = 2^n$$

c3) Per a comparar els ordres de magnitud hem de calcular el limit del quocient

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{1 + 2 + \dots + n} = (\text{Stolz}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} - 2^n}{n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 2^n - 2^n}{n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n + 1} = +\infty$$

i per tant a_n té major ordre de magnitud que b_n .

2.- BLOC II - Segon parcial (ut3, ut4 i ut5)

a) (0.5p) Calcula la suma exacta de la sèrie $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{3n-4}{2^{n-1}}$

b) (0.5p) Fent ús de la sèrie de potències per a e^x i la cota d'error de Leibniz, aproxima el valor de $\frac{1}{e^2}$ amb dos decimals exactes.

c) (0.5p) Si $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$, calcula $f'(x)$ y suma aquesta sèrie on siga convergent.

d) (1.5p) Donada l'esfera d'equació $(x-1)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 10$ troba l'equació del pla tangent i de la recta normal a l'esfera en el punt $P = (1, 3, -2)$.
Verifica que la recta normal calculada passa pel centre de l'esfera.

e) (0.5p) Calcula $\nabla f(\pi, 2, 0)$ si $f(x, y, z) = \log\left(\frac{xy}{\pi}\right) - 4 \sin(x + z^2)$

a) Es una sèrie aritmètico geomètrica de raó $r = \frac{-1}{2}$. Aplicant les fórmules corresponents,

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{3n-4}{2^{n-1}} &= 3 \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{2^{n-1}} - 4 \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n-1}} = -6 \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} n \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^n + 8 \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{-1}{2}\right)^n = \\ &= -6 \cdot \left(\frac{1 \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^1}{1 - \left(\frac{-1}{2}\right)} + \frac{\left(\frac{-1}{2}\right)^{1+1}}{\left(1 - \left(\frac{-1}{2}\right)\right)^2} \right) + 8 \cdot \frac{\left(\frac{-1}{2}\right)^1}{1 - \left(\frac{-1}{2}\right)} = -6 \cdot \left(-\frac{2}{9}\right) + 8 \cdot \left(\frac{-1}{3}\right) = \frac{-4}{3} \end{aligned}$$

b) La sèrie de potències de e^x ve donada per

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Si $x = -2$ tindrem

$$\frac{1}{e^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n!}$$

que es una sèrie alternada (i convergent) en les condicions del teorema de Leibniz.

Aplicant la cota corresponent, per a obtenir la precisió demanada, necessitem

$$a_{N+1} = \frac{2^{N+1}}{(N+1)!} < 10^{-3} \Leftrightarrow \frac{(N+1)!}{2^{N+1}} > 1000 \Leftrightarrow N \geq 9$$

i obtindrem l'aproximació

$$\frac{1}{e^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n!} \approx \sum_{n=0}^9 (-1)^n \frac{2^n}{n!} = \mathbf{0.135097...}$$

c) $f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+1) \cdot x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^{n+1} = \frac{x}{1-x}$, per a $x \in]-1, 1[$

d) Considerem $F(x, y, z) = (x-1)^2 + y^2 + (z+1)^2 - 10$

$$\begin{aligned}\nabla F(x, y, z) &= (2(x-1), 2y, 2(z+1)) \\ \nabla F(1, 3, -2) &= (0, 6, -2)\end{aligned}$$

L'equació del pla tangent serà

$$0(x-1) + 6(y-3) - 2(z+2) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 6y - 2z - 22 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 3y - z = 11$$

L'equació de la recta normal serà

$$r(t) = (1, 3, -2) + t \cdot (0, 6, -2) \quad \Longleftrightarrow \quad r(t) = (1, 3 + 6t, -2 - 2t)$$

L'equació de la recta normal, per a $t = \frac{-1}{2}$ ens dona el punt $r\left(\frac{-1}{2}\right) = (1, 0, -1)$ que es el centre de l'esfera.

e) $\nabla f(x, y, z) = \left(\frac{\pi}{xy} \cdot \frac{y}{\pi} - 4 \cos(x+z^2), \frac{\pi}{xy} \cdot \frac{x}{\pi}, -4 \cos(x+z^2) 2z \right) = \left(\frac{1}{x} - 4 \cos(x+z^2), \frac{1}{y}, -8z \cos(x+z^2) \right)$,
d'on

$$\nabla f(\pi, 2, 0) = \left(\frac{1}{\pi} - 4 \cos(\pi), \frac{1}{2}, 0 \right) = \left(\frac{1+4\pi}{\pi}, \frac{1}{2}, 0 \right)$$

3.- BLOQUE III - Residu (ut6)

a) (0.5p) Calcula el valor de $\int_0^1 \frac{x}{2-x^2} dx$

b) (1.0p) Aproxima el seu valor fent ús de la regla de Simpson amb l'interval d'integració dividit en sis parts. Verifica la precisió que trobes comparant amb el resultat de a)

a) $\int_0^1 \frac{x}{2-x^2} dx = \frac{-1}{2} \log(2-x^2) \Big|_0^1 = \frac{-1}{2} \log(1) - \frac{-1}{2} \log(2) = \frac{\log(2)}{2} \approx 0.34657...$

b) Per a l'aproximació demanada considerem $h = \frac{1}{6}$ i la partició $P = \left\{ 0, \frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{5}{6}, 1 \right\}$

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{1}{x^2+x+1} dx &\simeq S_6 = \frac{1}{3} \left(\frac{0}{2-0^2} + 4 \cdot \frac{\left(\frac{1}{6}\right)}{2-\left(\frac{1}{6}\right)^2} + 2 \cdot \frac{\left(\frac{1}{3}\right)}{2-\left(\frac{1}{3}\right)^2} + \right. \\ &\quad \left. + 4 \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)}{2-\left(\frac{1}{2}\right)^2} + 2 \cdot \frac{\left(\frac{2}{3}\right)}{2-\left(\frac{2}{3}\right)^2} + 4 \cdot \frac{\left(\frac{5}{6}\right)}{2-\left(\frac{5}{6}\right)^2} + \frac{1}{2-1^2} \right) \\ &= \frac{1}{18} \left(0 + 4 \cdot \frac{6}{71} + 2 \cdot \frac{3}{17} + 4 \cdot \frac{2}{7} + 2 \cdot \frac{3}{7} + 4 \cdot \frac{30}{47} + 1 \right) = \frac{1}{18} \cdot \frac{354225}{56729} = \frac{118075}{340374} \approx 0.3469...\end{aligned}$$

que aproxima el valor exacte de l'integral, obtingut en a), amb tres decimals exactes.