

DEPARTAMENT DE MATEMÀTICA APLICADA (ETSINF)

AMA - Primer parcial 9-11-2009 Duració: 1h

1. a) _(0.5p) Determina el conjunt dels $x \in \mathbb{R}$ tals que $|x^2 - 2| \leq 1$.

b) _(0.5p) Escriu $z = \frac{x-i}{1+xi}$, on $x \in \mathbb{R}$, en forma binomial.

Expressa el resultat en forma polar.

Calcula $z \cdot w$, on $w = 2\frac{2\pi}{3}$ i escriu el resultat en forma binomial.

a) Observa que

$$|x^2 - 2| \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq x^2 - 2 \leq 1 \Leftrightarrow 1 \leq x^2 \leq 3 \Leftrightarrow 1 \leq |x| \leq \sqrt{3} \Leftrightarrow |x| \geq 1 \wedge |x| \leq \sqrt{3}$$

Ara bé,

$$|x| \geq 1 \Leftrightarrow x \in]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$$

i, d'altra banda,

$$|x| \leq \sqrt{3} \Leftrightarrow -\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3} \Leftrightarrow x \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$$

En conseqüència, la solució final serà la intersecció d'aquest dos conjunts, és a dir,

$$|x^2 - 2| \leq 1 \Leftrightarrow x \in [-\sqrt{3}, -1] \cup [1, \sqrt{3}].$$

b) Reescriurem z en forma binomial

$$z = \frac{x-i}{1+xi} = \frac{(x-i)(1-xi)}{(1+xi)(1-xi)} = \frac{x-i-x^2i+xi^2}{1+x^2} = -i$$

d'on $|z| = 1$ i $\arg(z) = -\frac{\pi}{2}$. La forma polar de z serà

$$z = 1 \cdot e^{-\frac{\pi}{2}}$$

Tenint en compte el producte de nombres complexos en forma polar

$$z \cdot w = (2 \cdot 1) \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{2} = 2\frac{\pi}{6}$$

que, a partir de la forma trigonomètrica, pot escriure's com

$$z \cdot w = 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \right) = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = \sqrt{3} + i$$

-
2. _(1p) Compara els ordres de magnitud de les successions $a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}$ i $b_n = \log(n)$
-

a) Aplicant el criteri de Stolz, podem comprovar que $a_n \gg b_n$, ja que

$$\begin{aligned} \lim \frac{a_n}{b_n} &= \lim \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}}{\log(n)} = \lim \frac{\left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n+1}}\right) - \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)}{\log(n+1) - \log(n)} = \\ &= \lim \frac{\frac{1}{\sqrt{n+1}}}{\log\left(\frac{n+1}{n}\right)} = \lim \frac{1}{\sqrt{n+1} \left(\log\left(\frac{n+1}{n}\right)\right)} = \lim \frac{1}{\log\left(\frac{n+1}{n}\right)^{\sqrt{n+1}}} = \frac{1}{\log\left(\lim\left(\frac{n+1}{n}\right)^{\sqrt{n+1}}\right)} \stackrel{\text{Euler}}{=} \\ &= \frac{1}{\log\left(e^{\lim\left(\sqrt{n+1}\left(\frac{n+1}{n}-1\right)\right)}\right)} = \frac{1}{\lim\left(\sqrt{n+1}\left(\frac{n+1}{n}-1\right)\right)} = \frac{1}{\lim\left(\frac{\sqrt{n+1}}{n}\right)} = +\infty \end{aligned}$$

on s'ha tingut en compte que

$$\lim \left(\frac{n+1}{n}\right)^{\sqrt{n+1}} = 1^\infty$$

i podem aplicar la fórmula d'Euler per resoldre aquesta indeterminació, és a dir,

$$\lim \left(\frac{n+1}{n}\right)^{\sqrt{n+1}} = e^{\lim\left(\sqrt{n+1}\left(\frac{n+1}{n}-1\right)\right)}.$$

3. _(1.0p) Considera la successió definida per

$$\begin{cases} 2a_{n+2} = 3a_{n+1} + 2a_n \\ a_1 = 0, a_2 = 1 \end{cases}$$

a)_(0.3p) Escribeu els cinc primers termes de la successió.

b)_(0.7p) Troba explícitament a_n resolent la recurrència corresponent.

a) La recurrència pot expressar-se en la forma

$$a_{n+2} = \frac{3}{2}a_{n+1} + a_n$$

i donat que $a_1 = 0$, $a_2 = 1$, tindrem

$$\begin{aligned} a_3 &= \frac{3}{2}a_2 + a_1 = \frac{3}{2} \\ a_4 &= \frac{3}{2}a_3 + a_2 = \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} + 1 = \frac{13}{4} \\ a_5 &= \frac{3}{2}a_4 + a_3 = \frac{3}{2} \cdot \frac{13}{4} + \frac{3}{2} = \frac{51}{8}. \end{aligned}$$

b) La recurrència pot expressar-se també en la forma

$$a_{n+2} - \frac{3}{2}a_{n+1} - a_n = 0$$

així que l'equació característica corresponent serà

$$r^2 - \frac{3}{2}r - 1 = 0$$

que té per solució dues arrels reals simples, $r_1 = -\frac{1}{2}$ i $r_2 = 2$.

La recurrència correspon al cas 1 i la seua solució general pot escriure's en la forma:

$$a_n = C_1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^n + C_2 \cdot 2^n$$

Tenint en compte les condicions inicials trobarem les constants. Així,

$$\begin{array}{lclcl} \text{per a } n = 1 & ; & a_1 & = & -\frac{1}{2}C_1 + 2C_2 & = & 0 \\ \text{per a } n = 2 & ; & a_2 & = & \frac{1}{4}C_1 + 4C_2 & = & 1 \end{array}$$

d'on, resolent el sistema, $C_1 = \frac{4}{5}$ i $C_2 = \frac{1}{5}$. D'ací,

$$a_n = \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{5} \cdot 2^n$$