# Fiches thérapeutiques de la SEP

## A. Traitements plateforme

## 1. Acétate de glatiramère

**Nom commercial** : Copaxone® ; une spécialité marocaine référencée est Pramer®.

**Bilan pré thérapeutique spécifique :**

- Vérifier les antécédents d'allergie au glatiramère ou aux excipients.

**Grossesse et allaitement** : (afficher pour les femmes seulement)

- Grossesse : (cocher) (texte)
- Allaitement. (cocher)

**Effets indésirables :**

- Réactions au site d'injection : douleur, rougeur, prurit et gonflement.
- Bouffées vasomotrices, palpitations, oppression thoracique ou essoufflement transitoires après injection.
- Rarement : réaction allergique grave ou atteinte hépatique.

**Prix approximatif au Maroc :**

- Pramer® 40 mg, boîte de 12 seringues : 2 873 DH.
- Boîte de 3 seringues : 1 042 DH.

Équivalents, remboursement

## 2. Interféron bêta

**Noms commerciaux** : Avonex®, Betaferon®, Extavia®, Plegridy®, Rebif® (sélectionnée).

**Bilan préthérapeutique spécifique :**

- NFS, ALAT/ASAT, TSH, urée et créatinine.
- Évaluer les antécédents de dépression, de maladie hépatique et de dysthyroïdie.
- Surveillance biologique régulière après initiation.

**Grossesse et allaitement**

- Grossesse : (cocher) (texte)
- Allaitement (cocher)

**Effets indésirables**

- Syndrome pseudo-grippal : fièvre, frissons, myalgies, céphalées.
- Réactions au site d'injection.
- Augmentation des transaminases, anomalies de la NFS.
- Troubles de l'humeur et troubles thyroïdiens possibles.

**Prix approximatif au Maroc**

- Avonex®, boîte de 4 doses : 8 010 DH (**Prix hospitalier :** 7 834,00 DH.).
- Betaferon®, boîte de 15 flacons : 8 480 DH. (Prix Hospitalier : 8 318,00 DH)
- Rebif® 44 µg, boîte de 12 seringues : 8 187 DH (prix hospitalier 8016,56 DH).
- Plegridy® et Extavia® : prix exact à confirmer. (Non commercialiser au Maroc)

# 3. Tériflunomide

**Nom commercial :** Aubagio®.

**Bilan préthérapeutique spécifique**

- NFS, ALAT/ASAT, pression artérielle.
- Test de grossesse (β-HCG) chez les patientes concernées.
- Dépistage des hépatites et autres infections selon le terrain et le protocole local.
- Évaluer les antécédents hépatiques et les traitements hépatotoxiques associés.

**Grossesse et allaitement (contre indiquer)**

- Grossesse : contre-indiqué en raison du risque fœtal.
- Allaitement : non recommandé.
- En cas de projet de grossesse, prévoir une procédure d'élimination accélérée et vérifier la disparition du médicament selon le RCP.

**Effets indésirables**

- Diarrhée, nausées et alopécie.
- Augmentation des transaminases, hypertension.
- Leucopénie et infections possibles.
- Rarement : hépatotoxicité sévère ou neuropathie périphérique.

**Prix approximatif au Maroc**

- Aubagio® 14 mg, boîte de 28 comprimés : 8 699 DH. (**Prix hospitalier :** 8 537,00 MAD)

# 4. Diméthyl fumarate

**Nom commercial :** Tecfidera® ; générique référencé : Fumetil®.

**Bilan préthérapeutique spécifique**

- NFS avec numération des lymphocytes.
- Bilan hépatique : ALAT/ASAT.

- Fonction rénale selon le contexte.
- Évaluer les infections actives et les antécédents d'immunodépression.

**Grossesse et allaitement**

- Grossesse : décision individualisée ; une exposition doit être réévaluée avec le neurologue.
- Allaitement : décision au cas par cas, en tenant compte de la spécialité, de l'âge du nourrisson et du RCP.

**Effets indésirables**

- Bouffées vasomotrices, douleurs abdominales, diarrhée, nausées.
- Lymphopénie et risque infectieux.
- Augmentation des transaminases.
- Rarement : LEMP, surtout en cas de lymphopénie prolongée.

Prix approximatif au Maroc

- Tecfidera® 240 mg, boîte de 56 gélules : 8 781 DH (prix hospitalier : 8 616,00 DH).
- **Tecfidera 120 mg** : **1 376,00 DH** (prix hospitalier : 1 108,00 DH)
- Fumetil® 240 mg, boîte de 56 gélules : 4 590 DH.

# 5. Diroximel fumarate

Nom commercial : Vumerity®.

Bilan préthérapeutique spécifique

- NFS avec lymphocytes et bilan hépatique.
- Évaluer les infections et l'immunodépression.
- Compléter le bilan rénal et les examens complémentaires selon le RCP.

Grossesse et allaitement

- Grossesse : données limitées ; réévaluation du rapport bénéfice/risque.
- Allaitement : données insuffisantes pour conclure ; décision spécialisée.

Effets indésirables

- Bouffées vasomotrices, nausées, douleurs abdominales et diarrhée.
- Lymphopénie, infections et élévation possible des enzymes hépatiques.
- Rarement : LEMP en présence de facteurs de risque.

Prix approximatif au Maroc

- n'est pas commercialisé au Maroc prix plus de 8 200 MAD par boîte

# B. Traitements de haute efficacité (THE)

# 6. Fingolimod

Nom commercial : Gilenya®.

Bilan préthérapeutique spécifique

- NFS, ALAT/ASAT et bilirubine.
- ECG et évaluation des antécédents cardiaques, des troubles de conduction et des médicaments bradycardisants.
- Statut VZV ; sérologies et dépistages infectieux selon le terrain.
- Examen ophtalmologique selon les facteurs de risque, examen cutané et IRM de référence.
- Test de grossesse si indiqué.

Grossesse et allaitement

- Grossesse : contre-indiqué ; contraception pendant le traitement et pendant les 2 mois suivant l'arrêt.
- Allaitement : non recommandé selon le RCP.
- L'arrêt doit être planifié par le neurologue en raison du risque de rebond de la SEP.

  Medicines Agency (EMA)

Effets indésirables

- Bradycardie et troubles de conduction, surtout à l'initiation.
- Infections, lymphopénie et zona.
- Augmentation des transaminases.
- Œdème maculaire.
- Rarement : LEMP et réactivation sévère de la SEP après arrêt.

Prix approximatif au Maroc

- Gilenya® 0,5 mg, boîte de 28 gélules : 12 023 DH (**Prix hospitalier :** Environ 11 795,00 DH).

# 7. Ponesimod

Nom commercial : Ponvory®.

Bilan préthérapeutique spécifique

- NFS, bilan hépatique, ECG et évaluation cardiovasculaire selon les antécédents.
- Statut VZV et dépistage des infections selon le terrain.
- Test de grossesse si indiqué.
- Examen ophtalmologique selon les facteurs de risque.

Grossesse et allaitement

- Grossesse : à éviter ; contraception pendant le traitement et pendant la période prévue par le RCP après l'arrêt.
- Allaitement : données insuffisantes ; vérifier le RCP actuel.

Effets indésirables

- Infections respiratoires, céphalées et hypertension.
- Augmentation des transaminases et lymphopénie.
- Bradycardie ou troubles de conduction au début.
- Œdème maculaire et risque de réactivation de la SEP après arrêt.

Prix approximatif au Maroc

- Ponvory® : prix public local non confirmé.

# 8. Ozanimod

Nom commercial : Zeposia®.

Bilan préthérapeutique spécifique

- NFS, bilan hépatique, ECG selon le profil cardiovasculaire.
- Statut VZV et dépistage des infections selon le terrain.
- Évaluation des antécédents ophtalmologiques, notamment d'œdème maculaire.
- Test de grossesse si indiqué.
- Vérification des interactions médicamenteuses.

Grossesse et allaitement

- Grossesse : à éviter ; contraception pendant le traitement et pendant 3 mois après l'arrêt, conformément aux recommandations européennes du produit.
- Allaitement : vérifier le RCP et évaluer le rapport bénéfice/risque.

Effets indésirables

- Infections respiratoires, céphalées et hypertension.
- Élévation des transaminases.
- Lymphopénie et risque infectieux.
- Bradycardie et œdème maculaire possibles.

Prix approximatif au Maroc

- Zeposia® : prix public local non confirmé.

# 9. Natalizumab

Nom commercial : Tysabri®.

Bilan préthérapeutique spécifique

- Sérologie du virus JC et index des anticorps anti-JC si indiqué.
- IRM cérébrale de référence.
- NFS et bilan hépatique.
- Dépistage infectieux et revue des traitements immunosuppresseurs antérieurs.
- Évaluation du risque de LEMP avant initiation et au cours du suivi.

Grossesse et allaitement

- Grossesse : décision spécialisée selon l'activité de la SEP ; une poursuite peut être envisagée dans certaines situations.
- Allaitement : décision individualisée avec le neurologue, selon la situation clinique et le RCP.

Effets indésirables

- Céphalées, fatigue et nausées (à cocher)
- Réactions à la perfusion ou à l'injection (à cocher).
- Infections et réactions allergiques (à cocher).
- Risque majeur : LEMP, notamment selon le statut JC (index <= 0.9 ;0.9<index<= 1.5 ; > 1.5(a cocher)), la durée d'exposition (< 24 mois, > 24 mois (à cocher)). Et les traitements antérieurs (texte).

Prix approximatif au Maroc

- Tysabri® 300 mg IV, un flacon : 14 234 DH (**Prix hospitalier** 13 963,00 DH).

# 10. Ocrelizumab (anticorps monoclonal anti-CD20)

Nom commercial : Ocrevus®.

Bilan préthérapeutique spécifique

- NFS, bilan hépatique et dosage des immunoglobulines (texte) (insertion des image (optionnel)).
- Dépistage de l'hépatite B avant traitement ; compléter les sérologies selon le contexte (texte) (insertion des image (optionnel)).
- Évaluer les infections actives et les antécédents d'immunodépression (texte) (insertion des image (optionnel)).
- Vérifier et mettre à jour les vaccinations avant initiation.
- Test de grossesse si indiqué(texte) (insertion des image (optionnel)).

Grossesse et allaitement

- Grossesse : projet à discuter avec le neurologue ; le RCP européen recommande une contraception pendant le traitement et pendant 4 mois après la dernière dose.
- Allaitement : peut être envisagé après évaluation individuelle ; tenir compte des recommandations du RCP et de l'état du nourrisson.

Effets indésirables

- Réactions liées à la perfusion : prurit, éruption, fièvre, céphalées et hypotension.
- Infections respiratoires et herpétiques.
- Diminution des immunoglobulines, parfois associée à des infections répétées.
- Réactivation de l'hépatite B.
- Rarement : réactions allergiques sévères.

Prix approximatif au Maroc

- Ocrevus® 300 mg, un flacon : 42 099 DH.

# 11. Ofatumumab

Nom commercial : Bonspri ®.

Bilan préthérapeutique spécifique

- NFS et dosage des immunoglobulines.
- Dépistage de l'hépatite B.
- Sérologies infectieuses complémentaires selon le terrain.
- Vérification des vaccinations et recherche d'une infection active.
- Test de grossesse si indiqué.

Grossesse et allaitement

- Grossesse : à planifier avec le neurologue ; le RCP européen prévoit une contraception pendant le traitement et pendant 6 mois après l'arrêt.
- Allaitement : à évaluer individuellement selon le RCP, la période post-partum et la situation clinique.

Effets indésirables

- Réactions au site d'injection.
- Fièvre, céphalées et fatigue après injection.
- Infections respiratoires et herpétiques.
- Diminution des immunoglobulines et risque de réactivation de l'hépatite B.
- Rarement : infections graves ou réactions allergiques.

Prix approximatif au Maroc

Bonspri 20 mg : 11 326,00 DHS (**Prix Hospitalier :** 11 112,00 DHS).

# 12. Rituximab

Nom commercial : MabThera® ou biosimilaire.

Bilan préthérapeutique spécifique

- NFS et dosage des immunoglobulines.

- Sérologie de l'hépatite B, notamment antigène HBs et anticorps anti-HBc ; autres sérologies selon le terrain.
- Évaluation des infections actives et des antécédents infectieux.
- Vérification des vaccinations avant traitement.
- Test de grossesse si indiqué.

effets indésirables

- Réactions à la perfusion : fièvre, frissons, éruption et hypotension.
- Infections et neutropénie.
- Hypogammaglobulinémie.
- Réactivation de l'hépatite B.
- Rarement : LEMP et réactions cutanées graves.

Prix approximatif au Maroc

- MabThera® 500 mg, un flacon : environ 9 735 DH.
- Le coût total dépend du nombre de flacons requis et du protocole hospitalier.

# 13. Cladribine

Nom commercial : Mavenclad®.

Bilan préthérapeutique spécifique

- NFS avec numération des lymphocytes, fonction rénale et bilan hépatique.
- Dépistage du VIH, des hépatites et de la tuberculose selon le protocole.
- Statut VZV et vérification des vaccinations.
- Test de grossesse avant les cycles chez les patientes concernées.
- Recherche d'infection active, d'immunodépression et d'antécédents de cancer.

Grossesse et allaitement

- Grossesse : contre-indiquée pendant le traitement et pendant 6 mois après la dernière dose.
- Contraception : requise chez les femmes et les hommes concernés pendant le traitement et durant les 6 mois suivant la dernière dose.
- Allaitement : contre-indiqué pendant le traitement et pendant la période définie par le RCP après la dernière dose.

Effets indésirables

- Lymphopénie, parfois importante.
- Zona et autres infections.
- Céphalées, nausées et fatigue.
- Élévation des enzymes hépatiques.
- Risques infectieux et nécessité d'une surveillance hématologique.

Prix approximatif au Maroc

- Mavenclad® 10 mg, boîte d'un comprimé : environ 20 057 DH.
- Le coût d'un cycle ou des deux années de traitement nécessite de calculer le nombre de comprimés selon le poids et le schéma prescrit.

# 14. Mitoxantrone

Noms commerciaux mentionnés : Elsep® et Novantrone®.

Bilan préthérapeutique spécifique

- NFS, ionogramme, urée, créatinine, bilan hépatique et CRP.
- ECG et échocardiographie avec mesure de la fraction d'éjection ventriculaire gauche.
- Dépistage des infections et test de grossesse avant chaque cure si indiquée.
- Évaluation du risque hématologique, cardiaque et de fertilité.
- Calcul de la dose cumulée reçue et vérification des traitements antérieurs.

Grossesse et allaitement

- Grossesse : contre-indiquée.
- Allaitement : contre-indiqué.
- Contraception : selon le document fourni, pendant le traitement et jusqu'à 6 mois après la dernière cure, chez les femmes et les hommes concernés.

Effets indésirables

- Nausées, vomissements, fatigue et alopécie.
- Myélosuppression, infections et risque hématologique.
- Toxicité cardiaque pouvant entraîner une insuffisance cardiaque.
- Infertilité ou aménorrhée.
- Risque de leucémie aiguë secondaire.

N’est pas commercialisé au Maroc