

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 X	42 X
3 O	23 O	43 O
4 X	24 O	44 O
5 O	25 X	45 X
6 X	26 O	46 O
7 O	27 O	47 O
8 O	28 O	48 X
9 X	29 O	49 O
10 O	30 X	50 O
11 O	31 O	51 O
12 X	32 X	52 O
13 O	33 O	53 O
14 X	34 X	54 O
15 O	35 X	55 O
16 X	36 O	56 O
17 O	37 O	57 X
18 X	38 X	58 O
19 X	39 X	59 O
20 O	40 X	60 X

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~11회 (I · II 단원, 엔탈피·반응열)

1	O	규소(Si) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다. 해설 · 규소는 14족이라 원자가 전자가 4개이다.
2	X	F이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +1이다. 옳은 문장 · F이 안정한 이온이 될 때 전하량은 -1이다. 해설 · 17족은 전자 1개를 얻어 -1가.
3	O	지각 질량비 1위는 산소이다. 해설 · $O > Si > Al > Fe$.
4	X	N_2 는 반응성이 커서 쉽게 반응한다. 옳은 문장 · N_2 는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. 해설 · 삼중결합으로 매우 안정.
5	O	CO_2 1몰의 질량은 44 g이다. 해설 · $12 + 16 \times 2 = 44$.
6	X	H_2O 1몰에 들어 있는 수소 원자는 1몰이다. 옳은 문장 · H_2O 1몰에 들어 있는 수소 원자는 2몰이다. 해설 · 물 1분자당 수소 2개.
7	O	$0^\circ C$, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. 해설 · 표준 상태 몰부피.
8	O	반응 전후 총질량은 보존된다. 해설 · 원자가 새로 생기거나 사라지지 않기 때문이다. 기체가 날아가도 닫힌 계에서는 총질량이 그대로다.
9	X	화학반응식 계수비는 질량비와 같다. 옳은 문장 · 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. 해설 · 질량은 분자량을 곱해야 한다.
10	O	한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다. 해설 · 부족한 반응물이 제한.
11	O	원자번호는 양성자수와 같다. 해설 · 양성자수가 원소를 결정.
12	X	동위원소는 양성자수가 서로 다르다. 옳은 문장 · 동위원소는 양성자수가 서로 같다. 해설 · 같은 원소이므로.
13	O	원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. 해설 · 양성자·중성자가 질량을 차지.
14	X	세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다. 옳은 문장 · 세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다. 해설 · $n=3$ 은 적외선.
15	O	3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다. 해설 · $3 \rightarrow 2$: 656nm 빨강.
16	X	백색광은 선 스펙트럼을 만든다. 옳은 문장 · 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. 해설 · 모든 파장이 연속으로 나타난다.
17	O	s 오비탈의 부양자수는 0이다. 해설 · 양자수: 주n(껍질)·부l(종류 $s_0p_1d_2$)·자기m(방향 $-l \sim +l$)·스핀($\pm 1/2$).
18	X	p 오비탈의 부양자수는 2이다. 옳은 문장 · p 오비탈의 부양자수는 1이다. 해설 · 양자수: 주n(껍질)·부l(종류 $s_0p_1d_2$)·자기m(방향 $-l \sim +l$)·스핀($\pm 1/2$).

19	X	네온(원자번호 10)의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^4$이다. 옳은 문장 · 네온의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^6$이다. 해설 · 전자 10개로 $2p^6$ 완성.
20	O	같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다. 해설 · 유효핵전하 증가.
21	O	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. 해설 · F가 전기음성도 최대.
22	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 커진다. 옳은 문장 · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. 해설 · 반지름 증가로 인력 약화.
23	O	발열 반응에서는 반응엔탈피 ΔH가 0보다 작다. 해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
24	O	이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다. 해설 · 전하가 클수록 인력이 강하다.
25	X	이온결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통한다. 옳은 문장 · 이온결합 물질은 고체에서는 통하지 않고 액체·수용액에서 통한다. 해설 · 고체는 이온이 고정되어 있다.
26	O	SF_6의 분자 모양은 정팔면체형이다. 해설 · SN_6, 비공유쌍 0 → 정팔면체.
27	O	XeF_4의 분자 모양은 평면사각형이다. 해설 · SN_6, 비공유쌍 2 → 평면사각형.
28	O	화학 결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다. 해설 · 결합 형성은 발열 과정.
29	O	SF_4에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다. 해설 · 혼성: SN_5 sp^3d, SN_6 sp^3d^2.
30	X	SF_6에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다. 옳은 문장 · SF_6에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2이다. 해설 · 혼성: SN_5 sp^3d, SN_6 sp^3d^2.

31	O	가역 반응은 정반응과 역반응이 모두 일어나는 반응이다. 해설 · 양방향으로 진행.
32	X	평형 상태에서는 정반응과 역반응이 모두 멈춘다. 옳은 문장 · 평형 상태에서는 정반응과 역반응의 속도가 같을 뿐 반응은 계속 일어난다. 해설 · 동적 평형은 멈춘 것이 아니다.
33	O	동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다. 해설 · 두 속도가 같아 농도가 일정.
34	X	평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 계속 증가한다. 옳은 문장 · 평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 일정하게 유지된다. 해설 · 속도가 같아 농도 변화가 없다.
35	X	평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 항상 서로 같다. 옳은 문장 · 평형 상태에서 농도는 일정할 뿐 서로 같은 것은 아니다. 해설 · 일정과 같음은 다르다.
36	O	평형 상태에서는 겉보기 변화가 관찰되지 않는다. 해설 · 농도가 일정해 변화가 보이지 않는다.
37	O	평형 상수 K는 (생성물 농도의 곱)/(반응물 농도의 곱)으로 나타낸다. 해설 · 각 농도는 계수만큼 거듭제곱한다. 고체·순수 액체는 넣지 않고, K는 온도만 바뀌면 변한다.
38	X	평형 상수 식에서 각 물질의 농도는 계수와 무관하게 1제곱한다. 옳은 문장 · 평형 상수 식에서 각 물질의 농도는 반응식의 계수만큼 거듭제곱한다. 해설 · 계수가 지수가 된다.
39	X	평형 상수 K가 크면 반응물이 많다. 옳은 문장 · 평형 상수 K가 크면 생성물이 많다(정반응 우세). 해설 · K가 클수록 생성물 쪽으로 치우친다.
40	X	평형 상수 K가 작으면 생성물이 많다. 옳은 문장 · 평형 상수 K가 작으면 반응물이 많다(역반응 우세). 해설 · K가 작을수록 반응물 쪽으로 치우친다.
41	O	동적 평형에서는 정반응과 역반응이 같은 빠르기로 계속 일어난다. 해설 · 두 반응이 동시에 진행.
42	X	평형 상수는 농도나 압력을 바꾸면 변한다. 옳은 문장 · 평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변하고 농도·압력으로는 변하지 않는다. 해설 · K는 온도만의 함수.
43	O	평형 상수는 온도가 변하면 값이 달라진다. 해설 · K는 온도에 의존한다.
44	O	반응 지수 Q는 현재 농도로 계산한 값이다. 해설 · 임의 시점의 농도로 계산.
45	X	$Q < K$ 이면 역반응이 우세하게 진행된다. 옳은 문장 · $Q < K$ 이면 정반응이 우세하게 진행된다. 해설 · 생성물이 부족해 정반응이 진행.
46	O	$Q > K$ 이면 역반응이 우세하게 진행된다. 해설 · 생성물이 많아 역반응이 진행.
47	O	$Q = K$ 이면 반응은 평형 상태이다. 해설 · Q와 K가 같으면 평형.
48	X	평형 상수 식에는 고체와 순수한 액체의 농도도 포함한다. 옳은 문장 · 평형 상수 식에는 고체와 순수한 액체의 농도를 포함하지 않는다. 해설 · 농도가 일정해 식에서 제외한다.

49	O	비가역 반응은 한 방향으로만 진행된다. 해설 · 역반응이 거의 일어나지 않는다.
50	O	평형 상태는 정반응과 역반응이 동시에 일어나는 동적인 상태이다. 해설 · 멈춘 것이 아니라 동적이다.
51	O	평형 상태에 도달하면 정반응 속도와 역반응 속도가 같아진다. 해설 · 속도가 같아진 시점이 평형.
52	O	닫힌 용기에서 반응이 진행되면 결국 동적 평형에 도달할 수 있다. 해설 · 가역 반응은 평형에 도달.
53	O	평형 상수가 매우 크면 반응이 거의 완결된 것으로 볼 수 있다. 해설 · 생성물이 압도적으로 많다.
54	O	같은 반응이라도 온도가 다르면 평형 상수 값이 다를 수 있다. 해설 · K는 온도에 의존한다.
55	O	평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어나고 있다. 해설 · 동적 평형.
56	O	동적 평형에서 반응물이 생성물로, 생성물이 반응물로 끊임없이 바뀐다. 해설 · 양방향 반응이 계속된다.
57	X	평형 상수 K의 단위는 항상 mol/L이다. 옳은 문장 · 평형 상수 K는 반응에 따라 단위가 달라지거나 무차원이며 항상 mol/L인 것은 아니다. 해설 · 계수 합에 따라 단위가 달라진다.
58	O	반응 지수 Q를 평형 상수 K와 비교하면 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다. 해설 · Q와 K의 대소로 방향 판단.
59	O	평형에 도달하는 데 걸리는 시간은 반응에 따라 다를 수 있다. 해설 · 반응 속도에 따라 다르다.
60	X	정반응이 발열 반응이면 역반응도 발열 반응이다. 옳은 문장 · 정반응이 발열 반응이면 역반응은 흡열 반응이다. 해설 · 역반응의 엔탈피 부호는 반대.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

- 1 규소(Si) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다.
- 2 F이 안정한 이온이 될 때 전하량은 -1이다. [교정]

I -2

- 3 지각 질량비 1위는 산소이다.
- 4 N₂는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. [교정]

I -3

- 5 CO₂ 1몰의 질량은 44 g이다.
- 6 H₂O 1몰에 들어 있는 수소 원자는 2몰이다. [교정]
- 7 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.

I -4

- 8 반응 전후 총질량은 보존된다.
- 9 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. [교정]
- 10 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.

II -1

- 11 원자번호는 양성자수와 같다.
- 12 동위원소는 양성자수가 서로 같다. [교정]
- 13 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다.

II -2

- 14 세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다. [교정]
- 15 3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다.
- 16 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. [교정]

II -3

- 17 s 오비탈의 부양자수는 0이다.
- 18 p 오비탈의 부양자수는 1이다. [교정]
- 19 네온의 바닥상태 전자 배치는 1s² 2s² 2p⁶이다. [교정]

II -4

- 20 같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다.
- 21 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.
- 22 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. [교정]

엔탈피

- 23 발열 반응에서는 반응엔탈피 ΔH가 0보다 작다.
- 28 화학 결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다.

II -5

- 24 이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다.

25 이온결합 물질은 고체에서는 통하지 않고 액체·수용액에서 통한다. [교정]

II -6a

26 SF_6 의 분자 모양은 정팔면체형이다.

27 XeF_4 의 분자 모양은 평면사각형이다.

II -6b

29 SF_4 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.

30 SF_6 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다. [교정]

III-1

31 가역 반응은 정반응과 역반응이 모두 일어나는 반응이다.

32 평형 상태에서는 정반응과 역반응의 속도가 같을 뿐 반응은 계속 일어난다. [교정]

33 동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다.

34 평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 일정하게 유지된다. [교정]

35 평형 상태에서 농도는 일정할 뿐 서로 같은 것은 아니다. [교정]

36 평형 상태에서는 겉보기 변화가 관찰되지 않는다.

37 평형 상수 K 는 (생성물 농도의 곱)/(반응물 농도의 곱)으로 나타낸다.

38 평형 상수 식에서 각 물질의 농도는 반응식의 계수만큼 거듭제곱한다. [교정]

39 평형 상수 K 가 크면 생성물이 많다(정반응 우세). [교정]

40 평형 상수 K 가 작으면 반응물이 많다(역반응 우세). [교정]

41 동적 평형에서는 정반응과 역반응이 같은 빠르기로 계속 일어난다.

42 평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변하고 농도·압력으로는 변하지 않는다. [교정]

43 평형 상수는 온도가 변하면 값이 달라진다.

44 반응 지수 Q 는 현재 농도로 계산한 값이다.

45 $Q < K$ 이면 정반응이 우세하게 진행된다. [교정]

46 $Q > K$ 이면 역반응이 우세하게 진행된다.

47 $Q = K$ 이면 반응은 평형 상태이다.

48 평형 상수 식에는 고체와 순수한 액체의 농도를 포함하지 않는다. [교정]

49 비가역 반응은 한 방향으로만 진행된다.

50 평형 상태는 정반응과 역반응이 동시에 일어나는 동적인 상태이다.

51 평형 상태에 도달하면 정반응 속도와 역반응 속도가 같아진다.

52 닫힌 용기에서 반응이 진행되면 결국 동적 평형에 도달할 수 있다.

53 평형 상수가 매우 크면 반응이 거의 완결된 것으로 볼 수 있다.

54 같은 반응이라도 온도가 다르면 평형 상수 값이 다를 수 있다.

55 평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어나고 있다.

56 동적 평형에서 반응물이 생성물로, 생성물이 반응물로 끊임없이 바뀐다.

57 평형 상수 K 는 반응에 따라 단위가 달라지거나 무차원이며 항상 mol/L 인 것은 아니다. [교정]

58 반응 지수 Q 를 평형 상수 K 와 비교하면 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다.

59 평형에 도달하는 데 걸리는 시간은 반응에 따라 다를 수 있다.

60 정반응이 발열 반응이면 역반응은 흡열 반응이다. [교정]