

화학1 누적 OX 8회

화학 I · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 8-01 I-1 O₂는 일원자분자이다. ☐ O ☐ X
- 8-02 I-1 베릴륨(Be) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다. ☐ O ☐ X
- 8-03 I-1 소금물은 화합물이다. ☐ O ☐ X
- 8-04 I-2 청동기 시대가 철기 시대보다 앞선다. ☐ O ☐ X
- 8-05 I-2 N₂는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 8-06 I-3 O₂ 1몰의 질량은 16 g이다. ☐ O ☐ X
- 8-07 I-3 H₂ 1몰에 들어 있는 수소 원자는 2몰이다. ☐ O ☐ X
- 8-08 I-3 CO₂ 0.5몰의 질량은 44 g이다. ☐ O ☐ X
- 8-09 I-4 반응 전후 총질량은 보존된다. ☐ O ☐ X
- 8-10 I-4 화학반응식 계수비는 분자 수의 비와 같다. ☐ O ☐ X
- 8-11 I-4 H₂O의 수소:산소 질량비는 8:1이다. ☐ O ☐ X
- 8-12 II-1 원자번호는 양성자수와 같다. ☐ O ☐ X
- 8-13 II-1 동위원소는 양성자수가 서로 다르다. ☐ O ☐ X
- 8-14 II-1 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. ☐ O ☐ X
- 8-15 II-1 이온화 시 양성자수는 변하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 8-16 II-2 통승은 음극선 실험으로 전자를 발견했다. ☐ O ☐ X
- 8-17 II-2 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다. ☐ O ☐ X
- 8-18 II-2 들뜬 전자가 낮은 준위로 떨어지면 빛을 방출한다. ☐ O ☐ X
- 8-19 II-2 오비탈은 전자가 발견될 확률 분포이다. ☐ O ☐ X
- 8-20 II-3 오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어간다. ☐ O ☐ X
- 8-21 II-3 d 부껍질의 최대 전자 수는 5개이다. ☐ O ☐ X
- 8-22 II-3 한 오비탈의 두 전자는 스핀이 서로 반대이다. ☐ O ☐ X
- 8-23 II-3 L 껍질(n=2)의 최대 전자 수는 2이다. ☐ O ☐ X
- 8-24 II-3 산소(원자번호 8)의 바닥상태 전자 배치는 1s² 2s² 2p⁶이다. ☐ O ☐ X
- 8-25 II-4 같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다. ☐ O ☐ X
- 8-26 II-4 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. ☐ O ☐ X
- 8-27 II-4 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. ☐ O ☐ X
- 8-28 II-4 양이온은 중성 원자보다 반지름이 작다. ☐ O ☐ X
- 8-29 II-4 같은 주기에서 원자번호가 커지면 전기음성도가 작아진다. ☐ O ☐ X
- 8-30 II-4 할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 커진다. ☐ O ☐ X
- 8-31 II-5 원자들은 안정한 전자 배치를 이루기 위해 화학결합을 형성한다. ☐ O ☐ X

- 8-32 II-5 화학결합이 형성되면 에너지가 방출되어 더 안정해진다. ☐ O ☐ X
- 8-33 II-5 이온결합은 금속 양이온과 비금속 음이온 사이의 정전기적 인력으로 형성된다. ☐ O ☐ X
- 8-34 II-5 공유결합은 두 원자가 전자쌍을 공유하여 형성된다. ☐ O ☐ X
- 8-35 II-5 금속결합은 금속 양이온과 음이온 사이의 인력으로 형성된다. ☐ O ☐ X
- 8-36 II-5 이온결합 물질은 분자로 존재한다. ☐ O ☐ X
- 8-37 II-5 단일 결합은 전자쌍 1개, 이중 결합은 전자쌍 2개를 공유한다. ☐ O ☐ X
- 8-38 II-5 질소 분자 N₂는 단일 결합을 가진다. ☐ O ☐ X
- 8-39 II-5 두 원자가 너무 가까워지면 반발력이 작용한다. ☐ O ☐ X
- 8-40 II-5 결합은 인력과 반발력이 균형을 이루어 에너지가 가장 낮은 거리에서 안정하다. ☐ O ☐ X
- 8-41 II-5 이온결정은 외부 힘에 쉽게 쪼개지는 성질이 있다. ☐ O ☐ X
- 8-42 II-5 이온결합 물질은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다. ☐ O ☐ X
- 8-43 II-5 이온결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다. ☐ O ☐ X
- 8-44 II-5 금속은 고체 상태에서 전기가 통하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 8-45 II-5 금속의 전기 전도성은 자유전자 때문이다. ☐ O ☐ X
- 8-46 II-5 금속은 퍼지고(전성) 늘어나는(연성) 성질이 있다. ☐ O ☐ X
- 8-47 II-5 공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 낮다. ☐ O ☐ X
- 8-48 II-5 흑연은 공유결정이지만 전기가 통한다. ☐ O ☐ X
- 8-49 II-5 드라이아이스(CO₂)는 분자 결정으로 녹는점이 낮다. ☐ O ☐ X
- 8-50 II-5 분자 결정은 일반적으로 이온 결정보다 녹는점이 높다. ☐ O ☐ X
- 8-51 II-5 얼음은 분자 결정이다. ☐ O ☐ X
- 8-52 II-5 이온결정은 녹는점이 낮은 편이다. ☐ O ☐ X
- 8-53 II-5 전기음성도 차이가 큰 두 원자 사이의 공유결합은 무극성 공유결합이다. ☐ O ☐ X
- 8-54 II-5 같은 종류의 두 원자가 결합한 H₂의 결합은 무극성 공유결합이다. ☐ O ☐ X
- 8-55 II-5 격자 에너지는 기체 이온이 모여 이온결정을 형성할 때 방출하는 에너지이다. ☐ O ☐ X
- 8-56 II-5 이온의 전하가 클수록 격자 에너지는 작아진다. ☐ O ☐ X
- 8-57 II-5 이온의 크기가 작을수록 격자 에너지는 커진다. ☐ O ☐ X
- 8-58 II-5 NaCl은 이온결합 물질이다. ☐ O ☐ X
- 8-59 II-5 염화 나트륨 결정에서 Na⁺과 Cl⁻은 교대로 규칙적으로 배열된다. ☐ O ☐ X
- 8-60 II-5 물(H₂O)의 결합은 공유결합이다. ☐ O ☐ X