

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 O	42 O
3 O	23 X	43 O
4 X	24 O	44 X
5 O	25 X	45 X
6 X	26 O	46 O
7 O	27 O	47 O
8 X	28 O	48 O
9 O	29 X	49 X
10 O	30 O	50 O
11 O	31 O	51 O
12 X	32 O	52 X
13 O	33 X	53 O
14 X	34 X	54 X
15 O	35 O	55 O
16 X	36 O	56 O
17 O	37 O	57 O
18 O	38 X	58 O
19 X	39 X	59 X
20 O	40 O	60 X

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~16회 (Ⅰ·Ⅱ 단원, 엔탈피, Ⅲ 단원, Ⅳ-1·Ⅳ-2)

1	O	같은 족 원소는 루이스 전자점식의 점(원자가 전자) 개수가 서로 같다. 해설 · 같은 족은 원자가 전자 수가 같다.
2	X	소금물은 화합물이다. 옳은 문장 · 소금물은 혼합물이다. 해설 · 물과 소금이 섞인 혼합물.
3	O	지각 질량비 1위는 산소이다. 해설 · $O > Si > Al > Fe$.
4	X	인체를 개수비로 보면 1위는 산소이다. 옳은 문장 · 인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다. 해설 · 개수비 $H > O > C$.
5	O	O_2 1몰의 질량은 32 g이다. 해설 · $16 \times 2 = 32$.
6	X	H_2O 36 g은 1몰이다. 옳은 문장 · H_2O 36 g은 2몰이다. 해설 · $36 / 18 = 2$ 몰.
7	O	한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다. 해설 · 부족한 반응물이 제한.
8	X	H_2O 의 수소:산소 질량비는 8:1이다. 옳은 문장 · H_2O 의 수소:산소 질량비는 1:8이다. 해설 · $H\ 2 : O\ 16 = 1 : 8$.
9	O	동위원소는 중성자수가 서로 다르다. 해설 · 질량수 차이는 중성자수 차이.
10	O	이온화 시 양성자수는 변하지 않는다. 해설 · 전자만 변한다.
11	O	톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다. 해설 · 음극선 = 전자.
12	X	보어 모형에서 전자의 에너지는 연속적이다. 옳은 문장 · 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다. 해설 · 특정 준위만 허용.
13	O	d 부껍질의 최대 전자 수는 10개이다. 해설 · 오비탈 5개 $\times 2 = 10$.
14	X	같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 작아진다. 옳은 문장 · 같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 커진다. 해설 · 양성자만 늘어 인력 증가.
15	O	물의 증발은 열을 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 증발에는 열 흡수가 필요하다.
16	X	같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 커진다. 옳은 문장 · 같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다. 해설 · 유효핵전하 증가.
17	O	이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다. 해설 · 전하가 클수록 인력이 강하다.
18	O	CO_2 는 직선형 분자이다. 해설 · 결합 영역 2개, 고립쌍 0.

19	X	CH ₄ 는 극성 분자이다. 옳은 문장 · CH ₄ 는 무극성 분자이다. 해설 · 정사면체 대칭으로 쌍극자 상쇄.
20	O	평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다. 해설 · 동적 평형.
21	O	평형 상수 K가 크면 생성물이 많다. 해설 · 정반응 우세.
22	O	온도를 낮추면 발열 반응 쪽으로 평형이 이동한다. 해설 · 열을 내는 방향.
23	X	촉매는 평형 상수를 변화시킨다. 옳은 문장 · 촉매는 평형 상수를 변화시키지 않는다. 해설 · K는 온도만의 함수.
24	O	기체는 압력이 높을수록 용해도가 커진다. 해설 · 압력이 높으면 더 많이 녹는다.
25	X	포화 용액에서 용해와 석출은 멈춘다. 옳은 문장 · 포화 용액에서 용해와 석출은 같은 속도로 계속 일어난다. 해설 · 동적 평형.
26	O	몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰농도의 정의.
27	O	진한 용액에 용매를 더하면 몰농도가 작아진다. 해설 · 부피가 늘어 묽어진다.
28	O	흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피가 반응물보다 높다. 해설 · 흡수한 열만큼 생성물 엔탈피가 높다.
29	X	pH가 7보다 크면 산성이다. 옳은 문장 · pH가 7보다 크면 염기성이다. 해설 · pH > 7은 염기성.
30	O	25°C 순수한 물에서 [H ⁺] = [OH ⁻] = 10 ⁻⁷ M이다. 해설 · 중성.

31	O	중화반응은 산과 염기가 반응하여 물과 염을 생성하는 반응이다. 해설 · 산 + 염기 → 물 + 염.
32	O	중화반응의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 이다. 해설 · 실제 반응하는 이온만.
33	X	HCl과 NaOH의 중화에서 Na^+ 와 Cl^- 는 반응에 직접 참여하는 이온이다. 옳은 문장 · HCl과 NaOH의 중화에서 Na^+ 와 Cl^- 는 구경꾼 이온이다. 해설 · 반응에 참여하지 않는다.
34	X	구경꾼 이온은 반응에 직접 참여하는 이온이다. 옳은 문장 · 구경꾼 이온은 반응에 참여하지 않는 이온이다. 해설 · 반응 전후 그대로 남는다.
35	O	중화점에서 산이 내놓은 H^+ 의 몰수와 염기가 내놓은 OH^- 의 몰수가 같다. 해설 · 완전 중화 조건.
36	O	1가 산과 1가 염기의 중화에서는 $M_1V_1 = M_2V_2$ 가 성립한다. 해설 · H^+ 몰수 = OH^- 몰수.
37	O	중화 반응에서 산의 가수가 클수록 H^+ 를 더 많이 내놓는다. 해설 · 가수 = 내놓는 H^+ 수.
38	X	중화점에서 H^+ 의 몰수는 OH^- 의 몰수보다 크다. 옳은 문장 · 중화점에서 H^+ 의 몰수와 OH^- 의 몰수는 같다. 해설 · 같아야 완전 중화.
39	X	중화반응은 열을 흡수하는 흡열 반응이다. 옳은 문장 · 중화반응은 열을 내는 발열 반응이다. 해설 · 중화 시 열이 발생한다.
40	O	중화반응에서 발생하는 열을 중화열이라 한다. 해설 · 중화열의 정의.
41	O	중화적정은 농도를 모르는 산이나 염기의 농도를 표준 용액으로 알아내는 실험이다. 해설 · 중화적정의 목적.
42	O	중화적정에서 지시약의 색 변화로 중화점(종말점)을 확인한다. 해설 · 색 변화로 종말점 판단.
43	O	0.1 M HCl 100 mL를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 100 mL가 필요하다. 해설 · $0.1 \times 100 = 0.1 \times 100$.
44	X	0.1 M HCl 100 mL를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 50 mL가 필요하다. 옳은 문장 · 0.1 M HCl 100 mL를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 100 mL가 필요하다. 해설 · 같은 농도라 같은 부피.
45	X	강산과 강염기가 완전히 중화되면 중화점의 pH는 항상 7보다 작다. 옳은 문장 · 강산과 강염기가 완전히 중화되면 중화점의 pH는 7이다. 해설 · 강산-강염기 중화점은 중성.
46	O	중화반응으로 생성되는 염은 산의 음이온과 염기의 양이온으로 이루어진다. 해설 · 염의 구성.
47	O	$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ 에서 생성되는 염은 NaCl이다. 해설 · Na^+ 와 Cl^- 의 염.
48	O	제산제는 위산을 중화하는 데 이용된다. 해설 · 염기성 제산제로 산 중화.
49	X	산성화된 호수에 석회를 뿌리는 것은 산성을 더 강하게 만든다. 옳은 문장 · 산성화된 호수에 석회를 뿌리는 것은 중화반응으로 산성을 줄인다. 해설 · 염기성 석회로 산을 중화.

50	O	벌에 쏘였을 때 암모니아수를 바르는 것은 산성 독을 중화하기 위해서이다. 해설 · 염기성 암모니아수로 중화.
51	O	중화반응에서 산의 H^+ 1몰은 염기의 OH^- 1몰과 반응한다. 해설 · 1:1로 물을 만든다.
52	X	2가 산 0.1몰을 완전히 중화하려면 1가 염기 0.1몰이 필요하다. 옳은 문장 · 2가 산 0.1몰을 완전히 중화하려면 1가 염기 0.2몰이 필요하다. 해설 · 2가 산은 H^+ 0.2몰을 내놓는다.
53	O	중화점에 도달하기 전에는 산 또는 염기가 남아 있다. 해설 · 아직 완전 중화되지 않음.
54	X	중화점을 지나 염기를 더 넣으면 용액은 산성이 된다. 옳은 문장 · 중화점을 지나 염기를 더 넣으면 용액은 염기성이 된다. 해설 · OH^-가 남아 염기성.
55	O	산과 염기를 섞으면 물과 염이 생성된다. 해설 · 중화의 생성물.
56	O	중화반응에서 물이 생성되는 것은 H^+와 OH^-가 결합하기 때문이다. 해설 · $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$.
57	O	중화적정에 사용하는 농도를 정확히 아는 용액을 표준 용액이라 한다. 해설 · 표준 용액의 정의.
58	O	같은 몰수의 H^+와 OH^-가 반응하면 완전히 중화된다. 해설 · H^+ 몰수 = OH^- 몰수.
59	X	중화 반응의 알짜 이온 반응식에는 구경꾼 이온을 포함한다. 옳은 문장 · 중화 반응의 알짜 이온 반응식에는 구경꾼 이온을 포함하지 않는다. 해설 · 실제 반응 이온만 쓴다.
60	X	0.2 M NaOH 50 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M HCl의 부피는 50 mL이다. 옳은 문장 · 0.2 M NaOH 50 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M HCl의 부피는 100 mL이다. 해설 · OH^- 0.01몰 = H^+ 0.01몰, $0.01/0.1 = 0.1$ L.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 옳은 문장 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 옳게 고친 형태로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

- 1 같은 족 원소는 루이스 전자점식의 점(원자가 전자) 개수가 서로 같다.
- 2 소금물은 혼합물이다. [교정]

I -2

- 3 지각 질량비 1위는 산소이다.
- 4 인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다. [교정]

I -3

- 5 O₂ 1몰의 질량은 32 g이다.
- 6 H₂O 36 g은 2몰이다. [교정]

I -4

- 7 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.
- 8 H₂O의 수소:산소 질량비는 1:8이다. [교정]

II -1

- 9 동위원소는 중성자수가 서로 다르다.
- 10 이온화 시 양성자수는 변하지 않는다.

II -2

- 11 톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다.
- 12 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다. [교정]

II -3

- 13 d 부껍질의 최대 전자 수는 10개이다.
- 14 같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 커진다. [교정]

엔탈피

- 15 물의 증발은 열을 흡수하는 흡열 과정이다.
- 28 흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피가 반응물보다 높다.

II -4

- 16 같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다. [교정]

II -5

- 17 이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다.

II -6a

- 18 CO₂는 직선형 분자이다.

II -6b

- 19 CH₄는 무극성 분자이다. [교정]

III -1

- 20 평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다.

21 평형 상수 K가 크면 생성물이 많다.

III-2

22 온도를 낮추면 발열 반응 쪽으로 평형이 이동한다.

23 촉매는 평형 상수를 변화시키지 않는다. [교정]

III-3

24 기체는 압력이 높을수록 용해도가 커진다.

25 포화 용액에서 용해와 석출은 같은 속도로 계속 일어난다. [교정]

IV-1

26 몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

27 진한 용액에 용매를 더하면 몰농도가 작아진다.

IV-2

29 pH가 7보다 크면 염기성이다. [교정]

30 25°C 순수한 물에서 $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7} M$ 이다.

IV-3

31 중화반응은 산과 염기가 반응하여 물과 염을 생성하는 반응이다.

32 중화반응의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 이다.

33 HCl과 NaOH의 중화에서 Na^+ 와 Cl^- 는 구경꾼 이온이다. [교정]

34 구경꾼 이온은 반응에 참여하지 않는 이온이다. [교정]

35 중화점에서 산이 내놓은 H^+ 의 몰수와 염기가 내놓은 OH^- 의 몰수가 같다.

36 1가 산과 1가 염기의 중화에서는 $M_1V_1 = M_2V_2$ 가 성립한다.

37 중화 반응에서 산의 가수가 클수록 H^+ 를 더 많이 내놓는다.

38 중화점에서 H^+ 의 몰수와 OH^- 의 몰수는 같다. [교정]

39 중화반응은 열을 내는 발열 반응이다. [교정]

40 중화반응에서 발생하는 열을 중화열이라 한다.

41 중화적정은 농도를 모르는 산이나 염기의 농도를 표준 용액으로 알아내는 실험이다.

42 중화적정에서 지시약의 색 변화로 중화점(종말점)을 확인한다.

43 0.1 M HCl 100 mL를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 100 mL가 필요하다.

44 0.1 M HCl 100 mL를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 100 mL가 필요하다. [교정]

45 강산과 강염기가 완전히 중화되면 중화점의 pH는 7이다. [교정]

46 중화반응으로 생성되는 염은 산의 음이온과 염기의 양이온으로 이루어진다.

47 $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ 에서 생성되는 염은 NaCl이다.

48 제산제는 위산을 중화하는 데 이용된다.

49 산성화된 호수에 석회를 뿌리는 것은 중화반응으로 산성을 줄인다. [교정]

50 벌에 쏘였을 때 암모니아수를 바르는 것은 산성 독을 중화하기 위해서이다.

51 중화반응에서 산의 H^+ 1몰은 염기의 OH^- 1몰과 반응한다.

52 2가 산 0.1몰을 완전히 중화하려면 1가 염기 0.2몰이 필요하다. [교정]

53 중화점에 도달하기 전에는 산 또는 염기가 남아 있다.

54 중화점을 지나 염기를 더 넣으면 용액은 염기성이 된다. [교정]

55 산과 염기를 섞으면 물과 염이 생성된다.

56 중화반응에서 물이 생성되는 것은 H^+ 와 OH^- 가 결합하기 때문이다.

57 중화적정에 사용하는 농도를 정확히 아는 용액을 표준 용액이라 한다.

58 같은 몰수의 H^+ 와 OH^- 가 반응하면 완전히 중화된다.

59 중화 반응의 알짜 이온 반응식에는 구경꾼 이온을 포함하지 않는다. [교정]

60 0.2 M NaOH 50 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M HCl의 부피는 100 mL이다. [교정]