

화학1 누적 OX 10회

화학 I · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 10-01 II-6b SN5의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다. ☐ O ☐ X
- 10-02 II-6b SN6의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다. ☐ O ☐ X
- 10-03 II-6b SF₄에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다. ☐ O ☐ X
- 10-04 II-6b SF₆에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다. ☐ O ☐ X
- 10-05 II-6b XeF₄에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다. ☐ O ☐ X
- 10-06 II-6b PF₅에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다. ☐ O ☐ X
- 10-07 II-6b I₃⁻에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다. ☐ O ☐ X
- 10-08 II-6b SF₆의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. ☐ O ☐ X
- 10-09 II-6b SF₄의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. ☐ O ☐ X
- 10-10 II-6b PF₅의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. ☐ O ☐ X
- 10-11 II-6b XeF₄의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. ☐ O ☐ X
- 10-12 II-6b BrF₅의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. ☐ O ☐ X
- 10-13 II-6b ClF₃의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. ☐ O ☐ X
- 10-14 II-6b 전기음성도가 다른 두 원자 사이의 결합은 극성 공유결합이다. ☐ O ☐ X
- 10-15 II-6b 같은 원자 사이의 결합은 무극성 공유결합이다. ☐ O ☐ X
- 10-16 II-6b 극성 공유결합에서 전기음성도가 큰 원자가 부분적인 양전하(δ^+)를 띤다. ☐ O ☐ X
- 10-17 II-6b HCl에서 Cl은 부분적인 양전하(δ^+)를 띤다. ☐ O ☐ X
- 10-18 II-6b 쌍극자 모멘트는 결합의 극성 크기와 방향을 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 10-19 II-6b 결합이 극성이면 분자도 항상 극성이다. ☐ O ☐ X
- 10-20 II-6b CO₂는 극성 결합을 가지지만 무극성 분자이다. ☐ O ☐ X
- 10-21 II-6b CO₂가 무극성인 것은 직선형 대칭 구조로 쌍극자가 상쇄되기 때문이다. ☐ O ☐ X
- 10-22 II-6b H₂O는 극성 분자이다. ☐ O ☐ X
- 10-23 II-6b H₂O가 극성인 것은 굽은형 구조라 쌍극자가 상쇄되지 않기 때문이다. ☐ O ☐ X
- 10-24 II-6b CCl₄는 극성 분자이다. ☐ O ☐ X
- 10-25 II-6b CH₄는 극성 분자이다. ☐ O ☐ X
- 10-26 II-6b NH₃는 무극성 분자이다. ☐ O ☐ X
- 10-27 II-6b NH₃는 극성 분자이다. ☐ O ☐ X
- 10-28 II-6b BF₃는 평면 삼각형 대칭이라 무극성 분자이다. ☐ O ☐ X
- 10-29 II-6b HF는 무극성 분자이다. ☐ O ☐ X

- 10-30 II-6b 분자의 극성 여부는 결합의 극성과 분자 모양(대칭성)으로 결정된다. ☐ O ☐ X
- 10-31 I-1 인(P) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다. ☐ O ☐ X
- 10-32 I-1 Fe₂O₃는 분자이다. ☐ O ☐ X
- 10-33 I-2 인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다. ☐ O ☐ X
- 10-34 I-2 반응성이 클수록 먼저 사용되었다. ☐ O ☐ X
- 10-35 I-3 NH₃ 1몰의 질량은 14 g이다. ☐ O ☐ X
- 10-36 I-3 0°C, 1기압에서 5.6 L 기체는 0.25몰이다. ☐ O ☐ X
- 10-37 I-3 O₂ 0.5몰의 질량은 32 g이다. ☐ O ☐ X
- 10-38 I-4 기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다. ☐ O ☐ X
- 10-39 I-4 생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다. ☐ O ☐ X
- 10-40 I-4 일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다. ☐ O ☐ X
- 10-41 II-1 원자번호는 양성자수와 같다. ☐ O ☐ X
- 10-42 II-1 동위원소는 질량수가 서로 같다. ☐ O ☐ X
- 10-43 II-1 전자는 양성자보다 무겁다. ☐ O ☐ X
- 10-44 II-2 가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다. ☐ O ☐ X
- 10-45 II-2 적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다. ☐ O ☐ X
- 10-46 II-2 전자가 낮은 준위로 떨어지면 빛을 방출한다. ☐ O ☐ X
- 10-47 II-3 부양자수(l)은 오비탈의 종류를 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 10-48 II-3 자기양자수(m)는 전자궤질을 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 10-49 II-3 스핀양자수는 오비탈의 방향을 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 10-50 II-3 같은 주기에서 유효핵전하는 원자번호가 커질수록 커진다. ☐ O ☐ X
- 10-51 II-4 같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다. ☐ O ☐ X
- 10-52 II-4 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. ☐ O ☐ X
- 10-53 II-4 같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도가 커진다. ☐ O ☐ X
- 10-54 II-4 할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다. ☐ O ☐ X
- 10-55 II-5 이온결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다. ☐ O ☐ X
- 10-56 II-5 공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다. ☐ O ☐ X
- 10-57 II-5 H₂의 결합은 무극성 공유결합이다. ☐ O ☐ X
- 10-58 II-6a SN5의 기본 모양은 삼각쌍뿔형이다. ☐ O ☐ X
- 10-59 II-6a SN6의 기본 모양은 정팔면체형이다. ☐ O ☐ X
- 10-60 II-6a SF₄의 분자 모양은 시소형이다. ☐ O ☐ X