

화학1 누적 OX 18회

화학 I · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 18-01** I-1 탄소(C)와 규소(Si)는 루이스 전자점식의 점 개수가 서로 같다. ☐ O ☐ X
- 18-02** I-1 NaCl은 분자이다. ☐ O ☐ X
- 18-03** I-2 지각 질량비 1위는 산소이다. ☐ O ☐ X
- 18-04** I-2 N₂는 반응성이 커서 쉽게 반응한다. ☐ O ☐ X
- 18-05** I-3 CO₂ 1몰의 질량은 44 g이다. ☐ O ☐ X
- 18-06** I-3 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 11.2 L이다. ☐ O ☐ X
- 18-07** I-4 반응 전후 총질량은 보존된다. ☐ O ☐ X
- 18-08** I-4 화학반응식 계수비는 질량비와 같다. ☐ O ☐ X
- 18-09** II-1 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. ☐ O ☐ X
- 18-10** II-1 동위원소는 양성자수가 서로 다르다. ☐ O ☐ X
- 18-11** II-2 4→1 전이와 4→2 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:1이다. ☐ O ☐ X
- 18-12** II-2 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. ☐ O ☐ X
- 18-13** II-3 p 오비탈의 각마디 수는 1이다. ☐ O ☐ X
- 18-14** II-3 탄소(원자번호 6)의 바닥상태 전자 배치는 1s² 2s² 2p⁴이다. ☐ O ☐ X
- 18-15** 엔탈피 반응엔탈피는 반응물과 생성물의 결합 에너지 차이로 어림할 수 있다. ☐ O ☐ X
- 18-16** II-4 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 커진다. ☐ O ☐ X
- 18-17** II-5 금속결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다. ☐ O ☐ X
- 18-18** II-6a 입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 1개이면 사각뿔형이다. ☐ O ☐ X
- 18-19** II-6b SN5의 혼성 오비탈은 sp³d²이다. ☐ O ☐ X
- 18-20** III-1 평형 상태에서 정반응과 역반응은 멈춘다. ☐ O ☐ X
- 18-21** III-1 평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변한다. ☐ O ☐ X
- 18-22** III-2 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않는다. ☐ O ☐ X
- 18-23** III-2 압력을 높이면 기체 분자 수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다. ☐ O ☐ X
- 18-24** III-3 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. ☐ O ☐ X
- 18-25** III-3 외부 압력이 낮아지면 끓는점이 높아진다. ☐ O ☐ X
- 18-26** IV-1 물농도는 용질의 물수를 용액의 부피(L)로 나눈 값이다. ☐ O ☐ X
- 18-27** IV-1 희석해도 용질의 물수는 변하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 18-28** 엔탈피 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. ☐ O ☐ X
- 18-29** IV-2 25°C에서 pH + pOH = 7이다. ☐ O ☐ X
- 18-30** IV-3 중화반응의 알짜 이온 반응식은 H⁺ + OH⁻ → H₂O이다. ☐ O ☐ X
- 18-31** 부록 화학식량은 화학식을 이루는 원소들의 원자량을 모두 더한 값이다. ☐ O ☐ X
- 18-32** 부록 H₂O의 분자량은 16이다. ☐ O ☐ X

- 18-33** 부록 CO₂의 분자량은 44이다. ☐ O ☐ X
- 18-34** 부록 화합물에서 성분 원소의 질량비는 화학식으로부터 구할 수 있다. ☐ O ☐ X
- 18-35** 부록 H₂O에서 수소와 산소의 질량비는 8:1이다. ☐ O ☐ X
- 18-36** 부록 성분 원소의 질량 백분율은 (그 원소의 질량 / 화합물 전체 질량) × 100이다. ☐ O ☐ X
- 18-37** 부록 H₂O에서 산소의 질량 백분율은 약 88.9%이다. ☐ O ☐ X
- 18-38** 부록 H₂O에서 수소의 질량 백분율은 약 50%이다. ☐ O ☐ X
- 18-39** 부록 CO₂에서 탄소의 질량 백분율은 약 72.7%이다. ☐ O ☐ X
- 18-40** 부록 실험식은 화합물을 이루는 원자의 가장 간단한 정수비를 나타낸 식이다. ☐ O ☐ X
- 18-41** 부록 분자식은 분자를 이루는 실제 원자의 종류와 수를 나타낸 식이다. ☐ O ☐ X
- 18-42** 부록 과산화 수소 H₂O₂의 실험식은 H₂O₂이다. ☐ O ☐ X
- 18-43** 부록 포도당 C₆H₁₂O₆의 실험식은 CH₂O이다. ☐ O ☐ X
- 18-44** 부록 벤젠 C₆H₆의 실험식은 C₆H₆이다. ☐ O ☐ X
- 18-45** 부록 분자식은 항상 실험식과 같다. ☐ O ☐ X
- 18-46** 부록 분자량을 실험식량으로 나누면 분자식이 실험식의 몇 배인지 알 수 있다. ☐ O ☐ X
- 18-47** 부록 실험식량이 30이고 분자량이 180이면 분자식은 실험식의 3배이다. ☐ O ☐ X
- 18-48** 부록 실험식 CH₂O, 분자량 180인 화합물의 분자식은 C₆H₁₂O₆이다. ☐ O ☐ X
- 18-49** 부록 조성 분석에서 각 원소의 질량을 원자량으로 나누면 몰수를 얻는다. ☐ O ☐ X
- 18-50** 부록 원소들의 몰수의 가장 간단한 정수비가 실험식의 원자 수 비이다. ☐ O ☐ X
- 18-51** 부록 탄소 40%, 수소 6.7%, 산소 53.3%로 이루어진 화합물의 실험식은 CH₂O이다. ☐ O ☐ X
- 18-52** 부록 실험식만 알면 분자식을 항상 결정할 수 있다. ☐ O ☐ X
- 18-53** 부록 같은 실험식을 가져도 분자식이 다른 화합물이 있을 수 있다. ☐ O ☐ X
- 18-54** 부록 NaCl처럼 분자가 없는 물질은 실험식으로 조성을 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 18-55** 부록 일정 성분비 법칙에 따라 한 화합물의 조성은 항상 일정하다. ☐ O ☐ X
- 18-56** 부록 화합물의 질량 백분율은 시료의 양에 관계없이 일정하다. ☐ O ☐ X
- 18-57** 부록 CH₄에서 탄소의 질량 백분율은 25%이다. ☐ O ☐ X
- 18-58** 부록 분자량이 실험식량과 같으면 분자식과 실험식이 같다. ☐ O ☐ X
- 18-59** 부록 실험식 CH의 실험식량은 26이다. ☐ O ☐ X
- 18-60** 부록 두 원소로 된 화합물에서 한 원소의 질량%를 알면 나머지 원소의 질량%도 알 수 있다. ☐ O ☐ X