

화학2 누적 OX 5회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 5-01 고체 단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다. ☐ O ☐ X
- 5-02 고체 단순입방구조는 배위수가 6이다. ☐ O ☐ X
- 5-03 고체 단순입방구조에서 한변의 길이(l)는 $2r$ 이다. ☐ O ☐ X
- 5-04 고체 단순입방구조에서 단위세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$ 이다. ☐ O ☐ X
- 5-05 고체 CsCl은 면심입방구조이다. ☐ O ☐ X
- 5-06 고체 체심입방구조는 단위 세포당 입자수가 2개이다. ☐ O ☐ X
- 5-07 고체 체심입방구조는 배위수가 8이다. ☐ O ☐ X
- 5-08 고체 체심입방구조에서 한변의 길이(l)는 $4r/\sqrt{3}$ 이다. ☐ O ☐ X
- 5-09 고체 체심입방구조에서 단위세포의 부피는 $8r^3$ 이다. ☐ O ☐ X
- 5-10 고체 면심입방구조는 단위 세포당 입자수가 2개이다. ☐ O ☐ X
- 5-11 고체 면심입방구조는 배위수가 12이다. ☐ O ☐ X
- 5-12 고체 면심입방구조에서 한변의 길이(l)는 $2\sqrt{2}r$ 이다. ☐ O ☐ X
- 5-13 고체 면심입방구조에서 단위세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$ 이다. ☐ O ☐ X
- 5-14 고체 NaCl은 체심입방구조이다. ☐ O ☐ X
- 5-15 고체 육방밀집구조는 단위 세포당 입자수가 2개이다. ☐ O ☐ X
- 5-16 고체 육방밀집구조는 배위수가 12이다. ☐ O ☐ X
- 5-17 고체 육방밀집구조에서 한변의 길이(l)는 $2r$ 이다. ☐ O ☐ X
- 5-18 고체 육방밀집구조에서 단위세포의 부피는 $24\sqrt{2}r^3$ 이다. ☐ O ☐ X
- 5-19 고체 sc에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다. ☐ O ☐ X
- 5-20 고체 bcc에서 단위세포의 질량은 M/NA 이다. ☐ O ☐ X
- 5-21 고체 fcc에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다. ☐ O ☐ X
- 5-22 고체 ccp에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다. ☐ O ☐ X
- 5-23 고체 hcp에서 단위세포의 질량은 $6M/NA$ 이다. ☐ O ☐ X
- 5-24 고체 면심입방에서 사면체자리는 4개이다. ☐ O ☐ X
- 5-25 고체 면심입방에서 팔면체자리는 8개이다. ☐ O ☐ X
- 5-26 고체 단순입방구조의 충전율은 52%이다. ☐ O ☐ X
- 5-27 고체 결정성 고체는 입자가 규칙적으로 배열되어 있다. ☐ O ☐ X
- 5-28 고체 분자 결정의 구성 입자는 분자이다. ☐ O ☐ X
- 5-29 고체 분자 결정에서 분자들은 서로 공유 결합으로 연결되어 있다. ☐ O ☐ X
- 5-30 고체 분자 결정은 녹는점이 높다. ☐ O ☐ X
- 5-31 분자간힘 이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다. ☐ O ☐ X
- 5-32 분자간힘 실제기체는 분자 자체의 크기가 없다. ☐ O ☐ X

- 5-33 분자간힘 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. ☐ O ☐ X
- 5-34 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. ☐ O ☐ X
- 5-35 분자간힘 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다. ☐ O ☐ X
- 5-36 분자간힘 He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 5-37 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. ☐ O ☐ X
- 5-38 이상기체 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. ☐ O ☐ X
- 5-39 이상기체 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. ☐ O ☐ X
- 5-40 이상기체 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 5-41 이상기체 표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. ☐ O ☐ X
- 5-42 이상기체 온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 커진다. ☐ O ☐ X
- 5-43 이상기체 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. ☐ O ☐ X
- 5-44 이상기체 온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다. ☐ O ☐ X
- 5-45 이상기체 이상 기체는 분자 사이에 인력이 있다고 가정한다. ☐ O ☐ X
- 5-46 실제기체 실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다. ☐ O ☐ X
- 5-47 실제기체 이상 기체의 압축 인자 Z는 1이 아니다. ☐ O ☐ X
- 5-48 실제기체 실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. ☐ O ☐ X
- 5-49 분압 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. ☐ O ☐ X
- 5-50 분압 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. ☐ O ☐ X
- 5-51 분압 혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1보다 크다. ☐ O ☐ X
- 5-52 실제기체 반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다. ☐ O ☐ X
- 5-53 액체 증기 압력은 액체와 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다. ☐ O ☐ X
- 5-54 액체 증기 압력은 온도가 낮을수록 커진다. ☐ O ☐ X
- 5-55 액체 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. ☐ O ☐ X
- 5-56 액체 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. ☐ O ☐ X
- 5-57 액체 증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다. ☐ O ☐ X
- 5-58 액체 분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다. ☐ O ☐ X
- 5-59 액체 증발은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. ☐ O ☐ X
- 5-60 액체 휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다. ☐ O ☐ X