

일반화학 누적 OX 1회

일반화학 · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 1-01 기초지식 SI 기본 단위에서 질량은 kg, 길이는 m, 시간은 s, 온도는 K이다. ☐ O ☐ X
- 1-02 기초지식 물질의 양(몰질량)의 SI 기본 단위는 그램(g)이다. ☐ O ☐ X
- 1-03 기초지식 접두사 kilo는 10^3 , milli는 10^{-3} 을 의미한다. ☐ O ☐ X
- 1-04 기초지식 접두사 micro(μ)는 10^{-6} 을 의미한다. ☐ O ☐ X
- 1-05 기초지식 접두사 nano(n)는 10^{-9} 을 의미한다. ☐ O ☐ X
- 1-06 기초지식 유효숫자에서 0이 아닌 모든 숫자는 유효하다. ☐ O ☐ X
- 1-07 기초지식 숫자 사이에 있는 0은 유효숫자이다. ☐ O ☐ X
- 1-08 기초지식 소수에서 앞에 오는 0(예: 0.0025의 0들)은 유효숫자이다. ☐ O ☐ X
- 1-09 기초지식 소수점 뒤 끝자리의 0은 유효숫자이다. ☐ O ☐ X
- 1-10 기초지식 곱셈·나눗셈 결과의 유효숫자는 가장 적은 유효숫자 개수에 맞춘다. ☐ O ☐ X
- 1-11 기초지식 덧셈·뺄셈 결과는 소수점 이하 자릿수가 가장 많은 것에 맞춘다. ☐ O ☐ X
- 1-12 기초지식 셈으로 얻은 정확한 수는 유효숫자가 무한대로 취급된다. ☐ O ☐ X
- 1-13 기초지식 정확도는 측정값이 참값에 가까운 정도이다. ☐ O ☐ X
- 1-14 기초지식 정밀도는 측정값들이 서로 얼마나 일치하는지를 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 1-15 기초지식 정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. ☐ O ☐ X
- 1-16 기초지식 밀도는 질량을 부피로 나눈 값이다. ☐ O ☐ X
- 1-17 기초지식 섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다. ☐ O ☐ X
- 1-18 기초지식 차원 분석(단위 환산)에서는 환산 인자를 곱해 단위를 바꾼다. ☐ O ☐ X
- 1-19 원자 원자는 양성자·중성자·전자로 이루어진다. ☐ O ☐ X
- 1-20 원자 원자 번호는 양성자 수와 같다. ☐ O ☐ X
- 1-21 원자 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. ☐ O ☐ X
- 1-22 원자 질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. ☐ O ☐ X
- 1-23 원자 동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다르다. ☐ O ☐ X
- 1-24 원자 동위원소는 화학적 성질이 서로 크게 다르다. ☐ O ☐ X
- 1-25 원자 원자량은 가장 흔한 동위원소 하나의 질량과 같다. ☐ O ☐ X
- 1-26 원자 중성 원자에서 양성자 수와 전자 수는 같다. ☐ O ☐ X
- 1-27 원자 전자의 질량은 양성자의 질량과 거의 같다. ☐ O ☐ X
- 1-28 원자 양성자는 +전하, 전자는 -전하, 중성자는 전하가 없다. ☐ O ☐ X
- 1-29 양자수 주양자수 n 은 전자 껍질(에너지 준위)을 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 1-30 양자수 방위(각운동량) 양자수 l 은 부껍질(오비탈 모양)을 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 1-31 양자수 자기 양자수 m_l 은 오비탈의 공간적 방향을 나타낸다. ☐ O ☐ X

- 1-32 양자수 스핀 양자수 m_s 는 0 또는 1의 값을 가진다. ☐ O ☐ X
- 1-33 양자수 방위 양자수 l 은 0부터 n 까지의 값을 가진다. ☐ O ☐ X
- 1-34 양자수 $l=0$ 은 s, $l=1$ 은 p, $l=2$ 은 d, $l=3$ 은 f 오비탈이다. ☐ O ☐ X
- 1-35 양자수 자기 양자수 m_l 은 - l 부터 $+l$ 까지의 정수 값을 가진다. ☐ O ☐ X
- 1-36 양자수 s 오비탈은 1개, p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다. ☐ O ☐ X
- 1-37 양자수 p 오비탈은 5개, d 오비탈은 7개이다. ☐ O ☐ X
- 1-38 양자수 s 오비탈은 구형, p 오비탈은 아령형이다. ☐ O ☐ X
- 1-39 전자배치 파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다. ☐ O ☐ X
- 1-40 전자배치 한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 같아야 한다. ☐ O ☐ X
- 1-41 전자배치 훈트 규칙에 따라 같은 에너지의 오비탈에는 전자가 먼저 하나씩 채워진다. ☐ O ☐ X
- 1-42 전자배치 쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 높은 오비탈부터 채워진다. ☐ O ☐ X
- 1-43 전자배치 전자는 2p, 2s, 1s 순으로(높은 에너지부터) 채워진다. ☐ O ☐ X
- 1-44 전자배치 다전자 원자에서 4s 오비탈은 3d보다 먼저 채워진다. ☐ O ☐ X
- 1-45 전자배치 한 부껍질이 절반 채워지거나 가득 차면 비교적 안정하다. ☐ O ☐ X
- 1-46 전자배치 바닥상태는 전자가 에너지가 가장 낮게 배치된 상태이다. ☐ O ☐ X
- 1-47 전자배치 들뜬상태는 전자가 더 높은 에너지 준위에 있는 상태이다. ☐ O ☐ X
- 1-48 전자배치 원자가 전자는 가장 안쪽 껍질의 전자이다. ☐ O ☐ X
- 1-49 주기성 같은 족 원소는 원자가 전자 수가 서로 다르다. ☐ O ☐ X
- 1-50 주기성 전자 배치로 원소의 주기와 족을 알 수 있다. ☐ O ☐ X
- 1-51 주기성 같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 감소한다. ☐ O ☐ X
- 1-52 주기성 같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름은 증가한다. ☐ O ☐ X
- 1-53 주기성 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름은 증가한다. ☐ O ☐ X
- 1-54 주기성 이온화 에너지는 기체 상태 원자에서 전자 1개를 떼는데 필요한 에너지이다. ☐ O ☐ X
- 1-55 주기성 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 이온화 에너지는 대체로 증가한다. ☐ O ☐ X
- 1-56 주기성 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. ☐ O ☐ X
- 1-57 주기성 2차 이온화 에너지는 1차 이온화 에너지보다 크다. ☐ O ☐ X
- 1-58 주기성 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다. ☐ O ☐ X
- 1-59 주기성 전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 증가한다. ☐ O ☐ X
- 1-60 주기성 등전자 이온(전자 수가 같음)에서 핵전하가 클수록 반지름이 작다. ☐ O ☐ X