

화학1 누적 OX 2회

화학 I · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 2-01 I-1 물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자는 분자이다. ☐ O ☐ X
- 2-02 I-1 O₂는 삼원자분자이다. ☐ O ☐ X
- 2-03 I-1 NH₃ 한 분자에는 원자가 4개 들어 있다. ☐ O ☐ X
- 2-04 I-1 플루오린(F) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다. ☐ O ☐ X
- 2-05 I-1 과산화 수소 H₂O₂의 실험식은 HO이다. ☐ O ☐ X
- 2-06 I-1 전자의 질량은 양성자에 비해 무시할 수 있을 만큼 작다. ☐ O ☐ X
- 2-07 I-1 중성자는 전하를 띠지 않는다. ☐ O ☐ X
- 2-08 I-1 중성 원자에서 전자 수는 양성자 수와 같다. ☐ O ☐ X
- 2-09 I-1 전자는 원자핵 안에 들어 있다. ☐ O ☐ X
- 2-10 I-1 Ne은 최외각 전자가 2개로 안정하다. ☐ O ☐ X
- 2-11 I-1 같은 족 원소는 원자가전자 수가 같다. ☐ O ☐ X
- 2-12 I-1 Na는 1족 원소이다. ☐ O ☐ X
- 2-13 I-1 비금속 원자는 전자를 잃어 음이온이 된다. ☐ O ☐ X
- 2-14 I-1 Al이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +3이다. ☐ O ☐ X
- 2-15 I-1 산소 분자(O₂)의 결합은 이온결합이다. ☐ O ☐ X
- 2-16 I-1 금속 원자 사이의 결합은 이온결합이다. ☐ O ☐ X
- 2-17 I-1 기체는 모양과 부피가 모두 일정하지 않다. ☐ O ☐ X
- 2-18 I-1 공기는 순물질이다. ☐ O ☐ X
- 2-19 I-1 설탕물은 순물질이다. ☐ O ☐ X
- 2-20 I-1 다이아몬드는 화합물이다. ☐ O ☐ X
- 2-21 I-1 종이 타는 것은 화학변화이다. ☐ O ☐ X
- 2-22 I-1 얼음이 녹는 것은 화학변화이다. ☐ O ☐ X
- 2-23 I-1 색깔은 물리적 성질이다. ☐ O ☐ X
- 2-24 I-1 CaO는 분자이다. ☐ O ☐ X
- 2-25 I-1 루이스 전자점식에서는 안쪽 껍질 전자까지 모두 점으로 표시한다. ☐ O ☐ X
- 2-26 I-2 반응성이 큰 금속일수록 제련이 어려워 늦게 사용되었다. ☐ O ☐ X
- 2-27 I-2 지각에서 두 번째로 많은 원소는 알루미늄이다. ☐ O ☐ X
- 2-28 I-2 인체를 질량비로 보면 산소가 가장 많다. ☐ O ☐ X
- 2-29 I-2 N₂는 삼중결합을 가져 반응성이 작다. ☐ O ☐ X
- 2-30 I-2 하버보슈법은 질소와 수소로 암모니아를 합성한다. ☐ O ☐ X
- 2-31 I-3 원자량은 질량수 12인 탄소(¹²C)를 기준으로 한 상대적 질량이다. ☐ O ☐ X
- 2-32 I-3 원자량의 단위는 g이다. ☐ O ☐ X

- 2-33 I-3 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 고려한 값이다. ☐ O ☐ X
- 2-34 I-3 평균 원자량은 항상 정수이다. ☐ O ☐ X
- 2-35 I-3 동위원소는 양성자수는 같고 중성자수가 다르다. ☐ O ☐ X
- 2-36 I-3 동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다. ☐ O ☐ X
- 2-37 I-3 분자량은 분자를 이루는 원자들의 원자량을 곱한 값이다. ☐ O ☐ X
- 2-38 I-3 NaCl처럼 분자가 없는 물질은 분자량 대신 화학식량을 쓴다. ☐ O ☐ X
- 2-39 I-3 1몰은 6.02 × 10²³개의 입자 수이다. ☐ O ☐ X
- 2-40 I-3 어떤 물질 1몰의 질량(g)은 그 물질의 화학식량과 수치가 같다. ☐ O ☐ X
- 2-41 I-3 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. ☐ O ☐ X
- 2-42 I-3 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체의 종류에 따라 다르다. ☐ O ☐ X
- 2-43 I-3 같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다. ☐ O ☐ X
- 2-44 I-3 CO₂ 1몰의 질량은 44 g이다. ☐ O ☐ X
- 2-45 I-3 CH₄ 1몰의 질량은 12 g이다. ☐ O ☐ X
- 2-46 I-3 산소 분자 O₂ 1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다. ☐ O ☐ X
- 2-47 I-3 질량수 12인 탄소 12 g에 들어 있는 원자 수는 아보가드로 수와 같다. ☐ O ☐ X
- 2-48 I-3 몰수는 질량을 몰질량으로 나누어 구한다. ☐ O ☐ X
- 2-49 I-3 H₂O 9 g은 1몰이다. ☐ O ☐ X
- 2-50 I-3 0°C, 1기압에서 기체의 몰수는 부피(L)를 22.4로 나누어 구한다. ☐ O ☐ X
- 2-51 I-3 같은 질량의 H₂와 O₂ 중 몰수가 더 큰 것은 O₂이다. ☐ O ☐ X
- 2-52 I-3 분자량이 클수록 같은 질량에서 몰수가 작다. ☐ O ☐ X
- 2-53 I-3 수소 분자 H₂ 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다. ☐ O ☐ X
- 2-54 I-3 0°C, 1기압에서 기체의 밀도(g/L)에 22.4를 곱하면 분자량을 구할 수 있다. ☐ O ☐ X
- 2-55 I-3 같은 온도에서 같은 부피에 든 기체 분자 수는 압력이 높을수록 많다. ☐ O ☐ X
- 2-56 I-3 물 분자 6.02 × 10²³개의 질량은 18 g이다. ☐ O ☐ X
- 2-57 I-3 동위원소는 질량수가 서로 다르다. ☐ O ☐ X
- 2-58 I-3 어떤 원소의 평균 원자량은 가장 존재비가 큰 동위원소의 질량수와 항상 같다. ☐ O ☐ X
- 2-59 I-3 분자식이 같으면 실험식도 반드시 같다. ☐ O ☐ X
- 2-60 I-3 0°C, 1기압에서 CO₂ 11.2 L는 0.5몰이다. ☐ O ☐ X