

Chapter 3

同构定理

定义 3.1 商空间: F 为域, V 是 F 上的向量空间, S 是 V 的子空间, 则称 $\frac{V}{S} \equiv \{[v] \mid v \in V\}$ 是 F 的商空间, 其中 $[v] \equiv \{u \in V \mid u - v \in S\} = S + v$.

$\frac{V}{S}$ 是 F 上的向量空间.

证: $[u] + [v] = \{a \in V \mid a - u \in S\} + \{b \in V \mid b - v \in S\} = \{(a+b) \in V \mid a - u \in S, b - v \in S\}$.

$[u+v] = \{w \in V \mid w - (u+v) \in S\}$.

$\forall a+b \in [u] + [v], (a-u) + (b-v) = (a+b) - (u+v) \in S \implies (a+b) \in [u+v] \implies [u] + [v] \subseteq [u+v]$.

$\forall w \in [u+v], \exists c, d \in S, \text{ s.t. } c+d = w - (u+v) \implies w = (c+d) + (u+v) = (c+u) + (d+v),$ 其中 $(c+u) \in [u], (d+v) \in [v] \implies w \in [u] + [v]$.

故 $[u] + [v] = [u+v]$.

假设 $u \sim u', v \sim v'$, 即 $[u] = [u'], [v] = [v']$.

$\therefore [u] = [u'], \therefore uS = u'S \implies \exists s_1, s'_1 \in S, \text{ s.t. } u + s_1 = u' + s'_1 \iff v' = u + s_1 - s'_1,$

$\therefore [v] = [v'], \therefore vS = v'S \implies \exists s_2, s'_2 \in S, \text{ s.t. } v + s_2 = v' + s'_2 \iff v' = v + s_2 - s'_2,$

从而 $u' + v' = u + s_1 - s'_1 + v + s_2 - s'_2$, 其中 $\therefore s_1, s'_1, s_2, s'_2 \in S, s_1 - s'_1 \in S, s_2 - s'_2 \in S,$

$\therefore V$ 是交换群, $\therefore, \text{ s.t. } s_1 - s'_1 + v = v + s_1 - s'_1 \implies u' + v' = u + v + (s_1 - s'_1 + s_2 - s'_2)$

$\implies (u' + v')S = (u + v + (s_1 - s'_1 + s_2 - s'_2))S \implies [u' + v'] = [u + v],$

即 $[u] + [v] = [u+v]$ 与代表元选取无关, 故 $[u] + [v] = [u+v]$ 是运算.

$r[u] = r\{v \in V \mid v - u \in S\} = \{rv \mid v \in V, v - u \in S\} = \{rv \in V \mid rv - ru \in S\} = [ru].$

假设 $u \sim u'$, 即 $[u] = [u']$.

$\therefore [u] = [u'], \therefore uS = u'S \implies \exists s, s' \in S, \text{ s.t. } u + s = u' + s' \iff u' = u + s - s',$

从而 $ru' = r(u+s-s') = ru+r(s-s'),$ 其中 $s-s' \in S \implies (ru')S = (ru+r(s-s'))S = (ru)S \implies r[u'] = [ru'] = [ru],$

即 $r[u] = [ru]$ 与代表元选取无关, 故 $r[u] = [ru]$ 是运算.

$(\frac{V}{S}, +)$ 满足

(1) **结合律:** $([v] + [u]) + [w] = [u+v] + [w] = [u+v+w] = [u+(v+w)] = [u] + [v+w] = [u] + ([v] + [w])$

(2) **有单位元** $[0]: [0] + [u] = [0+u] = [u] = [u+0] = [u] + [0]$

(3) **有逆元:** $\forall v \in V, \exists -v, \text{ s.t. } [a] + [-a] = [a+(-a)] = [0] = [(-a)+a] = [-a] + [a]$

且 $[u] + [v] = [u+v] = [v+u] = [v] + [u]$, 即 $(\frac{V}{S}, +)$ 交换, 故 $(\frac{V}{S}, +)$ 是交换群. (总之就是因为 $\frac{V}{S}$ 中的元素 $[v]$ 保持了 V 中的元素 v 的各种运算性质, 所以 $(V, +)$ 是交换群就可以推出 $\frac{V}{S}$ 也是交换群.)

$\frac{V}{S}$ 满足

3. 同构定理

- (1) $r([u + v]) = r([u] + [v]) = r[u] + r[v]$
- (2) $(r + t)[u] = [(r + t)u] = [ru + tu] = [ru] + [tu] = r[u] + t[u]$
- (3) $(r \cdot t)[u] = [(r \cdot t)u] = [r(tu)] = r[tu] = r(t[u])$
- (4) 有单位元 1: $[1][u] = [1u] = [u]$

故 $\frac{V}{S}$ 是 F 上的向量空间. □

定理 3.1 (课本定理3.2): (1) $\Pi_S : V \rightarrow \frac{V}{S}, v \mapsto [v]$ 是线性变换.

(2) Π_S 是满线性变换, 即 $\text{Im } \Pi_S = \frac{V}{S}$.

(3) $\text{Ker } \Pi_S = S$.

证: (1) 显然 Π_S 是唯一的, 故 Π_S 是映射.

如前所证, V 和 $\frac{V}{S}$ 均为 F 上的向量空间.

$\because [u + v] = \{w \in V \mid w - (u + v) \in S\}, r[u] = [ru], \therefore r[u] + t[v] = [ru] + [tv] = [ru + tv]$, 故 Π_S 为线性变换.

(2) $\forall [v] \in \frac{V}{S}, \exists v \in V, \text{ s.t. } \Pi_S(v) = [v]$, 即 $\text{Im } \Pi_S = \frac{V}{S}$, 故 Π_S 是满线性变换.

(3) $\text{Ker } \Pi_S = \{v \in S \mid \Pi_S(v) = [0]\}$.

$\Pi_S(v) = [v] = S + v = [0] = S \implies v \in S \implies \text{Ker } \Pi_S = S$. □

定理 3.2 (课本定理3.3): (1) S, T 是子空间, 且 $S \subseteq T$, 则 $\frac{T}{S}$ 是 $\frac{V}{S}$ 的子空间.

(2) 取 X 为 $\frac{V}{S}$ 的子空间, 则 $\exists V$ 的子空间 T , s.t. $\emptyset \neq S \subseteq T, \frac{T}{S} = X$.

证: (1) $\frac{T}{S} = \{[u] \mid u \in T\}, \frac{V}{S} = \{[v] \mid v \in V\}$.

$\forall [u] \in \frac{T}{S}, u \in T, \because T$ 是 V 的子空间, $\therefore u \in V \implies [u] \in \frac{V}{S}$, 故 $\frac{T}{S} \subseteq \frac{V}{S}$.

$\forall [u_1], [u_2] \in \frac{T}{S}, r, t \in F, r[u_1] + t[u_2] = [ru_1 + tu_2], \because u_1, u_2 \in T, \therefore ru_1 + tu_2 \in T \implies [ru_1 + tu_2] \in \frac{T}{S}$, 故 $\frac{T}{S}$ 是线性空间.

综上, 得证.

(2) 取 $T = \cup_{[v] \in X} [v]$.

显然 $T \subseteq V$.

$\forall u, v \in T$, 根据 T 的定义, $[u], [v] \in X$,

$\because X$ 为子空间, $\therefore r[u] + t[v] = [ru + tv] \in X \implies ru + tv \in [ru + tv] \subseteq T = \cup_{[v] \in X} [v] \implies ru + tv \in T$.

故 T 为 V 的子空间.

$\because [0] = S, \therefore S \subseteq T$.

$\frac{T}{S} = \{[v] = S + v \mid v \in T\}$.


$\forall [v] \in \frac{T}{S}, v \in T \implies [v] \in X$.

$\forall [v] \in X, v \in T \implies [v] \in \frac{T}{S}$.

故 $\frac{T}{S} = X$.

综上, 得证. □

定理 3.3 第一同态基本定理(课本定理3.4): S 是 V 的子空间, $\tau \in \mathcal{L}(V, W)$,



若 $S \subseteq \text{Ker } \tau$, 即 $\text{Ker } \Pi_S \subseteq \text{Ker } \tau$, 则 $\exists! \tau'$, s.t. $\tau = \tau' \circ \Pi_S$, 即 $\forall v \in V, \tau(v) = \tau'([v])$, 此时上图可交换.

^a该定理回答了 τ' 的存在性 (即 τ' 在什么条件下存在) 的问题. 之所以称“基本”, 是因为若将该定理中的向量空间换成其他代数结构, 定理仍然成立.

证: τ' 的唯一性要求, 若 $[u] = [v]$, 则 $\tau'([u]) = \tau'([v])$,

即若 $u \sim v$, 则 $\tau(u) = \tau(v)$,


即若 $u - v \in S$, 则 $\tau(u - v) = 0$,

即 $S \subseteq \text{Ker } \tau$. □

此时, $\text{Ker } \tau' = \{[v] \in \frac{V}{S} \mid \tau'([v]) = 0\} = \{[v] \in \frac{V}{S} \mid \tau(v) = 0\} = \{[v] \in \frac{V}{S} \mid v \in \text{Ker } \tau\} = \{[v] \mid v \in \text{Ker } \tau\} = \frac{\text{Ker } \tau}{S}$,

$\text{Im } \tau' = \{\tau'([v]) \mid [v] \in \frac{V}{S}\} = \{\tau'([v]) \mid v \in V\} = \{\tau(v) \mid v \in V\} = \text{Im } \tau$ ($\because \Pi_S$ 满射, $\therefore \forall [v] \in \frac{V}{S}, \exists v \in V$).

那么, 如果 τ 双射, 即 $\exists \tau^{-1} \in \mathcal{L}(W, V)$, 再加上条件 $\text{Ker } \tau \subseteq S$, 即 $\text{Ker } \tau = S$, 如何?




此时, $\text{Ker } \tau' = \frac{\text{Ker } \tau}{S} = \{[v] \mid v \in \text{Ker } \tau\} = \{[v] \mid v \in S\} = \{[0]\} \implies \tau'$ 单射.

由上面关于第一同态定理的延伸讨论我们得到:

定理 3.4 第一同构定理(课本定理3.5): 若 $\text{Ker } \tau = S$, 则 τ' 单射, $\frac{V}{\text{Ker } \tau} = \frac{V}{S} \approx \text{Im } \tau$.

3. 同构定理



证: $V = \text{Ker } \tau \oplus (\text{Ker } \tau)^c$, 其中 $(\text{Ker } \tau)^c \approx \text{Im } \tau \implies \frac{V}{\text{Ker } \tau} = (\text{Ker } \tau)^c$. □


更一般地, 若 $V = S \oplus T$, 则 $\frac{V}{S} = T$, $\frac{V}{T} \approx S$.

证: $\forall v \in V, v = u_S + u_T$, 其中 $u_S \in S, u_T \in T$. 令投影映射 $P_T: V \rightarrow T, v = u_S + u_T \mapsto u_T$.

$\text{Ker } P_T = \{v \in V \mid P_T(v) = 0\} = S = [0] = \text{Ker } \Pi_S$.

$\exists! \tau'$ 单射, s.t. $P_T = \tau' \circ \Pi_S$.

又 $\text{Im } P_T = T$, 即 P_T 满射, $\therefore \tau'$ 满射 $\implies \tau'$ 同构 $\implies \frac{V}{S} \approx T$.



同理可证 $\frac{V}{T} \approx S$. □

定义 3.2 对偶(空间)和线性泛函: $V^* = \mathcal{L}(V, F)$ 是 F 上的向量空间, 称 V^* 为 V 的对偶(空间). 若 $f \in V^*$, 称 f 为线性泛函.

- (1) $\text{Ker } V^*$ 为 F 上的向量空间.
- (2) $\dim F = 1, \text{Im } f \subseteq F, \therefore \dim \text{Im } f \leq 1, \dim \text{Ker } f \geq \dim V - 1$.
- (3) V^* 非空, \therefore 必有零映射 $0 \in V^*, 0: V \rightarrow F, v \mapsto 0$.
- (4) 若 $\dim \text{Im } f = 0$, 则 $\text{Im } f = \{0\}$, f 为零映射.
- (5) 若 $\dim \text{Im } f = 1$, 则 $\text{Im } f = \langle r \rangle$, 其中 $0 \neq r \in F \implies \text{Im } f = F$,
由反证法易证, 若 $v \in f^{-1}(r) = \{v \in V \mid f(v) = r\}$, 其中 $r \neq 0$, 则 $v \neq 0$, 且必有 $f(\langle v \rangle^c) = \{0\}$.

证明一下 (5) 的末句:

3. 同构定理

证: 假设 $\exists u \in \langle v \rangle^c$, s.t. $f(u) \neq 0$,

则有 $f\left(\frac{ru}{f(u)}\right) = r \implies \frac{ru}{f(u)} \in f^{-1}(r) \implies f^{-1} = \langle v \rangle \oplus \langle u \rangle$,

又 $\because u \in \langle v \rangle^c$, $\therefore \dim f^{-1} \geq 2$, 这与 $f^{-1} \subseteq (\text{Ker } f)^c$, $\dim(\text{Ker } f)^c = \dim \text{Im } f \leq 1$ 矛盾,

故假设错误, $\forall u \in \langle v \rangle^c$, $f(u) = 0 \implies f(\langle v \rangle^c) = \{0\}$. □

定理 3.5 (课本定理3.11): (1) 若 $0 \neq v \in V$, $\exists 0 \neq f \in V^*$, s.t. $f(v) \neq 0$.

(2) $v = 0 \iff \forall f \in V^*, f(v) = 0$.

(3) $f \in V^*$, 若 $f(x) \neq 0$, 则 $V = \text{Ker } f \oplus \langle x \rangle$, 即 $\text{Im } f \approx \langle x \rangle$.

(4) $0 \neq f, g \in V^*$, $\text{Ker } f = \text{Ker } g \iff \exists 0 \neq \lambda \in F$, s.t. $f = \lambda g$.

证: (1) $v \neq 0$, 则 $V = \langle v \rangle \oplus \langle v \rangle^c$, 其中 $\langle v \rangle = \{rv \mid r \in F\}$.

令 $f: V \rightarrow F$, $rv + w \mapsto r$, 其中 $rv \in \langle v \rangle$, $w \in \langle v \rangle^c$, 故 $f(v) = 1$, $f \in V^*$.

我们来验证一下: $\forall u_1, u_2 \in V$, $r, t \in F$, u_1 和 u_2 可写成 $u_1 = r_1v + w_1$, $u_2 = r_2v + w_2$

$\implies f(ru_1 + tu_2) = f(r(r_1v + w_1) + t(r_2v + w_2)) = f((rr_1v + rw_1) + (tr_2v + tw_2)) = rr_1 + tr_2 = rf(r_1v + w_1) + tf(r_2v + w_2) = rf(u_1) + tf(u_2)$.

故得证.

并且需要注意这里的 f 的构造不是唯一的: 我们可以构造 $f: V \rightarrow F$, $rv + u \mapsto rt$, 其中 $u \in \langle v \rangle^c$, 如此一来, $f(v) = t$.

(2) “ \implies ”: 若 $v = 0$, 则 $\forall u \in V$, $f(v) + f(u) = f(v + u) = f(u) \implies f(v) = 0$.

“ \impliedby ”: 若 $\forall f \in V^*$, $f(v) = 0$, 则 $\forall u \in V$, $f(v + u) = f(v) + f(u) = f(u)$.

假设 $v \neq 0$, 则由 (1), $\exists v \in V^*$, s.t. $f(v) \neq 0$, 与假设矛盾, 故假设错误, $v = 0$.

(3) $f(x) \neq 0 \implies \text{Im } f \neq \{0\} \implies \dim \text{Im } f \neq 0 \implies \dim \text{Im } f \dim(\text{Ker } f)^c = 1 \implies \dim \text{Ker } f = \dim V - \dim(\text{Ker } f)^c = \dim V - 1$

$\implies \exists v \in V$, s.t. $V = \text{Ker } f \oplus (\text{Ker } f)^c = \langle v \rangle$,

又 $\because f(x) \neq 0$, $\therefore x \in \langle v \rangle \implies \langle x \rangle = \langle w \rangle \implies V = \text{Ker } f \oplus \langle x \rangle$, 故得证.

(4) “ \implies ”: 令 $K = \text{Ker } f = \text{Ker } g$.

$\because \text{Ker } f = \text{Ker } g$, $\forall x \notin K$, 由 (3) 有, $V = \langle x \rangle \oplus K$.

取 $\lambda = \frac{f(x)}{g(x)}$ 即得.

“ \impliedby ”: 若 $\exists \lambda \neq 0$, $f = \lambda g$, 则显然 $\text{Ker } f = \text{Ker } g$. □

定义 3.3 对偶基: $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$ 为 V 的基, 则 $\forall i, \exists b_i^* \in V^*$, s.t. $b_i^*(b_i) = 1$, 对 $j \neq i$, $b_i^*(b_j) = 0$, 即 $b_i^*(b_j) = \delta_{ij}$, 从而可以构造出 $\mathcal{B}^* = \{b_1^*, \dots, b_n^*\} \subseteq V^*$, 称为 \mathcal{B} 的对偶基.

定理 3.6 (课本定理3.12): (1) $\mathcal{B}^* = \{b_1^*, \dots, b_n^*\}$ 线性无关.

(2) $\dim V < \infty$, 则 \mathcal{B}^* 是 V^* 的基.

3. 同构定理

证: (1) $\sum_{i=1}^m r_i b_i^* = 0 \implies \forall v \in V, (\sum_{i=1}^m r_i b_i^*)(v) = 0(v) = 0$
 $\implies \sum_{i=1}^m r_i b_i^*(v) = 0$
 取 $v = b_j$, 则 $\sum_{i=1}^m r_i b_i^*(b_j) = \sum_{i=1}^m r_i \delta_{ij} = r_j = 0$,
 对各个 b_j 如法炮制, 从而得到 $r_j = 0 \forall i$, 故得证.

(2) $\forall f \in V^*, \forall v \in V, \because \mathcal{B}$ 是 V 的基, $\therefore v = \sum_{i=1}^n r_i b_i$
 $\implies b_j^*(v) = b_j^*(\sum_{i=1}^n r_i b_i) = \sum_{i=1}^n r_i b_j^*(b_i) = \sum_{i=1}^n r_i \delta_{ij} = r_j$
 回代得 $v = \sum_{i=1}^n b_i^*(v) b_i$
 $\implies f(v) = f(\sum_{i=1}^n b_i^*(v) b_i) = \sum_{i=1}^n b_i^*(v) f(b_i) = \sum_{i=1}^n f(b_i) b_i^*(v) = (\sum_{i=1}^n f(b_i) b_i^*)(v)$, 这里 $b_i^*(v), f(b_i) \in F$,
 因此可以交换位置, 我们可视 $\{b_i^*(v)\}$ 为基, $f(b_i)$ 为 $f(v)$ 在这组基上的展开系数
 $\implies f = \sum_{i=1}^n f(b_i) b_i^*$, 即 f 可展开为 $\{\mathcal{B}^*\}$ 的线性表示, 结合 (1) 得证. □

按照类似上面的方法, $\forall v \in V$, 我们都可构造 $v^* \in V^*$, s.t. $\forall u_1 \in \langle v \rangle, v^*(u) = 1, \forall u_2 \in \langle v \rangle^c, v^*(u_2) = 0$,
 从而有映射 $V \rightarrow V^*, v \mapsto v^*, 0 \mapsto 0$ (零映射).
 V^* 本身也是向量空间.

定义 3.4 二重对偶(空间): $V^{**} = \mathcal{L}(V^*, F)$ 称为二重对偶(空间), 其中的元素为 $v^{**} : V^* \rightarrow F, f \mapsto f(v)$.

$V \rightarrow V^* \rightarrow V^{**}, v \mapsto v^* \mapsto v^{**}, b_i \mapsto b_i^* \mapsto b_i^{**}$, 满足 $b_i^*(b_j) = \delta_{ij}, b_i^{**}(b_j^*) = b_j^*(b_i)$, 两个映射复合得 $\tau : V \rightarrow V^{**}, v \mapsto v^{**}$.

- (1) τ 是映射.
- (2) τ 是线性变换.
- (3) $\text{Ker } \tau = \{v \in V \mid \tau(v) = 0\} = \{0\} \iff \tau$ 单射.

证: (1) 若 $u = v$, 则 $\forall f \in V^*, u^{**}(f) = f(u) = f(v) = v^{**}(v)$, 即得证.


(2) $\tau(ru + tv) = (ru + tv)^{**}$,
 $\forall f \in V^*, (ru + tv)^{**}(f) = f(ru + tv) = rf(u) + tf(v) = ru^{**}(f) + tv^{**}(f) = r\tau(u)(f) + t\tau(v)(f) \implies$
 $\tau(ru + tv) = r\tau(u) + t\tau(v)$,
 结合 (1) 即得证.

(3) $\tau(v) = 0 \implies \forall f \in V^*, v^{**}(f) = 0 \implies f(v) = 0 \implies$ (定理 2.5 (1)) $v = 0$, 即得证. □

引理 3.1 (课本引理3.13): 若 $\dim V = n < \infty$, 则 $\dim V^* = \dim V^{**} = n$, V^{**} 与 V 同构, 一个线性空间的二重对偶就回到自身, 所以实际上套娃式的 V^{***} 是没有意义的, 这里我们就写成 $V^{**} = V$.

定义 3.5 算子伴随: 由线性变换 τ 可引出算子伴随 $\tau^* : W^* \rightarrow V^*, g \mapsto g \circ \tau$.

3. 同构定理



(1) τ^* 是映射.

(2) τ^* 是线性的.

证: (1) 若 $f = g \in W^*$, $v^* \in \tau^*$, 则 $\tau^*(f) = f \circ \tau = g \circ \tau = \tau^*(g)$, 故得证.

(2) $\tau^*(rg_1 + tg_2) = (rg_1 + tg_2) \circ \tau = rg_1 \circ \tau + tg_2 \circ \tau = r\tau^*(g_1) + t\tau^*(g_2)$, 故得证.

□


定理 3.7 (课本定理3.18): (1) $\tau, \sigma \in \mathcal{L}(V, W)$, $a, b \in F$, 则 $(a\tau + b\sigma)^* = a\tau^* + b\sigma^*$, 即求和与算子伴随可交换.

(2) $\sigma \in \mathcal{L}(V, W)$, $\tau \in \mathcal{L}(W, U)$, 则 $(\tau \circ \sigma)^* = \sigma^* \circ \tau^*$.

(3) $\tau \in \mathcal{L}(V)$ 可逆 $\implies (\tau^{-1})^* = (\tau^*)^{-1}$.

证: (1) $\forall f \in W^*$, $(a\tau + b\sigma)^*(f) = f \circ (a\tau + b\sigma) = af \circ \tau + bf \circ \sigma = a\tau^*(f) + b\sigma^*(f)$, 即得证.

(2) $\forall f \in U^*$, $(\tau \circ \sigma)^*(f) = f \circ (\tau \circ \sigma) = f \circ \tau \circ \sigma = (f \circ \tau) \circ \sigma = \sigma^*(f \circ \tau) = \sigma^*(\tau^*(f)) = (\sigma^* \circ \tau^*)(f) = (\sigma^* \circ \tau^*)(f) \implies (\tau \circ \sigma)^* = \sigma^* \circ \tau^*$.



(3) $1^* = (\tau \circ \tau^{-1})^* = (\tau^{-1})^* \circ \tau^* \implies (\tau^{-1})^* = (\tau^*)^{-1}$.

□

定理 3.8 (课本定理3.18): $\dim V < \infty$, $\dim W < \infty$, $\tau \in \mathcal{L}(V, W)$, $\tau^* \in \mathcal{L}(W^*, V^*)$, $\tau^{**} \in \mathcal{L}(V^{**}, W^{**}) = \mathcal{L}(V, W)$, 则 $\tau^{**} = \tau$.

定理 3.9 (课本定理3.22): $\tau \in \mathcal{L}(V, W)$, 其中 $\dim V < \infty$, $\dim W < \infty$, \mathcal{B} 和 \mathcal{C} 分别是 V 和 W 的定序基, \mathcal{B}^* 和 \mathcal{C}^* 分别是 \mathcal{B} 和 \mathcal{C} 的对偶空间, 则 $[\tau^*]_{\mathcal{C}^* \mathcal{B}^*} = ([\tau]_{\mathcal{B} \mathcal{C}})^T$.

证: 设 $\dim V = n$, $\dim W = m$, V 的定序基 $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$, W 的定序基 $\mathcal{C} = \{c_1, \dots, c_m\}$, $\tau \in \mathcal{L}(V, W)$ 的矩阵表示为 $[\tau]_{\mathcal{B} \mathcal{C}} = [\alpha_{ij}]_{m \times n}$, $\tau^* \in \mathcal{L}(W^*, V^*)$ 的矩阵表示为 $[\tau^*]_{\mathcal{C}^* \mathcal{B}^*} = [\beta_{ij}]_{n \times m}$,

即 $[\tau]_{\mathcal{B} \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} [\tau(b_1)]_{\mathcal{C}} & \cdots & [\tau(b_n)]_{\mathcal{C}} \end{pmatrix}$, 令 $[\tau(b_i)]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \alpha_{1i} \\ \vdots \\ \alpha_{mi} \end{pmatrix}$, $\tau(b_i) = \sum_{k=1}^m \alpha_{ki} c_k$.

$[\tau^*]_{\mathcal{C}^* \mathcal{B}^*} = \begin{pmatrix} [\tau^*(c_1^*)]_{\mathcal{B}^*} & \cdots & [\tau^*(c_m^*)]_{\mathcal{B}^*} \end{pmatrix}$, 其中 $[\tau^*(c_i^*)]_{\mathcal{B}^*} = \begin{pmatrix} \beta_{1i} \\ \vdots \\ \beta_{ni} \end{pmatrix}$, $\tau^*(c_i^*) = \sum_{l=1}^n \beta_{li} b_l^*$.

又 $\because \tau^*(c_i^*) = c_i^* \circ \tau$, 我们将这一复合函数作用在 b_j 上有, $(c_i^* \circ \tau)(b_j) = (\sum_{l=1}^n \beta_{li} b_l^*)(b_j) = \sum_{l=1}^n \beta_{li} b_l^*(b_j) = \beta_{ji}$
 $\implies \beta_{ji} = c_i^*(\tau(b_j))$, 代入上面的 $\tau(b_j)$ 的展开式得 $\beta_{ji} = c_i^*(\sum_{k=1}^m \alpha_{kj} c_k) = \sum_{k=1}^m \alpha_{kj} c_i^*(c_k) = \sum_{k=1}^m \alpha_{kj} \delta_{ik} = \alpha_{ij}$,
 故得证. □