函數方程

陳信睿

2024 年 7 月

目錄

1 函數方程基本概念 **2**

2 代值法 **2**

3 單射與滿射 **3**

4 柯西方程 **4**

5 附錄 **8**

6 習題 **8**

6.1 IMO 8

6.2 ISL 9

6.3 APMO 10

6.4 其他 10

7 習題解答 **11**

1 函數方程基本概念

在數奧領域中，函數方程是數奧中，代數 (Algebra) 領域中常見的一種題目類型，像是 2019 年的 IMO：

範例 1 (2019 IMO P1). *設 $\mathbb{Z}$ 爲所有整數的集合，試找到所有 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 滿足*

$$f(2a)+2f(b)=f(f(a+b)) \tag{1}$$

對所有整數 a,b 成立。

如上所示，函數方程最常見的形式就是給定函數的定義域、對應域，並且一條關於函數的等式，而我們的目標是要找到滿足所有這樣條件的函數，並且證明我們找到了所有解。像是上面這題的解包含以下

$$f(x)=0 \qquad \text{或} \qquad f(x)=2x+d\text{，其中 } d\in\mathbb{Z} \text{ 是常數。}$$

不過知道所有解，離正確答案還很遠，我們還要證明這是所有解，才能在數奧的競賽中拿到滿分。因此以下我們將探討常見的解函方技巧。

2 代值法

基本上，解決函方的核心作法就是要用已知的方程式來推到其他有用的條件。因此最基本的手法就是代入一些特殊值，並且看能不能得到有用的結果。以下爲範例：

範例 2. *試找到所有 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得*

$$xf(x+f(y))+xf(y)=2yf(x)+x^2 \tag{2}$$

對所有 $x,y\in\mathbb{R}$ 成立。

解答. 在式 (2) 中代入 $x=0$，可得 $f(0)y=0$ 對所有 $y\in\mathbb{R}$ 成立，因此 $f(0)=0$ 成立。接下來在式 (2) 中代入 $y=0$，可以得到 $xf(x)=x^2$ 對所有 $x\in\mathbb{R}$ 成立，因此 $f(x)=x$ 對所有 $x\neq 0$ 成立。加上前面已經得到 $f(0)=0$，我們可以得到 $f(x)=x$ 對於所有 $x\in\mathbb{R}$ 成立。經代回原式後驗證確實爲解。

有時候代值不一定要代一個常數，以下是個例子：

範例 3. *試找到所有 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得*

$$f(x+f(y))=x+y \tag{3}$$

對所有 $x,y\in\mathbb{R}$ 成立。

解答. 將 $x=-f(y)$ 代入即可得到

$$f(0)=y-f(y)\text{，}$$

故 $f(y)=y+c$ 其中 c 爲一常數。可驗證 $c=0$ 爲唯一可能，因此所求函數爲 $f(x)=x$。

3 單射與滿射

在這小節，要介紹函方中我認爲最重要的技巧，單射與滿射。

定義 1 (單射). 我們稱函數 f 爲單射的 (一對一, injective, one-to-one)，如果 $f(a) \neq f(b)$ 對所有 $a \neq b$ 成立。換句話說，若 $f(a) = f(b)$ 則 $a = b$。

而滿射的定義如下：

定義 2 (滿射). 我們稱函數 $f : X \to Y$ 爲滿射的 (surjective, onto)，如果對於每個 $y \in Y$，都存在 $x \in X$ 使得 $f(x) = y$。

爲什麼單射以及滿射這好用呢? 以下爲常用的性質：

性質 1. *若 $f : X \to X$ 爲單射的或是滿射的 (其中一個成立即可) 且 $f(f(x)) = f(x)$，則 $f(x) = x$。*

更廣泛地說，如果有單射，且我們有 $f(\text{expr1}) = f(\text{expr2})$，則我們可以得到 $\text{expr1} = \text{expr2}$。而如果我們有滿射且有 $\text{expr3} = 0$，爲 $f(x)$ 的表達式，則可以把 $f(x)$ 用 x 替換。

以下幾個例子爲常見的使用方法：

範例 4. *試找到所有函數 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 使得*

$$f(xy + f(x)) + f(x - yf(x)) = 2x \tag{4}$$

對所有 $x, y \in \mathbb{R}$ 成立。

解答. 以 $P(a, b)$ 表示將 $x = a, y = b$ 代入式 (4)。首先 $P(x, 0)$ 可得

$$f(f(x)) + f(x) = 2x \tag{5}$$

如果 $f(a) = f(b)$ 則

$$2a = f(f(a)) + f(a) = f(f(b)) + f(b) = 2b$$

即可得 $a = b$，這告訴我們 f 是單射的。

接下來，注意到 $P(x, -f(x)/x)$ $(x \neq 0)$ 可以得到

$$f\left(x + \frac{f(x)^2}{x}\right) = 2x - f(0) \tag{6}$$

我們現在利用這條式子證明 $f(0) = 0$，假設 $f(0) \neq 0$，則在式 (6) 中代入 $x = f(0)/2$，可以得到

$$f(c) = 0 \qquad \text{其中} \qquad c = \frac{f(0)}{2} + \frac{2}{f(0)} f\left(\frac{f(0)}{2}\right)^2$$

現在考慮 $P(c, y)$ 可以得到 $f(cy) = 2c$，若 $c \neq 0$，則 f 爲常數函數，與 f 單射矛盾，因此可以知道 $c = 0$，即得 $f(0) = 0$，又與假設矛盾，因此我們證出了 $f(0) = 0$。現在考慮

$P(x, x/f(x))$ $(x \neq 0)$，可以得到

$$f\left(\frac{x^2}{f(x)} + f(x)\right) = 2x，$$

與式 (6) 加上單射比較可得

$$x + \frac{f(x)^2}{x} = \frac{x^2}{f(x)} + f(x)，$$

化簡可得 $f(x) = x$ 對所有 $x \neq 0$ 成立。綜合前面得到的 $f(0) = 0$，我們有 $f(x) = x$ 對所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立，代回式 (4) 後檢驗確實成立。

這題我們可以看出單射確實是一個很強大的工具。下一題我們將示範滿射的使用方法。

範例 5. *試找到所有函數 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 使得*

$$f(xf(y) + f(x + y)) + yf(x) + f(x) = y \tag{7}$$

對所有 $x, y \in \mathbb{R}$ 成立。

解答. 由於我們想證明 f 滿射，改寫式(7)可得

$$f(xf(y) + f(x + y)) = (1 - f(x))y - f(x)，$$

也就是如果存在 $k \in \mathbb{R}$ 使得 $f(k) \neq 1$，則 f 滿射。這樣的 k 存在，否則 $f(x) \equiv 1$，但易見這不是一個解。因此現在我們有 f 滿射。以 $P(a, b)$ 表示將 $x = a, y = b$ 代入式(7)。由 $P(0, y)$ 可得

$$f(f(y)) + yf(0) + f(0) = y \tag{8}$$

若 $f(0) = 1$，則有 $f(f(y)) = -1$，由 f 滿射可知 $f(y) = -1$，與滿射矛盾，因此 $f(0) \neq 1$，改寫式(8)成以下

$$f(f(y)) = (1 - f(0))y - f(0)，$$

可以看出 f 單射。由於 f 滿射，存在 $c \in \mathbb{R}$ 使得 $f(c) = 0$，則 $P(c, 0)$ 可得 $f(cf(0)) = 0$，故 $cf(0) = c$ (根據 f 單射)，因此 $c = 0$ $(f(0) \neq 1)$。現在我們比較 $P(x, 0) : f(f(x)) + f(x) = 0$ 以及 $P(0, y) : f(f(y)) = y$，我們可以得到 $f(x) = -x$ 對所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立，代回式 (7) 確實爲解。

4 柯西方程

柯西方程是以下特殊形式的函數方程

$$f(x + y) = f(x) + f(y)，$$

有的時候，若我們能創造出這種形式的方程式，則我們能直接使用定理得出結論。

定理 3 (柯西方程). *假設* $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Q}$ *或是* $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ *滿足*

$$f(x+y)=f(x)+f(y) \tag{9}$$

則存在 $c\in\mathbb{Q}$ *使得* $f(x)=cx$。

證明. 以 $P(a,b)$ 表示將 $x=a,y=b$ 代入式 (9)。則 $P(0,0)$ 可得 $f(0)=0$。假設 $f(1)=c$，則我們證明 $f(n)=cn$ 對於所有 $n\in\mathbb{N}$ 成立。根據假設可知 $n=1$ 是對的，假設對於某個 $k\in\mathbb{N}$ 我們有所有 $n\le k$ 是對的，則

$$f(k+1)=f(k)+f(1)=ck+c=c(k+1)$$

代表 $n=k+1$ 是對的，根據數學歸納法，$f(n)=cn$ 對所有正整數 n 成立。

接下來由 $P(n,-n):0=f(0)=f(n)+f(-n)$ 可得 $f(-n)=-cn$，這證明完 $\mathrm{Dom}(f)=\mathbb{Z}$ 的情況。現在我們證明對於所有有理數 $x=p/q$ $(q\neq 0)$ 的情況。注意到使用前面數學歸納法的手法，我們可以得到

$$f(mx)=mf(x)，$$

其中 m 爲整數。故我們有 $f(p)=qf(p/q)$，因此 $f(p/q)=cp/q$，也就是說對於所有的 $x\in\mathbb{Q}$，我們有 $f(x)=cx$。 □

性質 2. *假設* $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ *滿足柯西方程，則我們有* $f(cx)=cf(x)$ *對所有* $c\in\mathbb{Q},x\in\mathbb{R}$ *成立。*

這個性質可以從上面的證明看出來。接下來，我們可能會有一個疑問，如果目標函數 f 的定義域爲 $\mathbb{R}$ 那麼定理 3 的結果還會成立嗎？事實上是不成立的，用大學的線性代數的語言來說是因爲 $\mathbb{R}$ 不是 $\mathbb{Q}$ 的有限維向量空間，此處的反例以現階段知識難以給出，因此放在附錄中。儘管如此，只要有更強的條件，我們還是能有一樣的結論。

定理 4 ($\mathbb{R}$ 上的柯西方程). *假設* $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ *滿足*

$$f(x+y)=f(x)+f(y)，$$

且 f *滿足以下三條件之一：*

1. f *在某區間上有上界或下界。*
2. f *在某區間上單調。*
3. f *在某區間上連續。*

則存在 $c\in\mathbb{R}$ *使得* $f(x)=cx$。

這個定理仰賴部份微積分知識以及一些關於無理數的不等式，因此就不詳細談這部份的理論，我認爲大概知道就好了。以下爲一些例題，首先最一開始提到的**範例** 1，就可以用代值加上柯西方程來解決，以下爲一種範例解法：

解答. 以 $P(x,y)$ 表示將 $a=x$ 及 $b=y$ 代入式 (1)。注意到 $P(0,a+b)$ 可以得到

$$f(0)+2f(a+b)=f(f(a+b))，$$

與式 (1) 比較可得：

$$f(0)+2f(a+b)=f(2a)+2f(b) \tag{10}$$

在式 (10) 中代入 $b=0$ 可以得到：

$$f(2a)=2f(a)-f(0)$$

代回式 (10) 可得：

$$f(a+b)+f(0)=f(a)+f(b)。$$

令 $g(x)=f(x)-f(0)$，則我們有 $g(a+b)=g(a)+g(b)$，根據定理 3，可以知道 $g(x)=cx$，而 $f(x)=cx+d$，其中 $c,d\in\mathbb{Z}$。代回原式化簡可得

$$(c-2)(c(a+b)+d)=0，$$

故 $c=2$ 或是 $c=0$ 且 $d=0$。綜合以上，所有解爲 $f(x)=2x+d, d\in\mathbb{Z}$，以及 $f(x)=0$。

範例 6. *試找到所有函數 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得*

$$f(x+y)=f(x)+f(y) \qquad 且 \qquad f(xy)=f(x)f(y) \tag{11}$$

對所有 $x,y\in\mathbb{R}$ 成立。

解答. 注意到在第二式中代入 $y=x$ 可得 $f(x^2)=f(x)^2$，因此對於所有 $t\geq 0$，我們有 $f(t)\geq 0$，這代表 f 在區間 $[0,1]$ 上有下界，根據定理 4 可知 $f(x)=cx$ 其中 $c\in\mathbb{R}$ 爲常數。代回原第二式可得 $c=0,1$，因此 $f(x)=x$ 或是 $f(x)=0$。

範例 7. *試找到所有函數 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得*

$$f(x+y)=f(x)+f(y) \qquad 且 \qquad f(x^3)=f(x)^3 \tag{12}$$

對所有 $x,y\in\mathbb{R}$ 成立。

解答. 首先根據性質 2 我們有 $f(p)=pf(1)$ 對所有 $p\in\mathbb{Q}$ 成立。接下來在第二式代入 $x=a+p$ $(p\in\mathbb{Q},a\in\mathbb{R})$，可以得到

$$f(a+p)^3=(f(a)+pf(1))^3=f(a)^3+3pf(1)f(a)^2+3f(a)p^2f(1)^2+(pf(1))^3$$
$$f((a+p)^3)=f(a^3)+3pf(a^2)+3p^2f(a)+p^3f(1)$$

此二式視爲 p 的多項式，爲恆等多項式，因此我們有

$$f(1)^3=f(1);\quad (f(1)^2-1)f(a)=0;\quad f(1)f(a)^2=f(a^2);\quad f(a)^3=f(a^3)，$$

由第一個條件可以得到 $f(1)=0,1,-1$。若 $f(1)=0$ 則 $f(a)=0$ 對所有 $a\in\mathbb{R}$ 成立。而第二式可以得到 $f(a^2)=f(a)^2$ 或是 $f(a^2)=-f(a)^2$，不管是何種情形，f 要嘛有上界，要嘛有下界，因此 f 爲線性。可知 f 有三種解 $f(x)=x$，$f(x)=-x$，$f(x)=0$。

接下來我們要討論另一種很類似柯西方程的函數方程，稱爲詹森方程 (Jenson's equation)，在多數情況與柯西方程等價。

定義 5 (詹森方程). 我們稱 $f : X \to Y$ 滿足詹森方程若

$$2f\left(\frac{x+y}{2}\right) = f(x) + f(y) \tag{13}$$

對所有 $x, y \in X$ 成立。在數奧領域中，X 通常爲 $\mathbb{Q}$，$\mathbb{R}$，或 $\mathbb{R}^+$。

以下介紹關於詹森方程的性質。

性質 3. *$f : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ 或是 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 滿足詹森方程，若且唯若 $g(x) = f(x) - f(0)$ 滿足柯西方程。此外若 $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}+$ 滿足詹森方程，則 $f(x) = ax + b$ 其中 $a, b \geq 0$ 爲滿足 $a^2 + b^2 > 0$ 的常數。*

證明. 首先，我們證明第一部份。在式(13)中代入 $y = 0$ 可得

$$2f\left(\frac{x}{2}\right) = f(x) + f(0)，$$

將此式代回式(13)可得

$$f(x+y) + f(0) = f(x) + f(y)，$$

令 $g(x) = f(x) - f(0)$ 則 $g(x+y) = g(x) + g(y)$。此外，我們容易看出如果 g 滿足柯西方程，則 $f(x) = g(x) + f(0)$ 滿足詹森方程，這證明了第一部份。現在證明第二部份，我們宣稱

$$f(nz) = (f(2z) - f(z))n + 2f(z) - f(2z) \tag{14}$$

對所有 $z \in \mathbb{R}^+$ 及 $n \in \mathbb{N}$ 成立。式(14)對 $n = 1, 2$ 成立，假設式(14)對 $n \leq k$ $(k \geq 2)$ 成立，則

$$\begin{aligned} f((k+1)z) &= 2f(kz) - f((k-1)z) \\ &= 2\Big((f(2z) - f(z))k + 2f(z) - f(2z)\Big) - \Big((f(2z) - f(z))(k-1) + 2f(z) - f(2z)\Big) \\ &= (f(2z) - f(z))(k+1) + 2f(z) - f(2z) \end{aligned}$$

此式(14)對 $n = k+1$ 亦成立。事實上，使用完全相同的手法，我們可以進一步證明對於所有的 $b > a > 0$，我們有

$$f((b-a)n + a) = \Big(f(b) - f(a)\Big)n + 2f(a) - f(b) \tag{15}$$

由式(14)可以看出對於所有 $(p/2^k, f(p/2^k))$ $(p \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N} \cup \{0\})$ 這樣形式的點都落在同一直線上，這是因爲對於每個固定的 $k_0 \in \mathbb{N} \cup \{0\}$，$(p/2^{k_0}, f(p/2^{k_0}))$ 皆落在同一直線 L_{k_0} 上，而對於更大的 $k' > k_0$，$p/2^{k_0} = p \cdot 2^{k'-k_0}/2^{k'}$ 落在直線 $L_{k'}$ 上，這表示 $L_{k_0} = L_{k'}$。現在我們可以假設所有 $(p/2^k, f(p/2^k))$ $(p \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N} \cup \{0\})$ 這樣形式的點都落在直線 $y = ax + b$ $(a \geq 0, b \geq 0, a^2 + b^2 > 0)$ 上。

假設存在 $s \in \mathbb{R}^+$ 使得 $f(s) \neq as + b$，則有兩種可能：$f(s) < as + b$ 與 $f(s) > as + b$。如果 $f(s) > as + b$，注意到對於所有 $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$，考慮 $t_k := \lceil s2^k \rceil / 2^k$ □

5 附錄

定理 6. *存在 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 滿足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 但是對於所有 $c\in\mathbb{R}$ 存在 $x_0\in\mathbb{R}$ 使得 $f(x_0)\neq cx_0$。也就是 f 不是線性函數。*

證明. 在線性代數中，我們可以知道 $\mathbb{R}$ 關於 $\mathbb{Q}$ 的向量空間存在基底 (basis)，不妨假設此基底爲 $\{1,\beta_1,\beta_2,\dots\}$。若

$$x=c+\sum_{i=1}^{N}c_i\beta_i\text{，}\qquad c,c_i\in\mathbb{Q}\text{，}$$

定義 $f(x)=c$，則可以看到 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 爲柯西方程。然而 $f(\beta_1)=0\neq\beta_1$，因此 f 不是線性函數。 □

6 習題

這些習題多數都只是幫讀者整理，前面有分類的題目選自 IMO, IMO shortlist, APMO 等競賽，並以年份排序，並不見得越前面越簡單，而後面的「其他」類別則是來自其他國家的題目，以我自己感受的難度排序。許多題目的難度非常高，我也不一定會寫。而有 * 標記的題目表示我有自己做出來的題目，可以優先寫這些題目。

6.1 IMO

問題 1 (2008 IMO 第四題 *). *試找到所有 $f:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}^+$ 使得*

$$\frac{\left(f(w)\right)^2+\left(f(x)\right)^2}{f(y^2)+f(z^2)}=\frac{w^2+x^2}{y^2+z^2}\tag{16}$$

對所有滿足 $wx=yz$ 的 $w,x,y,z\in\mathbb{R}^+$ 成立。

問題 2 (2010 IMO 第一題 *). *試找到所有 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得*

$$f(\lfloor x\rfloor y)=f(x)\lfloor f(y)\rfloor\tag{17}$$

對所有 $x,y\in\mathbb{R}$ 成立。

問題 3 (2012 IMO 第四題 *). *試找到所有 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 使得*

$$f(a)^2+f(b)^2+f(c)^2=2f(a)f(b)+2f(b)f(c)+2f(c)f(a)\tag{18}$$

對所有滿足 $a+b+c=0$ 的 $a,b,c\in\mathbb{Z}$ 成立。

問題 4 (2015 IMO 第五題). *試找到所有 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得*

$$f(x+f(x+y))+f(xy)=x+f(x+y)+yf(x)\tag{19}$$

對所有 $x,y\in\mathbb{R}$ 成立。

問題 5 (2017 IMO 第二題). 試找到所有 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得

$$f(f(x)f(y))+f(x+y)=f(xy) \tag{20}$$

對所有 $x,y\in\mathbb{R}$ 成立。

問題 6 (1999 IMO 第六題). 試找到所有 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得

$$f(x-f(y))=f(f(y))+xf(y)+f(x)-1 \tag{21}$$

對所有 $x,y\in\mathbb{R}$ 成立。

6.2 ISL

問題 7 (2009 ISL A7). 試找到所有 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得

$$f\left(xf(x+y)\right)=f\left(yf(x)\right)+x^2 \tag{22}$$

對所有 $x,y\in\mathbb{R}$ 成立。

問題 8 (2010 ISL A5). 試找到所有 $f:\mathbb{Q}^+\to\mathbb{Q}^+$ 使得

$$f\left(f(x)^2y\right)=x^3f(xy) \tag{23}$$

對所有 $x,y\in\mathbb{Q}^+$ 成立。

問題 9 (2011 ISL A3). 試找到所有函數對 $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得

$$g(f(x+y))=f(x)+(2x+y)g(y) \tag{24}$$

對所有 $x,y\in\mathbb{R}$ 成立。

問題 10 (2012 ISL A5). 試找到所有 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得

$$f(1+xy)-f(x+y)=f(x)f(y) \tag{25}$$

對所有 $x,y\in\mathbb{R}$ 成立，且 $f(-1)=0$。

問題 11 (2014 ISL A4). 試找到所有 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 使得

$$f\left(f(m)+n\right)+f(m)=f(n)+f(3m)+2014 \tag{26}$$

對所有 $m,n\in\mathbb{Z}$ 成立。

問題 12 (2014 ISL A6). 試找到所有 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 使得

$$n^2+4f(n)=f(f(n))^2 \tag{27}$$

對所有 $n\in\mathbb{Z}$ 成立。

問題 13 (2015 ISL A2*). 試找到所有 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 使得

$$f(x-f(y))=f(f(x))-f(y)-1 \tag{28}$$

對所有 $x,y\in\mathbb{Z}$ 成立。

問題 14 (2015 ISL A5). *試找到所有* $f:\mathbb{Z}\to 2\mathbb{Z}+1$ *使得*

$$f(x+f(x)+y)+f(x-f(x)-y)=f(x+y)+f(x-y) \tag{29}$$

對所有 $x,y\in\mathbb{Z}$ *成立。*

問題 15 (2016 ISL A4). *試找到所有* $f:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}^+$ *使得*

$$xf(x^2)f(f(y))+f(yf(x))=f(xy)\left(f(f(x^2))+f(f(y^2))\right) \tag{30}$$

對所有 $x,y\in\mathbb{R}^+$ *成立。*

問題 16 (2018 ISL A1*). *試找到所有* $f:\mathbb{Q}^+\to\mathbb{Q}^+$ *使得*

$$f(x^2f(y)^2)=f(x)^2f(y) \tag{31}$$

對所有 $x,y\in\mathbb{Q}^+$ *成立。*

問題 17 (2018 ISL A5). *試找到所有* $f:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}$ *使得*

$$\left(x+\frac{1}{x}\right)f(y)=f(xy)+f\left(\frac{y}{x}\right) \tag{32}$$

對所有 $x,y\in\mathbb{R}^+$ *成立。*

問題 18 (2020 ISL A6). *試找到所有* $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ *使得*

$$f^{(a^2+b^2)}(a+b)=af(a)+bf(b) \tag{33}$$

對所有 $a,b\in\mathbb{Z}$ *成立。註：*$f^{(n)}(x)=f\left(f^{(n-1)}(x)\right)$ $(n\in\mathbb{N})$ *且* $f^{(0)}(x)=x$*。*

附註. 這題是 2021 年三階選訓的模競第四題，由於二階選訓我失去太多分，因此這題對我來說是一定要寫出來才能當上國手，惋惜的是，我沒做出這題。

6.3 APMO

問題 19 (2015 APMO 第二題 *). *令* S *爲所有大於* 1 *的正整數的集合。試找到所有* $f:S\to S$ *使得*

$$f(a)f(b)=f(a^2b^2) \tag{34}$$

對所有 $a,b\in S,\ a\neq b$ *成立。*

6.4 其他

問題 20 (2014 韓國奧林匹亞 *). *試找到所有* $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ *使得*

$$f(xf(x)+f(x)f(y)+y-1)=f(xf(x)+xy)+y-1 \tag{35}$$

對所有 $x,y\in\mathbb{R}$ *成立。*

問題 21 (2008 加拿大 *). *試找到所有* $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ *使得*

$$f(2f(x)+f(y))=2x+y \tag{36}$$

對所有 $x, y \in \mathbb{Q}$ *成立。*

問題 22 (2010 印尼 *). *試找到所有* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *使得*

$$f(x^3 + y^3) = xf(x^2) + yf(y^2) \tag{37}$$

對所有 $x, y \in \mathbb{R}$ *成立。*

問題 23 (2019 Baltic Way*). *試找到所有* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *使得*

$$f(xf(y) - y^2) = (y + 1)f(x - y) \tag{38}$$

對所有 $x, y \in \mathbb{R}$ *成立。*

問題 24 (2007 義大利 *). *試找到所有* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *使得*

$$f(xy + f(x)) = xf(y) + f(x) \tag{39}$$

對所有 $x, y \in \mathbb{R}$ *成立。*

問題 25 (2020 香港 *). *試找到所有* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *使得*

$$f(f(x) + y) + f(x + f(y)) = 2f(xf(y)) \tag{40}$$

對所有 $x, y \in \mathbb{R}$ *成立。*

問題 26. *試找到所有* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *使得*

$$f(x + y) + f(x)f(y) = f(xy) + f(x) + f(y) \tag{41}$$

對所有 $x, y \in \mathbb{R}$ *成立。*

問題 27. *試找到所有* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *使得*

$$f\left(x^2 + xf(y)\right) = xf(x + y) \tag{42}$$

對所有 $x, y \in \mathbb{R}$ *成立。*

7 習題解答

這個小節將放上一些習題的參考解答，大部分的解答都是我的答案，並不一定是最乾淨、最簡單的答案，如果想看看有沒有更簡潔的作法可以去 AOPS `https://artofproblemsolving.com/` 找。此外，有標 † 的解答表示我是參考別人的解答的。

解答 (問題1). 以 $P(a, b, c, d)$ 表示將 $w = a, x = b, y = c, z = d$ 代入式(16)。$P(1,1,1,1)$ 可以得到 $f(1)^2 = f(1)$ 因此 $f(1) = 1$，而 $P(w, w, w, w)$ 可以得到 $f(w^2) = f(w)^2$。現在我們可以將式(16)改寫成

$$\frac{f(w^2) + f(x^2)}{f(y^2) + f(z^2)} = \frac{w^2 + x^2}{y^2 + z^2}$$

現考慮 $P(\sqrt{t},\sqrt{1/t},1,1)$，則我們有

$$f(t)+f\left(\frac{1}{t}\right)=t+\frac{1}{t} \tag{43}$$

此式對所有 $t\in\mathbb{R}^+$ 成立。將式(43) 左右兩式平方並且使用 $f(w^2)=f(w)^2$ 可得

$$f(t^2)+2f(t)f\left(\frac{1}{t}\right)+f\left(\frac{1}{t^2}\right)=t^2+2+\frac{1}{t^2}，$$

與式 (43) 中，t 代入 t^2 比較可得

$$f(t)f\left(\frac{1}{t}\right)=1 \tag{44}$$

式(43)與式(44)綜合可得

$$f(t)^2-\left(t+\frac{1}{t}\right)+1=0 \qquad 即 \qquad (f(t)-t)\left(f(t)-\frac{1}{t}\right)=0，$$

可得對於所有 $t\in\mathbb{R}^+$，要嘛 $f(t)=t$ 要嘛 $f(t)=1/t$。我們現在證明不可能存在 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}^+-\{1\}$，使得 $f(\alpha)=\alpha$ 但是 $f(\beta)=1/\beta$。這也代表 $f(x)\equiv x$ 以及 $f(x)\equiv 1/x$ 爲唯二解。考慮 $P(\alpha,\beta,\alpha\beta,1)$，則可以得到

$$\frac{\alpha^2+1/\beta^2}{f(\alpha^2\beta^2)+1}=\frac{\alpha^2+\beta^2}{\alpha^2\beta^2+1}\implies f(\alpha^2\beta^2)=\frac{(\alpha^2\beta^2+1)^2}{\beta^2(\alpha^2+\beta^2)}-1。$$

如果 $f(\alpha^2\beta^2)=\alpha^2\beta^2$，則

$$\alpha^2\beta^2+1=\beta^2(\alpha^2+\beta^2)\implies \beta^4=1，$$

與 $\beta\in\mathbb{R}^+-\{1\}$ 矛盾，而若 $f(\alpha^2\beta^2)=1/(\alpha^2\beta^2)$，則

$$\alpha^2\beta^2(\alpha^2\beta^2+1)=\beta^2(\alpha^2+\beta^2)\implies \alpha^4=1，$$

一樣矛盾。因此這樣的 α,β 不存在，故得證。

解答 (問題2). 以 $P(a,b)$ 表示將 $x=a,y=b$ 代入式(17)。$P(0,0)$ 可得 $f(0)=f(0)\lfloor f(0)\rfloor$，即有 $\lfloor f(0)\rfloor=1$ 或是 $f(0)=0$。

狀況 (1) $\lfloor f(0)\rfloor=1$，考慮 $P(x,0)$ 可得 $f(x)=f(0)=c$ $(1\le c<2)$，代回式(17)驗證正確。

狀況 (2) $f(0)=0$。考慮 $P(1,1)$ 可得 $f(1)=f(1)\lfloor f(1)\rfloor$，因此 $f(1)=0$ 或是 $\lfloor f(1)\rfloor=1$。第一種狀況中，$P(1,y)$ 可得 $f(y)\equiv 0$，易驗證這是解。現在我們假設 $\lfloor f(1)\rfloor=1$。首先 $P(x,1)$ 可得

$$f(x)=f(\lfloor x\rfloor) \tag{45}$$

接下來考慮 $P(1,y)$ 可得 $f(y)=f(1)\lfloor f(y)\rfloor$ 以此改寫式(17)可得

$$f\left(\lfloor x\rfloor y\right)=\frac{f(x)f(y)}{f(1)} \tag{46}$$

在此式中將 y 代入 $\lfloor y \rfloor$ 並使用式(45)可得

$$f\left(\lfloor x \rfloor y\right) = f\left(\lfloor x \rfloor \lfloor y \rfloor\right),$$

在此式中代入 $x = 2$ 與 $y = 1/2$ 可得 $f(1) = f(0) = 0$，與 $\lfloor f(1) \rfloor = 1$ 矛盾。

解答 (問題3). 以 $P(x, y, z)$ 表示將 $a = x, b = y, c = z$ 代入式(18)。$P(0, 0, 0)$ 可得 $3f(0)^2 = 0$ 即 $f(0) = 0$，而 $P(a, -a, 0)$ 可得 $f(a)^2 + f(-a)^2 = 2f(a)f(-a)$ 因此 $f(a) = f(-a)$。因此式(18)對於滿足 $a + b = c$ 也成立，$P(x, x, 2x)$ 化簡可得 $f(2x)^2 = 4f(x)f(2x)$，即 $f(2x) = 0$ 或是 $f(2x) = 4f(x)$。令 $A := \{n \in \mathbb{N} : f(n) = 0\}$，我們將討論 $A = \varnothing$ 與否。

狀況 (1) $A = \varnothing$。因爲對於任何 $x \in \mathbb{Z}$，$f(2x) = 0$ 或是 $f(2x) = 4f(x)$ 至少其中一個是對的，但 $A = \varnothing$，因此 $f(2x) = 4f(x)$ 對所有 $x \in \mathbb{Z}$ 成立。現在我們宣稱 $f(n) = n^2 f(1)$ 對所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立。使用數學歸納法證明，這對 $n = 1$ 是對的，假設此敘述對 $n \le k$ $(k \in \mathbb{N})$ 都是對的，化簡 $P(1, k, k+1)$ 則有

$$\left(f(k+1) - (k+1)^2 f(1)\right)\left(f(k+1) - (k-1)^2 f(1)\right) = 0,$$

如果 $f(k+1) = (k-1)^2 f(1)$，$P(2, k-1, k+1)$ 可得 $f(2)^2 = 4f(2)\left((k-1)^2 f(1)\right)$，由於 $A = \varnothing$，$f(2) \neq 0$，因此 $4f(1) = 4(k-1)^2 f(1)$ 且 $k = 2$。故 $f(3) = f(1)$。$P(1, 3, 4)$ 可得 $f(4)^2 = 4f(4)f(1)$ 因此 $f(4) = 4f(1) = f(2)$，但我們又有 $f(4) = 4f(2)$，這導致 $f(2) = 0$ 與 $A = \varnothing$ 矛盾。因此我們可以得到 $f(k+1) = (k+1)^2 f(1)$，根據數學歸納法可以知道 $f(n) = n^2 f(1)$ 對所有 n 成立。可以驗證 $f(n) = an^2$ $(a \in \mathbb{Z} - \{0\})$ 爲解。

狀況 (2) $A \neq \varnothing$，首先注意到若 $z \in A$ 則 $P(a, z-a, z)$ 可得 $f(a) = f(z-a)$ 因此 $f(a) = f(-a) = f(z+a)$ 爲週期函數。令 $w = \min A$，則對於所有 $z \in A$，我們都有 $w \mid z$，否則 $f(z') = 0$，其中 $z' < w$ 爲 z 除以 w 的餘數。我們不妨將 w 寫成 $2^t s$，其中 s 爲奇數且 $t \in \mathbb{N} \cup \{0\}$。若 $s \neq 1$ 則取 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $2^k \equiv 1 \pmod{s}$ [1] 則因爲 $f(a) = f(a+w)$ 且 $s \mid 2^k - 1$ 我們有 $f(2^t) = f(2^k 2^t)$。我們又有 $f(2^k 2^t) = 4^k f(2^t)$，因此 $(4^k - 1)f(2^t) = 0$ 這代表 $f(2^t) = 0$，與 $s \neq 1$ 矛盾。因此 w 只能是 2^t 的形式。

如果 $w = 2^t$ 其中 $t \ge 3$，則考慮 $P(2, w/2-1, w/2+1)$，因爲 $f(w/2-1) = f(w/2+1) \neq 0$，我們可以寫下 $4f(1) = f(2) = 4f(w/2-1)$，故 $f(w/2-1) = f(1)$，接下來 $P(1, w/2-1, w/2)$ 可得 $f(w/2) = 4f(1)$，然而我們又有 $f(w/2) = f(2^{t-1}) = 4^{t-1} f(1)$，由於 $t \ge 3$，故矛盾。因此 $t = 0, 1, 2$。如果 $t = 0$，表示 f 的週期爲 1，則 $f(n) \equiv 0$。如果 $t = 1$，則表示 f 的週期爲 2，因此 $f(2n) = 0$ 且 $f(2n+1) = f(1)$ 對所有 $n \in \mathbb{Z}$ 成立，我們可以驗證這對所有 $f(1) \neq 0$ 都是解。如果 $t = 2$，則有 $f(4n+1) = f(4n+3) = f(1)$, $f(4n+2) = 4f(1)$, $f(4n) = 0$ 對所有 $n \in \mathbb{Z}$ 成立，可以驗證此解對所有 $f(1) \neq 0$ 成立。

解答 (問題13). 以 $P(a, b)$ 表示將 $x = a, y = b$ 代入式(28)。由 $P(f(y), y)$ 可得

$$f(0) + 1 = f(f(f(y))) - f(y) \tag{47}$$

[1] 根據歐拉定理，這樣的 k 存在

考慮 $P(f(x), f(f(x)))$ 並使用式(47)代換可得 $f(-1-f(0)) = -1$。現在 $P(x, -1-f(0))$ 可得 $f(x+1) = f(f(x))$。使用此式代換式(47)可得

$$f(y+2) = f(f(y+1)) = f(f(f(y))) = f(y) + f(0) + 1，$$

也就是

$$f(y+2) = f(y) + f(0) + 1 \tag{48}$$

考慮 $P(f(0)+1, 2)$ 我們有

$$\begin{aligned} & f(f(0)+1-2f(0)-1) = f(f(0)+2) - f(2) - 1 \\ \Longrightarrow\quad & f(f(0)) - f(0)(f(0)+1) = f(f(0)) - f(0) - 1 \\ \Longrightarrow\quad & (f(0)-1)(f(0)+1) = 0 \end{aligned}$$

因此 $f(0) = 1$ 或是 $f(0) = -1$。接下來我們計算 $f(-1)$。考慮 $P(-1+f(-1), -1)$，我們得到

$$\begin{aligned} f(-1) &= f(f(-1+f(-1))) - f(-1) - 1 \\ &= f(-1+f(-1)+1) - f(-1) - 1 && (\text{因爲 } f(f(x)) = f(x+1)) \\ &= f(0) - f(-1) - 1 && (\text{又因爲 } f(f(x)) = f(x+1)) \end{aligned}$$

因此，

$$f(0) = 2f(-1) + 1 \tag{49}$$

先前得到 $f(0) = 1$ 或是 $f(0) = -1$ 的結論，我們現在就此討論。

狀況 (1) $f(0) = 1$，此時由式(49)可得 $f(-1) = 0$。由式(48)，我們有 $f(y+2) = f(y) + 2$，我們便可以得到 $f(x) = x + 1$ 對所有 $x \in \mathbb{Z}$ 成立。

狀況 (2) $f(0) = -1$，此時由式(49)可得 $f(-1) = -1$。由式(48)，我們有 $f(y+2) = f(y)$，我們便可以得到 $f(x) = -1$ 對所有 $x \in \mathbb{Z}$ 成立。

易驗證上述得到的結果都是解。

解答 (問題16). 以 $P(a, b)$ 表示將 $x = a, y = b$ 代入式(31)。由 $P(1/f(1), 1)$ 可得 $f(1/f(1)) = 1$，因此 $P(x, 1/f(1))$ 可得 $f(x^2) = f(x)^2$。將式(31)改寫可得

$$f(xf(y))^2 = f(x^2 f(y)^2) = f(x)^2 f(y) \tag{50}$$

在此式(50)中，左右兩式開根號可得

$$f(xf(y)) = f(x)\sqrt{f(y)}。$$

固定 $x, y \in \mathbb{Q}^+$，定義 $t_0 = y$ 且 $t_n = xf(t_{n-1})$，根據 f 的定義，我們有 $t_n \in \mathbb{Q}^+$，現在我們證明

$$f(t_n) = f(x)^{2-2^{1-n}} f(y)^{2^{-n}} \tag{51}$$

式(51)對 $n=0$ 是對的。假設式(51)對於 $n \le k$ $(k \in \mathbb{N} \cup \{0\})$ 是對的，則

$$\begin{aligned} f(t_{k+1}) &= f(xf(t_k)) = f(x)\sqrt{f(t_k)} = f(x) \cdot f(x)^{1-2^{-k}} f(y)^{2^{-k-1}} \\ &= f(x)^{2-2^{1-(1+k)}} f(y)^{2^{-(k+1)}} \end{aligned}$$

可得式(51)對 $n=k+1$ 也是對的，根據數學歸納法知道式(51)對所有 $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ 成立。假設存在 $s \in \mathbb{Q}^+$ 使得 $f(s) = p/q \neq 1$ $(\gcd(p,q)=1)$，則在式(51)中取 $x = 1/f(1), y = s$，可得 $f(t_n) = f(y)^{2^{-n}} = (p/q)^{2^{-n}}$，取 n 夠大即可使 $f(t_n)$ 爲無理數，與 f 的對應域爲 $\mathbb{Q}^+$ 矛盾。

解答 (問題19). 考慮

$$f(a)f(b)f(c)f(d)f(e) = f(a)f\left(b^2c^2\right)f\left(d^2e^2\right) = f(a)f\left(b^4c^4d^4e^4\right)$$

以及

$$\begin{aligned} f(a)f(b)f(c)f(d)f(e) &= f\left(a^2b^2\right)f(c)f(d)f(e) = f\left(a^4b^4c^2\right)f(d)f(e) \\ &= f\left(a^8b^8c^4d^2\right)f(e) = f\left(a^{16}b^{16}c^8d^4e^2\right) \text{。} \end{aligned}$$

只要取 $a,b,c,d,e \in S$ 滿足 $a^{16}b^{16}c^8d^4e^2 = b^4c^4d^4e^4$，且在合併時不會違反題目敘述中的條件，即可產生矛盾 $f(a)=1$。因此我們取

$$a=2, \quad b=2^2, \quad c=2, \quad d=2, \quad e=2^{22}\text{，}$$

即證明了這樣的 f 不存在。

解答 (問題20). 以 $P(a,b)$ 表示將 $x=a, y=b$ 代入式(35)。由 $P(0,1-f(0))$ 可知

$$f(f(0)f(1-f(0)) - f(0)) = 0$$

這代表存在 $c \in \mathbb{R}$ 使得 $f(c)=0$。$P(c,1)$ 可得 $f(0)=0$。$P(0,y)$ 有 $f(y-1)=y-1$，這表示 $f(x)=x$ 對所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立，易驗證這是解。

解答 (問題21). 以 $P(a,b)$ 表示將 $x=a, y=b$ 代入式(36)。首先 $P(0,0)$ 可得 $f(3f(0))=0$。現在我們證明 f 是單射的，假設 $f(a)=f(b)$，比較 $P(x,a)$ 與 $P(x,b)$ 可得 $a=b$，即有單射。考慮 $P(x,-2x)$ 有 $f(2f(x)+f(-2x)) = 0 = f(3f(0))$，根據單射我們有 $2f(x)+f(-2x) = 3f(0)$ 將此式代回式(36)可得

$$f\left(3f(0) - f(-2x) + f(y)\right) = 2x + y \tag{52}$$

此外，$P(3f(0),y)$ 與 $P(x,3f(0))$ 分別可得

$$\begin{aligned} f(f(y)) &= 6f(0) + y \\ f(2f(x)) &= 3f(0) + 2x \end{aligned} \tag{53}$$

在式(52)中，將 (x,y) 代入 $(-1/2f(x), f(y))$，並使用式(53)可得

$$f(3f(0) + y - x) = f(y) - f(x) \tag{54}$$

在此式中的 y 代入 $x+y-3f(0)$ 可得 $f(x)+f(y) = f(x+y-3f(0))$。在此式中代入 $x=2f(0)$ 及 $y=f(0)$ 並且使用式(53) 可得 $9f(0)=f(0)$ 即 $f(0)=0$。因此，$f(x)+f(y)=f(x+y)$

爲柯西方程。根據定理3，我們知道 $f(x) = cx$ 其中 $c \in \mathbb{Q}$ 爲常數。易驗證 $c = \pm 1$ 爲唯一的可能，因此所有解爲 $f(x) \equiv x$ 及 $f(x) \equiv -x$ 兩個。

解答 (問題22). 以 $P(a,b)$ 表示將 $x = a, y = b$ 代入式(37)。$P(0,0)$ 可得 $f(0) = 0$，而 $P(x,0)$ 可得

$$f(x^3) = xf(x^2) \tag{55}$$

將此結果代回式(37)可得 $f(x^3 + y^3) = f(x^3) + f(y^3)$。由於對於所有的 $u, v \in \mathbb{R}$，都存在 $x, y \in \mathbb{R}$ 使得 $u = x^3, v = y^3$，因此我們有 $f(u+v) = f(u) + f(v)$。這代表 f 滿足柯西方程，且根據性質2，我們有 $f(cx) = cf(x)$ 對於所有的 $c \in \mathbb{Q}$ 成立。

現在我們將 $x = a + p$ (固定 $a \in \mathbb{R}$，$p \in \mathbb{Q}$ 則不固定) 代入式55，並且使用性質2以及柯西方程展開，可以得到

$$\begin{aligned} f\left((a+p)^3\right) &= f(a^3) + 3f(a^2)p + 3f(a)p^2 + f(1)p^3 \\ (a+p)f\left((a+p)^2\right) &= (a+p)\left(f(a^2) + 2pf(a) + p^2 f(1)\right) \\ &= af(a^2) + \left(f(a^2) + 2af(a)\right)p + \left(af(1) + 2f(a)\right)p^2 + f(1)p^3 \end{aligned}$$

由於 a 被固定，因此此兩式可以視爲 p 的三次多項式，這兩個多像是在所有有理數上有一樣的值，因此這兩個是一樣的多項式。比較 p^2 項的係數可得 $3f(a) = 2f(a) + af(1)$，因此 $f(a) = af(1)$，這對所有 $a \in \mathbb{R}$ 都是對的，因此可得 $f(x) = cx$，其中 $c \in \mathbb{R}$ 爲常數。可以驗證每個 $c \in \mathbb{R}$ 都是解。

附註. 可以想想爲什麼兩個多項式只要在有理數上面的值全部一樣，則他們就是一樣的多項式。

解答 (問題23). 以 $P(a,b)$ 表示將 $x = a, y = b$ 代入式(38)。如果 f 爲常數函數，則 $f \equiv 0$ 爲唯一可能，現假設 f 不爲常數函數。由 $P(x,-1)$ 可得 $f(f(-1)x - 1) = 0$，如果 $f(-1) \neq 0$ 則 f 爲常數，與假設矛盾，因此有 $f(-1) = 0$。現在我們證明 f 爲零單，也就是 $f(a) \neq 0$ 對所有 $a \neq -1$ 成立。反設這樣的 $a \neq 1$ 存在，則 $P(x,a)$ 給我們

$$f(-a^2) = (a+1)f(x-a) \qquad \text{即} \qquad f(x-a) = f(-a^2)/(a+1) \text{ 爲常數函數，矛盾。}$$

由此，我們知道 f 爲零單。

考慮 $P(y-1, y)$，則有

$$f\left((y-1)f(y) - y^2\right) = 0,$$

根據零單，我們有 $(y-1)f(y) - y^2 = -1$，也就是 $f(y) = y + 1$ 對所有 $y \neq 1$ 成立。爲了解出 $f(1)$，再考慮 $P(y+1, y)$，可得

$$(y+1)f(1) = f((y+1)f(y) - y^2) = f(2y+1) = 2y + 2,$$

對所有 $y \neq 0, 1$ 成立，因此 $f(1) = 2$。綜合以上，$f(x) = x + 1$ 對所有 $x \in \mathbb{R}$ 與 $f \equiv 0$ 爲所有解。

解答 (問題24). 以 $P(a,b)$ 表示將 $x = a, y = b$ 代入式 (39)。$P(0,0)$ 有 $f(f(0)) = f(0)$ 且

$P(x,0)$ 有

$$f(f(x)) = f(0)x + f(x) \tag{56}$$

如果 $f(0) \neq 0$，則由式 (56) 可得 f 爲單射，然而 $f(f(0)) = f(0)$ 可得 $f(0) = 0$ 與 $f(0) \neq 0$ 矛盾。因此，$f(0) = 0$ 且式 (56) 可以寫成 $f(f(x)) = f(x)$。$P(f(x),-1)$ 可得 $f(x)\big(f(-1)+1\big) = 0$，如果 $f(-1) \neq -1$，則 $f \equiv 0$，可驗證這是一個解。

現在我們討論 $f(-1) = -1$ 的情形，考慮 $P(x,-1)$ 則有

$$f(f(x) - x) = f(x) - x \tag{57}$$

我們宣稱[2] $f(x) = x$ 對所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立。反設存在 $t \in \mathbb{R}$ 使得 $f(t) \neq t$，則考慮

$$w = xt + f(x) \qquad f(w) = xf(t) + f(x) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

將 w 代入式 (57)，可得

$$f\big((f(t)-t)x\big) = (f(t)-t)x,$$

由於我們假設 $f(t) \neq t$，這可以推論 $f(x) = x$ 對於所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立。此即產生矛盾，因此 $f(x) \equiv x$ 爲另一個解。綜合以上，總共有兩個解 $f(x) \equiv 0$ 及 $f(x) \equiv x$。

解答 (問題25). 以 $P(a,b)$ 表示將 $x = a, y = b$ 代入式(40)。比較式(40)與 $P(y,x)$ 可得

$$f(xf(y)) = f(yf(x)) \tag{58}$$

代入 $x = 0$，則有 $f(0) = f(f(0)y)$。如果 $f(0) \neq 0$，則 $f(x) \equiv c$ $(c \neq 0)$ 爲常數函數，因此我們討論完 $f(0) \neq 0$ 的情形。以下假設 $f(0) = 0$。

由 $P(x,0)$ 可得

$$f(f(x)) + f(x) = 0 \tag{59}$$

我們現證明 $f(f(x) + x) = 0$。$P(f(x),y)$ 給我們

$$f(-f(x) + y) + f(f(x) + f(y)) = 2f(f(x)f(y)) \tag{60}$$

將式(60)的 x, y 對調後與式(60)比較可得

$$f(-f(x) + y) = f(-f(y) + x),$$

此時再將 y 以 $f(x)$ 代入可得 $f(0) = f(f(x) + x)$，這證明初我們先前宣稱的結果。現在考慮 $P(1,1)$ 可得 $f(f(1)) = 0$ (注意到 $f(1 + f(1)) = 0$)，與式(59)比較可得 $f(1) = 0$。在式(58)中代入 $x = 1$ 可得 $f(f(y)) = 0$，在將此結果與式(59)綜合可得 $f(y) = 0$ 對所有 $y \in \mathbb{R}$ 成立。綜合以上，可得 $f(x) = c$ $(c \in \mathbb{R})$ 爲所有解。

解答 (問題26†). 假設 $P(a,b)$ 爲 $x = a, y = b$ 代入原式 (41)。首先注意到，如果 $f(x)$ 爲常數函數 c，則有 $c = 0, 2$。我們可得兩個解 $f(x) \equiv 0$ 以及 $f(x) \equiv 2$。

現假設 f 不爲常數函數。由 $P(x,0)$ 可得

$$f(x) + f(x)f(0) = f(0) + f(x) + f(0),$$

[2]在數奧競賽中，寫解時有時可以寫「宣稱」(claim) 來表示我們接下來要證明的敘述，這會讓解更易懂也更有結構性

可推論 $(f(x)-2)f(0)=0$，因爲 $f(x)$ 不爲常數，因此 $f(0)=0$。$P(x,1)$ 可得 $f(x+1)=(2-f(1))f(x)+f(1)$ 且 $P(x+1,1)$ 可得

$$\begin{aligned} f(x+2) &= (2-f(1))f(x+1)+f(1) \\ &= (2-f(1))^2 f(x)+f(1)(3-f(1)) \end{aligned}$$

將上式以 $x=0$ 代入可以得到 $f(2)=f(1)(3-f(1))$，並且以此代換：

$$f(x+2)=(2-f(1))^2 f(x)+f(2) \tag{61}$$

現在考慮 $P(x,2): f(x+2)=f(2x)+f(x)(1-f(2))+f(2)$，與式 (41) 比較可得

$$(2-f(1))^2 f(x)=f(2x)+f(x)(1-3f(1)+f(1)^2)，$$

我們可以推論 $f(2x)=(3-f(1))f(x)$。

因此有 $f(2x)=af(x)$ 且 $f(4x)=a^2 f(x)$，其中 $a=3-f(1)$。接下來 $P(2x,2y)$ 可得 $af(x+y)+a^2 f(x)f(y)=a^2 f(xy)+af(x)+af(y)$，與原式(41)比較可得：

$$a(a-1)f(x+y)=a(a-1)(f(x)+f(y))。$$

注意到 $a\neq 0$, 否則 $f(2x)=af(x)$ 可推論 $f(x)=0$ 爲常數函數，我們也有 $a\neq 1$，否則 $f(1)=3-a=2$ 且 $f(x+1)=(2-f(1))f(x)+f(1)=f(1)$ 爲常數函數。因此 $f(x+y)=f(x)+f(y)$，並且與式(41)可得 $f(xy)=f(x)f(y)$。根據範例 6 可知 $f(x)=x$ 或是 $f(x)=0$。

解答 (問題27†). 明顯 $f\equiv 0$ 爲解，不妨假設 f 不全爲 0，假設 $f(z)\neq 0$。以 $P(a,b)$ 表示將 $x=a, y=b$ 代入式 (42)。$P(x,z-x): f(x^2+xf(z-x))=xf(z)$ 可推出 f 滿射，此外 $P(0,0)$ 可得 $f(0)=0$；$P(x,0)$ 可得 $f(x^2)=xf(x)$。接下來我們證明：$f(z)\neq 0$ 對於所有的 $z\neq 0$ 成立。定義 $S=\{s\in\mathbb{R}: f(s)=0\}$，並考慮 $P(x,s)$ $(s\in S)$ 有 $f(x^2)=xf(x+s)$，則可推論 $f(x+s)=f(x)$ 無論 x 是否爲 0，這表示 $s\in S$ 則 s 是 f 的週期。很容易可以看到，如果 t 是 f 的週期，則 $f(t)=f(0)=0$，因此 $t\in S$，這表示 S 恰好蒐集了所有 f 的週期。以上可以看出若 $s,t\in S$ 則 $s+t\in S$ 且 $-s\in S$，而 $P(s,-s)\implies s^2\in S$。

現在假設 $s\in S-\{0\}$ 存在，比較 $P(x+s,y)$ 與 $P(x,y)$ $(x,y\in\mathbb{R})$ 我們有

$$f(x^2+2sx+s^2+(x+s)f(y))=(x+s)f(x+s+y)=(x+s)f(x+y)$$
$$f(x^2+xf(y))=xf(x+y)$$

如果 $s^2+2sx+sf(y)\in S$，則 $sf(x+y)=0$，因此 $f(x+y)=0$ 且 $x+y\in S$。由於 f 是滿射的，所以對於所有的 x，存在 $y\in\mathbb{R}$ 使得 $f(y)=-2x$，此時 $s^2+2sx+sf(y)=s^2\in S$，此時 $f(x+y)=0$，故 $f(x^2+xf(y))=f(-x^2)=0\implies -x^2\in S$ 對所有 $x\in\mathbb{R}$ 成立。我們可以推論當 $S\neq\{0\}$ 則 $S=\mathbb{R}$。

現在考慮 $P(-f(y),y)$ $(y\neq 0)$，可以得到 $0=-f(y)f(y-f(y))$，根據前面得到的「零單」條件，我們可以得到 $f(y)=y$ 對於所有的 $y\neq 0$ 成立，加上前面的 $f(0)=0$，我們得到 $f(x)=x$ 對於所有的 $x\in\mathbb{R}$ 成立，易驗證這是解。

附註. 這題用到的技巧叫做零單，也就是映射到 0 的點是單射，具體來說，只存在一個 $a\in\mathbb{R}$ 使得 $f(a)=0$，換句話說，若 $f(a)=f(b)=0$，則 $a=b$。