

历年全国硕士研究生入学考试线性代数试题

版本:2001-2011

解题方法及依据的知识点见下列参考文献:

- [1] 陈建龙等,《线性代数》(十一五国家级规划教材),科学出版社,2007.
 [2] 张小向等,《线性代数学习指导》,科学出版社,2008.
 [3] 周建华等,《几何与代数》(十一五国家级规划教材),科学出版社,2009.



一. 填空题

1. **01 数一** 设矩阵 A 满足 $A^2 + A - 4E = O$, 其中 E 为单位矩阵, 则 $(A - E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $A^2 + A - 4E = O \Rightarrow (A - E)(A + 2E) - 2E = O \Rightarrow (A - E)(A + 2E) = 2E \Rightarrow (A - E)^{-1} = \frac{1}{2}(A + 2E)$.

2. **01 数二** 设方程 $\begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ 有无穷多个解, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix} = \begin{vmatrix} a+2 & a+2 & a+2 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} \begin{matrix} \times(-1) \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix} = (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 \end{vmatrix} = (a+2)(a-1)^2$.

原方程有无穷多个解 $\Rightarrow (a+2)(a-1)^2 = 0 \Rightarrow a = -2$ 或 1 .

当 $a = 1$ 时, $\begin{bmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \times(-1) \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 由此可见此

时原方程有无穷解. 因此 $a = -2$.

事实上, $a = -2$ 时, $\begin{bmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & -2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix}$

$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \times 2 \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

3. **01 数三/四** 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{bmatrix}$ 且秩(A) = 3, 则 $k =$ _____.

解: $|A| = \begin{vmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \text{第1行} \\ \text{第2行} \\ \text{第3行} \\ \text{第4行} \end{smallmatrix} \leftarrow \begin{smallmatrix} \text{第1行} \\ \text{第2行} \\ \text{第3行} \\ \text{第4行} \end{smallmatrix} - \text{第4行}} \begin{vmatrix} k+3 & k+3 & k+3 & k+3 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{vmatrix} = (k+3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \text{第1行} \\ \text{第2行} \\ \text{第3行} \\ \text{第4行} \end{smallmatrix} \leftarrow \begin{smallmatrix} \text{第1行} \\ \text{第2行} \\ \text{第3行} \\ \text{第4行} \end{smallmatrix} - \text{第1行}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k-1 \end{vmatrix} = (k+3)(k-1)^3.$

秩(A) = 3 $\Rightarrow |A| = 0 \Rightarrow k = -3$ 或 1 .

当 $k = 1$ 时, 秩(A) = 1, 因此 $k = -3$.

4. **01 数四** 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$, 则第四行各元素余子式之和的值为_____.

解: [方法一] D 的第四行各元素余子式依次为

$$M_{41} = \begin{vmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ -7 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -56, M_{42} = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, M_{43} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 \end{vmatrix} = 42, M_{44} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 \end{vmatrix} = -14.$$

于是有 $M_{41} + M_{42} + M_{43} + M_{44} = -28$.

[方法二] 计算“ D 的第四行各元素余子式之和”相当于把 $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$ 按第四行展开, 而

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -7 \times (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 7 \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 4 & 4 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -28.$$

[注] 计算“ D 的第四行各元素代数余子式之和”相当于把 $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ 按第四行展开, 而 $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$.

5. **02 数一** 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Py}$ 可化成标准形 $f = 6y_1^2$, 则 $a =$ _____.

解: 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & a \end{bmatrix}$. 又因为 $f(x_1, x_2, x_3)$ 经

正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Py}$ 可化成标准形 $f = 6y_1^2$, 可见 A 的特征值为 $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. 于是有

$$3a = a + a + a = \text{tr} A = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 6.$$

故 $a = 2$.

[注] 也可以由 $f(x_1, x_2, x_3)$ 经正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Py}$ 可化成标准形 $f = 6y_1^2$ 看出 A 的秩为 1, 因而 $a = 2$.

6. **02 数二** 矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ 的非零特征值是_____.

解: 根据对角线法则, $\begin{vmatrix} \lambda & 2 & 2 \\ -2 & \lambda-2 & 2 \\ 2 & 2 & \lambda-2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)^2 + 8 - 8 - 4(\lambda-2) + 4(\lambda-2) - 4\lambda = \lambda^2(\lambda-4)$, 可见该矩阵的非零特征值是 4.

[注] 由此可以进一步看出 $A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ 不能与对角矩阵相似. 因为假若 A 相似于对角矩阵, 则 A

相似于 $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 因而秩(A) = 秩(A) = 1. 但秩(A) = 2, 矛盾!

7. **02 数三** 设三阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, 三维列向量 $\alpha = (a, 1, 1)^T$. 已知 $A\alpha$ 与 α 线性相关, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: 因为 $\alpha = (a, 1, 1)^T \neq 0$, 而且 $A\alpha$ 与 α 线性相关, 故存在 λ 使得 $A\alpha = \lambda\alpha$, 即

$$\begin{bmatrix} a \\ 2a+3 \\ 3a+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda a \\ \lambda \\ \lambda \end{bmatrix}.$$

由此可得 $\lambda = 1, a = -1$.

8. **02 数四** 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = A^2 - 3A + 2E$, 则 $B^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $B = A^2 - 3A + 2E = (A - E)(A - 2E) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$.

$$|B| = 2, B^* = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}, B^{-1} = \frac{1}{|B|} B^* = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

9. **03 数一** 从 \mathbf{R}^2 的基 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 到基 $\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 的过渡矩阵为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解: 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, $B = (\beta_1, \beta_2) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, 基 α_1, α_2 到基 β_1, β_2 的过渡矩阵为 P , 则 $B = AP$,

$$P = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}.$$

10. **03 数二** 设 α 为 3 维列向量, α^T 是 α 的转置. 若 $\alpha\alpha^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $\alpha^T\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: 设 $\alpha = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$, 则 $\alpha\alpha^T = \begin{bmatrix} a_1^2 & a_1a_2 & a_1a_3 \\ a_2a_1 & a_2^2 & a_2a_3 \\ a_3a_1 & a_3a_2 & a_3^2 \end{bmatrix}$. 又因为 $\alpha\alpha^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 所以

$$\alpha^T\alpha = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1 + 1 + 1 = 3.$$

11. **03 数二** 设三阶方阵 A, B 满足 $A^2B - A - B = E$, 其中 E 为三阶单位矩阵, 若 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $A^2B - A - B = E \Rightarrow (A^2 - E)B = A + E \Rightarrow (A + E)(A - E)B = A + E \Rightarrow |A + E| \cdot |A - E| \cdot |B| = |A + E|$.

$$\text{而 } |A + E| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 18, |A - E| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 2. \text{ 故 } |B| = \frac{1}{2}.$$

12. **03 数三/四** 设 n 维向量 $\alpha = (a, 0, \dots, 0, a)^T$, $a < 0$, E 为 n 阶单位矩阵, 矩阵 $A = E - \alpha\alpha^T$, $B = E + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T$, 其中 A 的逆矩阵为 B , 则 $a =$ _____.

解: $\alpha = (a, 0, \dots, 0, a)^T$, $a < 0 \Rightarrow \alpha^T\alpha = 2a^2$, $\alpha\alpha^T = \begin{bmatrix} a^2 & 0 & \cdots & 0 & a^2 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a^2 & 0 & \cdots & 0 & a^2 \end{bmatrix} \neq O$.

矩阵 $A = E - \alpha\alpha^T$, $B = E + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T$, 其中 A 的逆矩阵为 $B \Rightarrow (E - \alpha\alpha^T)(E + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T) = E$

$\Rightarrow E + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T - \alpha\alpha^T - \frac{1}{a}\alpha\alpha^T\alpha\alpha^T = E \Rightarrow (\frac{1}{a} - 1 - 2a)\alpha\alpha^T = O \Rightarrow \frac{1}{a} - 1 - 2a = 0 \Rightarrow a = -1$ (因为 $a < 0$).

13. **03 数四** 设 A, B 均为三阶方阵, E 为三阶单位矩阵. 已知 $AB = 2A + B$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 则 $(A - E)^{-1} =$ _____.

解: $AB = 2A + B \Rightarrow (A - E)(B - 2E) = AB - 2A - B + 2E = 2E \Rightarrow (A - E) \frac{1}{2}(B - 2E) = E \Rightarrow (A - E)^{-1} = \frac{1}{2}(B - 2E)$.

又因为 $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 所以 $(A - E)^{-1} = \frac{1}{2}(B - 2E) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

14. **04 数一/二** 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 矩阵 B 满足 $ABA^* = 2BA^* + E$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 是单位矩阵, 则 $|B| =$ _____.

解: $|A| = 3 \Rightarrow AA^* = |A|E = 3E \Rightarrow |A| \cdot |A^*| = |3E| = 27 \Rightarrow |A^*| = 9$.

$|A - 2E| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 1$.

$ABA^* = 2BA^* + E \Rightarrow (A - 2E)BA^* = E \Rightarrow |A - 2E| \cdot |B| \cdot |A^*| = |E| = 1 \Rightarrow |B| = \frac{1}{9}$.

15. **04 数三** 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$ 的秩为 _____.

解: 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$ 的矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$,

秩(f) = 秩(A) = 2.

16. **04 数四** 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $B = P^{-1}AP$, 其中 P 为三阶可逆矩阵, 则 $B^{2004} - 2A^2 =$ _____.

解: $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow A^2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $A^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

$B^{2004} - 2A^2 = (P^{-1}AP)^{2004} - 2A^2 = P^{-1}A^{2004}P - 2A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$.

17. **04 数四** 设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 是实正交矩阵, 且 $a_{11} = 1$, $b = (1, 0, 0)^T$, 则线性方程组 $Ax = b$ 的解是 _____.

解: $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 是实正交矩阵 $\Rightarrow AA^T = E$, 即

$$\begin{bmatrix} a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2 & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

由 $a_{11} = 1$ 可知 $a_{12} = a_{13} = 0$. 于是 $\mathbf{x} = \mathbf{E}\mathbf{x} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{A}^T(\mathbf{A}\mathbf{x}) = \mathbf{A}^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & a_{21} & a_{31} \\ 0 & a_{22} & a_{32} \\ 0 & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$

18. **05 数一/二/四** 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, 记矩阵 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $\mathbf{B} = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3)$. 如果 $|\mathbf{A}| = 1$, 那么 $|\mathbf{B}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $|\mathbf{B}| = |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3| = |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 3\alpha_3, 2\alpha_2 + 8\alpha_3| = |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 3\alpha_3, 2\alpha_3|$
 $= 2|\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_3| = 2|\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3| = 2|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 2|\mathbf{A}| = 2.$

[另解] $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \mathbf{B} = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3) \Rightarrow \mathbf{B} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow |\mathbf{B}| = |\mathbf{A}| \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = (2-1)(3-1)(3-2) = 2.$ (注: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix}$ 为范德蒙行列式).

19. **05 数三/四** 设行向量组 $(2, 1, 1, 1), (2, 1, a, a), (3, 2, 1, a), (4, 3, 2, 1)$ 线性相关, 且 $a \neq 1$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: 向量组 $(2, 1, 1, 1), (2, 1, a, a), (3, 2, 1, a), (4, 3, 2, 1)$ 线性相关 $\Rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & a & a \\ 3 & 2 & 1 & a \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0.$ 而

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & a & a \\ 3 & 2 & 1 & a \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1 - c_2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & a \\ 1 & 2 & 1 & a \\ 1 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & a-1 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & a-1 & a-1 \\ 1 & 0 & a-1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (a-1) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a-1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (a-1)(2a-1).$$

又因为 $a \neq 1$, 所以 $a = \frac{1}{2}$.

20. **06 数一** 点 $(2, 1, 0)$ 到平面 $3x + 4y + 5z = 0$ 的距离 $d = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $d = \frac{|3 \times 2 + 4 \times 1 + 5 \times 0|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2}} = \frac{10}{5\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$

21. **06 数一/二/三/四** 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, \mathbf{E} 为 2 阶单位矩阵, 矩阵 \mathbf{B} 满足 $\mathbf{BA} = \mathbf{B} + 2\mathbf{E}$, 则 $|\mathbf{B}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $\mathbf{BA} = \mathbf{B} + 2\mathbf{E} \Rightarrow \mathbf{B}(\mathbf{A} - \mathbf{E}) = 2\mathbf{E} \Rightarrow |\mathbf{B}| \cdot |\mathbf{A} - \mathbf{E}| = |2\mathbf{E}| = 4.$ 而 $|\mathbf{A} - \mathbf{E}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2$, 故 $|\mathbf{B}| = 2.$

22. **06 数四** 设 α_1, α_2 为 2 维列向量, 矩阵 $\mathbf{A} = (2\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2)$, $\mathbf{B} = (\alpha_1, \alpha_2)$. 若行列式 $|\mathbf{A}| = 6$, 则 $|\mathbf{B}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解: $6 = |\mathbf{A}| = |2\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2| = |2\alpha_1 + \alpha_2, 3\alpha_1| = 3|2\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1| = 3|\alpha_2, \alpha_1| = -3|\alpha_1, \alpha_2| = -3|\mathbf{B}| \Rightarrow |\mathbf{B}| = -2.$

[另解] $\mathbf{A} = (2\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2), \mathbf{B} = (\alpha_1, \alpha_2) \Rightarrow \mathbf{A} = \mathbf{B} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow |\mathbf{A}| = |\mathbf{B}| \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3|\mathbf{B}| \Rightarrow |\mathbf{B}| = -2.$

23. **07 数一/二/三/四** 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 \mathbf{A}^3 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A^3 \text{ 的秩为 } 1.$

24. **08 数一/二** 矩阵 A 的特征值是 $\lambda, 2, 3$, 其中 λ 未知, 且 $|A| = 24$, 则 $\lambda =$ _____.

解: $24 = |A| = \lambda \times 2 \times 3 \Rightarrow \lambda = 4.$

25. **08 数一/二** 设 A 为 2 阶矩阵, α_1, α_2 为线性无关的 2 维列向量, $A\alpha_1 = 0, A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2$, 则 A 的非零特征值为 _____.

解: α_1, α_2 为线性无关的 2 维列向量 $\Rightarrow P = (\alpha_1, \alpha_2)$ 为可逆矩阵.

$$A\alpha_1 = 0, A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2 \Rightarrow AP = A(\alpha_1, \alpha_2) = (0, 2\alpha_1 + \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow A$ 与 $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 有相同的特征值 $\Rightarrow A$ 的非零特征值为 1.

另解: α_1, α_2 为线性无关的 2 维列向量 $\Rightarrow \alpha_1 \neq 0, 2\alpha_1 + \alpha_2 \neq 0.$

$A\alpha_1 = 0 = 0\alpha_1 \Rightarrow 0$ 是 A 的一个特征值.

$A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2 \Rightarrow A(2\alpha_1 + \alpha_2) = 2A\alpha_1 + A\alpha_2 = 0 + 2\alpha_1 + \alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2 \Rightarrow 1$ 是 A 的一个特征值.

最后由 A 为 2 阶矩阵可知 A 的非零特征值为 1.

26. **08 数三/四** 设 3 阶矩阵 A 的特征值互不相同, 若行列式 $|A| = 0$, 则 A 的秩为 _____.

解: 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 由于 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 互不相同, 所以 A 相似于 $\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$ 且由 $\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = |A|$

$= 0$ 可知 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 中有一个为零, 另外两个不为零. 因此 A 的秩为 2.

27. **09 数一** 若 3 维向量 α, β 满足 $\alpha^T\beta = 2$, 其中 α^T 为 α 的转置, 则矩阵 $\beta\alpha^T$ 的非零特征值为 _____.

解: 3 维向量 α, β 满足 $\alpha^T\beta = 2 \Rightarrow \beta \neq 0 \Rightarrow \text{秩}(\beta\alpha^T) \leq \text{秩}(\beta) = 1 \Rightarrow$ 矩阵 $\beta\alpha^T$ 至多有一个非零的特征值.

$\alpha^T\beta = 2 \Rightarrow (\beta\alpha^T)\beta = \beta(\alpha^T\beta) = 2\beta \Rightarrow 2$ 是矩阵 $\beta\alpha^T$ 的非零特征值.

故矩阵 $\beta\alpha^T$ 的非零特征值为 2.

28. **09 数二** 设 α, β 为 3 维列向量, β^T 为 β 的转置, 若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $\beta^T\alpha =$ _____.

解: 设 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T, \beta = (b_1, b_2, b_3)^T$, 则 $\alpha\beta^T = \begin{bmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 \end{bmatrix}$. 因为 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 所以有

$$\beta^T\alpha = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = \text{Tr}(\alpha\beta^T) = 2 + 0 + 0 = 2.$$

29. **09 数三** 设 $\alpha = (1, 1, 1)^T, \beta = (1, 0, k)^T$, 若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $k =$ _____.

解: 因为 $\alpha = (1, 1, 1)^T, \beta = (1, 0, k)^T$, 所以 $\alpha\beta^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & k \\ 1 & 0 & k \\ 1 & 0 & k \end{bmatrix}$. 又因为矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 所以有

$$1 + 0 + k = \text{Tr}(\alpha\beta^T) = 3 + 0 + 0 = 3.$$

故 $k = 2$.

30. **10 数一** 设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0, 2)^T, \alpha_3 = (2, 1, 1, a)^T$, 若由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的向量空间的维数是 2, 则 $a =$ _____.

解: 首先, 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的向量空间的维数 = 秩 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$.

$$\text{其次, } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & a \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \times(-2) \times 1 \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & a \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \times 1 \times 2 \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & a-6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

故“由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的向量空间的维数是 2” \Leftrightarrow “秩 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$ ” \Leftrightarrow “ $a-6=0$ ” \Leftrightarrow “ $a=6$ ”.

31. **10 数二/三** 设 A, B 为 3 阶矩阵, 且 $|A|=3, |B|=2, |A^{-1}+B|=2$, 则 $|A+B^{-1}| =$ _____.

解: $A+B^{-1} = B^{-1}+A = (AA^{-1})B^{-1} + A(BB^{-1}) = A(A^{-1}+B)B^{-1}$.

$$|A+B^{-1}| = |A(A^{-1}+B)B^{-1}| = |A| \times |A^{-1}+B| \times |B^{-1}| = 3 \times 2 \times 2^{-1} = 3.$$

32. **11 数一** 若二次曲面的方程 $x^2 + 3y^2 + z^2 + 2axy + 2xz + 2yz = 4$, 经过正交变换化为 $y_1^2 + 4z_1^2 = 4$, 则 $a =$ _____.

解: 二次型 $x^2 + 3y^2 + z^2 + 2axy + 2xz + 2yz$ 的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \times(-1) \end{matrix}} \begin{vmatrix} 0 & a-1 & 0 \\ a-1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & a-1 \\ a-1 & 2 \end{vmatrix} = -(a-1)^2.$$

由题目条件可知存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$. 故 $|A|=0$. 由此可得 $a=1$.

$$\text{此时, } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-3 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \leftarrow \\ \times(-1) \\ \times 1 \end{matrix}} \begin{vmatrix} \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-1 \\ -1 & \lambda-3 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda-3 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \times 1 \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix}} \\ &= (\lambda-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & \lambda-4 & 0 \\ 0 & -2 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-4 & 0 \\ -2 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)\lambda(\lambda-4). \end{aligned}$$

可见 A 的特征值为 $\lambda_1=1, \lambda_2=0, \lambda_3=4$. 因而确实存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

33. **11 数二** 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$, 则 f 的正惯性指数为 _____.

解一: $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3) + 2x_2^2$

$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2.$$

$$\text{令 } \begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3, \\ y_2 = x_2 \\ y_3 = x_3 \end{cases}, \text{ 则 } \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 - y_3, \\ x_2 = y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \text{ 即 } \mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}, \text{ 其中 } \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ 为可逆矩阵,}$$

且 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形: $y_1^2 + 2y_2^2$.

可见 f 的正惯性指数为 2.

解二: $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$,

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-3 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \text{第一行} \\ \times(-1) \\ \times 1 \end{array} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-1 \\ -1 & \lambda-3 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda-3 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \begin{array}{l} \times 1 \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{array}$$

$$= (\lambda-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & \lambda-4 & 0 \\ 0 & -2 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-4 & 0 \\ -2 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)\lambda(\lambda-4).$$

可见 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 4$. 因而 f 的正惯性指数为 2.

34. **11 数三** 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 的秩为 1, A 的行元素之和为 3, 则 f 在正交变换下 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 下的标准形为

解: 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$. 因为 A 的行元素之和为 3,

即 $a_{11} + a_{12} + a_{13} = 3, a_{21} + a_{22} + a_{23} = 3, a_{31} + a_{32} + a_{33} = 3$,

$$\text{所以 } A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + a_{12} + a_{13} \\ a_{21} + a_{22} + a_{23} \\ a_{31} + a_{32} + a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

可见 3 是 A 的特征值.

因为秩(A) = 秩(f) = 1, 而且 A 正交相似于一个对角矩阵 Λ , 其对角线上的元素为 A 的特征值, 所以秩(Λ) = 秩(A) = 1, Λ 的对角线上只能有一个非零.

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$.

由此可知 f 在正交变换下 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 下的标准形为 $3y_1^2$.

二. 选择题

1. **01 数一** 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 A 与 B ().

(A) 合同且相似. (B) 合同但不相似. (C) 不合同但相似. (D) 不合同且不相似.

解: 因为 A 是实对称矩阵, 所以存在正交矩阵 Q 使 $Q^T A Q = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_4 \end{bmatrix}$ 记为 Λ , 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ 由 A

的特征值. 又因为秩(A) = 1, $\text{Tr}(A) = 4$, 所以 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ 中有一个非零, 其余 3 个为零, 且 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = \text{Tr}(A) = 4$. 可见 A 的非零特征值等于 4. 因而 A 与 B 合同且相似. **选 A.**

2. **01 数三/四** 设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a_{14} & a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{24} & a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{34} & a_{33} & a_{32} & a_{31} \\ a_{44} & a_{43} & a_{42} & a_{41} \end{bmatrix}, P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 其

中 A 可逆, 则 B^{-1} 等于 ().

(A) $A^{-1} P_1 P_2$. (B) $P_1 A^{-1} P_2$. (C) $P_1 P_2 A^{-1}$. (D) $P_2 A^{-1} P_1$.

解: 因为 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{C}_2 \leftrightarrow \text{C}_3]{\text{C}_1 \leftrightarrow \text{C}_4} \begin{bmatrix} a_{14} & a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{24} & a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{34} & a_{33} & a_{32} & a_{31} \\ a_{44} & a_{43} & a_{42} & a_{41} \end{bmatrix} = B$, 根据初等列变换与右乘相应的初等矩

阵之间的关系可知 $B = A P_2 P_1$. 因而 $B^{-1} = (A P_2 P_1)^{-1} = P_1^{-1} P_2^{-1} A^{-1} = P_1 P_2 A^{-1}$. **选 C.**

[注] 由于本题中的 $P_1 P_2 = P_2 P_1$, 因而 $B = A P_1 P_2$ 也成立. 由此可以得到 $B^{-1} = (A P_1 P_2)^{-1} = P_2^{-1} P_1^{-1} A^{-1} =$

$P_2 P_1 A^{-1}$. 事实上, $P_2 P_1 A^{-1} = A P_1 P_2$.

3. **01 数三** 设 A 是 n 阶矩阵, α 是 n 维列向量, 若秩 $\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{bmatrix} = \text{秩}(A)$, 则线性方程组().

(A) $Ax = \alpha$ 必有无穷多解.

(B) $Ax = \alpha$ 必有唯一解.

(C) $\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0$ 仅有零解.


(D) $\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0$ 必有非零解.

解: 因为秩 $\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{bmatrix} = \text{秩}(A) \leq n < n+1$, 而 $\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{bmatrix}$ 的列数为 $n+1$, 即齐次线性方程组 $\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0$ 的系数矩阵的秩小于未知数的个数, 故 $\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0$ 必有非零解. **选D.**


[注] ① 取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\alpha = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 则秩 $\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{bmatrix} = \text{秩}(A) = 2$, 此时 $Ax = \alpha$ 只有唯一解, 故选项(A)被排除.

② 取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\alpha = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 则秩 $\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{bmatrix} = \text{秩}(A) = 1$, 此时 $Ax = \alpha$ 有无穷多解, $\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0$ 有非零解, 故选项(B)和(C)被排除.


4. **02 数一** 设有三张不同平面的方程 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = b_i$, $i = 1, 2, 3$, 它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都为 2, 则这三张平面可能的位置关系为().




(A)



(B)



(C)











(D)

解: 令 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$, 由条件可知方程组 $Ax = b$ 有无穷多解, 而且对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中只有一个解向量, 因而 $Ax = b$ 的通解形如 $x = t \begin{bmatrix} l \\ m \\ n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix}$, 其中 $\begin{bmatrix} l \\ m \\ n \end{bmatrix}$ 为 $Ax = 0$ 的基础解系, $\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix}$ 为 $Ax = b$ 的特解, t 为任意实数. 由此可见这三张平面交于一条直线, 交线的参数方程为

$$\begin{cases} x = lt + x_0, \\ y = mt + y_0, \\ z = nt + z_0. \end{cases} \quad \text{选B.}$$

[注] 令 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$, 则平面的方程 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = b_i$, $i = 1, 2, 3$ 的几种可能的位置关系如下:

秩(A)	秩(A, b)	$Ax=b$ 有多少解	三张平面的相对位置	示意图	例子(A, b) =
3	3	唯一解	交于一点		$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$
2	3	无解	无公共点且两两不平行		$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$
2	3	无解	无公共点且有两张平面平行		$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$
2	2	无穷多解	交于一直线且两两不重合		$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$
2	2	无穷多解	交于一直线, 其中两张平面重合		$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$
1	2	无解	无公共点, 相互平行且不重合		$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$
1	2	无解	无公共点, 有两张平面重合		$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$
1	1	无穷多解	三张平面重合		$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

6. **12 数二** 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 而向量 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则对于任意常数 k , 必有().

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性无关. (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性相关.

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性无关. (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性相关.

解: 假若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性相关, 则由“ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关”可知 $k\beta_1 + \beta_2$ 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示. 因而可设

$$k\beta_1 + \beta_2 = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3.$$

又因为 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 故可设

$$\beta_1 = t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2 + t_3\alpha_3.$$

于是有

$$\beta_2 = (k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3) - k\beta_1 = (k_1 - kt_1)\alpha_1 + (k_2 - kt_2)\alpha_2 + (k_3 - kt_3)\alpha_3.$$

这与“ β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示”矛盾. 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性无关. 选A.

[注] 根据上述分析, 选项(B)立即可以排除. 若取 $k = 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性相关, 故可排除(C); 若取 $k = 1$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性无关, 故可排除(D).

7. 02数三 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则线性方程组 $(AB)x = 0$ ().

- (A) 当 $n > m$ 时仅有零解. (B) 当 $n > m$ 时必有非零解.
(C) 当 $m > n$ 时仅有零解. (D) 当 $m > n$ 时必有非零解.

解: 因为 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 所以 AB 是 $m \times m$ 矩阵. 当 $m > n$ 时, 秩 $(AB) \leq$ 秩 $(A) \leq n < m$, 此时 $(AB)x = 0$ 必有非零解. 选D.

[注] 根据上述分析, 选项(C)立即可以排除. 若取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $AB = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$, 此时 $(AB)x = 0$ 有非零解, 故可排除(A); 若取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 此时 $(AB)x = 0$ 仅有零解, 故可排除(B).

8. 02数三 设 A 是 n 阶实对称矩阵, P 是 n 阶可逆矩阵, 已知 n 维列向量 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 则矩阵 $(P^{-1}AP)^T$ 属于特征值 λ 的特征向量是().

- (A) $P^{-1}\alpha$. (B) $P^T\alpha$. (C) $P\alpha$. (D) $(P^{-1})^T\alpha$.

解: 由条件可得 $A\alpha = \lambda\alpha$, $(P^{-1}AP)^T(P^T\alpha) = [P^T A^T (P^T)^{-1}](P^T\alpha) = P^T A\alpha = \lambda(P^T\alpha)$. 选B.

9. 02数四 设 A, B 为 n 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 对应的伴随矩阵, 分块矩阵 $C = \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}$, 则 C 的伴随矩阵 $C^* =$ ().

- (A) $\begin{bmatrix} |A|A^* & O \\ O & |B|B^* \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} |B|B^* & O \\ O & |A|A^* \end{bmatrix}$.
(C) $\begin{bmatrix} |A|B^* & O \\ O & |B|A^* \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{bmatrix}$.

解: $C^* = (C_{ij})_{2n \times 2n}$, 其中 C_{ij} 表示 C 中第 i 行第 j 列处的元素的代数余子式.

当时 $i, j \leq n$ 时, $C_{ij} = A_{ij}|B|$; 当时 $i, j > n$ 时, $C_{ij} = |A|B_{ij}$;

当时 $i \leq n$ 且 $j > n$ 时, $C_{ij} = 0$; 当时 $i > n$ 且 $j \leq n$ 时, $C_{ij} = 0$. 选D.

[注] 后两种情况可以通过分析分块矩阵的秩得出结论.

10. 03数一/二 设向量组I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则().

- (A) 当 $r < s$ 时, 向量组II必线性相关. (B) 当 $r > s$ 时, 向量组II必线性相关.
(C) 当 $r < s$ 时, 向量组I必线性相关. (D) 当 $r > s$ 时, 向量组I必线性相关.

解: 不妨设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 均为列向量. 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$, 由条件可知存在 $s \times r$ 矩阵 C 使得 $A = BC$. 于是当 $r > s$ 时, 秩 $(A) \leq$ 秩 $(C) \leq s < r$, 从而向量组I必线性相关. 选D.

[注] 取I: $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, II: $\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 可排除(A)和(C); 取I: $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, II: $\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 可排除(B).

11. 03数一 设有齐次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$, 其中 A, B 均为 $m \times n$ 矩阵, 现有4个命题:

若 $Ax = 0$ 的解均是 $Bx = 0$ 的解, 则秩 $(A) \geq$ 秩 (B) .

若秩 $(A) \geq$ 秩 (B) , 则 $Ax = 0$ 的解均是 $Bx = 0$ 的解.

若 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 则秩 $(A) =$ 秩 (B) .

若秩 $(A) =$ 秩 (B) , 则 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解.

以上命题中正确的是().

- (A) . (B) . (C) . (D) .

解: $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解 $\Rightarrow n-\text{秩}(A) \leq n-\text{秩}(B) \Rightarrow \text{秩}(A) \geq \text{秩}(B)$, 可见 正确, 进一步可见 正确.

取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, 则 $\text{秩}(A) = \text{秩}(B)$, $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 是 $Ax=0$ 的解但不是 $Bx=0$ 的解, 可见 不正确.

选B.

12. **03 数三** 设三阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{bmatrix}$, 若 A 的伴随矩阵的秩等于 1, 则必有().

(A) $a=b$ 或 $a+2b=0$. (B) $a=b$ 或 $a+2b \neq 0$.

(C) $a \neq b$ 且 $a+2b=0$. (D) $a \neq b$ 且 $a+2b \neq 0$.

解: 假设 $a=b$, 则 A 的伴随矩阵 $A^* = O$, 因而 $\text{秩}(A^*) = 0 \neq 1$, 可见 $a \neq b$.

假设 $a \neq b$ 且 $a+2b \neq 0$, 则 $|A| = \begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+2b & a+2b & a+2b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix} = (a+2b) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix} \xrightarrow{\times(-b)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & a-b \end{vmatrix}$

$= (a+2b) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & a-b \end{vmatrix} = (a+2b)(a-b)^2 \neq 0$, 此时由 $AA^* = |A|E$ 可推出 A^* 可逆, 因而 $\text{秩}(A^*) = 3 \neq 1$, 可见 $a+2b=0$. 选C.

[注] 对于一般的 n 阶方阵 A , 可以证明 $\text{秩}(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当秩}(A) = n \text{ 时}; \\ 1, & \text{当秩}(A) = n-1 \text{ 时}; \\ 0, & \text{当秩}(A) < n-1 \text{ 时}. \end{cases}$

13. **03 数三** 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均为 n 维向量, 下列结论 不正确 的是().

(A) 若对于任意一组不全为零的数 k_1, k_2, \dots, k_s , 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s \neq 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

(B) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则对于任意一组不全为零的数 k_1, k_2, \dots, k_s , 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$.

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分必要条件是此向量组的秩为 s .

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的必要条件是其中任意两个向量线性无关.

解: 取 $\alpha_1 = \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, 则 α_1, α_2 线性相关, 但对于 $k_1 = k_2 = 1$, 有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \neq 0$. 选B.

14. **03 数四** 设矩阵 $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. 已知矩阵 A 相似于 B , 则 $\text{秩}(A-2E)$ 与 $\text{秩}(A-E)$ 之和等于().

(A) 2.

(B) 3.

(C) 4.

(D) 5.

解: 因为矩阵 A 相似于 $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 所以 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)$. 由此可得 A 的特

征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$. 因而 $\text{秩}(A-2E) = 3$ (否则 $\text{秩}(A-2E) < 3 \Rightarrow |A-2E| = 0 \Rightarrow 2$ 是 A 的特征值). 又因为 B 是对称矩阵, 所以 B 相似于对角矩阵, 从而 A 也相似于对角矩阵, 可见 A 的二重特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 有两个线性无关的特征向量与之对应, 即齐次线性方程组 $(A-E)x = 0$ 的基础解系由两个线性无关的解向量构成, 故 $\text{秩}(A-E) = 1$. 综上所述, $\text{秩}(A-2E) + \text{秩}(A-E) = 3 + 1 = 4$. 选C.

另解: 因为矩阵 A 相似于 B , 所以 $A-2E$ 相似于 $B-2E, A-E$ 相似于 $B-E$.

于是 $\text{秩}(A-2E) + \text{秩}(A-E) = \text{秩}(B-2E) + \text{秩}(B-E) = 3 + 1 = 4$.

15. **04 数一/二** 设 A 是 3 阶方阵, 将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B , 再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C , 则满足 $AQ = C$ 的可逆矩阵 Q 为().

$$(A) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (B) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (C) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad (D) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

解: 根据初等列变换与右乘相应的初等矩阵之间的对应关系可知 $Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. 选

D.

16. 04 数一/二 设 A, B 为满足 $AB = O$ 的任意两个非零矩阵, 则必有().

- (A) A 的列向量组线性相关, B 的行向量组线性相关.
 (B) A 的列向量组线性相关, B 的列向量组线性相关.
 (C) A 的行向量组线性相关, B 的行向量组线性相关.
 (D) A 的行向量组线性相关, B 的列向量组线性相关.

解: $AB = O, B \neq O \Rightarrow Ax = 0$ 有非零解 $\Rightarrow A$ 的列向量组线性相关.

$AB = O, A \neq O \Rightarrow B^T A^T = O, A^T \neq O \Rightarrow B^T x = 0$ 有非零解 $\Rightarrow B^T$ 的列向量组线性相关 $\Rightarrow B$ 的行向量组线性相关. 选A.

[注] 取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 A, B 为满足 $AB = O$ 的非零矩阵, 其中 A 的行向量组线性无关,

B 的列向量组线性无关, 由此可以排除选项(B), (C), (D).

17. 04 数三/四 设 n 阶矩阵 A 与 B 等价, 则必有().

- (A) 当 $|A| = a (a \neq 0)$ 时, $|B| = a$. (B) 当 $|A| = a (a \neq 0)$ 时, $|B| = -a$.
 (C) 当 $|A| \neq 0$ 时, $|B| = 0$. (D) 当 $|A| = 0$ 时, $|B| = 0$.

解: n 阶矩阵 A 与 B 等价 \Rightarrow 秩(A) = 秩(B). 当 $|A| = 0$ 时, 秩(B) = 秩(A) $< n \Rightarrow |B| = 0$.

n 阶矩阵 A 与 B 等价 \Rightarrow 存在可逆矩阵 P, Q 使得 $B = PAQ$. 当 $|A| = 0$ 时, $|B| = |PAQ| = |P| \cdot |A| \cdot |Q| = 0$.

选D.

[注] 取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, 则 A 与 B 等价且 $|A| = 1 \neq 0, |B| = 2$. 由此可以排除选项(A), (B), (C).

18. 04 数三 设 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* \neq O$, 若 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的互不相等的解, 则对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系().

- (A) 不存在. (B) 仅含一个非零解向量.
 (C) 含有两个线性无关的解向量. (D) 含有三个线性无关的解向量.

解: n 阶矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* \neq O \Rightarrow A$ 有非零的 $n-1$ 阶子式 \Rightarrow 秩(A) $\geq n-1$.

若 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的互不相等的解, 则秩(A) $< n$.

综上所述, 可见秩(A) = $n-1$. 因此齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中仅含一个非零解向量. 选B.

19. 05 数一/二/三 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 , 则 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是().

- (A) $\lambda_1 \neq 0$. (B) $\lambda_2 \neq 0$. (C) $\lambda_1 = 0$. (D) $\lambda_2 = 0$.

解: $[\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)] = [\alpha_1, A\alpha_1 + A\alpha_2] = [\alpha_1, \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2] = [\alpha_1, \alpha_2] \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$.

λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, 对应的特征向量分别为 $\alpha_1, \alpha_2 \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2$ 线性无关.

$\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关 \Leftrightarrow 秩 $[\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)] = 2 \Leftrightarrow$ 秩 $\begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} = 2 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$ 可逆 $\Leftrightarrow \lambda_2 \neq 0$. 选B.

20. 05 数一/二 设 A 为 $n (n \geq 2)$ 阶可逆矩阵, 交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 则().

- (A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得矩阵 B^* . (B) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B^* .

(C) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得矩阵 $-B^*$. (D) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得矩阵 $-B^*$.

解: 用 P 表示由 n 阶单位矩阵交换第 1 行与第 2 行所得的初等矩阵.

交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 $B \Rightarrow B = PA$ 且 $|B| = -|A|$.

A 可逆 $\Rightarrow B$ 可逆且 $A^* = |A|A^{-1}$, $B^* = |B|B^{-1} = -|A|(PA)^{-1} = -|A|A^{-1}P^{-1} = -A^*P^{-1} \Rightarrow -B^* = A^*P^{-1} \Rightarrow$ 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得矩阵 $-B^*$. 选 C.

21. **05 数三** 设矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足 $A^* = A^T$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, A^T 为 A 的转置矩阵, 若 a_{11}, a_{12}, a_{13} 为三个相等的正数, 则 a_{11} 为().

(A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$. (B) 3. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\sqrt{3}$.

解: 矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足 $A^* = A^T \Rightarrow |A|E = AA^* = AA^T \Rightarrow |A|^2 = |A| \cdot |A|^T = |AA^T| = |A|^3 \Rightarrow |A| = 0$ 或 $1 \Rightarrow AA^T = O$ 或 E .

$$a_{11}, a_{12}, a_{13} \text{ 为三个相等的正数 (设 } a_{11} = a_{12} = a_{13} = a) \Rightarrow AA^T = \begin{bmatrix} a & a & a \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & * & * \\ a & * & * \\ a & * & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3a^2 & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow 3a^2 = 1 \Rightarrow a = \frac{\sqrt{3}}{3}. \text{ 选 A.}$$

22. **05 数四** 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 若 $B = E + AB, C = A + CA$, 则 $B - C$ 为().

(A) E . (B) $-E$. (C) A . (D) $-A$.

解: $B = E + AB \Rightarrow (E - A)B = E \Rightarrow B = (E - A)^{-1}$; $C = A + CA \Rightarrow C(E - A) = A \Rightarrow C = A(E - A)^{-1}$.

综上所述, $B - C = (E - A)^{-1} - A(E - A)^{-1} = (E - A)(E - A)^{-1} = E$. 选 A.

23. **06 数一/二** 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均为 n 维列向量, A 是 $m \times n$ 矩阵, 下列选项正确的是().

(A) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关.

(B) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关.

(C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关.

(D) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关.

解: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关 \Rightarrow 秩 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) < s$

\Rightarrow 秩 $(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s) =$ 秩 $[A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)] \leq$ 秩 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) < s \Rightarrow A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关.

选 A.

[注] 由上面的分析可以立即排除选项(B). 取 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, α_1, α_2 线性无关, $A\alpha_1, A\alpha_2$ 也

线性无关. 由此可以排除选项(C). 取 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, α_1, α_2 线性无关, $A\alpha_1, A\alpha_2$ 线性相关.

由此可以排除选项(D).

24. **06 数一/二/三/四** 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B , 再将 B 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列

得 C , 记 $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则().

(A) $C = P^{-1}AP$. (B) $C = PAP^{-1}$. (C) $C = P^TAP$. (D) $C = PAP^T$.

解: $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. 由条件可知, $C = BP^{-1} = PAP^{-1}$. 选 B.

25. **07 数一/二/三/四** 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性相关的是().

(A) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$.

(B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$.

(C) $\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1$.

(D) $\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1$.

解: 不妨设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为列向量, 则 $(\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P$, 其中 $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 的秩为 2

\Rightarrow 秩 $(\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1) \leq$ 秩 $(P) = 2 < 3 \Rightarrow \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关. 选 A.

[注] $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 可逆.

又因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关. 类似地可以说明选项 (C), (D) 中的向量组线性无关.

26. 08 数一/二/三/四 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 A 与 B ().

(A) 合同且相似. (B) 合同但不相似. (C) 不合同但相似. (D) 既不合同也不相似.

解: $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \text{第1行} \times (-1) \\ \text{第2行} \times (-1) \\ \text{第3行} \times (-1) \end{smallmatrix}} \begin{vmatrix} \lambda & \lambda & \lambda \\ 1 & \lambda - 2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \text{第1行} \times (-1) \\ \text{第2行} \times (-1) \\ \text{第3行} \times (-1) \end{smallmatrix}} = \lambda \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 3)^2.$

由此可得 A 的特征值为 3, 3, 0. 又因为 A 是实对称矩阵, 所以 A 的合同规范形为 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. 但 A 与 B 不相似. 选 B.

[注] 两个同阶方阵 A 与 B 相似的必要条件有:

① $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$; ② A 与 B 有相同的特征值; ③ 秩 $(A) =$ 秩 (B) ; ④ 迹 $(A) =$ 迹 (B) ; ⑤ $|A| = |B|$.

两个同阶方阵 A 与 B 相似的充分必要条件有:

① [定义] 存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$; ② A 与 B 有相同的相似标准形.

两个同阶方阵 A 与 B 合同的必要条件有:

① A 与 B 有相同的对称性; ② 秩 $(A) =$ 秩 (B) .

两个同阶实对称矩阵 A 与 B 合同的充分必要条件有:

① [定义] 存在可逆矩阵 C 使得 $C^T AC = B$; ② 秩 $(A) =$ 秩 (B) 且 A 与 B 有相同的正惯性指数; ③ A 与 B 有相同的合同标准形; ④ A 与 B 有相同的合同规范形.

27. 08 数一/二/三/四 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵. 若 $A^3 = O$, 则 ().


(A) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 不可逆. (B) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆.

(C) $E - A$ 可逆, $E + A$ 可逆. (D) $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆.

解: 设 $A\xi = \lambda\xi$, 其中 ξ 为 n 维非零向量, 则 $\lambda^3\xi = A^3\xi = O\xi = O$. 由此可得 $\lambda^3 = 0$, 从而 $\lambda = 0$. 这就是说 A 的特征值一定为零. 所以 $|E - A| \neq 0$ (否则 1 是 A 的特征值), $|E + A| \neq 0$ (否则 -1 是 A 的特征值). 可见 $E - A$ 和 $E + A$ 都可逆. 事实上, $(E - A)(E + A + A^2) = E$, $(E + A)(E - A + A^2) = E$. 选 C.

28. 08 数一 设 A 为 3 阶实对称矩阵, 如果二次曲面方程 $(x, y, z)A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 1$ 在正交变换下的标准方程的图形如图, 则 A 的正特征值个数为 ().

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.



解: 由此曲面的标准方程的图形可知此二次曲面为双叶双曲面, 故 A 的正特征值个数为 1. **选B.**

[注] 二次曲面的分类及相应的图形可参见《线性代数学习指导》(张小向, 陈建龙 编, 科学出版社, 2008) 或《几何与代数》(周建华, 陈建龙, 张小向 编, 科学出版社, 2009).

29. **08 数二/三/四** 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, 则在实数域上与 A 合同的矩阵为().

- (A) $\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$.

解: 设 A 与 B 合同, 则存在可逆矩阵 C 使得 $C^T A C = B$. 于是有

$$|B| = |C^T A C| = |C^T| \cdot |A| \cdot |C| = |C| \cdot |A| \cdot |C| = |A| \cdot |C|^2 = -3|C|^2 < 0.$$

而(A), (B), (C), (D)四个选项中只有 $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ 的行列式为 $-3 < 0$. 事实上取 $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, 则有

$$C^T A C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

选D.

[注] 本题涉及到的矩阵都是实对称矩阵. 设 A 的特征值为 λ_1, λ_2 , 则 $\lambda_1 \lambda_2 = |A| = -3 < 0$. 可见 λ_1, λ_2 中一正一负. 因而 A 的秩为 2, 正惯性指数为 1. 故 A 与 B 合同的充分必要条件是: B 为 2 阶实对称矩阵且 $|B| < 0$.

30. **09 数一** 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维向量空间 \mathbf{R}^3 的一组基, 则由基 $\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3$ 到基 $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3+\alpha_1$ 的过渡矩阵为().

- (A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$.

解: 设所求的过渡矩阵为 P , 即 $(\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3+\alpha_1) = (\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3)P$, 亦即

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix} P,$$

其中 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 是可逆矩阵, 故 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix} P$. 由此可得

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}. \text{ 选A.}$$

31. **09 数一/二/三** 设 A, B 为 2 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 若 $|A| = 2, |B| = 3$, 则分块矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}$ 的伴随矩阵为().

- (A) $\begin{bmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{bmatrix}$.

解: A, B 为 2 阶矩阵, $|A| = 2, |B| = 3 \Rightarrow \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix} = 6, A^{-1} = \frac{1}{2}A^*, B^{-1} = \frac{1}{3}B^*.$

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^* \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & O \\ O & E \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} E & O \\ O & E \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^* &= 6 \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^{-1} = 6 \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} O & \frac{1}{3}B^* \\ \frac{1}{2}A^* & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{bmatrix}. \text{选B.} \end{aligned}$$

32. **09数二/三** 设 A, P 均为 3 阶矩阵, P^T 为 P 的转置矩阵, 且 $P^T A P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $Q^T A Q$ 为 ().

(A) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

解: $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

$$Q^T A Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} P^T A P \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}. \text{选A.}$$

33. **10数一** 设 A 为 $m \times n$ 型矩阵, B 为 $n \times m$ 型矩阵, E 为 m 阶单位矩阵, 若 $AB = E$, 则 ().

(A) 秩 $r(A) = m$, 秩 $r(B) = m$. (B) 秩 $r(A) = m$, 秩 $r(B) = n$.
(C) 秩 $r(A) = n$, 秩 $r(B) = m$. (D) 秩 $r(A) = n$, 秩 $r(B) = n$.

解: $m = r(E) = r(AB) \leq r(A) \leq m \Rightarrow r(A) = m$, $m = r(E) = r(AB) \leq r(B) \leq m \Rightarrow r(B) = m$. 选A.

34. **10数一/二/三** 设 A 为 4 阶对称矩阵, 且 $A^2 + A = O$, 若 A 的秩为 3, 则 A 相似于 ().

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

解: 首先, A 为对称矩阵 $\Rightarrow A$ 相似于对角矩阵 Λ (对角线上的元素为 A 的特征值).

其次, $A^2 + A = O \Rightarrow A$ 的特征值 λ 满足 $\lambda^2 + \lambda = 0$

(事实上, 设 ξ 为对应的特征向量, 即 $\xi \neq 0$ 且 $A\xi = \lambda\xi$, 则

$$(\lambda^2 + \lambda)\xi = \lambda(\lambda\xi) + \lambda\xi = \lambda(A\xi) + A\xi = A(\lambda\xi) + A\xi = A(A\xi) + A\xi = (A^2 + A)\xi = O\xi = 0$$

故 $\lambda^2 + \lambda = 0$)

$\Rightarrow A$ 的特征值 $\lambda = -1$ 或 0 .

最后, A 的秩为 3 $\Rightarrow \Lambda$ 的秩为 3.

综上所述, A 相似于 $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. 选D.

35. **10数二/三** 设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 下列命题正确的是 ().

(A) 若向量组 I 线性无关, 则 $r \leq s$. (B) 若向量组 I 线性相关, 则 $r > s$.
(C) 若向量组 II 线性无关, 则 $r \leq s$. (D) 若向量组 II 线性相关, 则 $r > s$.

解: 首先, 向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示 \Rightarrow 秩(I) \leq 秩(II).

其次, 向量组 I 线性无关 \Rightarrow 秩(I) = r .

故 $r =$ 秩(I) \leq 秩(II) $\leq s$. 可见命题(A)正确.

下面说明其他 3 个命题不正确.

- ① 取 $r=2, s=3, \alpha_1=\alpha_2=\beta_1=\beta_2=\beta_3$,
 则向量组 I: α_1, α_2 可由向量组 II: $\beta_1=\beta_2=\beta_3$ 线性表示, 且向量组 I 线性相关, 但 $r>s$ 不成立.
 可见命题(B)不正确.
- ② 取 $r=3, s=2, \alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=(0,0)^T, \beta_1=(1,0)^T, \beta_2=(0,1)^T$,
 则向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由向量组 II: β_1, β_2 线性表示, 且向量组 II 线性无关, 但 $r\leq s$ 不成立.
 可见命题(C)不正确.
- ③ 取 $r=2, s=3, \alpha_1=\alpha_2=\beta_1=\beta_2=\beta_3$,
 则向量组 I: α_1, α_2 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 且向量组 II 线性相关, 但 $r>s$ 不成立.
 可见命题(D)不正确.

选A.

36. **II 数一/二/三** 设 A 为三阶矩阵, 将 A 的第二列加到第一列得到矩阵 B , 再交换 B 的第二行与第三行得到单

位矩阵, 记 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A = ()$.

- (A) $P_1 P_2$. (B) $P_1^{-1} P_2$. (C) $P_2 P_1$. (D) $P_2 P_1^{-1}$.

解: 根据初等变换与初等矩阵的关系以及题目条件可得 $P_2(AP_1) = E$. 故 $A = P_2^{-1}P_1^{-1} = P_2P_1^{-1}$.

选D.

37. **II 数一/二** 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系可为 ().

- (A) α_1, α_2 . (B) α_1, α_3 . (C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

解: 因为 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 且 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程 $Ax = 0$ 的一个基础解系,

所以秩 $(A) = 3$, 且 $\alpha_1 + \alpha_3 = 1\alpha_1 + 0\alpha_2 + 1\alpha_3 + 0\alpha_4 = A(1, 0, 1, 0)^T = 0$.

由秩 $(A) = 3$ 可知 $|A| = 0$, 且 A 中存在 3 阶非零子式, 因而 $A^* \neq O$, 故秩 $(A^*) \geq 1$.

同时由 $A^*A = |A|E = 0E = O$ 可知, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 都是 $A^*x = 0$ 的解,

因而由秩 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$ 可知秩 $(A^*) \leq 1$.

于是可得秩 $(A^*) = 1$.

因此 $A^*x = 0$ 的任意 3 个线性无关的解向量都构成 $A^*x = 0$ 的基础解系.

另一方面, 由 $\alpha_1 + \alpha_3 = 0$ 可见 $\alpha_1 = -\alpha_3$, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

于是结合秩 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$ 可知 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关.

事实上, 由 $\alpha_1 = -\alpha_3$ 可见 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 能由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示,

因而 $3 = \text{秩}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \leq \text{秩}(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \leq 3$, 故秩 $(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$, 即 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关.

综上所述, $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 可作为 $A^*x = 0$ 的基础解系.

选D.

38. **II 数三** 设 A 为 4×3 矩阵, η_1, η_2, η_3 是非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的三个线性无关的解, k_1, k_2 为任意实数, 则 $Ax = \beta$ 的通解为 ().

- (A) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1)$. (B) $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_2(\eta_2 - \eta_1)$.
 (C) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_3 - \eta_1) + k_2(\eta_2 - \eta_1)$. (D) $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_3 - \eta_1) + k_2(\eta_2 - \eta_1)$.

解: 首先, 由条件可知 $A\eta_1 = \beta, A\eta_2 = \beta, A\eta_3 = \beta$, 因而

$$A(\eta_2 + \eta_3) = A\eta_2 + A\eta_3 = \beta + \beta = 2\beta, \quad A\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} = \beta,$$

$$A(\eta_2 - \eta_1) = A\eta_2 - A\eta_1 = \beta - \beta = 0, \quad A(\eta_3 - \eta_1) = A\eta_3 - A\eta_1 = \beta - \beta = 0,$$

这就是说, $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2}$ 是 $Ax = \beta$ 的一个特解, $\eta_2 - \eta_1$ 和 $\eta_3 - \eta_1$ 都是齐次线性组方程 $Ax = 0$ 的解.

其次, $\eta_2 - \eta_1$ 与 $\eta_3 - \eta_1$ 线性无关.

事实上, 假若 $\eta_2 - \eta_1$ 与 $\eta_3 - \eta_1$ 线性相关, 则 $\eta_1, \eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_1$ 线性相关, 因而 $\text{秩}(\eta_1, \eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_1) < 3$. 但 η_1, η_2, η_3 线性无关, 因而 $\text{秩}(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = 3$.

而 $(\eta_1, \eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_1) = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 其中 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 可逆.

故 $\text{秩}(\eta_1, \eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_1) = \text{秩}(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = 3$, 这与 $\text{秩}(\eta_1, \eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_1) < 3$ 矛盾!

最后, $\text{秩}(A) = 1$.

事实上, 一方面, 设 $\text{秩}(A) = r$, 则齐次线性组方程 $Ax = 0$ 只能有 $3-r$ 个线性无关的解, 由上一步可知 $3-r \geq 2$, 故 $r \leq 1$.

另一方面, $A \neq O$ (否则 $A = O \Rightarrow$ 非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 无解, 这与已知条件矛盾), 故 $\text{秩}(A) \geq 1$.

综上所述, $\eta_2 - \eta_1, \eta_3 - \eta_1$ 是齐次线性组方程 $Ax = 0$ 的一个基础解系, $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2}$ 是 $Ax = \beta$ 的一个特解,

因而 $Ax = \beta$ 的通解为 $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_3 - \eta_1) + k_2(\eta_2 - \eta_1)$.

三. 计算题

1. **01 数一** 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, $\beta_1 = t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2, \beta_2 = t_1\alpha_2 + t_2\alpha_3, \dots, \beta_s = t_1\alpha_s + t_2\alpha_1$, 其中 t_1, t_2 为实常数. 试问 t_1, t_2 满足什么关系时 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也为线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系.

解: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系 $\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

$$\beta_1 = t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2, \beta_2 = t_1\alpha_2 + t_2\alpha_3, \dots, \beta_s = t_1\alpha_s + t_2\alpha_1 \Rightarrow (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \begin{bmatrix} t_1 & 0 & 0 & \cdots & t_2 \\ t_2 & t_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & t_2 & t_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & t_1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{令 } P = \begin{bmatrix} t_1 & 0 & 0 & \cdots & t_2 \\ t_2 & t_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & t_2 & t_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & t_1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \text{ 也为线性方程组 } Ax = 0 \text{ 的一个基础解系} \Leftrightarrow \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \text{ 也线性无关} \Leftrightarrow P \text{ 可逆} \Leftrightarrow |P| \neq 0.$$

$$\begin{aligned} \text{而 } |P| &= \begin{vmatrix} t_1 & 0 & 0 & \cdots & t_2 \\ t_2 & t_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & t_2 & t_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & t_1 \end{vmatrix}_{s \times s} = t_1 \begin{vmatrix} t_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ t_2 & t_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & t_2 & t_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & t_1 \end{vmatrix}_{(s-1) \times (s-1)} - t_2 \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & t_2 \\ t_2 & t_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & t_2 & t_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & t_1 \end{vmatrix}_{(s-1) \times (s-1)} \\ &= t_1^s - t_2(-1)^s t_2 \begin{vmatrix} t_2 & t_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & t_2 & t_1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & t_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & t_2 \end{vmatrix}_{(s-2) \times (s-2)} = t_1^s + (-1)^{s+1} t_2^s. \end{aligned}$$

当 s 为偶数时, $|P| = t_1^s - t_2^s$, 此时 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也为线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系 $\Leftrightarrow t_1 \neq \pm t_2$.

当 s 为奇数时, $|P| = t_1^s + t_2^s$, 此时 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也为线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系 $\Leftrightarrow t_1 \neq -t_2$.

2. **01 数一** 已知 3 阶矩阵 A 与三维向量 x 使得向量组 x, Ax, A^2x 线性无关, 且满足 $A^3x = 3Ax - 2A^2x$.

(1) 记 $P = (x, Ax, A^2x)$, 求 3 阶矩阵 B 使 $A = PBP^{-1}$.

(2) 计算行列式 $|A + E|$.

解: (1) 因为 $AP = A(x, Ax, A^2x) = (Ax, A^2x, A^3x) = (Ax, A^2x, 3Ax - 2A^2x) = (x, Ax, A^2x) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$.

$$\text{所以 } B = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

$$(2) |A + E| = |PBP^{-1} + E| = |P(B + E)P^{-1}| = |P| \cdot |B + E| \cdot |P^{-1}| = |P| \cdot |B + E| \cdot |P|^{-1} = |B + E| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -4.$$

3. **01 数二** 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 且矩阵 X 满足 $AXA + BXB = AXB + BXA + E$, 其中 E 是

3 阶单位矩阵, 求 X .

解: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A - B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow (A - B)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$

$$AXA + BXB = AXB + BXA + E \Rightarrow (A - B)X(A - B) = E \Rightarrow X = (A - B)^{-2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

4. **01 数二** 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 若 $\beta_1 = \alpha_1 + t\alpha_2$, $\beta_2 = \alpha_2 + t\alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_3 + t\alpha_4$, $\beta_4 = \alpha_4 + t\alpha_1$, 讨论实数 t 满足什么条件时 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 也为线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系.

解: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系 $\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关.

$$\beta_1 = \alpha_1 + t\alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + t\alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + t\alpha_4, \beta_4 = \alpha_4 + t\alpha_1 \Rightarrow (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t \\ t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & t & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{令 } P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t \\ t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & t & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } |P| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & t \\ t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & t & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ t & 1 & 0 \\ 0 & t & 1 \end{vmatrix} - t \begin{vmatrix} 0 & 0 & t \\ t & 1 & 0 \\ 0 & t & 1 \end{vmatrix} = 1 - t^4.$$

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 也为线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系 $\Leftrightarrow \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 也线性无关 $\Leftrightarrow P$ 可逆 $\Leftrightarrow |P| \neq 0 \Leftrightarrow t \neq \pm 1$.

5. **01 数三/四** 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax = \beta$ 有解但不唯一, 试求

(1) a 的值. (2) 正交矩阵 Q 使 $Q^T A Q$ 为对角矩阵.

解: (1) $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2+a & 2+a & 2+a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} = (2+a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} = (2+a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ a-1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -(2+a)(a-1)^2.$

当 $a \neq -2$ 且 $a \neq 1$ 时, $|A| \neq 0$, 此时线性方程组 $Ax = \beta$ 有唯一解;

$$\text{当 } a = -2 \text{ 时, } (A, \beta) = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & -2 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} \text{第2行} - \text{第1行} \\ \text{第3行} + 2 \times \text{第1行} \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} \text{第2行} \times (-1/3) \\ \text{第1行} + \text{第2行} \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

此时秩(A) = 秩(A, β) = 2 < 3, 线性方程组 $Ax = \beta$ 有解但不唯一;

$$\text{当 } a=1 \text{ 时, } (A, \beta) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times(-1) \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

此时秩\$(A)=1\$, 秩\$(A, \beta)=2\$, 线性方程组 \$Ax=\beta\$ 无解.

根据题设条件可知 \$a=-2\$.

$$(2) |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 2 \\ -1 & \lambda+2 & -1 \\ 2 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{vmatrix} \lambda & \lambda & \lambda \\ -1 & \lambda+2 & -1 \\ 2 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & \lambda+2 & -1 \\ 2 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times 1 \\ \times(-2) \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda+3 & 0 \\ 0 & -3 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-3)(\lambda+3)\lambda.$$

由此可得 \$A\$ 的特征值为 \$\lambda_1=3, \lambda_2=-3, \lambda_3=0\$.

\$(3E-A)x=0\$ 的一个基础解系为 \$\xi_1=(-1, 0, 1)^T\$.

\$(-3E-A)x=0\$ 的一个基础解系为 \$\xi_2=(1, -2, 1)^T\$.

\$(0E-A)x=0\$ 的一个基础解系为 \$\xi_3=(1, 1, 1)^T\$.

\$\xi_1, \xi_2, \xi_3\$ 是两两正交的. \$\|\xi_1\|=\sqrt{2}, \|\xi_2\|=\sqrt{6}, \|\xi_3\|=\sqrt{3}\$.

$$\text{令 } q_1 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T, q_2 = \left(\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6}\right)^T, q_3 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)^T,$$

$$Q = (q_1, q_2, q_3) = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}, \text{ 则 } Q \text{ 为正交矩阵且 } Q^T A Q = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

6. **01 数三** 设 \$A\$ 为 \$n\$ 阶实对称阵, 秩\$(A)=n\$, \$A_{ij}\$ 是 \$A=(a_{ij})_{n \times n}\$ 中元素 \$a_{ij}\$ 的代数余子式 \$(i, j=1, 2, \dots, n)\$, 二次型 \$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{|A|} x_i x_j\$.

(1) 记 \$x=(x_1, x_2, \dots, x_n)^T\$, 把 \$f(x_1, x_2, \dots, x_n)\$ 写成矩阵形式, 并证明二次型 \$f(x)\$ 的矩阵为 \$A^{-1}\$.

(2) 二次型 \$g(x)=x^T A x\$ 与 \$f(x)\$ 的规范形是否相同? 说明理由.

解: (1) 因为 \$A\$ 为 \$n\$ 阶实对称阵, 秩\$(A)=n\$, 所以 \$|A| \neq 0\$ 且 \$A\$ 可逆. 于是由 \$AA^*=|A|E\$ 可知 \$A^*=|A|A^{-1}\$ (其中 \$A^*\$ 为 \$A\$ 的伴随矩阵, \$E\$ 为 \$n\$ 阶单位矩阵), 而且由

$$(A^{-1})^T A = (A^{-1})^T A^T = (AA^{-1})^T = E^T = E$$

可知 \$(A^{-1})^T = A^{-1}\$, 即 \$A^{-1}\$ 也是对称矩阵.

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{|A|} x_i x_j = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{bmatrix} \frac{A_{11}}{|A|} & \frac{A_{12}}{|A|} & \dots & \frac{A_{1n}}{|A|} \\ \frac{A_{21}}{|A|} & \frac{A_{22}}{|A|} & \dots & \frac{A_{2n}}{|A|} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{A_{n1}}{|A|} & \frac{A_{n2}}{|A|} & \dots & \frac{A_{nn}}{|A|} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},$$

$$\text{其中} \begin{bmatrix} \frac{A_{11}}{|A|} & \frac{A_{12}}{|A|} & \cdots & \frac{A_{1n}}{|A|} \\ \frac{A_{21}}{|A|} & \frac{A_{22}}{|A|} & \cdots & \frac{A_{2n}}{|A|} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{A_{n1}}{|A|} & \frac{A_{n2}}{|A|} & \cdots & \frac{A_{nn}}{|A|} \end{bmatrix} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} = \frac{1}{|A|} (A^*)^T = \frac{1}{|A|} (|A|A^{-1})^T = A^{-1}.$$

由此可见二次型 $f(x)$ 的矩阵为 A^{-1} .

(2) 设 A 的正负惯性指数分别为 p, q , 则由 $\text{秩}(A) = n$ 可知 $p + q = n$, 于是存在可逆矩阵 C 使得

$$C^T A C = \begin{bmatrix} E_p & O \\ O & -E_q \end{bmatrix},$$

其中 E_p, E_q 分别为 p 阶, q 阶单位矩阵. 从而有

$$C^{-1} A^{-1} (C^{-1})^T = C^{-1} A^{-1} (C^T)^{-1} = (C^T A C)^{-1} = \begin{bmatrix} E_p & O \\ O & -E_q \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} E_p & O \\ O & -E_q \end{bmatrix},$$

可见二次型 $g(x) = x^T A x$ 与 $f(x)$ 的规范形是否相同.

7. **01 数四** 设 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})^T$ ($i = 1, 2, \dots, r; r < n$)是 n 维实向量, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关. 已知 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 是线性方程组
- $$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + \cdots + a_{rn}x_n = 0 \end{cases}$$
- 的非零解向量. 试判断向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta$ 的

线性相关性.

解: 假若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta$ 线性相关, 则由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关可知 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示. 于是可设

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r), \beta = A\gamma.$$

又因为 β 是线性方程组 $A^T x = 0$ 的解, 即 $A^T \beta = 0$, 从而有 $\|\beta\|^2 = \beta^T \beta = (A\gamma)^T \beta = \gamma^T A^T \beta = 0$. 这与 β 是非零向量矛盾! 此矛盾表明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta$ 是线性无关的.

8. **02 数一/二** 已知4阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 均为4维向量, 其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, 如果 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 求线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

解: $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关 \Rightarrow 秩 $(A) = \text{秩}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \geq 3$.

$$\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3 \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \text{ 线性相关} \Rightarrow \text{秩}(A) = \text{秩}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) < 4.$$

综上可知秩 $(A) = 3$, 因而齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中只有一个解向量.

$$\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3 \Rightarrow \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 + 0\alpha_4 = 0 \Rightarrow \xi = (1, -2, 1, 0)^T \text{ 是 } Ax = 0 \text{ 的非零解.}$$

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 \Rightarrow \eta^* = (1, 1, 1, 1)^T \text{ 是 } Ax = \beta \text{ 的特解.}$$

因而 $Ax = \beta$ 的通解为 $\eta = k(1, -2, 1, 0)^T + (1, 1, 1, 1)^T$, 其中 k 为任意实数.

9. **02 数三** 设齐次线性方程组
- $$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0, \\ bx_1 + ax_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ bx_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + ax_n = 0, \end{cases}$$
- 其中 $a \neq 0, b \neq 0, n \geq 2$. 试讨论 a, b 为何值时,

方程组仅有零解, 有无穷多组解? 在有无穷多组解时, 求出全部解, 并用基础解系表示全部解.

解: 令 $A = \begin{bmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{bmatrix}$, 则 $|A| = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a + (n-1)b & a + (n-1)b & \cdots & a + (n-1)b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$

$$= [a+(n-1)b] \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{bmatrix} = [a+(n-1)b] \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a-b \end{bmatrix} = [a+(n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

当 $a \neq (1-n)b$ 且 $a \neq b$ 时, $|A| \neq 0$, 此时方程组仅有零解.

$$\begin{aligned} \text{当 } a = (1-n)b \text{ 时, } A &= \begin{bmatrix} (1-n)b & b & \cdots & b \\ b & (1-n)b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & (1-n)b \end{bmatrix} \begin{matrix} \times \frac{1}{b} \\ \times \frac{1}{b} \\ \vdots \\ \times \frac{1}{b} \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1-n & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1-n & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1-n \end{bmatrix} \rightarrow \\ &\begin{bmatrix} 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -1 & \cdots & -1 & n-1 \\ 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -1 & \cdots & -1 & n-1 \\ 0 & -n & \cdots & 0 & n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -n & n \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \times (-1) \\ \times (-\frac{1}{n}) \\ \vdots \\ \times (-\frac{1}{n}) \end{matrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \times (-1) \\ \vdots \\ \times (-1) \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 由此可得 } Ax=0 \text{ 的一个基础解系} \\ &\xi = (1, 1, \dots, 1)^T, \end{aligned}$$

以及通解

$$x = k(1, 1, \dots, 1)^T,$$

其中 k 为任意实数.

$$\begin{aligned} \text{当 } a = b \text{ 时, } A &= \begin{bmatrix} b & b & \cdots & b \\ b & b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & b \end{bmatrix} \begin{matrix} \times \frac{1}{b} \\ \times \frac{1}{b} \\ \vdots \\ \times \frac{1}{b} \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \times (-1) \\ \leftarrow \\ \vdots \\ \leftarrow \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \text{ 由此可得 } Ax=0 \text{ 的一个基础} \\ &\text{解系} \end{aligned}$$

$$\xi_1 = (-1, 1, 0, \dots, 0)^T, \xi_2 = (-1, 0, 1, \dots, 0)^T, \dots, \xi_{n-1} = (-1, 0, 0, \dots, 1)^T,$$

以及通解

$$x = k_1(-1, 1, 0, \dots, 0)^T + k_2(-1, 0, 1, \dots, 0)^T + \dots + k_{n-1}(-1, 0, 0, \dots, 1)^T,$$

其中 k_1, k_2, \dots, k_{n-1} 为任意实数.

10. **02 数三** 设 A 为三阶实对称矩阵, 且满足条件 $A^2 + 2A = O$. 已知 A 的秩 $r(A) = 2$.

(1) 求 A 的全部特征值.

(2) 当 k 为何值时, 矩阵 $A + kE$ 为正定矩阵, 其中 E 为三阶单位矩阵.

解: (1) A 为三阶实对称矩阵 \Rightarrow 存在正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$, 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 为 A 的特征值.

A 的秩 $r(A) = 2 \Rightarrow \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 中有两个非零, 一个为零. 不妨设 $\lambda_3 = 0$.

$A^2 + 2A = O \Rightarrow A$ 的特征值满足 $\lambda^2 + 2\lambda = 0$.

(事实上, 设 $\xi \neq 0$ 且 $A\xi = \lambda\xi$, 则 $(\lambda^2 + 2\lambda)\xi = (A^2 + 2A)\xi = O\xi = 0$, 因而 $\lambda^2 + 2\lambda = 0$.)

于是得 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$.

(2) 由(1)可知 $Q^T(A + kE)Q = Q^T A Q + Q^T kE Q = Q^T A Q + kE = \begin{bmatrix} -2+k & 0 & 0 \\ 0 & -2+k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{bmatrix}$. 因此 $A + kE$ 为正定矩阵 $\Leftrightarrow k > 2$.

11. **02 数四** 设四元齐次线性方程组(I)为

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

且已知另一四元齐次线性方程组(II)的一个基础解系为

$$\alpha_1 = (2, -1, a+2, 1)^T, \alpha_2 = (-1, 2, 4, a+8)^T.$$

(1)求方程组(I)的一个基础解系.

(2)当 a 为何值时, 方程组(I)与(II)有非零公共解? 在有非零公共解时, 求出全部非零公共解.

解: (1) $\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}.$

由此可得方程组(I)的一个基础解系:

$$\xi_1 = (5, -3, 1, 0)^T, \xi_2 = (-3, 2, 0, 1)^T.$$

(2) 方程组(I)与(II)有非零公共解 \Leftrightarrow 存在不全为零的数 k_1, k_2 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ 是方程组(I)的解

$$\Leftrightarrow \text{存在不全为零的数 } k_1, k_2 \text{ 使得 } \begin{cases} -(a+1)k_1 = 0 \\ (a+1)k_1 - (a+1)k_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} -a-1 & 0 \\ a+1 & -a-1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (1+a)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow a = -1.$$

当 $a = -1$ 时, $\begin{cases} -(a+1)k_1 = 0 \\ (a+1)k_1 - (a+1)k_2 = 0 \end{cases}$ 对于任意不全为零的数 k_1, k_2 都成立, 因此方程组(I)与(II)的全部非零公共解为 $\mathbf{x} = k_1(2, -1, 1, 1)^T + k_2(-1, 2, 4, 7)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意不全为零的数.

12. **02 数四** 设实对称矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{bmatrix}$, 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵, 并计算行列式 $|A-E|$ 的值.

解: $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-a & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-a \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} R_2 \leftrightarrow R_1 \\ R_3 \leftrightarrow R_1 \end{smallmatrix}} \begin{vmatrix} \lambda-a & -1 & -1 \\ \lambda-a-1 & \lambda-a-1 & 0 \\ -1 & 1 & \lambda-a \end{vmatrix} = (\lambda-a-1) \begin{vmatrix} \lambda-a & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & \lambda-a \end{vmatrix}$

$$= (\lambda-a-1) \begin{vmatrix} \lambda-a+1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & \lambda-a \end{vmatrix} = (\lambda-a-1) \begin{vmatrix} \lambda-a+1 & -1 \\ -2 & \lambda-a \end{vmatrix} = (\lambda-a-1)^2(\lambda-a+2).$$

由此可得 A 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = a+1, \lambda_3 = a-2$.

$$\lambda_1 E - A = (a+1)E - A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} R_2 \leftrightarrow R_1 \\ R_3 \leftrightarrow R_1 \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 由此可得 } (\lambda_1 E - A)\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ 的一个基础解系:}$$

$$\xi_1 = (1, 1, 0)^T, \xi_2 = (1, 0, 1)^T.$$

$$\lambda_3 E - A = (a-2)E - A = \begin{bmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} R_2 \leftrightarrow R_1 \\ R_3 \leftrightarrow R_1 \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} R_2 \times (-1) \\ R_3 \times (-1) \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} R_2 \times 1 \\ R_3 \times 2 \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} R_3 \times (-1) \\ R_3 \times (-\frac{1}{3}) \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} R_2 \times (-\frac{1}{3}) \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

由此可得 $(\lambda_3 E - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系:

$$\xi_3 = (-1, 1, 1)^T.$$

$$\text{令 } P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3), \text{ 则 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} a+1 & 0 & 0 \\ 0 & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & a-2 \end{bmatrix}.$$

$$|A-E| = |P|^{-1} \cdot |A-E| \cdot |P| = |P|^{-1} \cdot |A-E| \cdot |P| = |P|^{-1} (A-E)P = |P|^{-1}AP - P^{-1}EP = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a-3 \end{vmatrix} = a^2(a-3).$$

13. **03 数一** 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = P^{-1}A^*P$, 求 $B+2E$ 的特征值与特征向量, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 为 3 阶单位矩阵.

解: $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda-3 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\leftarrow} \begin{vmatrix} \lambda-7 & \lambda-7 & \lambda-7 \\ -2 & \lambda-3 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-7) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & \lambda-3 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\times 2} (\lambda-7) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-7)(\lambda-1)^2$. 由此可见 A 的特征值为 7, 1, 1 且 $|A| = 7$, $A^* = |A|A^{-1} = 7A^{-1}$.

$(7E-A)x = 0$ 的一个基础解系为 $\xi_1 = (1, 1, 1)^T$.

$(E-A)x = 0$ 的一个基础解系为 $\xi_2 = (-1, 1, 0)^T$, $\xi_3 = (-1, 0, 1)^T$.

令 $Q = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, 则 $Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $Q^{-1}A^{-1}Q = (Q^{-1}AQ)^{-1} = \begin{bmatrix} 1/7 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

令 $M = P^{-1}Q$,

$(P, Q) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\leftarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = (E, M)$.

可见 $M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. 又因为

$$\begin{aligned} M^{-1}(B+2E)M &= M^{-1}BM + M^{-1}2EM = M^{-1}BM + 2E = (P^{-1}Q)^{-1}P^{-1}A^*P(P^{-1}Q) + 2E \\ &= Q^{-1}PP^{-1}A^*PP^{-1}Q + 2E = Q^{-1}7A^{-1}Q + 2E = 7Q^{-1}A^{-1}Q + 2E \\ &= 7 \begin{bmatrix} 1/7 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

由此可见 $B+2E$ 的特征值为 $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 9$. 令 $M = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 即

$$\eta_1 = (0, 1, 1)^T, \eta_2 = (1, -1, 0)^T, \eta_3 = (-1, -1, 1)^T,$$

则 $B+2E$ 的对应于 $\lambda_1 = 3$ 的特征向量为 $k(0, 1, 1)^T$, 其中 k 为任意非零实数. 对应于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 9$ 的特征向量为 $k_1(1, -1, 0)^T + k_2(-1, -1, 0)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意不全为零的实数.

[注] $A^* = \begin{bmatrix} 5 & -2 & -2 \\ -2 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 5 \end{bmatrix}$, $P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & -4 \\ -2 & -2 & 3 \end{bmatrix}$, $B+2E = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ -2 & 7 & -4 \\ -2 & -2 & 5 \end{bmatrix}$, $|\lambda E - (B+2E)| = (\lambda-3)(\lambda-9)^2$.

14. **03 数二** 若矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & a \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ 相似于对角矩阵 Λ , 试确定常数 a 的值, 并求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = \Lambda$.

解: $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & 0 \\ -8 & \lambda-2 & -a \\ 0 & 0 & \lambda-6 \end{vmatrix} = (\lambda-6)^2(\lambda+2)$. 由此可见 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$, $\lambda_3 = -2$.

因为 A 相似于对角矩阵, 所以 A 有两个线性无关的特征向量与 6 对应, 即齐次线性方程组 $(6E-A)x = 0$ 的基础解系由两个线性无关的解向量构成, 故秩 $(6E-A) = 3 - 2 = 1$. 而

$6E-A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -8 & 4 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times 2} \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times \frac{1}{4}} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 可见 $a = 0$.

$$A = \begin{bmatrix} a_1+b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+b & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3+b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+b \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a_1+b & * & * & \cdots & * \\ a_1 & b & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & 0 & b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & 0 & 0 & \cdots & b \end{bmatrix} \text{记为 } B$$

$\times(-\frac{a_2}{a_1})$ $\times(-\frac{a_3}{a_1})$ \vdots $\times(-\frac{a_n}{a_1})$

其中 B 有一个 $n-1$ 阶子式 $\begin{vmatrix} b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & b \end{vmatrix} = b^{n-1} \neq 0$, 由此可见秩(A) = 秩(B) $\geq n-1$.

于是可得秩(A) = $n-1$. 对应的方程组有非零解, 其基础解系由 1 个线性无关的解向量构成, 而且任意 1 个非零的解向量都可以取作一个基础解系. 又因为 $\xi = (1, 1, \dots, 1)^T$ 是该方程组的一个非零解, 因此该方程组的一个基础解系为 $\xi = (1, 1, \dots, 1)^T$.

16. **03 数三** 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3$, ($b > 0$), 其中二次型的矩阵 A 的特征值之和为 1, 特征值之积为 -12.

(1) 求 a, b 的值.

(2) 利用正交变换将二次型 f 化为标准形, 并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵.

解: (1) $A = \begin{bmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{bmatrix}$. 因为 A 的特征值之和为 1, 所以 $a + 2 + (-2) = 1$, 即 $a = 1$. 进而有 $|A| = -4 - 2b^2$. 又因

为 A 的特征值之积为 -12, 所以 $-4 - 2b^2 = -12$, 由条件 $b > 0$ 可得 $b = 2$.

(2) $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ -2 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2(\lambda + 3)$. 由此可见 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -3$.

此时 $(2E - A)x = 0$ 的一个基础解系为

$$\xi_1 = (0, 1, 0)^T, \xi_2 = (2, 0, 1)^T.$$

$(-3E - A)x = 0$ 的一个基础解系为

$$\xi_3 = (1, 0, -2)^T.$$

ξ_1, ξ_2, ξ_3 两两正交, 且 $\|\xi_1\| = 1, \|\xi_2\| = \sqrt{5}, \|\xi_3\| = \sqrt{5}$.

$$\text{令 } q_1 = \xi_1, q_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \xi_2 = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)^T, q_3 = \frac{1}{\sqrt{5}} \xi_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, 0, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^T,$$

$$Q = (q_1, q_2, q_3) = \begin{bmatrix} 0 & 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{5} & -2/\sqrt{5} \end{bmatrix}, x = Qy, \text{ 则二次型 } f \text{ 化为标准形 } 2y_1^2 + 2y_2^2 - 3y_3^2.$$

17. **03 数四** 设有向量组(I): $\alpha_1 = (1, 0, 2)^T, \alpha_2 = (1, 1, 3)^T, \alpha_3 = (1, -1, a+2)^T$ 和向量组(II): $\beta_1 = (1, 2, a-3)^T, \beta_2 = (2, 1, a+6)^T, \beta_3 = (2, 1, a+4)^T$, 试问: 当 a 为何值时, 向量组(I)与(II)等价? 当 a 为何值时, 向量组(I)与(II)不等价?

解: 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & a+2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\times(-2)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & a+1 \end{vmatrix} = a+1$.

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ a-3 & a+6 & a+4 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times(-2) & \times(3-a) \\ \leftarrow & \end{smallmatrix}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 12-a & 10-a \end{vmatrix} \xrightarrow{\times \frac{1}{3}(12-a)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0.$$

由 $|B| \neq 0$ 可知秩(II)=3. 于是向量组(I)与(II)等价 \Leftrightarrow 秩(I)=3 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow a \neq -1$.

18. **03 数四** 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$ 可逆, 向量 $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{bmatrix}$ 是矩阵 A^* 的一个特征向量, λ 是 α 对应的特征值, 其中

A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, 试求 a, b 和 λ 的值.

解: $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = 3a-2. AA^* = |A|E = (3a-2)E.$

矩阵 A 可逆 $\Rightarrow A^* = |A|A^{-1}$ 可逆 $\Rightarrow \lambda \neq 0$.

向量 α 是矩阵 A^* 的一个特征向量, λ 是 α 对应的特征值 $\Rightarrow A^*\alpha = \lambda\alpha \Rightarrow AA^*\alpha = \lambda A\alpha$

$$\Rightarrow (3a-2) \begin{bmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 3a-2 \\ 3ab-2b \\ 3a-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda(3+b) \\ \lambda(2+2b) \\ \lambda(1+a+b) \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=1 \text{ 或 } b=-2 \\ \lambda=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=-2 \\ \lambda=4 \end{cases}.$$

19. **04 数一** 设有齐次线性方程组 $\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0, \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + \cdots + 2x_n = 0, \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \cdots \\ nx_1 + nx_2 + \cdots + (n+a)x_n = 0, \end{cases} (n \geq 2)$, 试问 a 取何值时, 该方程组有非零解, 并求出其通解.

解: 该齐次线性方程组的系数矩阵 A 的行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \vdots \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{vmatrix} \frac{n(n+1)}{2} + a & \frac{n(n+1)}{2} + a & \cdots & \frac{n(n+1)}{2} + a \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix} = [\frac{n(n+1)}{2} + a] \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix}$$

$$= [\frac{n(n+1)}{2} + a] \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a \end{vmatrix} = [\frac{n(n+1)}{2} + a] a^{n-1}.$$

该方程组有非零解 $\Leftrightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow a = -\frac{n(n+1)}{2}$ 或 0.

当 $a = -\frac{n(n+1)}{2}$ 时, $A = \begin{bmatrix} 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n & \cdots & n+a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1+a & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n-1 & n-1 & \cdots & n-1+a & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow$

$$\begin{bmatrix} -n & -n & \cdots & -n & \frac{n(n-1)}{2} \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n-1 & n-1 & \cdots & n-1+a & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(-\frac{1}{n})} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & \frac{1-n}{2} \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n-1 & n-1 & \cdots & n-1+a & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times(-2) & \cdots & \times(1-n) \\ \leftarrow & & \end{smallmatrix}}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2/3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2/3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2/3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

可见秩 $(4E-A)=2$, 因而 A 只有 1 个线性无关的特征向量与 4 对应. 此时 A 是不可以相似对角化.

21. **04 数二** 设有齐次线性方程组
$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 + (3+a)x_3 + 3x_4 = 0, \\ 4x_1 + 4x_2 + 4x_3 + (4+a)x_4 = 0, \end{cases}$$
 试问 a 取何值时, 该方程组有非零解,

并求出其通解.

解: 该齐次线性方程组的系数矩阵 A 的行列式

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+a \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{vmatrix} 10+a & 10+a & 10+a & 10+a \\ 2 & 2+a & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+a \end{vmatrix} = (10+a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+a \end{vmatrix} \\ &= (10+a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{vmatrix} = (10+a)a^3. \end{aligned}$$

该方程组有非零解 $\Leftrightarrow |A|=0 \Leftrightarrow a=-10$ 或 0 .

$$\begin{aligned} \text{当 } a=-10 \text{ 时, } A &= \begin{bmatrix} -9 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -8 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & -7 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} -9 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -8 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & -7 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} -4 & -4 & -4 & 6 \\ 2 & -8 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & -7 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(-\frac{1}{4})} \\ &\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 2 & -8 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & -7 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times(-2) & \times(-3) \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & -10 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -10 & \frac{15}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times(-\frac{1}{10}) \\ \times(-\frac{1}{10}) \\ \times(-\frac{1}{10}) \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times(-1) \\ \times(-1) \end{smallmatrix}} \\ &\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

由此可得该方程组的一个基础解系: $\xi = (\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, 1)^T$.

通解为 $x = k(\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, 1)^T$, 其中 k 为任意实数.

$$\text{当 } a=0 \text{ 时, } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times(-2) & \times(-3) & \times(-4) \\ \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

由此可得该方程组的一个基础解系:

$$\xi_1 = (-1, 1, 0, 0)^T, \xi_2 = (-1, 0, 1, 0)^T, \xi_3 = (-1, 0, 0, 1)^T.$$

通解为 $x = k_1(-1, 1, 0, 0)^T + k_2(-1, 0, 1, 0)^T + k_3(-1, 0, 0, 1)^T$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意实数.

[注] 当 $a=-10$ 时, $|A|=0 \Rightarrow$ 秩 $(A) < 4$. 同时 A 有一个 3 阶子式

$$\begin{vmatrix} -9 & 1 & 1 \\ 2 & -8 & 2 \\ 3 & 3 & -7 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{vmatrix} -4 & -4 & -4 \\ 2 & -8 & 2 \\ 3 & 3 & -7 \end{vmatrix} = -4 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -8 & 2 \\ 3 & 3 & -7 \end{vmatrix} = -4 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -10 & 0 \\ 0 & 0 & -10 \end{vmatrix} = -400 \neq 0 \Rightarrow \text{秩}(A) \geq 3.$$

于是可得秩 $(A)=3$. 因而对应的方程组 $Ax=0$ 的基础解系中只有一个解向量, 而且任取 $Ax=0$ 的一个非零解都可以作为 $Ax=0$ 的基础解系. 容易验证

$$\xi = (1, 2, 3, 4)^T$$

是 $Ax = 0$ 的一个非零解, 故该方程组的通解为 $x = k(1, 2, 3, 4)^T$, 其中 k 为任意实数.

22. **04数三** 设 $\alpha_1 = (1, 2, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, a+2, -3a)^T$, $\alpha_3 = (-1, -b-2, a+2b)^T$, $\beta = (1, 3, -3)^T$, 试讨论当 a, b 为何值时, (1) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示; (2) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一地线性表示, 并求出表示式; (3) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示式不唯一, 并求出表示式.

解: 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $(A, \beta) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & a+2 & -b-2 & 3 \\ 0 & -3a & a+2b & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -b & 1 \\ 0 & -3a & a+2b & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times 3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -b & 1 \\ 0 & 0 & a-b & 0 \end{bmatrix}.$

- (1) 当 $a = b = 0$ 时, 秩 $(A) = 1$, 秩 $(A, \beta) = 2$, 故线性方程组 $Ax = \beta$ 无解, 即 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

当 $a = 0, b \neq 0$ 时, $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -b & 1 \\ 0 & 0 & a-b & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -b & 1 \\ 0 & 0 & -b & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -b & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},$

此时秩 $(A) = 2$, 秩 $(A, \beta) = 3$, 故线性方程组 $Ax = \beta$ 无解, 即 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

- (2) 当 $a \neq 0$ 且 $a \neq b$ 时, 秩 $(A) =$ 秩 $(A, \beta) = 3$, 故线性方程组 $Ax = \beta$ 有唯一解 $x = (1 - \frac{1}{a}, \frac{1}{a}, 0)^T$, 即 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一地线性表示, 且 $\beta = (1 - \frac{1}{a})\alpha_1 + \frac{1}{a}\alpha_2$.

- (3) 当 $a = b \neq 0$ 时, 秩 $(A) =$ 秩 $(A, \beta) = 2$, 故线性方程组 $Ax = \beta$ 有无穷多解. 此时有

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -b & 1 \\ 0 & 0 & a-b & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times \frac{1}{a}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{a} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 - \frac{1}{a} \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{a} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

由此可得 $Ax = \beta$ 的通解 $x = k(0, 1, 1)^T + (1 - \frac{1}{a}, \frac{1}{a}, 0)^T$, 其中 k 为任意实数.

因此 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示式不唯一. 表示式如下:

$$\beta = (1 - \frac{1}{a})\alpha_1 + (k + \frac{1}{a})\alpha_2 + k\alpha_3,$$

其中 k 为任意实数.

23. **04数三** 设 n 阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ b & 1 & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & 1 \end{bmatrix}$, (1) 求 A 的特征值和特征向量; (2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解: (1) $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -b & \cdots & -b \\ -b & \lambda-1 & \cdots & -b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -b & -b & \cdots & \lambda-1 \end{vmatrix} = [\lambda - (1+(n-1)b)][\lambda - (1-b)]^{n-1},$

由此可得 A 的特征值 $\lambda_1 = 1+(n-1)b$, $\lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 1-b$.

$(\lambda_1 E - A)x = 0$ 的一个基础解系为 $\xi_1 = (1, 1, \dots, 1)^T$,

故对应于 $\lambda_1 = 1+(n-1)b$ 的特征向量为 $k\xi_1$, 其中 $k \neq 0$.

$(\lambda_2 E - A)x = 0$ 的一个基础解系为

$\xi_2 = (-1, 1, 0, \dots, 0)^T$, $\xi_3 = (-1, 0, 1, \dots, 0)^T, \dots, \xi_n = (-1, 0, 0, \dots, 1)^T$,

故对应于 $\lambda_1 = 1+(n-1)b$ 的特征向量为

$$k_1\xi_2 + k_2\xi_3 + \cdots + k_{n-1}\xi_n,$$

其中 k_1, k_2, \dots, k_{n-1} 不全为零.

- (2) 根据(1), 令 $P = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$, 则

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1+(n-1)b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1-b \end{pmatrix}.$$

24. **04 数四** 设线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 + \mu x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 + (2 + \lambda)x_2 + (4 + \mu)x_3 + 4x_4 = 1, \end{cases}$$
 已知 $(1, -1, 1, -1)^T$ 是该方程组的一个解,

试求(1)方程组的全部解,并用对应的齐次线性方程组的基础解系表示全部解;(2)该方程组满足 $x_2 = x_3$ 的全部解.

解: (1) 把 $\mathbf{x} = (1, -1, 1, -1)^T$ 代入该方程组得
$$\begin{cases} 1 - \lambda + \mu - 1 = 0, \\ 2 - 1 + 1 - 2 = 0, \\ 3 - (2 + \lambda) + (4 + \mu) - 4 = 1, \end{cases}$$
 由此可得 $\lambda = \mu$. 令 \mathbf{A} 为该线性方

程组的系数矩阵, $\mathbf{b} = (0, 0, 1)^T$, 则

$$(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \begin{bmatrix} 1 & \lambda & \lambda & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 + \lambda & 4 + \lambda & 4 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \times(-2) \times(-3) \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & \lambda & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 - 2\lambda & 1 - 2\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2 - 2\lambda & 4 - 2\lambda & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \times(-1) \\ \leftarrow \end{matrix}}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \lambda & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 - 2\lambda & 1 - 2\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & \lambda & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 - 2\lambda & 1 - 2\lambda & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \times(-\lambda) \times(2\lambda - 1) \\ \leftarrow \end{matrix}}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2\lambda & 1 - \lambda & -\lambda \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2(2\lambda - 1) & 2\lambda - 1 & 2\lambda - 1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{当 } \lambda \neq \frac{1}{2} \text{ 时, } \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2\lambda & 1 - \lambda & -\lambda \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2(2\lambda - 1) & 2\lambda - 1 & 2\lambda - 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times \frac{1}{2(2\lambda - 1)}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2\lambda & 1 - \lambda & -\lambda \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2\lambda & 1 - \lambda & -\lambda \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \times(-3) \times 2\lambda \end{matrix}}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}. \text{ 由此可得的对应的齐次线性方程组的一个基础解系为 } \boldsymbol{\xi} = (-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)^T, \text{ 原方}$$

程组的一个特解为 $\boldsymbol{\eta}^* = (0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)^T$, 因而原方程组的通解为

$$\mathbf{x} = k(-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)^T + (0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)^T,$$

其中 k 为任意实数.

$$\text{当 } \lambda = \frac{1}{2} \text{ 时, } \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2\lambda & 1 - \lambda & -\lambda \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2(2\lambda - 1) & 2\lambda - 1 & 2\lambda - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

由此可得的对应的齐次线性方程组的一个基础解系为

$$\boldsymbol{\xi}_1 = (1, -3, 1, 0)^T, \boldsymbol{\xi}_2 = (-\frac{1}{2}, -1, 0, 1)^T,$$

原方程组的一个特解为 $\boldsymbol{\eta}^* = (-\frac{1}{2}, 1, 0, 0)^T$, 因而原方程组的通解为

$$\mathbf{x} = k_1(1, -3, 1, 0)^T + k_2(-\frac{1}{2}, -1, 0, 1)^T + (-\frac{1}{2}, 1, 0, 0)^T,$$

其中 k_1, k_2 为任意实数.

- (2) 当 $\lambda \neq \frac{1}{2}$ 时, 由 $x_2 = x_3$ 得 $\frac{1}{2}k + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}k - \frac{1}{2}$, 故 $k = -1$. 由此可得该方程组满足 $x_2 = x_3$ 的解为
$$\mathbf{x} = (-1, 0, 0, 1)^T.$$

当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时, 由 $x_2 = x_3$ 得 $-3k_1 - k_2 + 1 = k_1$, 故 $k_2 = 1 - 4k_1$. 由此可得该方程组满足 $x_2 = x_3$ 的解为

$$\mathbf{x} = k_1(3, 1, 1, -4)^T + (-1, 0, 0, 1)^T,$$

其中 k_1 为任意实数.

25. **例4数四** 设三阶实对称矩阵 A 的秩为2, $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ 是 A 的二重特征值. 若 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (2, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (-1, 2, -3)^T$ 都是 A 的属于特征值6的特征向量.

(1) 求 A 的另一特征值和对应的特征向量; (2) 求矩阵 A .

解: (1) 设 A 的另一特征值为 λ_3 . 因为秩(A) = 2, 所以 $\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = |A| = 0$. 进而由 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ 可知 $\lambda_3 = 0$.

设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$ 是 A 的对应于 $\lambda_3 = 0$ 特征向量, 则由 A 是实对称矩阵以及 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (2, 1, 1)^T$ 是 A 的属于特征值6的特征向量可知 $\alpha_1^T \mathbf{x} = 0$, $\alpha_2^T \mathbf{x} = 0$. 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2)^T$, 则

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

由此可得 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系: $\xi = (-1, 1, 1)^T$. 故 A 的属于特征值0的特征向量为 $k(-1, 1, 1)^T$, 其中 k 为任意非零实数.

(2) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \xi)$, 则 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $A = P \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} P^{-1}$. 由

$$(P, E) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times \frac{1}{3}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \xrightarrow{\times 2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \text{ 可得 } P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}, \text{ 从而有}$$

$$A = P \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 12 & 0 \\ 6 & 6 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 4 \end{bmatrix}.$$

26. **例5数一** 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为2.

(1) 求 a 的值; (2) 求正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$, 把 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成标准形; (3) 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

解: (1) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$. $|A| = -8a$. 因为二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的秩为2, 即秩(A) = 2,

所以 $|A| = 0$. 由此可得 $a = 0$.

(2) $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-2)^2\lambda$. 由此可得 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 0$.

$(2E - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系为 $\xi_1 = (1, 1, 0)^T, \xi_2 = (0, 0, 1)^T$.

$(0E - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系为 $\xi_3 = (-1, 1, 0)^T$.

ξ_1, ξ_2, ξ_3 两两正交, $\|\xi_1\| = \sqrt{2}, \|\xi_2\| = 1, \|\xi_3\| = \sqrt{2}$.

令 $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \xi_1 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)^T, q_2 = \xi_2 = (0, 0, 1)^T, q_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \xi_3 = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)^T, Q = (q_1, q_2, q_3)$,

则 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 为正交变换, 而且经过此正交变换 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成标准形 $2y_1^2 + 2y_2^2$.

(3) $f(x_1, x_2, x_3) = 0 \Leftrightarrow 2y_1^2 + 2y_2^2 = 0 \Leftrightarrow y_1 = y_2 = 0 \Leftrightarrow \mathbf{y} = (0, 0, c)^T$ (其中 c 为任意实数)

$$\Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (\text{其中 } c \text{ 为任意实数}).$$

27. **05 数一/二** 已知 3 阶矩阵 \mathbf{A} 的第一行是 (a, b, c) , a, b, c 不全为零, 矩阵 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & k \end{pmatrix}$ (k 为常数), 且 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$, 求线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的通解.

解: 因为 3 阶矩阵 \mathbf{A} 的第一行是 (a, b, c) , a, b, c 不全为零, 所以 $\text{秩}(\mathbf{A}) \geq 1$. 从而 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的基础解系中至多有两个线性无关的解向量.

又因为 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$, 若 $k \neq 9$, 则 $\xi_1 = (1, 2, 3)^T$, $\xi_2 = (3, 6, k)^T$ 线性无关而且是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解, 此时 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的通解为 $\mathbf{x} = k_1(1, 2, 3)^T + k_2(3, 6, k)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意实数.

若 $k = 9$, 则有以下两种情况:

① 当 $\text{秩}(\mathbf{A}) = 2$ 时, $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的基础解系中只有一个(非零的)解向量, 而 $\xi_1 = (1, 2, 3)^T$ 是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的非零解. 所以此时 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的通解为 $\mathbf{x} = k(1, 2, 3)^T$, 其中 k 为任意实数.

② 当 $\text{秩}(\mathbf{A}) = 1$ 时, $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 与 $ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0$ 同解, 不妨设 $a \neq 0$, 则 $ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0$ 的一个基础解系为

$$\eta_1 = (-b, a, 0)^T, \eta_2 = (-c, 0, a)^T,$$

于是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的通解为 $\mathbf{x} = k_1(-b, a, 0)^T + k_2(-c, 0, a)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意实数.

28. **05 数二** 确定常数 a , 使向量组 $\alpha_1 = (1, 1, a)^T$, $\alpha_2 = (1, a, 1)^T$, $\alpha_3 = (a, 1, 1)^T$ 可由向量组 $\beta_1 = (1, 1, a)^T$, $\beta_2 = (-2, a, 4)^T$, $\beta_3 = (-2, a, a)^T$ 线性表示, 但向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

解: 令 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $\mathbf{B} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 则 $|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \text{第2行} - \text{第1行} \\ \text{第3行} - \text{第1行} \end{matrix}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 1 & 1-a \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \text{第2行} \leftrightarrow \text{第3行} \end{matrix}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 1-a \\ 0 & a-1 & 1-a \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{第3行} - (a-1)\text{第2行}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 1-a \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{第1行} - \text{第2行}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2a-1 \\ 0 & 1 & 1-a \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{第1行} - (2a-1)\text{第3行}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1-a \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{第2行} - \text{第3行}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$

$$= (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ a-1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -(a+2)(a-1)^2.$$

假若 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 从而构成 \mathbf{R}^3 的一组基, 于是向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 这不符合题目要求, 故 $|\mathbf{A}| = 0$, 即 $a = -2$ 或 1 .

$$\text{当 } a = -2 \text{ 时, } (\mathbf{B}, \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \text{第1行} \times (-1) \\ \text{第2行} - \text{第1行} \\ \text{第3行} + 2\text{第1行} \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & 3 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \text{第2行} \times (-1) \\ \text{第3行} + 2\text{第2行} \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \text{第2行} \times \frac{1}{3} \\ \text{第3行} \times (-\frac{1}{6}) \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \text{第2行} \leftrightarrow \text{第3行} \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \text{第1行} + 2\text{第2行} \\ \text{第1行} + 2\text{第3行} \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \text{第1行} - \text{第2行} \\ \text{第1行} - \text{第3行} \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \text{第1行} - \text{第3行} \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 这也不符合题目要求.

当 $a = 1$ 时, $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$, $\beta_1 = (1, 1, 1)^T$, $\beta_2 = (-2, 1, 4)^T$, $\beta_3 = (-2, 1, 1)^T$, 显然 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示.

综上所述, $a = 1$.

29. **05 数三/四** 已知齐次线性方程组(I) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases}$ 和(II) $\begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0 \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0 \end{cases}$ 同解, 求 a, b, c 的值.

解: 分别记齐次线性方程组(I)和(II)的系数矩阵为 \mathbf{A} 和 \mathbf{B} , 则 $|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = 2 - a$.

因为齐次线性方程组(II)中方程的个数小于未知数的个数, 从而一定有非零解, 又因为齐次线性方程组(I)与(II)同解, 这表明方程组(I)也有非零解, 所以 $|\mathbf{A}| = 0$, 即 $a = 2$. 于是有

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times(-2) & \times(-1) \\ \leftarrow & \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \leftarrow & \leftarrow \\ \times(-2) & \times 1 \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

由此可得方程组(I)的基础解系: $\xi = (-1, -1, 1)^T$. 把 $\xi = (-1, -1, 1)^T$ 代入方程组(II)得

$$\begin{cases} -1 - b + c = 0 \\ -2 - b^2 + c + 1 = 0 \end{cases}, \text{进而得到} \begin{cases} b = 0 \\ c = 1 \end{cases} \text{或} \begin{cases} b = 1 \\ c = 2 \end{cases}.$$

当 $b = 0, c = 1$ 时, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 的秩为 1, 此时方程组(II)的基础解系中有两个线性无关的解向量, 而方程组(I)的基础解系中只有一个(线性无关的)解向量, 这与题设条件矛盾.

当 $b = 1, c = 2$ 时, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ 的秩为 2, 此时方程组(II)的基础解系中也只有一个(线性无关的)解向量,

而且 $\xi = (-1, -1, 1)^T$ 是(II)的解, 因而方程组(II)的基础解系可取为 $\xi = (-1, -1, 1)^T$. 这表明方程组(I)和(II)确实同解.

综上所述, 有 $a = 2, b = 1, c = 2$.

30. **05 数三** 设 $D = \begin{bmatrix} A & C \\ C^T & B \end{bmatrix}$ 为正定矩阵, 其中 A, B 分别为 m 阶, n 阶对称矩阵, C 为 $m \times n$ 矩阵.

(I) 计算 $P^T D P$, 其中 $P = \begin{bmatrix} E_m & -A^{-1}C \\ O & E_n \end{bmatrix}$.

(II) 利用(I)的结果判断矩阵 $B - C^T A^{-1} C$ 是否为正定矩阵, 并证明你的结论.

解: (I) 由条件可知 A 为对称矩阵, 而且 $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-1}$.

$$\begin{aligned} P^T D P &= \begin{bmatrix} E_m & -A^{-1}C \\ O & E_n \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} A & C \\ C^T & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_m & -A^{-1}C \\ O & E_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_m & O \\ -C^T(A^{-1})^T & E_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & O \\ C^T & -C^T A^{-1} C + B \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A & O \\ O & B - C^T A^{-1} C \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

(II) 因为 $|P| = 1$, 可见 P 可逆, 因而 $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B - C^T A^{-1} C \end{bmatrix}$ 与 $D = \begin{bmatrix} A & C \\ C^T & B \end{bmatrix}$ 合同. 又因为 D 为正定矩阵, 所以

$\begin{bmatrix} A & O \\ O & B - C^T A^{-1} C \end{bmatrix}$ 也是正定矩阵. 于是对于任意的 n 维非零向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 令 $m+n$ 维向量 $y = (0, \dots, 0, x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 则 y 也是非零向量, 因而有

$$x^T (B - C^T A^{-1} C) x = y^T \begin{bmatrix} A & O \\ O & B - C^T A^{-1} C \end{bmatrix} y > 0.$$

故 $B - C^T A^{-1} C$ 是正定矩阵.

31. **05 数四** 设 A 为三阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的三维列向量, 且满足 $A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_3 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3$.

(I) 求矩阵 B , 使得 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)B$.

(II) 求矩阵 A 的特征值.

(III) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解: (I) 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的三维列向量, 所以矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆, 因而由

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)B$$

可知 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1} A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 存在而且唯一.

$$\text{又因为 } A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_2 + 3\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix},$$

$$\text{可见 } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

(II) 由 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可知 A 与 B 相似, 因而有相同的特征值.

$$\text{由 } |\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda-2 & -2 \\ -1 & -1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-4) \text{ 可得 } B \text{ 的特征值为 } \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4.$$

于是可得 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$.

(III) $(E-B)x = 0$ 的一个基础解系为 $\xi_1 = (-1, 1, 0)^T, \xi_2 = (-2, 0, 1)^T$.

$(4E-B)x = 0$ 的一个基础解系为 $\xi_3 = (0, 1, 1)^T$.

$$\text{令 } Q = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } Q^{-1}BQ = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

$$\text{再令 } P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)Q, \text{ 则有 } P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = (-\alpha_1 + \alpha_2, -2\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2 + \alpha_3), \text{ 而且}$$

$$P^{-1}AP = [(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)Q]^{-1}A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)Q = Q^{-1}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)Q = Q^{-1}BQ = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

$$32. \text{ 06 数一/二 } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 - bx_4 = 1 \end{cases} \text{ 有 3 个线性无关的解.}$$

(I) 证明方程组系数矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$. (II) 求 a, b 的值及方程组的通解.

证明(I): 设该方程组的 3 个线性无关的解为 η_1, η_2, η_3 , 则 $\eta_1 - \eta_2, \eta_1 - \eta_3$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的非零解, 而且 **线性无关** (否则由 $\eta_1 - \eta_2, \eta_1 - \eta_3$ 非零且 **线性相关** 可设 $\eta_1 - \eta_3 = k(\eta_1 - \eta_2)$, 于是有

$$(1-k)\eta_1 + k\eta_2 + \eta_3 = 0,$$

这与 η_1, η_2, η_3 线性无关 **矛盾**!). 因此 $r(A) \leq 4 - 2 = 2$. 又因为 A 有一个 2 阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, 所以 $r(A)$

≥ 2 . 综上所述可知 $r(A) = 2$.

解(II): 令 $b = (1, -1, 1)^T$, 则由 $r(A) = 2$ 以及

$$(A, b) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 & -b & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times(-4) \\ \times(-a) \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1-a & 3-a & -a-b & 1+a \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(1-a)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 4-2a & 4a-b-5 & 4-2a \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 4-2a & 4a-b-5 & 4-2a \end{bmatrix} \text{ 可知 } 4-2a = 4a-b-5 = 0, \text{ 故 } a = 2, b = 3. \text{ 此时}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 4-2a & 4a-b-5 & 4-2a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{由此可得 } \begin{cases} x_1 + 2x_3 - 4x_4 = 2, \\ x_2 - x_3 + 5x_4 = -3, \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} x_1 = -2x_3 + 4x_4 + 2, \\ x_2 = x_3 - 5x_4 - 3, \end{cases} \text{ 进而得 } Ax = b \text{ 的通解}$$

$$x = k_1(-2, 1, 1, 0)^T + k_2(4, -5, 0, 1)^T + (2, -3, 0, 0)^T,$$

其中 k_1, k_2 为任意实数.

$$33. \text{ 06 数一/二 } \text{ 设 3 阶实对称矩阵 } A \text{ 的各行元素之和均为 3, 向量 } \alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (0, -1, 1)^T \text{ 是线性方程}$$

组 $Ax = 0$ 的两个解, (I) 求 A 的特征值与特征向量. (II) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$.

06 数三/四 (III) 求 A 及 $(A - \frac{3}{2}E)^6$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

解: (I) 因为 A 是 3 阶实对称矩阵, 所以 A 有 3 个线性无关的特征向量. 令 $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$, 则由条件可知 $A\alpha_1 = 0\alpha_1, A\alpha_2 = 0\alpha_2, A\alpha_3 = 3\alpha_3$, 其中 α_1, α_2 线性无关, $\alpha_3 \neq 0$, 由此可见 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 3$. 对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ 的特征向量为 $k_1(-1, 2, -1)^T + k_2(0, -1, 1)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意不全为零的实数. 对应于 $\lambda_3 = 3$ 的特征向量为 $k(1, 1, 1)^T$, 其中 k 为任意非零实数.

(II) 令 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 = (0, -1, 1)^T - \frac{-3}{6}(-1, 2, -1)^T = (-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})^T, \beta_3 = \alpha_3$.

再把 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 单位化得:

$$q_1 = \frac{1}{\|\beta_1\|} \beta_1 = (\frac{-1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{-1}{\sqrt{6}})^T,$$

$$q_2 = \frac{1}{\|\beta_2\|} \beta_2 = (\frac{-1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})^T,$$

$$q_3 = \frac{1}{\|\beta_3\|} \beta_3 = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})^T.$$

$$\text{于是令 } Q = (q_1, q_2, q_3) = \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \text{ 则 } Q \text{ 为正交矩阵且 } Q^T A Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

(III) 因为 Q 为正交矩阵且 $Q^T A Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 所以

$$A = Q \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} Q^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$(A - \frac{3}{2}E)^2 = A^2 - 3A + \frac{9}{4}E = \frac{9}{4}E. \quad (A - \frac{3}{2}E)^6 = (\frac{9}{4}E)^3 = \frac{729}{64}E.$$

34. **06 数三/四** 设 4 维向量组 $\alpha_1 = (1+a, 1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (2, 2+a, 2, 2)^T, \alpha_3 = (3, 3, 3+a, 3)^T, \alpha_4 = (4, 4, 4, 4+a)^T$. 问 a 为何值时 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性相关? 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关时, 求其一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组线性表出.

解: 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 则 $|A| = \begin{vmatrix} 1+a & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2+a & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3+a & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4+a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10+a & 2 & 3 & 4 \\ 10+a & 2+a & 3 & 4 \\ 10+a & 2 & 3+a & 4 \\ 10+a & 2 & 3 & 4+a \end{vmatrix}$

$$= (10+a) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2+a & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3+a & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4+a \end{vmatrix} = (10+a) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & a & 0 \\ 1 & 0 & 0 & a \end{vmatrix} = (10+a)a^3.$$

于是, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性相关 $\Leftrightarrow \text{秩}(A) < 4 \Leftrightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow a = -10$ 或 0 .

当 $a = -10$ 时, $A = \begin{bmatrix} -9 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -8 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & -7 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -6 \\ 1 & -8 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & -7 & 4 \\ -9 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times(-1) \times 9 \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -6 \\ 0 & -10 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & -10 & 10 \\ 0 & 20 & 30 & -50 \end{bmatrix}$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -6 \\ 0 & -10 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & -10 & 10 \\ 0 & 0 & 30 & -30 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -6 \\ 0 & -10 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & -10 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \times(-2) \\ \times(-3) \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

由此可见 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组, 且 $\alpha_4 = -\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3$.

当 $a = 0$ 时, $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, 2, 2, 2)^T$, $\alpha_3 = (3, 3, 3, 3)^T$, $\alpha_4 = (4, 4, 4, 4)^T$. 显然 α_1 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组, 且 $\alpha_2 = 2\alpha_1$, $\alpha_3 = 3\alpha_1$, $\alpha_4 = 4\alpha_1$.

35. 07 数一/二/三/四 设线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \end{cases}$ 与方程 $x_1 + 2x_2 + x_3 = a-1$ 有公共解, 求 a 的值及所有公共解.

解: 令 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ a-1 \end{bmatrix}$, 则由条件可知 $Ax = b$ 有解, 因而 $\text{秩}(A) = \text{秩}(A, b)$. 而且所求的公共解就是 $Ax = b$ 的解.

$$(A, b) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ 1 & 4 & a^2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & a-1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times(-1) \\ \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 3 & a^2-1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times(-3) \times(-1) \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & a-1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & a-1 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times(a-2) \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & a-1 \\ 0 & 0 & 0 & (a-1)(a-2) \end{bmatrix}.$$

当 $a \neq 1$ 且 $a \neq 2$ 时, $\text{秩}(A) = 3$, $\text{秩}(A, b) = 4$, 不符合条件. 故 $a = 1$ 或 2 .

当 $a = 1$ 时, $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & a-1 \\ 0 & 0 & 0 & (a-1)(a-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times(-1) \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 由此可得

$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0, \\ x_2 = 0. \end{cases}$ 故所求的公共解为: $x = k(-1, 0, 1)^T$, 其中 k 为任意实数.

当 $a = 2$ 时, $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & a-1 \\ 0 & 0 & 0 & (a-1)(a-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times(-1) \\ \leftarrow \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \times(-1) \end{smallmatrix}}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{由此可得} \begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = 1, \\ x_3 = -1, \end{cases} \text{这就是所求的公共解.}$$

36. **07 数一/二/三/四** 设 3 阶对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -2, \alpha_1 = (1, -1, 1)^T$ 是 A 的属于 λ_1 的一个特征向量, 记 $B = A^5 - 4A^3 + E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

(I) 验证 α_1 是矩阵 B 的特征向量, 并求 B 的全部特征值与特征向量.

(II) 求矩阵 B .

解: (I) 由条件可知 $A\alpha_1 = \alpha_1, B\alpha_1 = (A^5 - 4A^3 + E)\alpha_1 = A^5\alpha_1 - 4A^3\alpha_1 + \alpha_1 = \alpha_1 - 4\alpha_1 + \alpha_1 = -2\alpha_1$. 可见 α_1 是矩阵 B 的特征向量, 对应的特征值为 -2 .

设 α_2, α_3 分别为对应于 $\lambda_2 = 2, \lambda_3 = -2$ 的特征向量, 则由 A 的对称性可知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交, 因而 α_2, α_3 是 $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ 的两个线性无关的解, 进一步可以看出 α_2, α_3 构成 $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ 的一个基础解系, 而且有

$$B\alpha_2 = (A^5 - 4A^3 + E)\alpha_2 = A^5\alpha_2 - 4A^3\alpha_2 + \alpha_2 = 2^5\alpha_2 - 4 \times 2^3\alpha_2 + \alpha_2 = \alpha_2.$$

$$B\alpha_3 = (A^5 - 4A^3 + E)\alpha_3 = A^5\alpha_3 - 4A^3\alpha_3 + \alpha_3 = (-2)^5\alpha_3 - 4 \times (-2)^3\alpha_3 + \alpha_3 = \alpha_3.$$

可见 B 的全部特征值为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$,

与 $\lambda_1 = -2$ 对应的特征向量为 $k(1, -1, 1)^T$, 其中 k 为任意非零实数.

与 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 对应的特征向量可表示为 $k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3$, 其中 k_1, k_2 为任意不全为零的实数.

下面来求 B 的与 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 对应的特征向量的具体表达式.

一方面, 若 α 是 B 的与 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 对应的特征向量, 则由于 B 也是实对称矩阵, 因而 α 与 α_1 正交; 另一方面, 若 α 是与 α_1 正交的非零向量, 则 α 是 $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ 的解, 因而能由 α_2, α_3 线性表示, 这意味着 α 是 B 的与 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 对应的特征向量. 所以 α 是 B 的与 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 对应的特征向量 $\Leftrightarrow \alpha$ 是与 α_1 正交的非零向量 $\Leftrightarrow \alpha$ 是 $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ 的非零解.

又因为 $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ 的一个基础解系为: $\xi_1 = (1, 1, 0)^T, \xi_2 = (-1, 0, 1)^T$. 所以 B 的与 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 对应的特征向量为 $k_1(1, 1, 0)^T + k_2(-1, 0, 1)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意不全为零的实数.

(II) 令 $P = (\alpha_1, \xi_1, \xi_2) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则由 (I) 可知 $P^{-1}BP = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

$$(P, E) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times 1 \\ \times (-1) \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times (-1) \\ \times (-1) \end{smallmatrix}}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times (-1) \\ \times (-1) \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \times (-\frac{1}{3}) \\ \times (-1) \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}. \text{由此可得 } P^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}, \text{于是有}$$

$$B = P \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

37. **08 数一/二/三/四** 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & 2a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & a^2 & 2a \end{bmatrix}_{n \times n}$ 满足方程 $Ax = b$, 其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, b = (1, 0, \dots,$

0)^T.(1) 求证 $|A| = (n+1)a^n$.(2) a 为何值时, 方程组有唯一解, 此时求 x_1 .(3) a 为何值时, 方程组有无穷多解, 此时求通解.

证明(1): 用数学归纳法. 记 $D_n = \begin{vmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & 2a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & a^2 & 2a \end{vmatrix}_{n \times n}$.

当 $n=1$ 时, $D_1 = 2a = (1+1)a^1$.

当 $n=2$ 时, $D_2 = \begin{vmatrix} 2a & 1 \\ a^2 & 2a \end{vmatrix} = 3a^2 = (2+1)a^2$.

可见结论对于 $n=1, 2$ 成立.

假设结论对于 $n < k$ 的情形已经成立(其中 $k \geq 3$), 下面来看 $n=k$ 的情形.

对 D_k 按第一行展开得:

$$D_k = \begin{vmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & 2a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & a^2 & 2a \end{vmatrix}_{k \times k} = 2aD_{k-1} - \begin{vmatrix} a^2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2a & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & a^2 & 2a \end{vmatrix}_{(k-1) \times (k-1)} = 2aD_{k-1} - a^2D_{k-2}.$$

由归纳假设, $D_{k-1} = ka^{k-1}$, $D_{k-2} = (k-1)a^{k-2}$, 故有

$$D_k = 2aD_{k-1} - a^2D_{k-2} = 2aka^{k-1} - a^2(k-1)a^{k-2} = 2ka^k - (k-1)a^k = (k+1)a^k.$$

即结论对于 $n=k$ 的情形也成立.

根据数学归纳法原理可知 $|A| = (n+1)a^n$ 对于一切正整数 n 都成立.

[注] 对 D_n 按第一行展开得 $D_n = 2aD_{n-1} - a^2D_{n-2}$. 由此可得

$$D_n - aD_{n-1} = aD_{n-1} - a^2D_{n-2} = a(D_{n-1} - aD_{n-2}) = a^2(D_{n-2} - aD_{n-3}) = \cdots = a^{n-3}(D_3 - aD_2) = a^{n-2}(D_2 - aD_1) = a^{n-2}(3a^2 - 2a^2) = a^n.$$

故 $D_n = aD_{n-1} + a^n$. 根据这个递推公式可得 $D_n = (n+1)a^n$.

解: (2) 方程组有唯一解 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow a \neq 0$.

$$\text{用 } \mathbf{b} = (1, 0, \dots, 0)^T \text{ 替换 } \begin{vmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & 2a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & a^2 & 2a \end{vmatrix}_{n \times n} \text{ 的第一列得 } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2a & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & a^2 & 2a \end{vmatrix}_{n \times n} = D_{n-1} = na^{n-1}.$$

当 $a \neq 0$ 时, 根据克拉默法则可得 $x_1 = \frac{na^{n-1}}{(n+1)a^n} = \frac{n}{(n+1)a}$.

解: (3) 方程组有无穷多解 $\Leftrightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow a = 0$.

$$\text{当 } a = 0 \text{ 时, } A\mathbf{x} = \mathbf{b} \text{ 即 } \begin{cases} x_2 = 1, \\ x_2 = 0, \\ \dots \\ x_n = 0, \end{cases} \text{ 其通解为 } \mathbf{x} = (c, 1, 0, \dots, 0)^T, \text{ 其中 } c \text{ 为任意实数.}$$

38. 08 数二/三/四 设 A 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-1, 1$ 特征向量, 向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$.

(1) 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

(2) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $P^{-1}AP$.

证明(1): 因为 α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-1, 1$ 特征向量, 所以 $A\alpha_1 = -\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2$, 而且 α_1, α_2 线性无关.

假若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 则 α_3 能由 α_1, α_2 线性表示, 于是可设 $\alpha_3 = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$.


又因为向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$, 所以 $A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2) = \alpha_2 + k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$. 整理得

$$2k_1\alpha_1 + \alpha_2 = 0.$$

这与 α_1, α_2 线性无关矛盾! 此矛盾表明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

解(2): 由条件可得 $AP = A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (-\alpha_1, \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$= P \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \text{ 故 } P^{-1}AP = P^{-1}P \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

39.  设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{bmatrix}$, $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$. (1) 求满足 $A\xi_2 = \xi_1, A^2\xi_3 = \xi_1$ 的所有向量 ξ_2, ξ_3 .

(2) 对(1)中任意向量 ξ_2, ξ_3 证明 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

解(1): $(A, \xi_1) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -4 & -2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \text{行2} + \text{行1} \\ \text{行3} \times (-1/4) \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \text{行3} \times (-1/4) \\ \text{行2} + \text{行3} \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\times(-\frac{1}{4})} \rightarrow$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \text{行1} + \text{行2} \\ \text{行1} \times 2 \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

由此可得满足 $A\xi_2 = \xi_1$ 的 $\xi_2 = k(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)^T + (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)^T$, 其中 k 为任意实数.


$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 4 & 4 & 0 \end{bmatrix},$$

$$(A^2, \xi_1) = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 & 1 \\ -2 & -2 & 0 & -1 \\ 4 & 4 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \text{行2} \times (-1) \\ \text{行1} \times 1/2 \\ \text{行3} \times 1/2 \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \text{行3} - \text{行1} \\ \text{行1} \times 2 \end{smallmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

由此可得满足 $A^2\xi_3 = \xi_1$ 的 $\xi_3 = k_1(-1, 1, 0)^T + k_2(0, 0, 1)^T + (\frac{1}{2}, 0, 0)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意实数.

证明(2): $|\xi_1, \xi_2, \xi_3| = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2}(k+1) & -k_1 + \frac{1}{2} \\ -1 & -\frac{1}{2}(k+1) & k_1 \\ 2 & k & k_2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \text{行2} + \text{行1} \\ \text{行1} \times 2 \end{smallmatrix}} \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2}(k+1) & -k_1 + \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 2 & k & k_2 \end{vmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2}(k+1) \\ 2 & k \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \neq 0.$

所以 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

40.  设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$.

(1) 求二次型 f 的矩阵的所有特征值.

(2) 若二次型 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 求 a 的值.

解: (1) 二次型 f 的矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ 1 & -1 & a-1 \end{bmatrix}$.

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda - a + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - a)(\lambda - a - 1)(\lambda - a + 2).$$

由此可得 A 的特征值为: $\lambda_1 = a, \lambda_2 = a+1, \lambda_3 = a-2$.

(2) 若二次型 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 则 $\lambda_1 = a, \lambda_2 = a+1, \lambda_3 = a-2$ 中有两个正数, 一个为0.

由此可得 $a = 2$.

41. **10数一/二/三** 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax = b$ 存在两个不同的解.

(1) 求 λ, a .

(2) 求 $Ax = b$ 的通解.

解: (1) $Ax = b$ 存在两个不同的解 $\Rightarrow |A| = 0 \Rightarrow (\lambda-1)(\lambda+1) = 0 \Rightarrow \lambda = 1$ 或 -1 .

$$\text{当 } \lambda = 1 \text{ 时, } (A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \times(-1) \\ \leftarrow \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1-a \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \times(a-1) \\ \leftarrow \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由此可见秩 $(A) = 1$ 而秩 $(A, b) = 2$, $Ax = b$ 无解.

$$\text{当 } \lambda = -1 \text{ 时, } (A, b) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \times 1 \\ \leftarrow \end{matrix}} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1+a \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \times 1 \\ \leftarrow \end{matrix}} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2+a \end{pmatrix},$$

由此可见秩 $(A) = 2$.

由于 $Ax = b$ 有解, 故秩 $(A, b) = \text{秩}(A) = 2$, 可见 $2 + a = 0$, 即 $a = -2$.

此时 $Ax = b$ 有无数多解, 当然存在两个不同的解.

综上所述, $\lambda = -1, a = -2$.

$$\begin{aligned} \text{(2) 由(1)得 } (A, b) &= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \times(-1) \\ \times(-\frac{1}{2}) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \uparrow \\ \times 1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ 故 } \begin{cases} x_1 - x_3 = \frac{3}{2}, \\ x_2 = -\frac{1}{2}, \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} x_1 = x_3 + \frac{3}{2}, \\ x_2 = -\frac{1}{2}, \end{cases} \text{ 由此可得 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_3 + \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_3 \\ 0 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

可见 $Ax = b$ 的通解为 $x = k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 k 为任意实数.

42. **10数一** 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$, 且 Q 的第三列为 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2})^T$.

(1) 求矩阵 A .

(2) 证明 $A + E$ 为正定矩阵, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

解: (1) 因为二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$.

所以 A 的特征值为: $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$.

设 $Q = (q_1, q_2, q_3)$, 则 q_1, q_2 为 A 的对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的特征向量, $q_3 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2})^T$ 为 A 的对应于 $\lambda_3 = 0$ 的特征向量.

为了求 q_1, q_2 , 我们先证明“非零向量 ξ 为 A 的对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的特征向量 $\Leftrightarrow \xi$ 与 q_3 正交”.

一方面, A 的对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的特征向量 ξ 必与 q_3 正交.

另一方面, 设 ξ 与 q_3 正交. 注意到 q_1, q_2, q_3 是 \mathbb{R}^3 的一组标准正交基, 故可设 $\xi = k_1 q_1 + k_2 q_2 + k_3 q_3$,

由于 ξ 与 q_3 的内积为 0, 即 $\langle \xi, q_3 \rangle = 0$, 于是有

$$0 = \langle \xi, q_3 \rangle = \langle k_1 q_1 + k_2 q_2 + k_3 q_3, q_3 \rangle = k_1 \langle q_1, q_3 \rangle + k_2 \langle q_2, q_3 \rangle + k_3 \langle q_3, q_3 \rangle = k_3.$$

从而 $\xi = k_1 q_1 + k_2 q_2$, 进而 $A\xi = A(k_1 q_1 + k_2 q_2) = k_1 Aq_1 + k_2 Aq_2 = k_1 q_1 + k_2 q_2 = \xi$,

可见 ξ 为 A 的对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的特征向量.

因此 q_1, q_2 可取为任意两个与 $q_3 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2})^T$ 正交的标准正交向量组, 即 $\frac{\sqrt{2}}{2}x_1 + 0x_2 + \frac{\sqrt{2}}{2}x_3 = 0$ 的两个正交的单位解向量.

而 $\frac{\sqrt{2}}{2}x_1 + 0x_2 + \frac{\sqrt{2}}{2}x_3 = 0$ 的一个基础解系为

$$\xi_1 = (-1, 0, 1)^T, \xi_2 = (0, 1, 0)^T,$$

它们已经是正交的了, 单位化即得

$$q_1 = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2})^T, q_2 = (0, 1, 0)^T.$$

于是由 $Q^T A Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 得

$$A = Q \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} Q^T = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

证明(2) 由(1)得 $Q^T A Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 从而 $Q^T(A+E)Q = Q^T A Q + Q^T E Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + E = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

可见 $A+E$ 的特征值全大于零, 因而 $A+E$ 为正定矩阵.

43. 10 数二/三 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{bmatrix}$, 正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵, 若 Q 的第一列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$.

求 a, Q .

解: 设 $Q = (q_1, q_2, q_3)$, 由条件可知 $q_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$ 是 A 的特征向量.

$$\text{设 } Aq_1 = \lambda_1 q_1, \text{ 即 } \begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} = \lambda_1 \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix},$$

$$\text{从而 } \begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 即 } \begin{bmatrix} 2 \\ 5+a \\ 4+2a \end{bmatrix} = \lambda_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 由此可得 } \lambda_1 = 2, a = -1.$$

$$\text{故 } A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -4 \\ 1 & \lambda-3 & 1 \\ -4 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \xrightarrow[\times(-1)]{\begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix}} \begin{vmatrix} \lambda-5 & 5-\lambda & \lambda-5 \\ 1 & \lambda-3 & 1 \\ -4 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-5) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & \lambda-3 & 1 \\ -4 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \xrightarrow[\times 4]{\begin{matrix} \times(-1) \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix}} \\ &= (\lambda-5) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & -3 & \lambda+4 \end{vmatrix} = (\lambda-5) \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 \\ -3 & \lambda+4 \end{vmatrix} = (\lambda-5)(\lambda-2)(\lambda+4). \end{aligned}$$

故 A 的特征值为: $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 5, \lambda_3 = -4$.

$$5E - A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 1 \\ -4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow[\times 4]{\begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & -4 \\ -4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow[\times 4]{\begin{matrix} \times(-5) \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -9 & -9 \\ 0 & 9 & 9 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

由此可得 $(5E-A)x=0$ 的基础解系: $\xi_2 = (1, -1, 1)^T$.

$$-4E - A = \begin{bmatrix} -4 & 1 & -4 \\ 1 & -7 & 1 \\ -4 & 1 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow[\times 4]{\begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & -7 & 1 \\ -4 & 1 & -4 \\ -4 & 1 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -7 & 1 \\ -4 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -7 & 1 \\ 0 & -27 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

由此可得 $(-4E-A)x=0$ 的基础解系: $\xi_3 = (-1, 0, 1)^T$.

$$\text{令 } q_2 = \frac{1}{\|\xi_2\|} \xi_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T, q_3 = \frac{1}{\|\xi_3\|} \xi_3 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T,$$

$$\text{则 } Q = (q_1, q_2, q_3) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \text{ 为正交矩阵, 且 } Q^T A Q = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}.$$

注: 若取 $Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$, 则 $Q^T A Q = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$.

44. **例数一/二** 设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1 = (1, 1, 1)^T$, $\beta_2 = (1, 2, 3)^T$, $\beta_3 = (3, 4, a)^T$ 线性表示.

(1) 求 a 的值.

(2) 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出.

解: (1) 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$,

则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示 \Leftrightarrow 矩阵方程 $BX = A$ 无解 $\Leftrightarrow \text{秩}(B) \neq \text{秩}(B, A)$.

$$\text{而 } (B, A) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & a & 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \times(-1) \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & a-3 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \times(-2) \\ \leftarrow \end{matrix}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & a-5 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由此可见 $a-5=0$, 即 $a=5$.

$$(2) (A, B) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \times(-1) \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\leftarrow}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \times(-3) \quad \times(-1) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{由此可见 } AX = B \text{ 的解为 } X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 4 & 2 & 10 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \text{ 故 } (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 4 & 2 & 10 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix},$$

$$\text{即 } \beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3, \beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2, \beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3.$$

45. **例数三** 设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1 = (1, a, 1)^T$, $\beta_2 = (1, 2, 3)^T$, $\beta_3 = (1, 3, 5)^T$ 线性表示.

(1) 求 a 的值.

(2) 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出.

解: (1) 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$,

则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示 \Leftrightarrow 矩阵方程 $BX = A$ 无解 $\Leftrightarrow \text{秩}(B) \neq \text{秩}(B, A)$.

$$\text{而 } (B, A) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ a & 2 & 3 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 5 & 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \times(-a) \quad \times(-1) \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2-a & 3-a & -a & 1 & 3-a \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \times \frac{1}{2} \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 2-a & 3-a & -a & 1 & 3-a \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 2-a & 3-a & -a & 1 & 3-a \end{pmatrix} \xrightarrow{\times(a-2)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & a-1 & -a & \frac{1}{2}a & a-1 \end{pmatrix}.$$

由此可见 $a-1=0$, 即 $a=1$.

$$(2) (A, B) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\times(-3) \times(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{由此可见 } AX=B \text{ 的解为 } X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 故 } (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{即 } \beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3, \beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2, \beta_3 = \alpha_3.$$

46. **11 数一/二/三** 设 A 为三阶实对称矩阵, $r(A)=2$ 且 $A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$

(1) 求 A 的特征值与特征向量.

(2) 求矩阵 A .

解: (1) 因为 A 为三阶实对称矩阵, 所以 A 有 3 个实的特征值且对应于不同的特征值的特征向量是正交的. 又因为 $r(A)=2$, 所以 A 有一个特征值为 0, 另外两个特征值非零.

$$\text{由 } A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ 可以看出 } \xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 和 } \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 分别是 } A \text{ 的对应于 } \lambda_1 = -1 \text{ 和 } \lambda_2 = 1 \text{ 的特征向量.}$$

A 的对应于 $\lambda_3 = 0$ 的特征向量与 ξ_1, ξ_2 正交, 即齐次线性方程组 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} x = 0$ 的非零解.

$$\text{该齐次线性方程组的一个基础解系为 } \xi_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

综上所述, A 的 3 个特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$.

对应的特征向量依次为 $k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, k_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意非零实数.

$$(2) \text{ 由(1)可知, 令 } P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3), \text{ 则 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \text{由 } (P, E) &= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\leftarrow} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\leftarrow} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\times 1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\times \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ 可得} \end{aligned}$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \text{ 故 } A = P \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

四. 证明题

1. **02 数一** 设 A, B 为同阶方阵,

- (1) 如果 A, B 相似, 试证 A, B 的特征多项式相等.
- (2) 举一个二阶方阵的例子说明(1)的逆命题不成立.
- (3) 当 A, B 均为实对称矩阵时, 试证(1)的逆命题成立.

证明(1): 如果 A, B 相似, 那么存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$, 于是有

$$|\lambda E - A| = |P^{-1} \cdot |\lambda E - A| \cdot P| = |P^{-1} \cdot |\lambda E - A| \cdot P| = |P^{-1}(\lambda E - A)P| = |P^{-1}\lambda EP - P^{-1}AP| = |\lambda E - B|.$$

这就是说 A, B 的特征多项式相等.

解(2): 取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = |\lambda E - B|$.

但是假若存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$, 则有 $B = P^{-1}AP = P^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. 这是不可能的.

故 A, B 不相似.

证明(3): 当 A, B 均为 n 阶实对称矩阵时, 若 A, B 的特征多项式相等, 则 A, B 具有相同的特征值. 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的特征值, 则存在正交矩阵 P, Q 使得

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} = Q^{-1}BQ,$$

于是有 $(PQ^{-1})^{-1}A(PQ^{-1}) = QP^{-1}APQ^{-1} = QQ^{-1}BQQ^{-1} = B$, 故 A, B 相似.

2. **02 数二** 已知 A, B 为 3 阶矩阵, 且满足 $2A^{-1}B = B - 4E$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵.

(1) 证明: 矩阵 $A - 2E$ 可逆.

(2) 若 $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 求矩阵 A .

证明(1): $2A^{-1}B = B - 4E \Rightarrow 2B = A(B - 4E) = AB - 4A \Rightarrow AB - 4A - 2B = O$

$$\Rightarrow (A - 2E)(B - 4E) = AB - 4A - 2B + 8E = O + 8E = 8E \Rightarrow (A - 2E) \frac{1}{8}(B - 4E) = E \Rightarrow A - 2E \text{ 可逆}.$$

解(2): 由上面的证明可知 $A - 2E = 8(B - 4E)^{-1}$, 因而 $A = 8(B - 4E)^{-1} + 2E$, 其中 $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$,

$$B - 4E = \begin{bmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, (B - 4E)^{-1} = \begin{bmatrix} -1/4 & 1/4 & 0 \\ -1/8 & -3/8 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{bmatrix}. \text{ 故 } A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

3. **03 数一/二** 已知平面上三条不同直线的方程为

$$l_1: ax + 2by + 3c = 0,$$

$$l_2: bx + 2cy + 3a = 0,$$

$$l_3: cx + 2ay + 3b = 0,$$

试证这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a + b + c = 0$.

证明: $\begin{vmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix} = 6 \begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = 6(a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$

$$= 6(a+b+c)(bc+ac+ab-a^2-b^2-c^2) = -3(a+b+c)[(a-b)^2+(a-c)^2+(b-c)^2].$$

由于 l_1, l_2, l_3 是三条不同的直线, 所以 a, b, c 不能全部相等, 因而 $(a-b)^2+(a-c)^2+(b-c)^2 \neq 0$.

$$\begin{aligned} \text{于是, 这三条直线交于一点} &\Leftrightarrow \text{齐次线性方程组} \begin{cases} ax+2by+3c=0 \\ bx+2cy+3a=0 \\ cx+2ay+3b=0 \end{cases} \text{有唯一解} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{vmatrix} = 0 \\ &\Leftrightarrow -3(a+b+c)[(a-b)^2+(a-c)^2+(b-c)^2] = 0 \Leftrightarrow a+b+c=0. \end{aligned}$$

4. **08 数一** 设 $A = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T$, α, β 是三维列向量, α^T 为 α 的转置, β^T 为 β 的转置. 证明:

(1) $r(A) \leq 2$. (2) 若 α, β 线性相关, 则 $r(A) < 2$.

证明: (1) 因为 α, β 为三维列向量, 所以 $r(\alpha\alpha^T) \leq r(\alpha) \leq 1$, $r(\beta\beta^T) \leq r(\beta) \leq 1$. 于是有

$$r(A) = r(\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \leq r(\alpha\alpha^T) + r(\beta\beta^T) \leq 2.$$

(2) 若 α, β 线性相关, 不妨设 $\beta = k\alpha$, 则有

$$r(A) = r(\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) = r[\alpha\alpha^T + (k\alpha)(k\alpha)^T] = r(\alpha\alpha^T + k^2\alpha\alpha^T) = r[(1+k^2)\alpha\alpha^T] = r(\alpha\alpha^T) \leq r(\alpha) \leq 1.$$