

$$y=2x-1$$

$$\begin{array}{l} y=2x-1\\ y=2x-1\\ x^2-1 \end{array}$$

$$x^2-1$$

$$x^{2y}, x^{2y^x}, X_{n_1}^{2y^z}$$

$$2^{2^{2^{2^{2^{2^2}}}}}$$

$$f'(x)-f'''(x)|_{x=0}$$

$$\pi, \Phi, \Sigma, \mu, \alpha$$

$$\Gamma\Pi\Phi\hbox{는}\Gamma\Pi\Phi\hbox{와}\hbox{다르다}.$$

$$\hbox{는}\Psi\Theta\Omega\hbox{와}\hbox{다르다}.$$

$$\sqrt[x]{x}, \sqrt[3]{ax+b}, \sqrt[2]{5}, \sqrt{2}, \sqrt[x]{2}$$

$$\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+x}}}}}}\ldots\ldots\ldots\quad (1)$$

$$\sqrt{a} \quad \sqrt{d} \quad \sqrt{g}$$

$$(x_1+\cdots+x_n)$$

$$(a_1,\ldots,a_m)$$

$$\ldots (...)$$

$$\frac{x^2+1}{y_1^2-1}$$

$$1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+x}}}}$$

$$\frac{1}{2},\frac{x}{2}$$

$$\mathcal{S}\hbox{를}\mathcal{S}=\{A\mid A\ni\mathcal{T}\}\hbox{라 하자}.$$

$$\emptyset,\emptyset$$

$$\nexists,\not\subset,\not\leftarrow$$

$$\lim_{n\rightarrow\infty}$$

$$\lim_{n\rightarrow\infty}$$

$$\limsup_n$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty}$$

$$\iint \cdots \int f dP$$

$\sqrt{4n}$

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$$

디스플레이 스타일:

$$\sum_{i=1}^n x_i = \int_0^1 f$$

$$\frac{a-b}{c+d} \neq \frac{a-b}{c+d}$$

$$\frac{c}{a} = \frac{a}{b}$$

$$\overline{c + d}$$

$$\frac{a-b}{a-b}$$

$$c + d$$

$$\vec{x} + \vec{y} = \begin{cases} a \\ b \end{cases}$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\widehat{a-1} = \widetilde{x-y} + \widehat{\text{Cov}}$$

a

$$b$$

\mathcal{C}

$$a - b$$

$$b - c$$

$$c - a$$

$$x^2 + 2x + 1$$

$$x^2 + 2x + 1$$

$$x^2 + 2x + 1$$

$$a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1$$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

-
-
-

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

[illegible]

$$\left(\begin{array}{c} \left|\begin{array}{cc} a & b \\ c & d \end{array}\right| \\ e \\ f \end{array}\right)$$

$$x^n = \overbrace{x \times x \times \cdots \times x}$$

$$\overbrace{a+b+\overline{c+d}}+e$$

$$\overbrace{a+\underbrace{b+c+e}_{123}}^{ab}$$

$$\frac{p(x_i|\boldsymbol{x}_{-i})}{1-p(x_i|\boldsymbol{x}_{-i})}=\theta_1\sum_{i=1}^m x_i+\beta_1\sum_{\text{nbr}} x_ix_{i'}\text{} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} (x+y)^2 &= x^2+xy+yx+y^2 \text{} \quad (4) \\ &= x^2+xy+xy+y^2 \\ &= x^2+2xy+y^2 \text{} \quad (5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x+y)^2 &= x^2+xy+yx+y^2 \text{} \quad (6) \\ &= x^2+2xy+y^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x+y)^2 &= x^2+xy+yx+y^2 \text{} \quad (6) \\ &= x^2+2xy+y^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l= \\ x+y+z+a+b+c+d+e+f+g+o+s+t+ \\ u+v+w \end{aligned}$$

Math italic *different* is from *different*.

$$f(x)=\left\{\begin{array}{ll} x & ifx>2orifx<-2 \\ x & ifx>2orifx<-2 \\ x & if\,x>2\,or\,if\,x<-2 \end{array}\right.\text{} \quad (7)$$

$$\begin{array}{l} \text{Form } e^{\text{pdf}} + (x) \\ \text{Form } e^{\text{pdf}} + (x) \end{array}$$

Form $e^{\text{pdf}} + (x)$
Form $e^{\text{pdf}} + (x)$
 Form $e^{\text{pdf}} + (x)$
ABC

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$$

$$a = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$$

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$$

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$$

$$aX + \beta + \gamma$$

$$aX + \beta + \gamma$$

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$

AAAAA

$$a + b$$

$$\overline{c - d}$$

$$\frac{a+b}{c-d}$$

$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + x}}}}$$

$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + x}}}}}$$

$$\text{표준편차} = \sqrt{\text{분산}} = \sqrt{\frac{\text{편차}^2 \text{의 합}}{\text{표본의 개수} - 1}} \quad \dots \dots \dots (8)$$

$$\int_0^\infty f(x)dx$$

$$\int_0^{\infty} f(x) dx$$

$$0$$

$$\int f(x)dx$$

$$J_0$$

$$\int_0^\infty f(x)dx$$

$$\int_0^\infty f(x)dx$$

$$\inf \sup_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

$$\infsup_{n\rightarrow\infty}f_n(x)$$

$$\mathop{\mathrm{woops}}\infsup_{n\rightarrow\infty}f_n(x)$$

$$\infsup_{n\rightarrow\infty}^{\mathrm{woops}}f_n(x)$$

$$\sum_{i,j=1,n\atop i\neq j}$$

$$\sum_{i,j=1,ni\neq j}\binom{2n}{n},\, {}_{2n}\mathrm{C}_{\mathrm{n}}\\ \binom{2n}{n}$$

$$\binom{2n}{n}$$

$$\begin{array}{c} \left[\begin{array}{c} x \\ 2y \end{array} \right] \\ \left\{ \begin{array}{c} a-c \\ b \end{array} \right\} \end{array}$$

$$^{231}_{73}\mathrm{U}$$

$$^{231}_{73}\mathrm{U}$$

$$x+\left\langle \begin{array}{c} a+b \\ c \end{array} \right\rangle$$

$$x+\left|\begin{array}{c} \uparrow a+b \\ c \end{array}\right|\downarrow$$

$$B=\begin{pmatrix}\lambda&l\\a&\alpha\end{pmatrix}$$

$$B=\left(\begin{array}{cc}\lambda&l\\a&\alpha\end{array}\right)$$

$$A=\begin{array}{cc} & \begin{array}{ccc} n_1 & n_2 & n_3 \end{array} \\ \begin{array}{c} m_1 \\ m_2 \end{array} & \left(\begin{array}{ccc} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{array} \right) \end{array}$$

$$A=\begin{array}{cc} & \begin{array}{ccc} n_1 & n_2 & n_3 \end{array} \\ \begin{array}{c} m_1 \\ m_2 \end{array} & \left(\begin{array}{ccc} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{array} \right) \end{array}$$

$$\mathfrak{5}$$

$$f(x)=\left\{\begin{array}{ll}x & \text{for } x>0 \\ -x & \text{for } -1<x\leq 0 \\ x^2 & \text{otherwise}\end{array}\right.$$

$$f(x)=\left\{\begin{array}{ll}x & \text{for } x>0 \\ -x & \text{for } -1<x\leq 0 \\ x^2 & \text{otherwise}\end{array}\right.$$

$$\frac{a+b}{c+d}$$

$$\frac{a+b}{c+d}$$

$$\{x\big|x\in X\}$$

$$\{x\mid x\in X\}$$

$$\{x\big|x\in X\}$$

$$\{x\big|x\in X\}$$

$$\left\{\left\{\left\{\left\{\left\{\right\}\right\}\right\}\right\}\right\}$$

$$|b-|x+y||$$

$$\left|b-|x+y|\right|$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\}\text{ if }\mu=0,\sigma=1\tag{9a}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\{-\frac{x^2}{2\sigma^2}\}\text{ if }\mu=0\tag{9b}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\{-\frac{x^2}{2}\}\text{ if }\mu=0,\sigma=1\tag{9c}$$

식 9b와 9c는 식 9a의 특별한 경우이다.

ABCDER

MathfrackFont

®✓✠