$y = 2x - 1$

$y = 2x - 1$
$y = 2x - 1$
$x^2 - 1$

$$x^2 - 1$$

$x^{2y}, x^{2y^x}, X_{n_1}^{2y^z}$
$2^{2^{2^{2^{2^{2^2}}}}}$
$f'(x) \quad f'''(x)|_{x=0}$
$\pi, \Phi, \Sigma, \mu, \alpha$
$\mathit{\Gamma\Pi\Phi}$는 $\Gamma\Pi\Phi$와 다르다.
Ψ는 $\Psi\Theta\Omega$와 다르다.
$\sqrt[n]{x}, \sqrt[3]{ax+b}, \sqrt[2]{5}, \sqrt{2}, \sqrt[x]{2}$

$$\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+x}}}}}} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (1)$$

$$\sqrt{a} \quad \sqrt{d} \quad \sqrt{g}$$

$(x_1 + \cdots + x_n)$
$(a_1, \ldots, a_m)$
$\ldots(\ldots)$
$\dfrac{x^2+1}{y_1^2-1}$
$1 + \cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+x}}}}$
$\frac{1}{2}, \frac{x}{2}$
$\mathcal{S}$를 $\mathcal{S} = \{A \mid A \ni \mathcal{T}\}$라 하자.
$\emptyset, \emptyset$
$\not\ni, \not\subset, \not< $
$\lim_{n\to\infty}$

$$\lim_{n\to\infty}$$

$\limsup_n$

$$\liminf_{n\longrightarrow\infty}$$

$$liminf_{n\longrightarrow\infty}$$

$a \bmod b \qquad y \pmod{a+b}$

$\iint\cdots\int f dP$

$1/\log n \qquad 1/\log$

$\sqrt{4}\,n$

$f(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\Big\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\Big\}$

$$f(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\Big\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\Big\}$$

$$f(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\}$$

디스플레이 스타일:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = \int_0^1 f$$

텍스트 스타일: $\sum_{i=1}^{n} x_i = \int_0^1 f$

$\frac{a-b}{c+d}$ 와 $\frac{a-b}{c+d}$

$\dfrac{a-b}{c+d}$

$\frac{a-b}{c+d}$

$$\vec{x}+\vec{y} = \left\{ \begin{array}{l} a \\ b \end{array} \right.$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\widehat{a-1} = \widetilde{x-y} + \widehat{\mathrm{Cov}}$$

$$\begin{array}{lrr} a & b & c \\ a-b & b-c & c-a \\ x^2+2x+1 & x^2+2x+1 & x^2+2x+1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ \qquad\qquad\vdots \\ a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \end{array} \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \quad (2)$$

$$\left(\left| \begin{array}{cc} a & b \\ c & d \end{array} \right| \right)$$
$$\begin{matrix} e \\ f \end{matrix}$$

$$x^n = \overbrace{x \times x \times \cdots \times x}$$

$$\overbrace{a + \underbrace{b + \overline{c + d}} + e}$$

$$\overbrace{a + \underbrace{b + c}_{123} + e}^{ab}$$

$$\frac{p(x_i|\boldsymbol{x}_{-i})}{1 - p(x_i|\boldsymbol{x}_{-i})} = \theta_1 \sum_{i=1}^{m} x_i + \beta_1 \sum_{\text{nbr}} x_i x_{i'} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (3)$$

$$\begin{aligned} (x+y)^2 &= x^2 + xy + yx + y^2 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (4) \\ &= x^2 + xy + xy + y^2 \\ &= x^2 + 2xy + y^2 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x+y)^2 &= x^2 + xy + yx + y^2 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (6) \\ &= x^2 + 2xy + y^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l = \\ &\quad x + y + z + a + b + c + d + e + f + g + o + s + t + \\ &\quad u + v + w \end{aligned}$$

Math italic $different$ is from *different*.

$$f(x) = \begin{cases} x & if x > 2 or if x < -2 \\ x & \text{if} x > 2 \text{orif} x < -2 \\ x & \text{if } x > 2 \text{ or if } x < -2 \end{cases} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (7)$$

Form $\mathrm{e}^{\mathrm{pdf}} + \ (\mathrm{x})$
Form $e^{pdf} + \ (x)$

$\texttt{Form e}^{\texttt{pdf}} + (\texttt{x})$
$\mathbf{Form\ e^{pdf}} + (\mathbf{x})$
$\mathsf{Form\ e^{pdf}} + (\mathsf{x})$
$\mathcal{ABC}$

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n)^T$$

$\boldsymbol{a = (a_1, a_2, \ldots, a_n)^T}$
$\boldsymbol{a}= (a_1, a_2, \ldots, a_n)^T$
$\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, \ldots, a_n)^T$
$\boldsymbol{aX + \beta + \gamma}$
$\boldsymbol{aX} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma}$
$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$
$AAAAA$
$\frac{a+b}{c-d}$
$\frac{a+b}{c-d}$
$1 + \frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+x}}}}$

$$1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1+x}}}}}$$

$$\text{표준편차} = \sqrt{\text{분산}} = \sqrt{\frac{\text{편차}^2\text{의 합}}{\text{표본의 개수} - 1}} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (8)$$

$\int_0^\infty f(x)dx$
$\int\limits_0^\infty f(x)dx$

$$\int_0^\infty f(x)dx$$

$\int_0^\infty f(x)dx$
$\int_0^\infty f(x)dx$
$\inf \sup_{n\to\infty} f_n(x)$

$\inf\sup f_n(x)$
$\underset{\text{woops}}{\underset{n\to\infty}{\inf\sup}} f_n(x)$
$\underset{n\to\infty}{\inf\sup} f_n(x)$
$\inf\sup_{n\to\infty}^{\text{woops}} f_n(x)$

$$\sum_{\substack{i,j=1,n\\ i\neq j}}$$

$$\sum_{i,j=1,ni\neq j}$$
$\binom{2n}{n}$, ${}_{2n}\mathrm{C}_{\mathrm{n}}$
$\left(\begin{array}{c} 2n \\ n \end{array}\right)$

$$\tbinom{2n}{n}$$

$\left[\begin{smallmatrix} x \\ 2y \end{smallmatrix}\right]$
$\left\{\begin{smallmatrix} a-c \\ b \end{smallmatrix}\right\}$

$${}^{231}_{73}\mathrm{U}$$

$${}^{231}_{73}\mathrm{U}$$

$$x + \left\langle \begin{array}{c} a+b \\ c \end{array} \right\rangle$$

$$x + \left\uparrow \begin{array}{c} a+b \\ c \end{array} \right\downarrow$$

$$B = \begin{pmatrix} \lambda & l \\ a & \alpha \end{pmatrix}$$

$$B = \left(\begin{array}{cc} \lambda & l \\ a & \alpha \end{array}\right)$$

$$A = \begin{array}{c} \\ m_1 \\ m_2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} n_1 & n_2 & n_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{pmatrix} \end{array}$$

$$A = \begin{array}{c} \\ m_1 \\ m_2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} n_1 & n_2 & n_3 \end{array} \\ \left(\begin{array}{ccc} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{array}\right) \end{array}$$

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{for } x > 0 \\ -x & \text{for } -1 < x \leq 0 \\ x^2 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{for } x > 0 \\ -x & \text{for } -1 < x \leq 0 \\ x^2 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\frac{a+b}{c+d}$$

$$\frac{a+b}{c+d}$$

$$\{x \middle| x \in X\}$$

$$\{x \mid x \in X\}$$

$$\{x \middle| x \in X\}$$

$$\{x \middle| x \in X\}$$

$$\left\{\left\{\left\{\{\}\right\}\right\}\right\}$$

$$|b - |x + y||$$

$$\left|b - |x + y|\right|$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\} \text{ if } \mu = 0, \sigma = 1 \tag{9a}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\{-\frac{x^2}{2\sigma^2}\} \text{ if } \mu = 0 \tag{9b}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\{-\frac{x^2}{2}\} \text{ if } \mu = 0, \sigma = 1 \tag{9c}$$

식 9b와 9c는 식 9a의 특별한 경우이다.

$\mathbb{ABCDER}$

$\mathfrak{MathfrackFont}$

®✓✠

$$\sum_{\substack{i=j\\j<k\\j\neq k}} x_{ij}^{j-k}$$

$$\iiint\limits_{\substack{x\in A\\y\in B\\C\ni z}} f(x,y,z)dxdydz$$

$$\sum^{\sum^{m-n}} \sum^{n} x_{ij}$$

$$\begin{aligned} a = d + e + f + g + h + i + j + k + l + m \\ + q + r + s + t + u + v + w + x + y + x + z \\ + q + r + s + t + u + v + w + x + y + z \\ = e + f + g + h + i + j + k + l + m + z + y + x + m_2 \end{aligned} \tag{10}$$

$$(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 \tag{11}$$

$$(x+y+z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx \tag{12}$$

$$(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 \tag{13}$$

$$(x+y+z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx \tag{14}$$

$$a_{11} = a_{12} \qquad a_{13} = a_{14} \tag{15}$$

$$(x+y)^2 = (x+y)(x+y)x^2 + 2xy + y^2 = z^2 \tag{16}$$

$$f(x) = \frac{1}{(1+x^2)} \qquad g(x) = \sqrt{2\pi} \tag{17}$$

$$\begin{array}{lcl} a = \alpha & & D = \Delta\Delta\Delta \\ b = \beta\beta & \text{versus} & e = \epsilon\epsilon \\ c = \gamma\gamma\gamma & & Z = \Omega \end{array} \quad \dots\dots\dots \quad (18)$$

$$\begin{array}{ccc} a = \alpha & & D = \Delta\Delta\Delta \\ b = \beta\beta & \text{versus} & e = \epsilon\epsilon \\ c = \gamma\gamma\gamma & & Z = \Omega \end{array} \quad \dots\dots\dots \quad (19)$$

$$\begin{array}{l} f(x) = \mathcal{F}(x) g(x) = \mathcal{G}(x) \\ f(x) = \mathfrak{F}(x)\, g(x) = \mathfrak{G}(x) \end{array} \quad \text{where} \quad \begin{array}{c} \mathfrak{F} = \mathbb{F} \\ \mathfrak{G} = \mathbb{G} \end{array} \quad \dots\dots \quad (20)$$

$$f(x) = \mathcal{F}(x) \qquad g(x) = \mathcal{G}(x) \qquad \mathcal{G} = \mathbb{G} \qquad (21)$$

$$f(x) = \mathfrak{F}(x) \qquad g(x) = \mathfrak{G}(x) \qquad \mathcal{F} = \mathbb{F} \qquad (22)$$

$$\begin{array}{lcr} f(x) = \mathcal{F}(x) & g(x) = \mathcal{G}(x) & \mathcal{G} = \mathbb{G} \\ f(x) = \mathfrak{F}(x) & g(x) = \mathfrak{G}(x) & \mathcal{F} = \mathbb{F} \end{array}$$

$$P_{i-j} = \begin{cases} 0 & \text{if } r-j \text{ is odd} \\ r!(-1)^{i-j} & \text{if } r-j \text{ is even} \end{cases} \quad \dots\dots\dots \quad (23)$$

$$a_1 = a_0 + d \qquad (24)$$

$$a_2 = a_1 + d = a_0 + 2d \qquad (25)$$

in general

$$a_n = a_{n-1} + d = a_0 + nd \qquad (26)$$

$$a_1 \quad = \quad a_0 + d \quad \dots\dots\dots \quad (27a)$$

$$a_n \quad = \quad a_{n-1} + d \quad \dots\dots\dots \quad (27b)$$

$$A_1, A_2, \ldots, A_1, A_2, \ldots$$

$$A_1 + A_2 + \cdots, A_1 + A_2 + \cdots$$

곱하기$A_1A_2\cdots, A_1A_2\cdots$

$$\int_{A_1}\int_{A_2}\cdots\int_{A_1}\int_{A_2}\cdots$$

"다음의 행렬 $\left[\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right]$은 문장 내에서 쓴 작은 행렬이다."

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & \cdots\cdots & \end{matrix}$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} D_1t & -a_{12}t_2 & \ldots & -a_{1n}t_n \\ -a_{21}t_1 & D_2t & \ldots & -a_{2n}t_n \\ -a_{31}t_1 & -a_{n2}t_2 & \ldots & D_nt \\ -a_{n1}t_1 & -a_{n2}t_2 & \ldots & D_nt \end{pmatrix}$$

$$\overleftarrow{a} \quad \overrightarrow{a} \quad \overleftrightarrow{a} \quad \underleftarrow{a} \quad \underrightarrow{a} \quad \underleftrightarrow{a}$$

$$\ddot{a}$$

$$\dddot{a}$$

$$\ddddot{a}$$

$$A \xleftarrow[\mu]{n\to\infty} B \xrightarrow[\sigma]{n\to-\infty} C \underset{\delta}{\rightarrow} D$$

$$\sqrt[\beta]{x}\,\sqrt[\beta]{x}$$

$$\boxed{\eta \leq N(\mu, \sigma^2) + O_p(n)}$$

$$\frac{a+b}{c-d} \qquad \binom{n}{x}$$

$$\frac{a+b}{c-d} \qquad \binom{n}{x}$$

$$\tfrac{a+b}{c-d} \qquad \binom{n}{x}$$

$$\cfrac{2}{\sqrt{2}+\cfrac{1}{\sqrt{2}+\cfrac{1}{\sqrt{2}+\cfrac{1}{\sqrt{2}+\cdots}}}}$$

$$\overset{*}{X}\underset{*}{X}$$

$${}_{a}^{b}\sum_{c}^{d}$$

$${}^{b}\sum\int_{c}$$

$\gcd(c, m \bmod n)$
$x = y \pmod b$
$x = y \mod c$
$x = y \ (d)$

$$\int f d\mu \quad \iint f d\mu \quad \iiint f d\mu \quad \iiiint f d\mu \int \cdots \int f d\mu \ . \ . \ . \tag{28}$$

$$\sqrt{a} + \sqrt{y} + \sqrt{d} \qquad \sqrt{a} + \sqrt{y} + \sqrt{d}$$

$$\xrightarrow{a\alpha+\beta+\gamma}$$

$$\xrightarrow[a\alpha+\beta+\gamma]{}$$

$$\xleftarrow{a\alpha+\beta+\gamma}$$

$$\xleftarrow[a\alpha+\beta+\gamma]{}$$

$$\xleftarrow[\beta]{\alpha}$$

$$\begin{array}{ccc} F(x) & \xleftarrow[n\longrightarrow\infty]{} & G(x) \\ {\scriptstyle n\longrightarrow\infty}\downarrow{\scriptstyle m\sim n} & & \uparrow{\scriptstyle m\longrightarrow\infty} \\ \mathcal{F}(x) & = & \mathcal{G} \end{array}$$