

Base R 1: Vectors

HONG CHEN

February 10, 2018

1. Create the vectors:

(a) (1, 2, 3, . . . , 19, 20)

```
c(1:20)
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
```

(b) (20, 19, . . . , 2, 1)

```
seq(20,1,-1)
```

```
## [1] 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
```

(c) (1, 2, 3, . . . , 19, 20, 19, 18, . . . , 2, 1)

```
c(1:20,seq(19,1,-1))
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 18 17
## [24] 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
```

(d) assign vector c(4, 6, 3) variable name tmp

```
tmp <- c(4,6,3)
```

Use tmp for parts (e), (f) and (g)

(e) (4, 6, 3, 4, 6, 3, . . . , 4, 6, 3) where there are 10 occurrences of 4.

```
rep(tmp,10)
```

```
## [1] 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3
```

(f) (4, 6, 3, 4, 6, 3, . . . , 4, 6, 3, 4) where there are 11 occurrences of 4, 10 occurrences of 6 and 10 occurrences of 3.

```
c(rep(tmp,10),4)
```

```
## [1] 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4 6 3 4
```

(g) (4, 4, . . . , 4, 6, 6, . . . , 6, 3, 3, . . . , 3) where there are 10 occurrences of 4, 20 occurrences of 6 and 30 occurrences of 3.

```
c(rep(4,10),rep(6,20),rep(3,30))
```

```
## [1] 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3
## [36] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
```

2. Create a vector of the values of

$e^x \cos(x)$ at $x = 3, 3.1, 3.2, \dots, 6$.

```
# reset value of tmp
x2 <- seq(3,6,by=0.1)
exp(x2)*cos(x2)

## [1] -19.884531 -22.178753 -24.490697 -26.773182 -28.969238 -31.011186
## [7] -32.819775 -34.303360 -35.357194 -35.862834 -35.687732 -34.685042
## [13] -32.693695 -29.538816 -25.032529 -18.975233 -11.157417 -1.362099
## [19] 10.632038 25.046705 42.099201 61.996630 84.929067 111.061586
## [25] 140.525075 173.405776 209.733494 249.468441 292.486707 338.564378
## [31] 387.360340

# To keep the listing shorter
```

3. Create the following vectors:

(a) $(0.1^3 0.1^1, 0.1^6 0.2^4, \dots, 0.1^{36} 0.2^{34})$

```
x3a1 <- seq(3,36,3)
x3a2 <- seq(1,34,3)
c((0.1^x3a1)*(0.2^x3a2))

## [1] 2.000000e-04 1.600000e-09 1.280000e-14 1.024000e-19 8.192000e-25
## [6] 6.553600e-30 5.242880e-35 4.194304e-40 3.355443e-45 2.684355e-50
## [11] 2.147484e-55 1.717987e-60

(b)  $(2, \frac{2^2}{2}, \frac{2^3}{3}, \dots, \frac{2^{25}}{25})$ 
```

```
x3b <- c(1:25)
2^x3b/x3b

## [1] 2.000000e+00 2.000000e+00 2.666667e+00 4.000000e+00 6.400000e+00
## [6] 1.066667e+01 1.828571e+01 3.200000e+01 5.688889e+01 1.024000e+02
## [11] 1.861818e+02 3.413333e+02 6.301538e+02 1.170286e+03 2.184533e+03
## [16] 4.096000e+03 7.710118e+03 1.456356e+04 2.759411e+04 5.242880e+04
## [21] 9.986438e+04 1.906502e+05 3.647221e+05 6.990507e+05 1.342177e+06
```

4. Calculate the following:

(a) $\sum_{i=10}^{100} (i^3 + 4i^2)$

```
x4a <- c(10:100)
sum(x4a^3+4*x4a^2)
```

```
## [1] 26852735
```

(b) $\sum_{i=1}^{25} (\frac{2^i}{i} + \frac{3^i}{i^2})$

```
x4b <- c(1:25)
sum((2^x4b)/2+3^x4b/(x4b^2))
```

```
## [1] 2159917261
```

5. Use the function `paste()` to create the following character vectors of length 30:

- (a) ("label 1", "label 2", ..., "label 30"). Note that there is a single space between label and the number following.

```
paste("label",1:30,sep=" ")
```

```
## [1] "label 1" "label 2" "label 3" "label 4" "label 5" "label 6"
## [7] "label 7" "label 8" "label 9" "label 10" "label 11" "label 12"
## [13] "label 13" "label 14" "label 15" "label 16" "label 17" "label 18"
## [19] "label 19" "label 20" "label 21" "label 22" "label 23" "label 24"
## [25] "label 25" "label 26" "label 27" "label 28" "label 29" "label 30"
```

- (b) ("fn1", "fn2", ..., "fn30").

```
paste("fn",1:30,sep="")
```

```
## [1] "fn1" "fn2" "fn3" "fn4" "fn5" "fn6" "fn7" "fn8" "fn9" "fn10"
## [11] "fn11" "fn12" "fn13" "fn14" "fn15" "fn16" "fn17" "fn18" "fn19" "fn20"
## [21] "fn21" "fn22" "fn23" "fn24" "fn25" "fn26" "fn27" "fn28" "fn29" "fn30"
```

6. Execute the following lines which create two vectors of random integers which are chosen with replacement from the integers 0, 1, . . . , 999. Both vectors have length 250.

```
set.seed(50)
xVec <- sample(0:999, 250, replace=T)
yVec <- sample(0:999, 250, replace=T)
```

Suppose $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ denotes the vector `xVec` and $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ denotes the vector `yVec`.

- (a) Create the vector $(y_2 - x_1, \dots, y_n - x_{n-1})$.

```
yVec[2:250]-xVec[1:249]
```

```
## [1] 163 -122 317 -146 417 393 249 -489 741 771 81 402 -549 338
## [15] 583 -403 -67 217 307 -121 -269 36 -706 -563 102 48 397 297
## [29] -45 -152 497 405 339 -400 499 -89 211 -670 87 74 554 149
## [43] -183 612 193 -453 -70 -141 127 -709 -708 -722 -64 388 -184 -212
## [57] 242 430 275 672 -150 275 -96 -255 512 577 264 439 149 -916
## [71] 374 -889 -332 324 -553 394 -87 -75 345 -735 -55 100 -40 15
## [85] 279 409 790 -547 -487 -399 -619 -168 -185 19 645 551 227 -366
## [99] 242 147 247 -499 -614 758 63 -227 247 379 -472 566 -762 152
## [113] 493 360 69 190 544 -176 216 -676 -205 782 -109 189 -233 505
## [127] -219 288 -57 487 256 300 -192 -263 704 674 217 280 17 -68
## [141] 259 612 -127 1 545 -231 -191 -338 333 495 -21 -4 294 -668
## [155] -814 420 793 631 -67 655 143 611 -220 -518 -285 327 523 -13
## [169] -679 -241 39 193 342 588 469 68 895 -658 232 -331 27 441
## [183] -733 -182 -399 79 -469 371 475 265 -407 211 59 -974 -90 218
## [197] 396 -486 -963 -327 425 220 128 235 294 -107 -365 146 -588 449
```

```
## [211] -434 221 846 386 -910 161 206 109 712 -334 -434 7 640 -350
## [225] 923 353 -579 225 327 410 568 -195 -83 154 -486 -195 667 -144
## [239] 272 410 546 380 -559 414 674 193 222 -92 553
```

(b) Create the vector $(\frac{\sin(y_1)}{\cos(x_2)}, \frac{\sin(y_2)}{x_3}, \dots, \frac{y_{n-1}}{\cos(x_n)})$.

```
sin(yVec[1:249])/cos(xVec[2:250])
```

```
## [1] 0.88603405 -1.44184825 0.82807258 -1.61591717 -0.86017343
## [6] 20.26356465 -0.79930406 1.72414444 -0.08094240 -0.74895634
## [11] -2.59866958 -0.37361045 31.11471579 0.12355916 -0.35925226
## [16] -0.90743608 0.34374436 5.78205917 -2.57418558 -0.78661325
## [21] -0.59855406 0.98936263 0.33042931 -1.75124647 -0.59435547
## [26] 1.05374692 0.65497397 -0.11596582 -0.97176537 0.57180267
## [31] 0.75799030 -0.49259143 -0.99433357 0.05377148 -3.77616264
## [36] 20.54902944 0.77784817 1.28146891 -0.51650728 6.66902699
## [41] -0.92970072 -10.93066299 -3.13102962 30.87943423 -1.14281543
## [46] 0.36757630 1.18479716 0.94594159 0.93339520 0.93632658
## [51] -11.05384468 2.76893270 0.97488334 -0.08932225 -1.33616578
## [56] -3.30065552 0.62663162 -1.96486337 0.08653876 0.56695489
## [61] 44.07630714 -1.11764853 0.11230330 -0.46073106 -0.13860882
## [66] 0.84026052 2.64708780 -1.63174570 -9.63022830 -2.15553419
## [71] -0.42770826 3.24955062 -4.23453154 0.93067452 -0.88388390
## [76] 0.69339350 1.72841015 -8.22082884 1.69276461 1.02074555
## [81] -3.21968328 -0.90739226 1.11331935 0.59579467 0.19571363
## [86] -0.17975474 4.38929818 0.64431266 -1.54509170 -0.26536991
## [91] -0.81679156 1.34164181 -1.03400420 -1.33639979 -0.44444499
## [96] 0.96777754 -0.09545121 -0.63686070 -2.30844090 -0.11384497
## [101] 1.08800453 1.06851885 -0.30428029 -1.77044888 -1.45269351
## [106] 0.97943716 -2.15021752 1.56128032 0.61018741 5.59692239
## [111] -1.03020002 -1.14632240 -0.81548097 0.95359082 74.12815803
## [116] -0.20329495 -0.08875385 -0.76023984 -0.42372635 -0.68385723
## [121] 1.28860542 0.94117702 1.89561343 0.69369539 4.15021756
## [126] -1.08026240 1.26615554 0.02147428 3.32694398 0.22930300
## [131] 1.14217476 0.73847767 8.72339712 -17.15727240 0.90435970
## [136] 1.07791792 0.75391899 -0.26297571 0.83894657 -1.22542984
## [141] -0.57277292 -1.22429033 2.10719833 -1.35745285 -0.84117115
## [146] -0.69663176 -0.99207337 -1.17363312 -5.50814669 -1.12309426
## [151] 0.60767585 0.32903697 -0.08845387 -4.42251048 -1.31360561
## [156] -1.05268827 -1.45007537 -1.03184453 0.38034305 2.06381128
## [161] -1.64568068 0.47938401 46.18666528 1.75988821 14.03349520
## [166] 1.99884446 -1.02170635 1.02445028 -0.15250370 -1.11793279
## [171] -4.12228606 1.02355677 0.89546497 0.74732250 -2.09533197
## [176] -2.40630344 -0.73530615 0.90759126 -0.87474163 -4.22536917
## [181] -2.04450866 -7.41320483 0.03607946 -0.85674969 -0.85648584
## [186] 2.58973778 8.68248704 -0.74202802 1.07347586 1.37638585
## [191] 1.73104746 -0.57596355 -0.49915725 0.11786229 -0.45584137
## [196] -0.97726281 -6.86428063 -0.60929448 -0.72132361 0.00000000
## [201] 1.00734878 4.20789995 -0.81616263 -1.72455176 10.00784534
## [206] 0.71310632 8.77005056 -0.64297796 0.24086573 -6.12424634
## [211] 0.94848253 9.22132979 -5.85933168 -0.77292827 -0.85749485
## [216] 0.80000340 -10.45187777 2.91489552 0.86914823 0.93956496
## [221] 1.15020196 -4.25009579 -0.97278301 1.05669698 23.96919924
## [226] -0.11659711 0.58615433 -1.23512544 1.08111948 3.37846777
## [231] 0.96204558 -1.18727215 0.77801767 2.39161655 1.01270315
```

```
## [236] 0.30508064 -1.13987140 1.35085069 2.13213714 0.95034702
## [241] 0.48941676 -1.03804260 1.11768517 -0.25446052 -15.07630921
## [246] 1.12429826 0.28067653 -0.75125301 -1.91160477
```

(c) Create the vector $(x_1 + 2x_2 - x_3, x_2 + 2x_3 - x_4, \dots, x_{n-2} + 2x_{n-1} - x_n)$

```
xVec[1:248]+2*xVec[2:249]-xVec[3:250]
```

```
## [1] 1382 70 1221 1749 -98 796 1949 623 -134 618 288 1472 517 -45
## [15] 794 1982 1489 344 -206 1207 292 771 2085 810 1032 1547 767 537
## [29] 702 676 737 664 1451 435 1355 168 1150 989 926 348 1757 1299
## [43] 409 -497 501 2150 1157 1081 1323 2030 1887 1744 879 590 493 1330
## [57] 1254 1281 465 767 1691 464 1238 805 -519 1425 710 -611 1517 963
## [71] 1836 2243 -158 1860 606 506 1917 1304 2021 2025 238 226 733 1538
## [85] 581 -659 824 1109 1136 1339 1239 1584 2300 562 567 -375 1372 761
## [99] 1142 714 1801 2220 624 -806 1738 268 398 1941 668 2037 829 345
## [113] 337 -45 635 -285 1225 691 1792 2216 123 538 1130 1124 1172 944
## [127] 271 -62 229 785 -70 1346 1622 381 104 1036 1015 199 589 1399
## [141] 601 506 560 -145 171 1204 1427 1278 1128 615 269 37 1521 2172
## [155] 1602 464 74 1575 599 88 -267 1185 1655 1564 1420 880 229 1651
## [169] 959 1306 2008 1243 267 1110 556 -791 1300 844 1578 2427 708 1554
## [183] 1439 1150 1269 2274 1419 1067 187 2071 781 -148 1767 1851 1019 -196
## [197] 554 2223 1710 -90 788 1209 876 1322 275 1191 323 1570 1234 768
## [211] 1715 903 -768 1546 1452 -47 1125 -330 871 2463 894 133 975 201
## [225] -137 1553 299 865 746 184 267 839 -63 863 2411 133 1739 1145
## [239] 1015 47 209 1468 846 10 1146 31 1405 1058
```

(d) Calculate $\sum_{i=1}^{n-1} \frac{e^{-x_{i+1}}}{x_i + 10}$

```
sum(exp(-xVec[2:250])/(xVec[1:249]+10))
```

```
## [1] 0.01269872
```

7. This question uses the vectors xVec and yVec created in the previous question and the functions sort,

order, mean, sqrt, sum, and abs.

(a) Pick out the values in yVec which are > 600 .

```
yVec[yVec>600]
```

```
## [1] 709 871 621 930 948 783 878 671 860 768 698 974 855 813 776 721 917
## [18] 985 705 884 840 687 957 955 786 938 930 641 615 988 881 881 997 823
## [35] 791 643 779 693 845 815 752 766 635 993 919 686 635 613 660 800 743
## [52] 965 743 615 615 803 948 760 604 800 772 863 902 689 881 941 924 693
## [69] 835 632 872 876 850 961 681 791 947 915 712 665 921 798 866 828 942
## [86] 841 645 681 827 884 890 970 632 717 846 952 609 824 695 675 777 813
## [103] 792 783 611 853 738 668 791
```

(b) What are the index positions in yVec of the values which are > 600 ?

```
which(yVec>600)
```

```
## [1] 1 2 5 6 8 10 11 13 16 18 27 28 32 33 34 36 42
## [18] 43 45 48 50 55 58 59 60 61 63 66 67 68 72 79 80 86
```

```
## [35] 88 94 95 96 97 101 102 105 107 109 111 114 118 119 120 123 125
## [52] 127 131 132 134 136 137 138 139 142 143 150 151 154 157 158 159 161
## [69] 163 164 167 168 172 173 174 175 176 178 180 181 182 183 187 189 190
## [86] 203 204 205 206 211 213 214 219 220 224 226 227 230 232 237 238 239
## [103] 241 243 245 246 247 249 250
```

(c) What are the values in xVec which correspond to the values in yVec which are > 600? (By correspond, we mean at the same index positions.)

```
xVec[yVec>600]
```

```
## [1] 708 437 513 44 646 107 390 640 676 364 577 257 408 437 618 627 836
## [18] 278 55 458 803 358 525 511 266 578 197 38 724 61 995 652 956 19
## [35] 680 760 48 294 69 505 964 24 10 840 878 113 789 444 986 537 515
## [52] 263 359 189 457 274 543 324 176 160 260 407 216 977 148 293 660 137
## [69] 852 743 353 371 768 339 203 478 49 880 996 894 357 900 972 467 324
## [86] 517 446 533 190 501 124 14 5 863 399 256 678 188 258 110 957 285
## [103] 34 631 179 545 123 238 178
```

(d) Create the vector $(|x_1 - \bar{x}|^{1/2}, |x_2 - \bar{x}|^{1/2}, \dots, |x_n - \bar{x}|^{1/2})$

```
abs(xVec-mean(xVec))^0.5
```

```
## [1] 16.0044994 3.8543482 15.8699716 17.7522956 7.8194629 20.1954450
## [7] 15.7208142 13.9335566 20.2449006 18.5702989 7.8648585 13.5224258
## [13] 13.7165593 19.3611983 13.2233127 14.9714395 19.5740645 9.3731532
## [19] 19.4385185 16.8480266 12.8118695 16.0890025 16.0668603 19.7520632
## [25] 11.9522383 14.0763632 11.1867779 13.9590831 11.3073427 9.1572922
## [31] 9.6879306 6.6223863 3.8543482 12.8896858 15.1610026 13.2341981
## [37] 18.1894475 15.7842960 8.8800901 2.4787093 9.4263461 19.5995918
## [43] 13.1854465 18.9434949 19.9212449 15.7525871 22.4085698 2.4787093
## [49] 16.1599505 18.7388367 23.3268943 17.6958752 13.6800585 12.3634947
## [55] 9.6879306 5.1822775 16.2217138 8.5524266 7.6905136 13.6329014
## [61] 11.2313846 14.2528594 15.9642100 11.5388041 17.9681941 20.3434510
## [67] 16.4967876 19.7700784 17.7723381 22.1843188 7.4259006 23.3054500
## [73] 14.4618118 19.4385185 22.6967839 17.4314658 14.3228489 22.4531512
## [79] 14.1472259 22.4531512 9.5469367 20.8532012 10.6233705 4.1405314
## [85] 9.5991666 20.8051917 21.2333700 15.1044364 9.2273506 13.8976257
## [91] 15.4642814 15.3669776 19.3944322 17.5540309 20.0961688 12.5640758
## [97] 19.5667064 18.8452647 11.8682770 14.7018366 7.2899931 22.6305988
## [103] 13.4217734 21.0678903 20.6846803 20.2520122 21.0203711 12.7335777
## [109] 19.7013705 9.9426355 20.6432556 19.4898948 16.0890025 18.4080417
## [115] 19.2316406 11.3954377 18.9962101 18.3614814 2.8028557 23.1115556
## [121] 13.1203658 20.8292103 9.2273506 10.1066315 7.9463199 2.8537694
## [127] 13.7424889 20.2449006 19.3870060 13.9948562 9.6361818 16.2128344
## [133] 18.8452647 2.2680388 18.7844617 13.3362663 9.5469367 11.3073427
## [139] 16.6089133 5.0143793 9.4416100 17.0837935 13.8512093 16.6690132
## [145] 20.0961688 6.0709143 15.9732276 13.1584194 8.8399095 6.6974622
## [151] 15.3576040 15.0948998 7.5402918 22.9160206 19.3944322 3.0239048
## [157] 17.4314658 12.6038089 14.4271965 20.3434510 17.7441821 15.0948998
## [163] 20.0035997 17.0629423 15.2034207 9.6511139 9.9426355 8.9919964
## [169] 20.3505282 0.3794733 18.9510950 17.7804387 10.6233705 15.7751704
## [175] 5.1131204 20.0712730 20.7811453 20.6916408 5.3050919 23.3268943
## [181] 21.0272205 9.7394045 21.1694119 12.2940636 14.6677878 18.3069386
## [187] 22.8066657 2.2680388 3.8915293 11.3073427 21.8207241 18.5163711
## [193] 9.3196566 23.1331796 10.9610219 13.1093860 18.4080417 15.8159413
```

```
## [199] 22.6084940 6.8451443 19.7194320 13.0055373 8.0711833 2.4199174
## [205] 9.0079964 16.1819653 13.6434600 13.2987217 20.3259440 4.1056059
## [211] 7.0102782 14.7358067 18.1067943 20.9250090 21.6366356 11.9939985
## [217] 19.1795725 8.4346903 21.1389688 20.2766861 20.2025741 18.2169152
## [223] 15.6797959 7.2702132 20.5634627 13.9948562 15.0380850 19.8205953
## [229] 6.7189285 16.2436449 18.0237621 13.9232180 8.7095350 16.7587589
## [235] 18.1423262 20.4485696 18.4893483 22.4754088 12.9172753 8.3579902
## [241] 20.4415264 6.9897067 13.3844686 15.9642100 16.5183534 9.6511139
## [247] 18.1343872 17.5540309 14.6238162 16.5485951
```

(e) How many values in yVec are within 200 of the maximum value of the terms in yVec?

```
sum(yVec>max(yVec)-200)
```

```
## [1] 57
```

(f) How many numbers in xVec are divisible by 2? (Note that the modulo operator is denoted %%.)

```
sum(xVec%%2==0)
```

```
## [1] 124
```

(g) Sort the numbers in the vector xVec in the order of increasing values in yVec.

```
xVec[order(yVec,decreasing=FALSE)]
```

```
## [1] 405 842 308 572 461 8 256 507 373 639 42 616 29 645 376 669 688
## [18] 197 63 638 862 77 996 93 59 585 661 72 339 20 206 537 174 322
## [35] 42 603 425 48 707 452 477 99 224 811 715 358 963 222 395 543 480
## [52] 193 683 710 691 954 700 614 787 835 275 435 309 368 224 460 497 944
## [69] 530 765 523 171 870 807 469 828 624 200 713 365 781 74 129 76 701
## [86] 760 193 866 353 168 967 545 920 541 650 148 277 18 667 865 987 120
## [103] 655 1 554 699 311 458 632 84 269 82 280 544 17 621 807 113 136
## [120] 457 702 91 625 767 828 109 860 363 121 657 668 324 382 956 299 403
## [137] 74 928 415 38 127 176 678 179 444 724 189 457 513 743 5 10 789
## [154] 38 760 446 986 894 238 640 110 203 533 113 358 977 294 137 258 577
## [171] 55 708 996 863 627 123 515 359 964 324 24 364 260 618 957 48 107
## [188] 631 266 680 478 178 34 900 537 160 274 437 285 505 19 188 190 467
## [205] 852 803 517 69 399 768 545 408 676 407 972 437 353 371 390 995 652
## [222] 148 458 501 124 216 880 836 878 357 660 44 197 578 293 324 49 646
## [239] 543 256 511 525 339 263 14 257 278 61 840 956
```

(h) Pick out the elements in yVec at index positions 1, 4, 7, 10, 13, . . .

```
yVec[c(seq(1,length(yVec),3))]
```

```
## [1] 709 517 437 783 671 860 581 347 279 974 216 776 538 460 985 248 317
## [18] 288 687 957 938 101 615 285 106 414 881 488 484 791 246 643 845 553
## [35] 465 87 993 116 473 635 310 428 965 19 489 803 604 800 175 516 902
## [52] 689 881 593 835 398 358 850 791 915 665 167 866 942 320 482 216 488
## [69] 681 273 884 970 469 717 127 952 284 695 325 777 792 72 738 791
```

8. By using the function cumprod or otherwise, calculate

$$1 + \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3} \frac{4}{5}\right) + \left(\frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{6}{7} + \dots + \left(\frac{2}{3} \frac{4}{5} \dots \frac{38}{39}\right)\right)$$

```
1+sum(cumprod(seq(2,38,2)/seq(3,39,2)))
```

```
## [1] 6.976346
```