

黎曼面话题:几何畸变的估计、拟共形映射、Teichmüller 映射、Garsia嵌入和黎曼面的模空间*

2024 年 4 月 21 日

目录

| | | |
|----------|------------------------|-----------|
| 1 | 几何畸变估计 | 3 |
| 1.1 | 全纯函数族 | 3 |
| 1.2 | Gronwall 面积估计定理 | 4 |
| 1.3 | Koebe 畸变定理 | 7 |
| 2 | Riemann 映射 | 9 |
| 2.1 | Riemann 映射定理 | 9 |
| 2.2 | Riemann 映射的计算方法 | 10 |
| 2.2.1 | Schwarz-Christoffel 映射 | 10 |
| 3 | 共形映射的存在性与唯一性 | 10 |
| 4 | 多连通区域的狭缝映射 | 11 |
| 4.1 | 狭缝映射的存在性 (Hilbert 定理) | 11 |
| 4.1.1 | 狭缝映射 | 12 |
| 5 | 拟共形映射 | 14 |
| 5.1 | 拟共形映射和 Beltrami 系数 | 14 |
| 5.2 | Beltrami 方程与黎曼映照定理 | 15 |
| 5.3 | 建立在黎曼曲面上的拟共形映射 | 15 |
| 5.4 | 极值拟共形映射问题 | 16 |
| 6 | Teichmüller 映射 | 17 |
| 6.1 | Grötzsch 问题 | 17 |
| 6.2 | Teichmüller 映射 | 18 |
| 6.3 | Teichmüller 映射的计算 | 19 |

*此话题基于 prof. David Gu 的著作 [1] 和Garsia的文章an Imbedding of Closed Riemanna Surface in Euclidean Space整理而成

目录 (续)

| | |
|-------------------------------|----|
| • 6.4 Teichmüller 映射的应用 | 20 |
| • 7 Garsia 嵌入的构造部分 (手稿) | 20 |
| • 8 附录 A 黎曼面的模空间演示文稿 | 20 |

在展示我们的主要结果前, 我们首先定义一些基本的概念并由此证明几个重要的定理.

1 几何畸变估计

1.1 全纯函数族

Definition 1. 所有定义在单位圆盘上, 同时满足归一化条件的单叶全纯映射构成函数族

$$\mathcal{S} = \{f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}: f \text{ 是 } \mathbb{D} \text{ 上单叶函数, } f(0) = 0, f'(0) = 1\}.$$

每一个 \mathcal{S} 的成员函数都在 0 点附近存在 Taylor 展开

$$f(z) = z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \cdots,$$

Taylor 级数在单位圆盘 $|z| < 1$ 内收敛.

Definition 2 (Koebe 函数). 称全纯函数 $k(z) \in \mathcal{S}$ 且

$$k(z) = \frac{z}{(1-z)^2} = z + 2z^2 + 3z^3 + 4z^4 + \cdots, \quad (1)$$

为 Koebe 函数. Koebe 函数将单位圆盘 \mathbb{D} 映到复平面上射线的补集 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, -1/4]$.

Lemma 1. 假设全纯函数 $f \in \mathcal{S}$, 其平方根

$$g(z) = \sqrt{f(z^2)},$$

有一个连续的分支属于 \mathcal{S} .

证明. 因为 $f(z)$ 在 $z = 0$ 具有唯一的零点, 因此 $f(z^2)$ 在 $z = 0$ 具有 2 阶零点. 因此, 我们得到级数展开:

$$f(z^2) = z^2 + a_2 z^4 + a_3 z^6 + a_4 z^8 + \cdots = z^2(1 + a_2 z^2 + a_3 z^4 + a_4 z^6 + \cdots),$$

括号内部的表达式记为

$$H(z) = 1 + a_2 z^2 + a_3 z^4 + a_4 z^6 + \cdots,$$

在 \mathbb{D} 上没有零点 (因为如果存在 $\zeta \in \mathbb{D}, \zeta \neq 0$, 满足 $H(\zeta) = 0$, 那么 $\zeta^2 \in \mathbb{D}$, 并且 $f(\zeta^2) = 0, \zeta^2 \neq 0$, 这和 $f(z)$ 在 $z = 0$ 具有唯一的零点相矛盾), 因此 $\sqrt{H(z)}$ 在 \mathbb{D} 上有两个连续分支, 一个在原点取值为 $+1$, 另一个在原点取值为 -1 . 我们选取第一个分支, 记为 $h(z)$. 由公式

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}x^2 + \cdots,$$

得到

$$h(z) = \sqrt{H(z)} = 1 + \frac{a_2}{2}z^2 + \cdots,$$

由此

$$g(z) = \sqrt{f(z^2)} = z \cdot h(z) = z + \frac{a_2}{2}z^3 + \cdots, \quad (2)$$

有 $g(0) = 0, g'(0) = 1 \cdot h(z) + z \cdot h'(z)|_{z=0} = 1$. 我们再证明 $g(z)$ 在 \mathbb{D} 上是单叶的. 假设 z_1 和 z_2 是 \mathbb{D} 上两点, 满足 $g(z_1) = g(z_2)$, 那么 $f(z_1^2) = f(z_2^2)$. 因为 f 是单叶的, 所以 $z_1^2 = z_2^2, z_1 = \pm z_2$. $h(z)$ 是偶函数, $h(z) = h(-z)$; $g(z)$ 是奇函数, $g(-z) = -g(z)$. 因此, $g(z_1) = -g(z_2)$, 由此 $g(z_1) = 0$ 并且 $z_1 = 0$. 因此, $g(z)$ 在单位圆盘 \mathbb{D} 上是单叶的. \square

同样, 我们定义单位圆的补空间为

$$\Delta := \{w \in \mathbb{C} : |w| > 1\}.$$

Definition 3. 所有定义在 Δ 上的满足归一化条件的全纯函数构成函数族,

$$\Sigma = \{g: \Delta \rightarrow \mathbb{C} : g \text{ 是 } \Delta \text{ 上单叶函数, } \lim_{z \rightarrow \infty} g(z) = \infty, g'(\infty) = 1\}.$$

Σ 的成员函数 $g \in \Sigma$ 在 ∞ 附近存在级数展开

$$g(z) = z + b_0 + \frac{b_1}{z} + \frac{b_2}{z^2} + \cdots,$$

级数在单位圆外 $|z| > 1$ 收敛.

每个 $g \in \Sigma$ 将 Δ 映到某个紧单连通集的补集. 经过平行移动, Σ 可以变换成 Σ 子族,

$$\Sigma' = \{f: \Delta \rightarrow \mathbb{C} : f \in \Sigma, 0 \notin f(\Delta)\}.$$

容易证明函数族 S 和 Σ' 之间存在一一对应. 每一个 $f \in S$, 映射

$$g(z) = \frac{1}{f(1/z)}, \quad |z| > 1,$$

属于函数族 Σ' , 同时具有级数展开形式

$$g(z) = z - a_2 + \frac{a_2^2 - a_3}{z} + \cdots,$$

特别地, 函数族 Σ' 在取平方根的变换下不变: 假设 $G(z) \in \Sigma'$, 那么我们有

$$G(z) = \sqrt{g(z^2)} = z(1 + b_0 z^{-2} + b_1 z^{-4} + \cdots)^{1/2}.$$

Definition 4 (Lebesgue 零测集). 一个集合 $E \subset \mathbb{C}$ 称为零 Lebesgue 测度, 如果对于一切 $\varepsilon > 0$, 存在可数无穷多个点 $z_i \in \mathbb{C}$ 和 $\gamma_i \geq 0, i = 1, 2, \cdots$, 使得

$$E \subset \bigcup_i B(z_i, \gamma_i), \quad \sum_i \pi \gamma_i^2 < \varepsilon.$$

Definition 5 (全映射). 全纯函数族

$$\tilde{\Sigma} = \{f: \Delta \rightarrow \mathbb{C} : f \in \Sigma, \mathbb{C} \setminus f(\Delta) \text{ 的 Lebesgue 测度为零}\},$$

称为“全映射”族.

1.2 Gronwall 面积估计定理

在复平面 \mathbb{C} 上, 复数 $z = x + iy, x, y \in \mathbb{R}$, 平面的 Lebesgue 测度为 μ , 面元为

$$dA = dx \wedge dy = \frac{i}{2} dz \wedge d\bar{z} = \frac{i}{2} d(zd\bar{z}) = \frac{1}{2i} d(\bar{z}dz).$$

Lemma 2. 假设 Ω 是一个 Jordan 区域 (Jordan domain), 其边界 $\partial\Omega$ 是一条 Jordan 曲线 (Jordan curve), 解析映射 $f: \mathbb{D} \rightarrow \Omega$ 为单叶映射, 那么

$$\mu(\Omega) = \frac{i}{2} \int_{\partial\mathbb{D}} f(z) \overline{f'(z)} d\bar{z},$$

或者等价地

$$\mu(\Omega) = \frac{1}{2i} \int_{\partial\mathbb{D}} \overline{f(z)} f'(z) dz. \quad (3)$$

证明. Jordan 区域的面积为

$$\mu(\Omega) = \frac{i}{2} \int_{\mathbb{D}} d(wd\bar{w}) = \frac{i}{2} \int_{\partial\mathbb{D}} wd\bar{w},$$

代入 $w = f(z)$, 得到 $d\bar{w} = \overline{f'(z)}d\bar{z}$

$$\mu(\Omega) = \frac{i}{2} \int_{\partial\mathbb{D}} f(z)\overline{f'(z)}d\bar{z}.$$

等式 (3) 的证明类似. □

在 1941 年, Gronwall 发现了下列的面积估计定理.

Theorem 1 (Gronwall 面积定理). 如果函数族 Σ 的成员

$$g(z) = z + b_0 + \frac{b_1}{z} + \frac{b_2}{z^2} + \cdots,$$

那么

$$\sum_{n=1}^{\infty} n|b_n|^2 \leq 1, \quad (4)$$

等号成立当且仅当 $g \in \tilde{\Sigma}$, 即 g 为全映射.

证明. 对一切 $r > 1$, 令 C_r 是圆周 $\{|z| = r\}$ 在映射 g 下的像 $C_r = g(\{|z| = r\})$. 每个 C_r 都是光滑的简单闭曲线. E_r 表示 $\mathbb{C} \setminus C_r$ 的有限连通分支. 令 $w = u + iv$ 是 g 像的复坐标. 对于一切 $r > 1$, 计算 E_r 的面积,

$$\begin{aligned} \mu(E_r) &= \oint_{C_r} u dv = \frac{1}{2i} \oint_{C_r} \bar{w} dw = \frac{1}{2i} \oint_{|z|=r} \overline{g(z)} g'(z) dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (re^{-i\theta} + \sum_{n=0}^{\infty} \bar{b}_n r^{-n} e^{in\theta}) \\ &\quad \cdot (1 - \sum_{m=1}^{\infty} m b_m r^{-m-1} e^{-i(m+1)\theta}) r e^{i\theta} d\theta \\ &= \pi(r^2 - \sum_{n=1}^{\infty} n|b_n|^2 r^{-2n}). \end{aligned}$$

等号两边取极限, 令 r 趋于 1,

$$\mu(\mathbb{C} \setminus g(\Delta)) = \pi(1 - \sum_{n=1}^{\infty} n|b_n|^2),$$

因为左侧非负, 因此右侧非负, 我们得到不等式(4). □

Corollary 1. 如果 $g \in \Sigma$, 那么 $|b_1| \leq 1$, 等式成立当且仅当

$$g(z) = z + b_0 + \frac{b_1}{z}, \quad |b_1| = 1,$$

这种共形映射 g 将 Δ 映成一个长度为 4 的线段的补集.

证明. 由 Gronwall 面积定理, 我们得到 $|b_1| \leq 1$. 当等号成立的时候, 对一切 $n \geq 2, b_n = 0$. 令 $a_1 = \sqrt{b_1}, a_2 = 1/a_1$, 构造复平面上的线性变换 $h_1(z) = a_1 z$ 和 $h_2(z) = a_2(z - b_0)$, 那么

$$f(z) = h_2 \circ g \circ h_1 = z + \frac{1}{z},$$

是单叶共形映射, 将 Δ 映成 $\mathbb{C} \setminus [-2, 2]$. 因为 $|b_1| = 1$, h_1 和 h_2 为旋转平移, 即刚体变换, 线段长度保持不变. □

Theorem 2 (Bieberbach). 如果 $f \in \mathcal{S}$, 那么 $|a_2| \leq 2$, 等式成立当且仅当 f 是 Koebe 函数的一个旋转.

证明. 假设函数

$$f(z) = z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \cdots,$$

应用平方根变换, 由等式 (2) 得到

$$h(z) = \sqrt{f(z^2)} = z + \frac{a_2}{2} z^3 + \cdots.$$

由引理 1, $h(z)$ 属于函数族 \mathcal{S} . 构造函数

$$\begin{aligned} g(z) &= \frac{1}{h(1/z)} = \frac{1}{f(1/z^2)^{1/2}} = \frac{1}{1/z + \frac{a_2}{2z^3} + \cdots} \\ &= z \left(\frac{1}{1 + \frac{a_2}{2z^2} + \cdots} \right) = z - \frac{a_2}{2} \frac{1}{z} + \cdots, \end{aligned}$$

则 $g(z)$ 属于函数族 Σ . 由推论 1 得到 $|a_2| \leq 2$. 如果 $|a_2| = 2$, 函数 $g(z)$ 具有形式

$$g(z) = z - \frac{e^{i\theta}}{z},$$

这等价于

$$f(1/z^2) = \frac{z^2}{z^4 - 2e^{i\theta}z^2 + e^{i2\theta}},$$

进行坐标变换, $w = 1/z^2$ 在单位圆盘上, 那么

$$f(w) = \frac{w}{(1 - e^{i\theta}w)^2} = e^{-i\theta} \frac{e^{i\theta}w}{(1 - e^{i\theta}w)^2} = e^{-i\theta} k(e^{i\theta}w),$$

这里 $k(w)$ 是 Koebe 函数 (1). □

全纯映射是开映射 (open mapping), 即全纯映射将任意开集映到开集. 因此对于每一个全纯函数 $f \in \mathcal{S}$, 其像 $f(\mathbb{D})$ 都包含一个以原点为圆心, 半径严格大于 0 的开圆. 1907 年左右, Koebe 发现所有的全纯映射 $f \in \mathcal{S}$ 的像 $f(\mathbb{D})$ 都包含某一个开圆, $B(0, \rho)$. Koebe 映射显示了 ρ 必须不大于 $1/4$, Koebe 猜测 $\rho = 1/4$. 后来, Bieberbach 证明了 Koebe 的猜想.

Theorem 3 (Koebe 1/4-定理). 对于每一个全纯函数 $f \in \mathcal{S}$, $f(\mathbb{D})$ 包含开圆盘 $|w| < 1/4$. 如果存在 $|w| = 1/4$ 并且 $w \notin f(\mathbb{D})$, 当且仅当 f 是 Koebe 函数, 或者与 Koebe 函数相差一个旋转.

证明. 令 $f(z) = z + a_2 z^2 + \cdots$ 是 \mathcal{S} 中的函数, 单位圆盘在 f 下的像不包含 w 点, $w \in f(\mathbb{D})$. 构造全纯函数

$$h(z) = \frac{wf(z)}{w - f(z)} = z + \left(a_2 + \frac{1}{w}\right)z^2 + \cdots,$$

那么 $h(z)$ 在函数族 \mathcal{S} 中. 由定理 2 得到

$$\left|a_2 + \frac{1}{w}\right| \leq 2,$$

同时 $|a_2| \leq 2$, 我们得到 $|1/w| \leq 4$, $|w| \geq 1/4$. 等号成立当且仅当 f 是 Koebe 函数, 或者与 Koebe 函数相差一个旋转. 对于 \mathcal{S} 中的其他函数, $g \in \mathcal{S}$, $g(\mathbb{D})$ 覆盖以原点为圆心的更大开圆盘. □

1.3 Koebe 畸变定理

单位圆盘 \mathbb{D} 中的曲线在映射 $f \in \mathcal{S}$ 下发生畸变, 畸变的速率取决于导数 $f'(z)$. 举例而言, 如果 $|f'(z)|$ 变化迅速, 那么 z 附近具有同样长度的曲线被映射到长度非常不同的曲线; 如果 $\arg f'(z)$ 变化迅速, 那么直线被映射成弯曲剧烈的曲线. 在 0 点处, 函数二阶导数的上界 $|a_2| \leq 2$, 使得 $f'(z)$ 的变化一致有界, 这里 z 在单位圆盘内变动. 这里的一致估计和具体的映射 $f \in \mathcal{S}$ 的选取无关. Koebe 畸变定理给出了这些一致的界限.

Theorem 4. 任意一个 $f \in \mathcal{S}$, 都有

$$\left| \frac{zf''(z)}{f'(z)} - \frac{2r^2}{1-r^2} \right| \leq \frac{4r}{1-r^2}, \quad r = |z| < 1. \quad (5)$$

证明. 给定函数 $f \in \mathcal{S}$, 取定点 $z \in \mathbb{D}$, 我们用 Möbius 变换来构造全纯函数

$$F(w) = \frac{f\left(\frac{w+z}{1+\bar{z}w}\right) - f(z)}{(1-|z|^2)f'(z)} = w + \frac{1}{2}\left((1-|z|^2)\frac{f''(z)}{f'(z)} - 2\bar{z}\right)w^2 + \dots$$

因为映射 $F \in \mathcal{S}$, 由定理2, w^2 系数的模不大于 2, 因此

$$|(1-|z|^2)\frac{f''(z)}{f'(z)} - 2\bar{z}| \leq 4,$$

这蕴含了定理中的不等式 (5). □

Lemma 3. 假设 $f \in \mathcal{S}$, 则在单位圆盘 \mathbb{D} 中存在 $\log f'(z)$ 的一个连续分支, 将 0 映到 0. 对一切 $z = re^{i\theta} \in \mathbb{D}$, 我们都有

$$\frac{zf''(z)}{f'(z)} = r \frac{\partial}{\partial r}(\log |f'(z)|) + ir \frac{\partial}{\partial r}(\arg f'(z)).$$

证明. 因为映射 $f(z)$ 是单值映射, 因此在单位圆内导数处处非 0, $\forall z \in \mathbb{D}, f'(z) \neq 0$. 因为 $f'(0) = 1$, 所以在 \mathbb{D} 上存在 $\log f'(z)$ 的连续分支将 0 映到 0. 令 $u(z) = u(re^{i\theta})$ 是定义在某个开集 $U \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数, 由关系 $z = r \cos \theta + ir \sin \theta$, 我们有

$$r \frac{\partial u}{\partial r} = r \frac{\partial u}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial r} = r \frac{\partial u}{\partial z} \cdot (\cos \theta + i \sin \theta) = z \cdot \frac{\partial u}{\partial z}.$$

将这一公式应用于函数 $\log f'(z)$, 并且用关系 $\log z = \log |z| + i \arg z$, 我们得到

$$\frac{zf''(z)}{f'(z)} = z \cdot \frac{\partial}{\partial z}(\log f'(z)) = r \frac{\partial}{\partial r}(\log |f'(z)|) + ir \frac{\partial}{\partial r}(\arg f'(z)).$$

□

Theorem 5 (畸变定理). 对每一个 $f \in \mathcal{S}$, 我们有

$$\frac{1-r}{(1+r)^3} \leq |f'(z)| \leq \frac{1+r}{(1-r)^3}, \quad |z| = r < 1. \quad (6)$$

在某个 $z \neq 0$ 等号成立, 当且仅当 f 是 Koebe 函数的旋转.

证明. 不等式 $|w - c| < R$ 蕴含着 $c - R \leq \operatorname{Re} w \leq c + R$. 特别地, 由不等式 (5), 对 $|z| = r$, 我们有

$$\frac{2r^2}{1-r^2} - \frac{4r}{1-r^2} \leq \operatorname{Re} \left(\frac{zf''(z)}{f'(z)} \right) \leq \frac{2r^2}{1-r^2} + \frac{4r}{1-r^2}$$

简化后得到

$$\frac{2r^2 - 4r}{1 - r^2} \leq \operatorname{Re}\left(\frac{zf''(z)}{f'(z)}\right) \leq \frac{2r^2 + 4r}{1 - r^2} \quad (7)$$

由引理 3, 我们得到存在 $\log f'(z)$ 在 \mathbb{D} 上的连续分支, 将 0 映到 0, 更进一步, 由引理中的不等式, 我们得到

$$\frac{2r - 4}{1 - r^2} \leq \frac{\partial}{\partial r} \log |f'(re^{i\theta})| \leq \frac{2r + 4}{1 - r^2}, \quad (8)$$

固定 θ 积分 r

$$\begin{aligned} \int_0^R \frac{2r + 4}{1 - r^2} dr &= \int_0^R \frac{3}{1 - r} + \frac{1}{1 + r} dr \\ &= -3 \log(1 - r) + \log(1 + r) \Big|_{r=0}^{r=R} = \log \frac{1 + R}{(1 - R)^3}, \end{aligned}$$

我们得到

$$\log \frac{1 - R}{(1 + R)^3} \leq \log |f'(re^{i\theta})| \leq \log \frac{1 + R}{(1 - R)^3}, \quad (9)$$

因为指数映射 $x \mapsto e^x$ 单调递增, 因此得到定理的不等式 (6).

如果在某一点 $z = Re^{i\theta} \in \mathbb{D}, z \neq 0$, 不等式 (6) 成立, 那么不等式 (7) 对于 R 成立, 这意味着不等式 (7) 和 (8) 对于任意 $r \in (0, R)$ 都成立, 令 r 趋向于 0, 我们得到等式

$$\operatorname{Re}(e^{i\theta} f''(0)) = +4 \text{ 或者 } \operatorname{Re}(e^{i\theta} f''(0)) = -4.$$

由定理 5, $|f''(0)| \leq 4$, 因此 $|f''(0)| = 4$, f 是 Koebe 函数的一个旋转.

反之, 考虑 Koebe 函数 $k(z) = z/(1 - z)^2$, 我们有

$$k'(z) = \frac{1 + z}{(1 - z)^3}$$

对于所有 $z = r \in (0, 1)$, 不等式 (6) 的右侧成立. 再令 $h(z) = e^{i\phi} k(e^{-i\phi} z)$, 我们得到

$$h'(z) = \frac{1 - z}{(1 + z)^3},$$

对于所有 $z = r \in (0, 1)$, 不等式 (6) 的左侧成立. □

Theorem 6 (增长定理). 对每一个全纯函数 $f \in \mathcal{S}$

$$\frac{r}{|1 + r|^2} \leq |f(z)| \leq \frac{r}{|1 - r|^2}, \quad |z| = r, \quad (10)$$

更多地, 对于任意 $z \in \mathbb{D}, z \neq 0$, 等号成立当且仅当 f 是 Koebe 函数的一个旋转.

证明. 定理 5 给定导数模 $|f'(z)|$ 的上界, 固定一点 $z = re^{i\theta} \in \mathbb{D}$, 观察到

$$f(z) = \int_0^r f'(\rho e^{i\theta}) d\rho,$$

于是

$$|f(z)| \leq \int_0^r |f'(\rho e^{i\theta})| d\rho \leq \int_0^r \frac{1 + \rho}{(1 - \rho)^3} d\rho = \frac{r}{|1 - r|^2}.$$

假设 $z \in \mathbb{D}$ 是单位圆盘内部的任意一点, 我们考虑两种可能性:

$$1. |f(z)| \geq 1/4,$$

$$2. |f(z)| \leq 1/4.$$

假设第一种情况发生, 因为对于任意 $r \in (0, 1)$, $r/(1+r)^2 \leq 1/4$, 我们得到不等式 $r/(1+r)^2 \leq |f(z)|$. 假设第二种情况发生, 根据定理 3, 径向直线段 $rf(z)$, $r \in [0, 1]$ 在 f 的像里面. 因为 f 为单值映射, 径向直线段的原像在 \mathbb{D} 中是一条简单曲线, 连接 0 和 z , 记为 C . 我们有

$$f(z) = \int_C f'(\zeta) d\zeta.$$

根据 C 的定义, 对于 C 上的任意一点 $z \in C$, $dw = f'(z)dz$ 和 $f(z)$ 具有相同的辐角, 因此我们有

$$\begin{aligned} |f(z)| &= \left| \int_C f'(\zeta) d\zeta \right| = \int_C |f'(\zeta) d\zeta| = \int_C |f'(\zeta)| |d\zeta| \\ &\geq \int_0^r \frac{1-\rho}{(1+\rho)^3} d\rho = \frac{r}{(1+r)^2}. \end{aligned}$$

不等式(10)的两端, 如果有一端等号成立, 则不等式(6)的相应端等式成立, 由畸变定理, 这意味着 f 是 Koebe 函数的一个旋转. 反之, 通过选取 Koebe 函数的一个旋转, 不等式(9)的两端等式都可以达到. \square

Theorem 7 (径向畸变定理). 对于任意 $f \in \mathcal{S}$

$$|\arg f'(z)| \leq 2 \log \frac{1+r}{1-r}, \quad |z| = r.$$

证明. 考虑畸变定理中的不等式(5), 我们有

$$-\frac{4r}{1-r^2} \leq \operatorname{Im}\left(\frac{zf''(z)}{f'(z)}\right) \leq \frac{4r}{1-r^2},$$

由引理 3 得到

$$-\frac{4}{1-r^2} \leq \frac{\partial}{\partial r} \arg f'(re^{i\theta}) \leq \frac{4}{1-r^2},$$

通过积分得到

$$|\arg f'(z)| \leq \int_0^r \frac{4}{1-r^2} dr = 2 \log \frac{1+r}{1-r}.$$

\square

这样, 我们对全纯函数的值和一阶导数的模都有了一致估计.

2 Riemann 映射

Riemann 映射是复变函数几何理论的基础, 我们在本章中简要回顾 Riemann 映射定理及其计算方法.

2.1 Riemann 映射定理

Theorem 8 (Riemann 映射定理). 给定复平面上单连通区域 $\Omega \subset \mathbb{C}$, Ω 不是整个复平面, 和一点 $z_0 \in \Omega$, 则存在唯一的一个解析函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{D}$, 满足条件: $f(z_0) = 0$ 和 $f'(z_0) > 0$, 使得 $f(z)$ 定义了从 Ω 到单位圆盘 $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$ 的双射.

Remark 1. 如果不要求条件 $f(z_0) = 0$ 和 $f'(z_0) > 0$, 则共形映射不唯一. 所有这些映射彼此相差一个圆盘到自身的 *Möbius* 变换:

$$\varphi: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}, \quad \varphi(z) = e^{i\theta} \frac{z - z_0}{1 - \bar{z}_0 z}.$$

简略起见, 我们仅概述其证明思路: 首先定义一个全纯函数的正规族, 然后考察函数的 Taylor 或者 Laurent 级数展开, 构造一个序列使得某一个系数取得极值, 由正规族的紧性得到极值函数的存在性, 再证明这个极值函数就是所求得共形映射.

2.2 Riemann 映射的计算方法

2.2.1 Schwarz-Christoffel 映射

当平面单连通区域是多边形时, Riemann 映射具有非常简洁的形式: Schwarz-Christoffel 映射. 这一公式在工程上被广泛应用.

给定平面多边形 $\Omega = \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$, 在顶点 z_k 处, 多边形外角为 $\beta_k \pi$, 共形映射将多边形映到上半平面, 记为 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{H}, w = f(z)$, $\mathbb{H} = \{\operatorname{Im}(z) > 0 \mid z \in \mathbb{C}\}$. 顶点的原像和像记为 z_k 和 w_k , 那么逆映射具有形式

$$f^{-1}(w) = C_1 \int_0^w \prod_{k=1}^{n-1} (w - w_k)^{-\beta_k} dw + C_2,$$

这里 C_1, C_2 是两个复值常数, $f(z_n) = \infty$. 在实际应用中, 我们往往需要探测 w_k 的位置, 这增加了算法的复杂度.

3 共形映射的存在性与唯一性

一个新月形状

$$\Omega = \{z: |z| < 1\} \setminus \left\{z: \left|z - \frac{1}{2}\right| < \frac{1}{2}\right\}$$

经过共形映射

$$\varphi_1(z) = \pi i \frac{1+z}{1-z}$$

映成水平无限带状区域, $\{z \mid 0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$; 考虑共形映射 $\varphi_2(z) = \exp z$, 将无限带状区域 $\{z \mid 0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$ 映成上半平面 $\{z \mid \operatorname{Im} z > 0\}$, 再用 $\varphi_3(z) = (z-i)/(z+i)$ 映成单位圆盘 \mathbb{D} . 复合映射 $\varphi_3 \circ \varphi_2 \circ \varphi_1: \Omega \rightarrow \mathbb{D}$ 给出了从新月形状到单位圆盘的 Riemann 映射.

Theorem 9. 每一个复平面上的双连通区域 Ω 都共形等价于一个标准环带.

证明. 假如 Ω 的一条边界只有一个孤立的点 z_0 , 那么 $\Omega \cup \{z_0\}$ 是一个单连通区域. 如果 Ω 的另外一条边界包含多于一个点, 则存在共形映射 $\varphi: \Omega \cup \{z_0\} \rightarrow \mathbb{D}$, 将 $\Omega \cup \{z_0\}$ 映成单位圆盘, Ω 和 $\{z \mid 0 < |z| < 1\}$ 共形等价; 如果 Ω 的另外一条边界只包含一个点, 则存在共形映射 $\varphi: \Omega \cup \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$, 将 $\Omega \cup \{z_0\}$ 映成整个复平面 \mathbb{C} , Ω 和 $\{z \mid 0 < |z| < \infty\}$ 共形等价.

现在假设 Ω 的两个边界 γ_1 和 γ_2 都包含多于一个点, $\partial\Omega = \gamma_2 - \gamma_1$. 假设 γ_1 是有界的. 那么从 Ω 到平面标准环带的共形映射可以如下构造:

1. γ_1 的补集有两个连通分支, 其中包含 Ω 的分支记为 Ω_1 . 将 Ω_1 共形映射到单位圆盘 $|z'| < 1$, Ω 映射成 Ω' , γ_2 映射成曲线 γ'_2 , 包含在单位圆盘 $\{|z'| < 1\}$ 内.

2. γ'_2 的补集有两个连通分支, 其中包含 Ω' 的分支记为 Ω'_2 . 将 Ω'_2 共形映射到单位圆盘外部 $|z''| > 1$, 同时将 $z' = \infty$ 映成 $z'' = \infty$. γ'_1 映成曲线 γ''_1 包含在单位圆盘外部 $|z''| > 1$, Ω' 映射成 Ω'' , Ω'' 不包含 ∞ . Ω'' 的边界为 γ''_1 和 $\gamma''_2 = \{|z''| = 1\}$.
3. 应用映射 $t = \log z''$, 将 Ω'' 映到 B_1 , B_1 包含在右半平面 $\{t \mid \operatorname{Re} t > 0\}$. 这个映射并不是单射, B_1 是一条铅直的无限长的带状单连通区域, 一条边界是虚轴, 另外一条边界是无限长的解析曲线. B_1 具有周期性, 对于任意 $t \in B_1, t + 2k\pi i, k \in \mathbb{Z}$ 都在 B_1 之中.
4. 应用 Riemann 映射定理, 存在一个映射 $\omega = f(t)$, 将 B_1 映成铅直带状区域 $B_2 = \{\omega \mid 0 < \operatorname{Re} \omega < h\}, t = -\infty i, 0, +\infty i$ 映到了 $\omega = -\infty i, 0, +\infty i$. (因为 B_1 和 B_2 都是单连通区域, 边界多于一个点, 由 Riemann 映射定理彼此共形等价.) 这个映射将 $t = 2\pi i$ 映到了正虚轴上的某个点 ω_0 , 经过相似变换, 不妨设 $\omega_0 = 2\pi i$.

我们证明映射具有性质

$$f(t + 2\pi i) = f(t) + 2\pi i.$$

因为两个共形映射 $f(t+2\pi i)$ 和 $f(t)+2\pi i$ 都将 B_1 映到 B_2 , 同时将 $-\infty i, 0, +\infty i$ 映到 $-\infty i, 2\pi i, +\infty i$. 由 Riemann 映射的唯一性, 我们得到 $f(t+2\pi i) = f(t) + 2\pi i$.

5. 映射 $\xi = \exp(\omega)$ 将 B_2 映到标准环带 $1 < |\xi| < e^h$. 这个映射并非单射, 但是复合映射 $\xi = e^{f(\log z'')}$, 将 Ω'' 映到 $1 < |\xi| < e^h$, 是共形单射.

因此, 将上述映射复合, $z \rightarrow \xi$, 我们得到共形映射, 将 Ω 映到环带 $1 < |\xi| < e^h$, 这里 h 依赖于初始区域 Ω .

□

4 多连通区域的狭缝映射

我们用较为初等的复变函数方法证明一种共形映射的存在性: 狭缝映射 (slit mapping). 给定亏格为 0 的多连通曲面, 存在共形映射将其映射到平面区域, 每个边界的连通分支都被映成一条狭缝 (slit) 或者同心圆周.

4.1 狭缝映射的存在性 (Hilbert 定理)

首先回忆 Bieberbach 定理: 单叶全纯函数族

$$\mathcal{S} = \{g: \{|z| < 1\} \rightarrow \mathbb{C} \mid g(0) = 0, g'(0) = 1, g(z) = z + \sum_{n=2}^{\infty} b_n z^n, |z| < 1\},$$

对于一切 $w \notin g(\mathbb{D})$, 我们有

$$|b_2| \leq 2, \quad |b_2 + \frac{1}{w}| \leq 2. \quad (11)$$

考虑 Bieberbach 定理的推论.

Corollary 2. 考虑单叶全纯 (univalent holomorphic) 函数族,

$$\Sigma = \{f: \{|z| > 1\} \rightarrow \overline{\mathbb{C}} \mid f(\infty) = \infty, \lim_{z \rightarrow \infty} f'(z) = 1, f(z) = z + b_0 + \frac{b_1}{z} + \frac{b_2}{z^2} + \cdots, |z| > 1\},$$

那么对一切 $f \in \Sigma$

$$\partial f(|z| > 1) = f(|z| = 1) \subset \{|w - b_0| \leq 2\}.$$

证明. 我们先证明如下命题: 如果 $f(z) \in \Sigma$, 那么 $f(z^{-1})^{-1} \in \mathcal{S}$ 考虑 $f(z^{-1})^{-1}$,

$$\text{因为 } f(z) = z + b_0 + \frac{b_1}{z} + \frac{b_2}{z^2} + \cdots,$$

所以

$$f(z^{-1}) = \frac{1}{z} + b_0 + b_1 z + b_2 z^2 + \cdots,$$

故而

$$\begin{aligned} f(z^{-1})^{-1} &= z(1 + b_0 z + b_1 z^2 + \cdots)^{-1} \\ &= z(1 - (b_0 z + b_1 z^2 + \cdots) + \cdots) \\ &= z - b_0 z^2 - b_1 z^3 + \cdots. \end{aligned}$$

$$\text{令 } g(z) = f(z^{-1})^{-1}$$

$$g(z) = z - b_0 z^2 - b_1 z^3 + \cdots,$$

则 $g(0) = 0, g'(0) = 1, g \in \mathcal{S}$.

给定任意一点 $\zeta \in \partial\mathbb{D}, |\zeta| = 1, w = g(\zeta) \notin g(\mathbb{D})$, 由 Bieberbach 不等式 (11),

$$|-b_0 + \frac{1}{w}| \leq 2,$$

由 $w = g(\zeta) = 1/f(\zeta^{-1})$, 得到 $1/w = f(1/\zeta), \zeta' = 1/\zeta \in \partial\mathbb{D}$, 我们得到

$$|-b_0 + f(\zeta')| \leq 2.$$

□

直接计算可得:

Lemma 4. 在 ∞ 点附近, 解析函数

$$\alpha(z) = z + \frac{k_1}{z} + \cdots, \quad \beta(z) = z + \frac{l_1}{z} + \cdots,$$

那么

$$\beta \circ \alpha(z) = z + \frac{k_1 + l_1}{z} + \cdots.$$

4.1.1 狭缝映射

我们首先定义狭缝区域:

Definition 6 (狭缝区域). 复平面上的区域 (连通开集) $\Omega \subset \mathbb{C}$ 称为狭缝区域 (*slit domain*), 如果其边界 $\partial\Omega$ 的每个连通分支或者是一个点, 或者是水平闭区间.

我们给出两个正规函数族的判定准则:

Lemma 5. 给定一族全纯函数 F , 如果存在三个相异的点 a, b, c , 使得对任意的 $f \in F$, 都有 a, b, c 在 f 的值域之外, 那么 F 是正规函数族.

Lemma 6. 如果 $\mathcal{F} = \{f\}$ 是正规函数族, 那么

$$\mathcal{F}^{-1} = \{f^{-1} \mid f \in \mathcal{F}\}$$

也是正规函数族.

Theorem 10 (Hilbert). 复平面上的一切区域 $\Omega \subset \mathbb{C}$, 其边界 $\partial\Omega$ 具有有限个连通分支, 都和平面某个狭缝区域共形等价.

证明. 给定一个平面区域 $\Omega \subset \mathbb{C}$, 我们用 Möbius 变换, 可以假设 $\infty \in \Omega$ 并且 $\Omega \subset \{|z| > 1\}$, 令单叶全纯映射族

$$\Sigma = \{f: \Omega \rightarrow \hat{\mathbb{C}} \mid f(\infty) = \infty, \lim_{z \rightarrow \infty} f'(z) = 1, f(z) = z + b_0 + \frac{b_1}{z} + \frac{b_2}{z^2} + \dots, |z| > 1\}. \quad (12)$$

令 $f(z) = z \in \Sigma$, 所以 Σ 是非空集合, $\Sigma \neq \emptyset$.

考察

$$\Sigma^{-1} = \{f^{-1} \mid f \in \Sigma\}.$$

由推论2, 我们得到

$$\{|z| < 1\} \subset [f^{-1}(|w - b_0| > 2)]^c,$$

因此, $f^{-1}(|w - b_0| > 2)$ 不包含三个点 $\{-1 + \epsilon, 0, 1 - \epsilon\}$, 由引理5, Σ^{-1} 是一个正规函数族. 故而, 由引理6, Σ 也是一个正规函数族. 由正规函数族的紧性, 存在函数序列的极限 $f \in \Sigma$, 使得

$$\operatorname{Re}_f(b_1) = \max_{g \in \Sigma} \operatorname{Re}_g(b_1).$$

我们欲证明 $f(\Omega)$ 是一个狭缝区域. 若反之, 则存在 $\partial f(\Omega)$ 的一个连通分支 Γ , Γ 既不是一个点, 也不是一条水平线段. 此时可以构造一个映射

$$g: \hat{\mathbb{C}} \setminus \Gamma \rightarrow \hat{\mathbb{C}} \setminus [-2R, 2R].$$

构造方法如下: 首先构造 Riemann 映射的逆映射 $\alpha: \{|z| > R\} \rightarrow \hat{\mathbb{C}} \setminus \Gamma$,

$$\alpha(z) = z + \frac{\varepsilon}{z} + \dots$$

和狭缝映射 $\beta: \{|z| > R\} \rightarrow \hat{\mathbb{C}} \setminus [-2R, 2R]$,

$$\beta(z) = z + \frac{R^2}{z},$$

则复合映射 $g: \hat{\mathbb{C}} \setminus \Gamma \rightarrow \hat{\mathbb{C}} \setminus [-2R, 2R]$,

$$g(w) = \beta \circ \alpha^{-1}(w) = w + \frac{\lambda}{w} + \dots.$$

由 Gronwall 定理的推论, 比较 α, β , 它们将圆盘的补集映到平面区域, 狭缝映射 b_1 的实部达到最大, 因此

$$R^2 = \operatorname{Re}_\beta(b_1) > \operatorname{Re}_\alpha(b_1) = \varepsilon.$$

由引理4, $\beta(z) = g \circ \alpha(z)$, 我们得到

$$R^2 = \operatorname{Re}_\beta(b_1) = \operatorname{Re}_{g \circ \alpha}(b_1) = \operatorname{Re}_g(b_1) + \operatorname{Re}_\alpha(b_1) = \lambda + \varepsilon > \varepsilon.$$

由此, 得到 $\operatorname{Re}_g(b_1) = \lambda > 0$. 由引理4, 在 $\{|z| > 1\}$ 上, 复合映射

$$g \circ f(z) = z + \frac{\operatorname{Re}_f(b_1) + \lambda}{z} + \dots.$$

由 $\lambda > 0$, 我们得到 $\operatorname{Re}_{g \circ f}(b_1) > \operatorname{Re}_f(b_1)$, 这和 f 的取法矛盾, 因此假设错误, 结论成立. \square

5 拟共形映射

拟共形映射理论是研究曲面间映射的数学分支,其主要内容包括研究曲面间映射的表示、满足特定限制映射的存在性和唯一性、在映射空间中的优化和变分、最优映射和全纯微分的内在联系等。

拟共形映射最开始被引进用于解决一类非共形映射的极值问题:在把矩形 R 映射至矩形 T 的保持顶点对应的连续可微分映射中,什么样的映射“最接近”共形映射。Grotzsh 给出了度量非共形映射对共形映射偏差的定义,此后,Teichmüller 继承和发展了上述思想,运用拟共形映射去研究经典的 Riemann 模问题,并建立和发展了 Teichmüller 空间。

5.1 拟共形映射和 Beltrami 系数

Definition 7. 给定一个 Riemann 面 X 和 Y 间的 C^1 同胚 $f: X \rightarrow Y, w = f(z)$, 我们说 f 是拟共形的, 如果:

$$K(f) = \sup_{z \in X} K_z(f) < \infty$$

其中,

$$K_z(f) = \frac{1 + k(z)}{1 - k(z)}$$

这里

$$k(z) = \left| \frac{f_{\bar{z}}}{f_z} \right|$$

。如果 $K=K(f)$, 我们说 f 是 K -拟共形的。

Definition 8. 令 Ω 是复平面的区域, 给定 C^1 映射 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 。我们记 $w = f(z)$, 复参数 $z = x + iy, w = u + iv$, 导映射表示成

$$dw = w_z dz + w_{\bar{z}} d\bar{z}$$

, 定义

$$\mu(z) := \frac{f_{\bar{z}}}{f_z} = \frac{w_{\bar{z}}}{w_z}$$

为映射的 Beltrami 系数。

值得注意的是, 虽然 μ 是依赖局部参数的选取的, 但是 $|\mu|$ 并不依赖局部参数的选取, 因此可以定义 f 的最大伸缩商为

$$K[f] = \sup_z \left| \frac{1 + |\mu|}{1 - |\mu|} \right|$$

Theorem 11. $K=1$ 时, f 为共形同胚。

证明. 设 $Q(z_1, z_2, z_3, z_4)$ 是 X 内任意一个四边形, $\bar{Q} \subset X$, 记 $\bar{Q} = f(Q), w_j = f(z_j), j = 1, 2, 3, 4$, 又设 φ 和 ϕ 分别是 $Q(z_1, z_2, z_3, z_4)$ 和 $\bar{Q}(w_1, w_2, w_3, w_4)$ 到矩形 $R(0, a, a + bi, bi)$ 和 $R'(0, a', a' + b'i, b'i)$ 的标准共形映射, 则 $\varphi \circ f \circ \phi^{-1}$ 是 R 到 R' 的 1-拟共形映射。可以证明 $\varphi \circ f \circ \phi^{-1}$ 把每一条水平线段都映射为水平线段, 把垂直线段都映射至垂直线段, 因此为仿射变换, 又易知 $\varphi \circ f \circ \phi^{-1}$ 为相似变换, 这样 f 为共形映射, 由于四边形选取的任意性, 从而 f 为共形同胚。□

Definition 9. 设 f 是一个 C^1 类的拟共形映射, $\mu(z)$ 是一个连续复值函数, 满足 $\|\mu\|_\infty < 1$ 是复特征, 那么 $w = f(z)$ 就满足方程

$$f_{\bar{z}}(z) = \mu f_z(z)$$

, 称之为 Beltrami 方程。

Beltrami 方程是著名的 Cauchy-Riemann 方程的推广。

5.2 Beltrami 方程与黎曼映照定理

Definition 10. 一个定义在集合 X 上的实值函数 f 的支集, 是指 X 的一个子集, 满足 f 恰好在这个子集上非 0。

Definition 11. 引进积分算子

设 w 在复平面上有定义, 具有紧致的支集, 并且 p 方可积, $p > 2$.

$$T_w(z) = -\frac{1}{\pi} \iint_C \frac{w(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\xi d\eta, \zeta = \xi + i\eta$$

Theorem 12. 设 $\mu(z)$ 是有界可测函数, $\|\mu\|_\infty < 1$, 且有一个有界支集, 则 *Beltrami* 方程在平面上有下列形式的解:

$$f(z) = z + T_w(z), w \in L_p, p > 2$$

从这个定理以及 Beltrami 方程与拟共形映射的关系立刻可以推出

Theorem 13. 设 $\mu(z)$ 是一个给定的可测函数, $\|\mu\|_\infty < 1$, 在平面上有有界的支集, 则存在全平面的拟共形映射 f 以 μ 为特征值, 且满足:

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{f(z)}{z} = 1$$

Theorem 14 (表示定理). 在 $\mu(z)$ 有一个有界支集的情况下, *Beltrami* 方程的全平面同胚解有表达式

$$f(z) = z + T_\mu(z) + T_{\mu H_\mu(z)}(z) + \cdots$$

H 是 Hilbert 变换

Theorem 15 (可测黎曼映照定理). 假设 $\mu : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ 是定义在单位圆盘上的光滑复值函数, $\|\mu\|_\infty < 1$, 那么存在单位圆盘的自身同胚 $\varphi : D \rightarrow \mathbb{D}$, 使得 *Beltrami* 方程

$$\frac{\partial f(z)}{\partial \bar{z}} = \mu(z) \frac{\partial f(z)}{\partial z}$$

成立, 并且不同的映射彼此相差一个单位圆盘上的 *Mobius* 变换。

证明. 这个定理的证明思路如下: 1. $f : (\mathbb{D}, |dz|^2) \rightarrow (\mathbb{D}, |dw|^2)$ 是拟共形映射, 在其诱导的拉回度量为 $f^*(|dw|^2)$, 同样的映射, 在拉回度量下 $f : (\mathbb{D}, f^*(|dw|^2)) \rightarrow (\mathbb{D}, |dw|^2)$ 是等距变换。2. 假设映射的 Beltrami 系数为 μ , 则其诱导的拉回度量为

$$f^*(|dw|^2) = dw d\bar{w} = |w_z dz + w_{\bar{z}} d\bar{z}|^2 = |w_z|^2 |dz + \mu d\bar{z}|^2$$

那么辅助度量和拉回度量共性等价, 因此, 同样的映射在辅助度量下成共形映射, 根据经典黎曼映照定理, 这个映射存在。□

5.3 建立在黎曼曲面上的拟共形映射

Definition 12. 假定 M 为一个黎曼面, 有共形图像 (U_α, ϕ_α) , M 上的 *Beltrami* 微分 μ 为每个局部参数 z_α 指定一个可测复值函数 μ_α , 满足: 若 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, 则

$$\mu_\alpha(z_\alpha) \frac{d\bar{z}_\alpha}{dz_\alpha} = \mu_\beta(z_\beta) \frac{d\bar{z}_\beta}{dz_\beta}$$

Theorem 16 (单值化定理). 任何一个黎曼曲面 M , 必同胚于下列曲面之一:

- (i) $\bar{\mathbb{C}}$
- (ii) \mathbb{C}
- (iii) $\mathbb{C} - 0$ (柱面)
- (iv) 环面
- (v) Δ/Γ .

其中 Δ 为不含边界的单位圆盘, Γ 是 $Aut\Delta$ 的一个子群。

由单值化定理, 除去几种特殊曲面外, 大多数曲面具有双曲型万有覆盖曲面。

Theorem 17. 假定双曲黎曼面 M_0 和 M_1 有共同的复叠空间 U , 且复叠映射分别为 p_0 和 p_1 , 记 G_0 和 G_1 为复叠变换群, 若 \tilde{f} 为 M_0 和 M_1 间的映射 f 的提升, 如果 f 为 K -拟共形映射, 则 \tilde{f} 也为 K -拟共形映射。

接下来讨论 \tilde{f} 的复特征。

设 $f: M_0 \rightarrow M_1$ 所诱导的 Beltrami 微分借助 M_0 的整体单值化参数表示为

$$\mu(z) \frac{d\bar{z}}{dz}, \forall z \in U$$

对于任意一个元素 $g \in G_0$ 点 z 与 $\zeta = g(z)$ 对应 M_0 上的同一个点, 换句话说, z 与 ζ 可以看做 $p_0(z)$ 的两个参数, 故 μ 满足

$$\mu(z) = \mu(g(z))g'(\bar{z})/g'(z), \forall g \in G_0$$

.

5.4 极值拟共形映射问题

Definition 13. M_0 和 M_1 为亏格大于 1 的两个紧黎曼曲面, h 为定向同胚映射, 记 Q 为拟共形映射且同伦于 h 的 f 的集合, 若 $f_0 \in Q$ 满足

$$\forall f \in Q, K[f_0] \leq K[f]$$

, 则称 f_0 极值, 若取等唯一, 则称唯一极值。

Definition 14. 对黎曼面 X , 拟共形映射 f 将 X 映射至另一个黎曼空间 Y , 则称 (f, Y) 为黎曼面 X 的共形结构的形变。

Definition 15. X 的共形结构的形变 $(f_0, X_0), (f_1, X_1)$ 称之为等价的, 如果存在共形映射 $c: X_0 \rightarrow X_1$ 且同伦 g_t 连接 cf_0, f_1 满足:

1. 对一切 $z \in X, g_0(z) = c(f_0(z)), g_1(z) = f_1(z)$
2. 对一切 $z \in \partial X, t \in [0, 1], g_t(z) = cf_0(z) = f_1(z)$

称这样的等价类组成的空间为 X 的 Teichmüller 空间, 记为 $T(X)$ 。

Theorem 18. 紧的黎曼曲面每个等价类都有一个极值拟共形映射。

这个定理也可以推广至有限型黎曼空间。

证明. 设 $f_*: S_0 \rightarrow S_1$, 在 $[f_*]$ 中存在一个序列 f_n 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} K[f_n] = \inf_{f \in [f_*]} K[f]$$

设两个黎曼曲面有共同的万有复叠空间 U , 相应的复叠映射为 p_0, p_1 , 相应的复叠变换群为 G_0, G_1 , 设 \tilde{f}_n 是 f_n 的提升, 为 K_n -拟共形映射, 其中 $K_n = K[f_n]$, 记 $K = \sup K_n$, 因此 \tilde{f}_n 是 K -拟共形映射, 因此存在一个子序列内闭一致收敛, 设其收敛函数为 \tilde{f}_0 , 这个函数是 U 内的 K -拟共形映射。

对于一个任意固定的 $g \in G_0$, $g_n = \tilde{f}_0 \circ g \circ \tilde{f}_0^{-1}$ 是 G_1 中的元素, 当 n 充分大时, g_n 是一个固定元素, 由此, \tilde{f}_0 可以投影为 S_0, S_1 的拟共形映射 f_0 。

接下来证明

$$K[f_0] = k[\tilde{f}_0] = \lim_{n \rightarrow \infty} K[f_n]$$

设右侧式子极限为 K_0 , 那么对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使得 $n > N$ 时, $K[\tilde{f}_n] < K_0 + \varepsilon$, 因此, \tilde{f}_0 一定是 $K_0 + \varepsilon$ 拟共形映射, 由 ε 的任意性可得 $K[f_0] \leq K_0$ 。

最后只需证明, f_0 在同伦类中。

Lemma 7 (单值性定理). M 为一个黎曼曲面, (\tilde{M}, p) 为其上的一个正则复叠空间, 若 M 上的两条弧线 γ_1, γ_2 具有相同的起点和终点 a, b , 且两者同伦, 通过 a 的任意一个上方点 \tilde{a} , 两条弧线 γ_1, γ_2 的提升具有相同起点和终点且同伦。

事实上, 在 n 特别大时, 已经说明 $g_n = \tilde{f}_0 \circ g \circ \tilde{f}_0^{-1}$ 为一固定元素, 记为 η , 这样, \tilde{f}_0 诱导的 G_0, G_1 之间的同构:

$$\chi_0: \gamma \rightarrow \tilde{f}_0 \circ \gamma \circ \tilde{f}_0^{-1}$$

与 f_* 提升诱导的同构只差一个内部自同构, 故由引理, $f_0 \in [f_*]$. □

6 Teichmüller 映射

6.1 Grötzsch 问题

Grötzsch 问题是一个最简单的极值问题的情形, 考虑平面上的两个矩形,

$$R_0 = [0, a] \times [0, 1], R_1 = [0, a_1] \times [0, 1]$$

, 考虑寻求一个拟共形映射, 使得 $f(R_0) = R_1$, 且保持顶点相对应, 并且使得 $K[f]$ 最小。

Theorem 19 (Grötzsch). 这样的拟共形映射存在且唯一, 并且是一个仿射拉伸映射:

$$x \mapsto \frac{a_1}{a}x, y \mapsto y$$

证明. 不妨设 $a_1 \geq a$.

记定理所述的仿射拉伸变换为 f_0 , 只需证 f_0 为所求。

显然得, 有 $K[f_0] = \frac{a_1}{a}$ 。

设 f 是两个矩形之间任意一个拟共形映射, 且保持顶点的一一对应, 对于几乎所有的 $y \in [0, 1]$, $f(x+iy)$ 是 x 的绝对连续函数, 对这样的 y , 我们有

$$a_1 \leq \int_0^a |f_x(x+iy)| dx$$

两边对 y 进行积分, 得

$$a_1 \leq \int_0^1 dy \int_0^a |f_x(x+iy)| dx = \iint_{R_0} |f_x(x+iy)| dx dy$$

从而有

$$\begin{aligned} a_1^2 &\leq \iint_{R_0} \frac{|f_x(x+iy)|^2}{J_f} dx dy \iint_{R_0} J_f dx dy \\ &\leq a_1 \iint_{R_0} \frac{(|f_z| + |f_{\bar{z}}|)^2}{|f_z|^2 - |f_{\bar{z}}|^2} dx dy \\ &\leq K(f) a a_1 \end{aligned}$$

从而, 我们有

$$K[f] \geq K[f_0]$$

当 $K[f] = K[f_0]$ 时, 上述所有不等号全部取等。

故 $f_{\bar{z}}/f_z$ 恒为一个实数, 且 $J_f = |f_z|^2(1-|\mu|^2)$ 也是常数, 故 $|f_z|$ 为常数, 从而对几乎所有的 y 而言, $x \mapsto f(x+iy)$ 的像是一条水平直线段, 且 f_x 为非负实数, 由 $f_x = f_z + f_{\bar{z}}$ 得到 $f_z, f_{\bar{z}}$ 均为非负实数, 因而 f 为仿射变换。□

我们可以将平面上的矩形进行推广, 考虑两个 Jordan 区域 D_0, D_1 , 在他们的边界上依次选择 4 个点, 寻求把 D_0 映射至 D_1 的拟共形极值映射, 使得伸缩商最小。

这个问题可以用两个 Jordan 区域到矩形的共形映射, 化归为 Grötzsch 问题, 推广的 Grötzsch 问题的解为 $\phi^{-1} \circ A \circ \varphi$ 其中 ϕ, φ 为两个共形映射, A 是上述定理中的拉伸变换。

6.2 Teichmüller 映射

设 $f : S_0 \rightarrow S_1$ 是两个黎曼曲面间的拟共形映射, 我们一般将每个同伦类中, 最大伸缩商最小的微分同胚称之为 Teichmüller 映射。

Theorem 20 (Strebel; Teichmüller 映射唯一性定理). 设 $f_0 : X \rightarrow Y$ 是黎曼面间的拟共形映射, 其 Beltrami 微分具有形式 $k_0|\varphi_0|/\varphi_0, 0 < k_0 < 1$, 其中 φ_0 是 X 上的全纯二次微分, 称为 f_0 的伴随二次微分, 其单位模 $\|\varphi_0\| = 1$ 。则对任意一个 $f_1 \in [f_0]$, 记其 Teichmüller 微分为 μ , 必成立

$$\|\mu\|_\infty \geq k_0$$

等号成立当且仅当 $\mu = k_0|\varphi_0|/\varphi_0$

证明。

Lemma 8 (Reich-Strebel 不等式). 在定理条件下, 有以下不等式成立:

$$K_0 \leq \iint_X \frac{|1 + \mu\varphi_0/|\varphi_0||^2}{1 - |\mu|^2} |\varphi_0| dx dy$$

显然, 以下式子成立

$$\frac{|1 + \mu\varphi_0/|\varphi_0||^2}{1 - |\mu|^2} \leq \frac{1 + k(f_1)}{1 - k(f_1)}$$

从而由引理, 可知

$$K_0 \leq \iint_X \frac{1 + k(f_1)}{1 - k(f_1)} |\varphi_0| dx dy \leq K(f_1)$$

最后一个是因为最大伸缩商的定义。

等号成立时, 有

$$\frac{1+k_0}{1-k_0} = \frac{1+k(f_1)}{1-k(f_1)}$$

且

$$\mu\varphi_0/|\varphi_0| = k_0$$

。

□

在这个定理中, 范数等于 1 可以改为范数有穷, 如果没有这个条件, Teichmüller 映射不一定是极值映射。

而关于 Teichmüller 映射的存在性, 在讨论开黎曼曲面的极值问题时, Strebel 等人举出了例子来表明, 这种情况下, 极值映射不一定唯一, 也不一定存在 Teichmüller 映射, 在这种情况下, 存在性问题需要引进下面的 Hamilton 序列来讨论。

Definition 16. 设 k 是一个极值映射的复特征, X 上的全纯函数列 φ_n 如果使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_X k \varphi_n dx dy = \|k\|_\infty$$

则称序列为一个 Hamilton 序列。如果其闭一致收敛于 0, 则称之为退化的 Hamilton 序列。

引入边界伸缩商

Definition 17. h 是单位圆 \mathbb{D} 边界的保向自同胚

$$H[h] = \inf_{f \in [h]} \lim_{r \rightarrow 1} \sup_{z \in \partial\mathbb{D} - \partial\mathbb{D}_r} K_z(f)$$

Theorem 21. 若在 h 处极值映射的复特征 k 有退化的 Hamilton 序列, 则 $H[h] = K[h]$ 。

Theorem 22. 当 $H[h] < K[h]$ 时, $[h]$ 中一定有 Teichmüller 映射。

Theorem 23. 若 $f: \partial\mathbb{D} \rightarrow \partial\mathbb{D}$ 是给定的关于边界 h 处的极值映射, k 为复特征, 并且关于 k 没有退化的 Hamilton 序列, 则 f 是唯一的极值映射, 并且是 Teichmüller 映射。

6.3 Teichmüller 映射的计算

首先我们需要一些调和映射的知识。

Definition 18. 给定可度量曲面之间的 C^1 光滑映射, $f: (S, \sigma(z)|dz|^2) \rightarrow (R, \rho(w)|dw|^2)$, 定义调和能量密度为

$$e(f, \sigma, \rho) = \frac{\rho(w(z))}{\sigma(z)} (|w_z|^2 + |w_{\bar{z}}|^2)$$

, 调和能量为

$$\begin{aligned} E_\rho(f) &= \int_S e(f, \sigma, \rho) dA_\sigma = \int_S \frac{\rho(w(z))}{\sigma(z)} (|w_z|^2 + |w_{\bar{z}}|^2) \sigma(z) dx dy \\ &= \int_S \rho(|w_z|^2 + |w_{\bar{z}}|^2) dx dy \end{aligned}$$

关于 Teichmüller 映射的计算方法有以下定理给出:

Theorem 24. *Teichmüller 映射 f 和目标曲面对应的全纯二次微分 ψ 所诱导的奇异度量 $\rho = |\psi|$ 满足*

$$\sup_{\rho \in CM(R)} \inf_{g \sim f} E_{\rho}(g) = 1/2(K'[f] + \frac{1}{K'[f]})$$

其中 $K'[f]$ 是和 f 同伦的拟共形映射等价类的极值最大伸缩商,

$$CM(R) = \{\rho(w) : R \rightarrow \mathbb{R}_{>0} \mid \int_R \rho(w) du dv = 1\}$$

6.4 Teichmüller 映射的应用

对 Teichmüller 映射有两个重要的应用—等几何分析参数化和平面形状插值。形状插值是计算机动画和电影产业的经典问题。等几何分析无缝融合了计算机辅助工程和计算机辅助设计。这两个不同的领域都和几何映射密切相关。对于任意两个区域之间的映射,一般要求映射必须是双射,扭曲尽可能小且尽可能光滑。拟共形映射,特别是 Teichmüller 映射正好满足上述要求。

等几何分析的出现,主要是为了解决有限元分析的耗时问题,等几何分析跳过了有限元分析原来需要的转化为可分析网格的步骤,使得设计和分析统一了起来。然而等几何分析需要进行参数化这个关键的步骤,需要尽可能正交且均匀分布的参数化曲线,因此 Teichmüller 映射在参数化分析中被引进了过来。

形状插值的目标是给定初始形状和目标形状,然后可以生成一序列中间形状,同时使得从初始形状到目标形状的这种演变是渐进而又自然的,由于形状插值会产生中间时刻的形状序列,因此人们往往把形状插值问题看做是数据驱动的建模。而对于动态变化复杂的拓扑曲面,求解微分同胚一直是挑战性的问题,而 Teichmüller 映射可以作为一个强有力的武器。

7 Grasia 嵌入的构造部分

请见手稿部分 (基于参考文献[2], 21页起)

8 黎曼面的模空间

请见附录A演示稿部分

参考文献

- [1] Xianfeng Gu and Shing-Tung Yau. *Computational Conformal Geometry*, volume 3 of *Advanced Lectures in Mathematics*. International Press and Higher Education Press, 2007.
- [2] Garsia, Adriano M.. "An Imbedding of Closed RIEMANN Surfaces in EUCLIDEAN Space.." *Commentarii mathematici Helvetici* 35 (1961): 93-110.