

线性代数期中试卷 答案

姓名\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 专业\_\_\_\_\_ 考试时间 2014.11.22

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一. 简答与计算题(本题共5小题,每小题8分,共40分)

1.计算 $n$ 阶行列式  $D_n = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}.$

解:  $D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}$ ,故 $D_n - D_{n-1} = D_{n-1} - D_{n-2} = \cdots = D_2 - D_1 = 1$ ,  
 $D_n = D_{n-1} + 1 = \cdots = D_1 + n - 1 = n + 1$ .

2. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} e^t & \cos t & \sin t \\ e^t & -\sin t & \cos t \\ e^t & -\cos t & -\sin t \end{pmatrix}$ , 求 $A^{-1}$ 。

解一: 分 $\sin t \neq 0$  和 $\sin t = 0$ ,均有

$(A, E) \rightarrow \left( e^t \ 0 \ 0 \ \middle| \ \frac{1}{2} \ 0 \ \frac{1}{2} \right) \rightarrow \left( 1 \ 0 \ 0 \ \middle| \ \frac{e^{-t}}{2} \ 0 \ \frac{e^{-t}}{2} \right)$   
 $\left( 0 \ \sin t \ -\cos t \ \middle| \ \frac{1}{2} \ -1 \ \frac{1}{2} \right) \rightarrow \left( 0 \ 1 \ 0 \ \middle| \ \frac{\sin t + \cos t}{2} \ -\sin t \ \frac{\sin t - \cos t}{2} \right)$   
 $\left( 0 \ \cos t \ \sin t \ \middle| \ \frac{1}{2} \ 0 \ -\frac{1}{2} \right) \rightarrow \left( 0 \ 0 \ 1 \ \middle| \ \frac{\sin t - \cos t}{2} \ \cos t \ -\frac{\sin t + \cos t}{2} \right)$ ,可得 $A^{-1}$ .

解二:  $|A| = 2e^t$ ,  $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ e^t(\sin t + \cos t) & -2e^t \sin t & e^t(\sin t - \cos t) \\ e^t(\sin t - \cos t) & 2e^t \cos t & -e^t(\sin t + \cos t) \end{pmatrix}$ ,可得 $A^{-1}$ .

3. 已知一个矩阵 $A$ 的伴随矩阵为 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$ 且 $|A| > 0$ , 求 $A^{-1}$ 。

解: 计算可以得到 $|A^*| = 9$ , 那么由于此时 $|A|^2 = |A^*|$  和条件 $|A| > 0$ , 得到 $|A| = 3$ 。

则 $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^* = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 2/3 \\ 2/3 & 4/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 & 5/3 \end{pmatrix}$ 。

4. 若 $A$ 为 $n$ 阶可逆矩阵,  $u, v$ 为 $n$ 维列向量, 若矩阵 $A + uv^T$ 有形式为 $A^{-1} + t(A^{-1}uv^TA^{-1})$ 的逆矩阵, 其中 $t$ 为实数, 则 $t$ 为何值?

解:  $(A + uv^T)(A^{-1} + t(A^{-1}uv^TA^{-1})) = E + uv^TA^{-1} + tuv^TA^{-1} + t(uv^TA^{-1}uv^TA^{-1}) = E$ ,  
故 $uv^TA^{-1} + tuv^TA^{-1} + tuv^TA^{-1}uv^TA^{-1} = O$ , 两边右乘 $A$ 得  
 $uv^T + tuv^T + tuv^TA^{-1}uv^T = u(1 + t + tv^TA^{-1}u)v^T = O$ ,  $\therefore t = -1/(1 + v^TA^{-1}u)$ .

5. 设 $n$ 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ , 求矩阵 $A$ 的特征值及其重数。

解:  $|\lambda E - A| = (\lambda - n)\lambda^{n-1} = 0$ , 故 $A$  的特征值为:  $\lambda = n$ ,  $\lambda = 0(n-1重)$ 。

二.(15分) 解线性方程组

$$\begin{cases} mx_1 + nx_2 + nx_3 = n, \\ nx_1 + mx_2 + nx_3 = n, \\ nx_1 + nx_2 + mx_3 = n, \end{cases}$$

其中参数  $m, n$ 不全为0。

解: 方程组的增广矩阵 $B = \left( \begin{array}{ccc|c} m & n & n & n \\ n & m & n & n \\ n & n & m & n \end{array} \right) \xrightarrow{r} \left( \begin{array}{ccc|c} m+2n & m+2n & m+2n & 3n \\ n & m & n & n \\ n & n & m & n \end{array} \right)$ 。

当 $m+2n \neq 0$  时,  $B \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3n/(m+2n) \\ 0 & m-n & 0 & (m-n)n/(m+2n) \\ 0 & 0 & m-n & (m-n)n/(m+2n) \end{array} \right)$ ,

故当 $m+2n \neq 0$ 且 $m \neq n$  时,  $B \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & n/(m+2n) \\ 0 & 1 & 0 & n/(m+2n) \\ 0 & 0 & 1 & n/(m+2n) \end{array} \right)$ ,得唯一解 $\begin{pmatrix} n/(m+2n) \\ n/(m+2n) \\ n/(m+2n) \end{pmatrix}$ 。

当 $m+2n \neq 0$ 且 $m = n$  时,  $B \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$ ,得通解为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

当 $m+2n = 0$  时,  $B \rightarrow \left( \begin{array}{ccc|c} n & m & n & n \\ n & n & m & n \\ 0 & 0 & 0 & 3n \end{array} \right)$ , 若 $n = 0$ , 则 $m = 0$ , 与 $m, n$  不全为0矛盾,

故 $n \neq 0$ , 矩阵最后一行得矛盾方程, 故无解。

三.(10分) 设 $A$ 是一个 $m \times n$ 的矩阵,  $B$ 是一个 $m \times k$ 的矩阵。证明: 存在一个 $n \times k$ 的矩阵 $C$ 使得 $AC = B$ 的充分必要条件是  $r(A) = r(A, B)$ .

证: 首先说明 $AC = B$  等价于 $B$  的列向量组可以由 $A$  的列向量组线性表示。那么 $A$  的一个极大无关组也是 $(A, B)$  的极大无关组。所以 $r(A) = r(A, B)$ 。反过来推导类似。

四. (15分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

(1)求可逆矩阵 $P$ 使得 $PA$ 为行简化梯形阵。

(2)求 $A$ 的秩。

(3)设 $A$ 的列分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ , 即 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ , 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大无关组, 并用此极大无关组线性表示其余向量。

解: (1) 对 $(A, E)$  做初等行变换

$$(A, E) \rightarrow \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 3/2 & -1/2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1/2 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1/2 & 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5/2 & -1/2 & -2 & 1 \end{array} \right) = (B, P),$$

$$\text{故 } P = \begin{pmatrix} 3/2 & -1/2 & -1 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 1 & 0 \\ 5/2 & -1/2 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2)  $A$ 经初等行变换后的行简化梯形 $B$  有3个非零行, 故 $r(A) = 3$ 。

(3) 由行简化梯形 $B$  可知,  $A$  的列中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  为一个极大无关组, 最后列 $\alpha_4 = -\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3$ 。

五.(10分) 设 $n$ 阶矩阵 $C = (e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n})$ , 其中 $e_j = (0, 0, \dots, 1, 0, \dots, 0)^T$  (第 $j$ 个分量为1, 其余为0),  $j = 1, 2, \dots, n$ , 而 $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ 为 $(1, 2, \dots, n)$ 的一个排列, 证明: (1)  $C^{-1} = C^T$ , (2)  $C^{-1} \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)C = \text{diag}(d_{i_1}, d_{i_2}, \dots, d_{i_n})$ .

$$\text{证: (1) } C^T C = \begin{pmatrix} e_{i_1}^T \\ e_{i_2}^T \\ \vdots \\ e_{i_n}^T \end{pmatrix} (e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) = (a_{kj})_{n \times n} = (e_{i_k}^T e_{i_j})_{n \times n} = E, \text{故 } C^{-1} = C^T.$$

$$(2) \quad \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) = (d_{i_1} e_{i_1}, d_{i_2} e_{i_2}, \dots, d_{i_n} e_{i_n}),$$

$$\text{故 } C^{-1} \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)C = C^T (d_{i_1} e_{i_1}, d_{i_2} e_{i_2}, \dots, d_{i_n} e_{i_n}) = \text{diag}(d_{i_1}, d_{i_2}, \dots, d_{i_n}).$$

六.(10分) 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & x \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix},$$

设矩阵 $A$ 相似于 $B$ , (1)求常数 $x, y$ , (2)求 $A$ 的特征值和特征向量。

解:  $B$  的特征值为 $2, 2, y$ ,  $A$  的特征方程为 $|\lambda E - A| = (\lambda - 2)[\lambda^2 - (x + 3)\lambda + 3(x - 1)] = 0$ ,  $A$ 相似于 $B$ , 它们有相同的特征值。

将 $\lambda = 2$  代入上式第二个括号, 得 $x = 5$ , 故 $\lambda^2 - 8\lambda + 12 = 0$ , 得 $\lambda = 2, 6$ , 从而 $y = 6$ 。

当 $\lambda = 2$ 时, 特征向量为 $\alpha_1 = (-1, 1, 0)^T$ ,  $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$ , 当 $\lambda = 6$  时, 特征向量为 $\alpha_3 = (1, -2, 3)^T$ 。