

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Анализ молекулярной мишени и доступных данных

Объект исследования: BCR::ABL1 тирозинкиназа — WT и T315I

Ф.И.О. студента	Шпока Владислав, Пясецкий Кирилл (4 курс, 3 группа)
Дата	25.09.2026

Цель работы

Собрать и структурировать основные биологические, структурные и химические данные по BCR::ABL1, сравнить WT и T315I и сформировать набор данных, который будет использоваться в следующих лабораторных работах.

Основные ресурсы

Ресурс	Адрес
UniProt	https://www.uniprot.org/uniprotkb/P00519
RCSB Protein Data Bank	https://www.rcsb.org/
AlphaFold DB	https://alphafold.ebi.ac.uk/entry/P00519
ChEMBL	https://www.ebi.ac.uk/chembl/
BindingDB	https://www.bindingdb.org/
PubChem	https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

Все внешние данные имеют источник. Дата обращения ко всем базам — 25.09.2026. Выборки из ChEMBL, RCSB и PubChem выполнены программно через публичные API; скрипты приложены в папке *scripts/*.

1. Идентификация мишени в UniProt

Найдите *reviewed*-запись ABL1_HUMAN. Заполните таблицу. В поле «Kinase domain» укажите положение домена в последовательности, если оно приведено в записи.

Параметр	Результат
Protein name	Tyrosine-protein kinase ABL1 (EC 2.7.10.2); синонимы: Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1, c-ABL, p150
Gene	ABL1 (синонимы ABL, JTK7)
UniProt accession	P00519 (ABL1_HUMAN), статус: reviewed (Swiss-Prot)
Organism	<i>Homo sapiens</i> (человек), NCBI taxon 9606
Sequence length	1130 а.о. (изоформа 1a, P00519-1; изоформа 1b P00519-2 на 19 остатков длиннее)
Protein type	нерецепторная (цитоплазматическая) тирозинпротеинкиназа, протоонкоген; трансфераза, связывает АТФ и Mg^{2+}
Kinase domain	Protein kinase domain: 242–493
Основная функция	Фосфорилирование тирозиновых остатков белков-мишеней; участие в ремоделировании цитоскелета, адгезии и подвижности клеток, эндоцитозе рецепторов, аутофагии, ответе на повреждение ДНК и апоптозе

Основные функциональные участки, указанные в UniProt:

Участок	Положение / примечание
CAP region	1–60 (N-концевой «кэп», участвует в автоингибировании)
SH3 domain	61–121
SH2 domain	127–217
Protein kinase domain	242–493
Сайт связывания АТФ	248–256, 271, 316–322
Active site (proton acceptor)	Asp363
Kinase activation loop	381–405 (включая Tyr393 — автофосфорилирование)
Точка разрыва при транслокации	между остатками 26 и 27
DNA-binding region	869–968
F-actin-binding region	953–1130
Сигналы ядерной локализации (NLS)	605–609, 709–715, 762–769; NES 1090–1100
Миристоилирование	Gly2 (нужен для автоингибирования)

Кратко поясните, почему в дальнейших лабораторных работах основной интерес представляет именно **ABL1 kinase domain**:

Патологическим в BCR::ABL1 является не весь белок, а нерегулируемая тирозинкиназная активность, которая целиком определяется киназным доменом (242–493). Все клинически применяемые ингибиторы (иматиниб, нилотиниб, дазатиниб, бозутиниб, понатиниб), кроме аллостерического асциминиб, связываются в АТФ-кармане этого домена, и исследуемая мутация T315I находится внутри него. Кроме того, полноразмерный BCR::ABL1 (≈ 2000 а.о. для p210) экспериментально не закристаллизован: практически все структуры PDB представляют собой изолированный киназный домен ABL1 (иногда вместе с SH3–SH2). Поэтому структурный анализ и докинг выполняются на киназном домене, а не на полной химерной последовательности.

Замечание о нумерации. Позиции даны по изоформе 1a (P00519-1, 1130 а.о.), где gatekeeper-остаток — Thr315. В части публикаций и структур PDB используется нумерация изоформы 1b (на 19 остатков

больше), где тот же остаток — Thr334 (например, в 5M04 мутация записана как T334I). Это одна и та же замена.

2. Что представляет собой BCR::ABL1

Кратко ответьте на вопросы. Используйте связный текст и укажите источники.

Какие два гена участвуют в образовании BCR::ABL1?

Ген BCR (*breakpoint cluster region*, хромосома 22, локус 22q11) и ген ABL1 (*Abelson tyrosine kinase 1*, хромосома 9, локус 9q34). В UniProt точка разрыва в ABL1 указана прямо в записи: остатки 26/27.

Какое хромосомное изменение приводит к образованию fusion gene?

Реципрокная транслокация t(9;22)(q34;q11). Укороченная хромосома 22 называется филадельфийской хромосомой (Ph). На ней формируется химерный ген BCR::ABL1, кодирующий слитный белок. В зависимости от точки разрыва в BCR получаются изоформы p210 (типична для ХМЛ), p190 (чаще при Ph⁺ ОЛЛ) и редкая p230.

С каким заболеванием прежде всего связан BCR::ABL1?

С хроническим миелоидным лейкозом (ХМЛ, CML; UniProt: *Leukemia, chronic myeloid*, MIM 608232). Та же транслокация встречается при Ph-позитивном остром лимфобластном лейкозе и реже при ОМЛ.

Почему BCR::ABL1 обладает патологической тирозинкиназной активностью?

Нормальная ABL1 находится в автоингибированном состоянии: её удерживают в «закрытой» конформации N-концевой миристоил, вставленный в гидрофобный карман C-доли киназного домена, а также контакты SH3-домена с линкером SH2-киназный домен и CAP-участок. При транслокации N-конец ABL1 (остатки 1–26, включая Gly2) теряется и замещается фрагментом BCR. В результате: (1) исчезает миристоильное автоингибирование; (2) coiled-coil домен BCR вызывает олигомеризацию белка, что запускает межмолекулярное автофосфорилирование петли активации (Tyr393). Киназа переходит в постоянно активное, не зависящее от внешних сигналов состояние.

Почему BCR::ABL1 является лекарственной мишенью?

Это «драйверная» мутация: одна молекулярная причина полностью определяет фенотип заболевания, а патологический белок присутствует только в опухолевых клетках. Он обладает ферментативной активностью с хорошо определённым и «закрываемым» малыми молекулами АТФ-карманом. Успех иматиниба, превративший ХМЛ из смертельного заболевания в контролируемое хроническое, служит прямым подтверждением: подавление активности мишени останавливает прогрессирование болезни.

Схема причинно-следственной связи:

Этап	Содержание
1. Генетическое изменение	Реципрокная транслокация t(9;22)(q34;q11), образование филадельфийской хромосомы
2. Образование BCR::ABL1	Химерный ген BCR::ABL1 → слитный белок (чаще p210); ABL1 теряет N-концевой участок 1–26 и приобретает coiled-coil домен BCR
3. Изменение активности	Утрата миристоильного автоингибирования + олигомеризация → автофосфорилирование Tyr393 → конститутивная тирозинкиназная активность
4. Нарушение сигнализации	Постоянное фосфорилирование CRKL, STAT5, GAB2, CBL и др.; активация путей RAS/MAPK, PI3K/AKT, JAK/STAT
5. Клеточный эффект	Независимая от ростовых факторов пролиферация миелоидных предшественников, подавление апоптоза, нарушение адгезии к строме костного мозга
6. Заболевание	Хронический миелоидный лейкоз (при иных точках разрыва — Ph ⁺ ОЛЛ)

Источники: UniProt P00519 (разделы *Function*, *Activity regulation*, *Disease*, *Site*); Ph-хромосома и транслокация — запись UniProt со ссылкой на PMID 3021337.

3. Мутация T315I

Найдите информацию о мутации T315I. Сравните WT и T315I. Не анализируйте пока детально межатомные взаимодействия — это будет отдельная лабораторная работа.

Обозначение T315I означает замену Thr315 → Ile315. Остаток 315 расположен внутри киназного домена (242–493), непосредственно у АТФ-связывающего участка (сайт связывания АТФ включает остатки 316–322), в конце шарнирной (hinge) области, в мотиве FYIITEFMTYG (остатки 311–321).

Характеристика	WT	T315I
Аминокислота в позиции 315	Thr (треонин)	Ile (изолейцин)
Сокращение аминокислоты	T	I
Полярность боковой цепи	полярная, незаряженная (гидроксильная группа –OH)	неполярная, гидрофобная (разветвлённый алкил)
Размер боковой цепи	небольшая ($-\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$), объём $\approx 116 \text{ \AA}^3$	крупнее и разветвлённая ($-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$), объём $\approx 167 \text{ \AA}^3$
Возможность H-bond	да: –OH выступает донором/акцептором водородной связи	нет: донора/акцептора в боковой цепи не остаётся
Влияние на binding site	–OH ориентирует и «сужает» вход в гидрофобный карман за gatekeeper	исчезает ключевая H-связь, объём боковой цепи растёт → стерическое перекрытие входа в back pocket
Влияние на чувствительность к ингибиторам	чувствительна ко всем TKI 1–3 поколений	резистентность к иматинибу, нилотинибу, дазатинибу, бозутинибу; сохраняется активность понатиниба, асциминиба, аксетиниба (in vitro)

Почему Thr315 называют gatekeeper residue?

Этот остаток стоит «привратником» на границе между АТФ-карманом и дополнительной гидрофобной полостью (back pocket, hydrophobic pocket II), расположенной глубже. Размер его боковой цепи определяет, пройдёт ли молекула ингибитора в эту полость: малый треонин оставляет «дверь» открытой, крупный изолейцин её закрывает. Кроме того, гидроксильная группа Thr315 образует водородную связь с ингибиторами типа II (в комплексе с иматинибом, 2HYY, это одна из ключевых связей, закрепляющих аминопиримидиновую часть молекулы).

Почему замена одной аминокислоты может заметно изменить эффективность ингибитора?

Аффинность ингибитора определяется не всей поверхностью белка, а несколькими взаимодействиями в кармане связывания, и остаток 315 участвует сразу в двух из них. Во-первых, теряется водородная связь: одна H-связь — это порядка 4–8 кДж/моль, что при пересчёте через $\Delta G = -RT \ln K$ уже даёт изменение константы связывания в несколько раз. Во-вторых, и это главное, добавляется стерическое препятствие: более объёмная боковая цепь изолейцина перекрывает участок, который занимала часть молекулы ингибитора. Связывание становится не просто менее выгодным, а геометрически невозможным без перестройки всего комплекса. Поэтому эффект нелинейный: по нашим данным (раздел 8) IC_{50} иматиниба растёт примерно с 280 нМ до $> 10\,000$ нМ, а для дазатиниба — с 0,6 нМ до $> 10\,000$ нМ, то есть более чем в 10^4 раз. Молекулы, не опирающиеся на контакт с остатком 315 (понатиниб с линейной тройной связью, огибающей gatekeeper; асциминиб, связывающийся в мистостойном кармане), теряют в активности мало или не теряют вовсе.

4. Экспериментальные структуры в RCSB PDB

Найдите минимум 3 структуры ABL1 kinase domain без T315I и 3 структуры с T315I. Для каждой записи проверьте экспериментальный метод, разрешение, лиганд, цепь и дополнительные мутации.

PDB ID	Форма	Метод	Resol., Å	Ligand	Chain	Доп. мутации
2HYY	WT	X-ray	2.40	STI — иматиниб	A, B, C, D	нет
3CS9	WT	X-ray	2.21	NIL — нилотиниб	A, B, C, D	нет
3UE4	WT	X-ray	2.42	DB8 — бозутиниб	A, B	нет
4WA9	WT	X-ray	2.20	AXI — аксетиниб	A, B	нет
3QRJ	T315I	X-ray	1.82	919 — ребастиниб (DCC-2036)	A, B	нет (только T315I)
4TWP	T315I	X-ray	2.40	AXI — аксетиниб; Na ⁺ , Ni ²⁺	A, B	нет (только T315I)
2V7A	T315I	X-ray	2.50	627 — данусертиб (PHA-739358); Mg ²⁺	A, B	нет (только T315I)
5M04	T315I	X-ray	2.17	AY7 — асциминиб + NIL — нилотиниб	A	D363N (в записи T334I, D382N — нумерация 1b)

Все перечисленные записи — человеческий ABL1 (P00519). Поиск проводился по ссылке на UniProt-запись; всего найдено 109 записей, из них 68 покрывают позицию 315, то есть реально содержат киназный домен (60 WT и 8 T315I). Форма определялась автоматически по последовательности в окрестности остатка 315: мотив FYIITEF — WT, FYIIIEF — T315I (скрипт [scripts/survey_pdb.py](#)). Дополнительно рассмотрены структуры мышинного ортолога (P00520): 1IEP (WT + иматиниб, 2.10 Å), 3DXZ (WT + понатиниб, 2.20 Å), 3IK3 (T315I + понатиниб, 1.90 Å), 2Z60 (T315I + PPY-A, 1.95 Å); они использованы в разделе 8 как источник PDB_ID для понатиниба, у которого нет структуры с человеческим T315I.

Какие отличия между найденными структурами показались вам наиболее существенными?

- Организм и нумерация.** Часть классических структур получена на мышинном Abl1 (P00520), причём часть записей использует нумерацию изоформы 1b (сдвиг на 19 остатков). Иначе «тот же» остаток окажется в другом месте.
- Границы конструкции.** Одни записи содержат только киназный домен (≈ 229 –500), другие захватывают SH3–SH2 (например, 5M04: 27–515). От этого зависит, какие контакты видны в структуре.
- Конформация белка.** Структуры делятся на DFG-in (активная; например, 2GQG с дазатинибом) и DFG-out / «иматиниб-подобную» неактивную (2HYY, 1IEP). Для докинга это принципиально.
- Дополнительные мутации.** Не все записи «чистые»: в 5M04, помимо T315I, введена каталитически инактивирующая замена D363N, в 3DK7 — ещё и L445P.
- Лиганды.** 64 из 68 «киназных» записей содержат малую молекулу; аро-форм почти нет. Это удобно для анализа сайта связывания, но означает, что мы почти всегда видим белок, уже подстроившийся под конкретный лиганд.

5. Выбор структур для дальнейшей работы

Выберите одну структуру WT и одну T315I, которые будут использоваться далее. Предпочтение отдавайте структурам с нужной формой белка, известным ингибитором, хорошим качеством экспериментальных данных и минимальным количеством дополнительных мутаций.

Параметр	WT	T315I
PDB ID	2HYY	3QRJ
Experimental method	X-ray diffraction	X-ray diffraction
Resolution	2.40 Å	1.82 Å
Chain	A, B, C, D (для работы — A)	A, B (для работы — A)
Ligand	STI — иматиниб (Gleevec)	919 — ребастиниб (DCC-2036)
Дополнительные мутации	нет	нет (только T315I)
Причина выбора	Человеческий ABL1 kinase domain (P00519, 228–500) без посторонних мутаций, в комплексе с эталонным ингибитором 1-го поколения; каноническая структура, на которую ссылается большинство работ по иматинибу	Человеческий ABL1 kinase domain с единственной интересующей нас заменой T315I, лучшее разрешение среди всех T315I-структур (1.82 Å), в комплексе с ингибитором, активным против T315I; сайт связывания полностью разрешён

6. Предсказанная структура в AlphaFold DB

Найдите ABL1 в AlphaFold DB и кратко ответьте на вопросы.

Есть ли AlphaFold prediction для ABL1?

Да. Запись AF-P00519-F1 (модель версии v6, AlphaFold DB / EMBL-EBI), <https://alphafold.ebi.ac.uk/entry/P00519>.

Покрывает ли модель полную последовательность?

Да, модель покрывает остатки 1–1130, то есть всю каноническую последовательность изоформы 1a целиком (одним фрагментом F1). Это отличает её от экспериментальных структур, где представлен, как правило, только фрагмент ≈229–515.

Где примерно расположен kinase domain?

В остатках 242–493 той же нумерации, что и в UniProt. В модели это компактная двухдольная структура; остальная часть белка (примерно с 520-го остатка до С-конца) — протяжённая неструктурированная область, которая в UniProt так и помечена (*Disordered*, 518–996) и предсказана с низкой уверенностью.

Можно ли найти готовую AlphaFold-модель BCR::ABL1 T315I?

Нет. AlphaFold DB содержит модели для белков из референсных протеомов в их канонической последовательности. Там нет ни модели слитного белка BCR::ABL1 (это продукт соматической хромосомной перестройки, а не запись протеома), ни модели варианта T315I. Модель мутанта пришлось бы строить самостоятельно — заменой остатка в структуре с последующей минимизацией или прогоном AlphaFold/ColabFold на изменённой последовательности.

Чем AlphaFold-модель принципиально отличается от PDB structure?

PDB-структура — результат физического эксперимента (здесь — рентгеновской дифракции): координаты выведены из электронной плотности реального кристалла, у них есть разрешение, *R*-факторы и, как правило, реально связанный лиганд. AlphaFold-модель — вычислительное предсказание по последовательности: у неё нет разрешения и нет лигандов, ионов и воды, а вместо экспериментальной погрешности — оценки достоверности pLDDT и PAE. Кроме того, предсказывается одна «усреднённая» конформация, тогда как киназа реально существует в нескольких (DFG-in/DFG-out), и именно различие конформаций определяет связывание ингибиторов. Прослеженная логическая цепочка: *sequence data* (UniProt) → *experimental structure* (PDB) → *predicted structure* (AlphaFold).

7. Известные ингибиторы BCR::ABL1

Найдите минимум 5 известных ингибиторов BCR::ABL1. Желательно включить соединения с различной активностью против T315I.

Compound	WT	T315I	Clinical/approved status	Источник
Imatinib	да	нет	одобрен (FDA 2001), 1-е поколение	ChEMBL941; PDB 2HYY; PMID 15930265
Nilotinib	да	нет	одобрен (2007), 2-е поколение	ChEMBL255863; PDB 3CS9; PMID 15930265
Dasatinib	да	нет	одобрен (2006), 2-е поколение	ChEMBL1421; PDB 2GQG; PMID 15930265
Bosutinib	да	частично (IC ₅₀ 26 нМ in vitro, клинически не показан)	одобрен (2012), 2-е поколение	ChEMBL288441; PDB 3UE4; PMID 19039322
Ponatinib	да	да	одобрен (2012), 3-е поколение; единственный АТФ-конкурентный ТКИ с клинической активностью против T315I	ChEMBL1171837; PDB 3OXZ/3IK3; PMID 20513156
Asciminib	да	да	одобрен (2021); аллостерический ингибитор (STAMP), связывается в миристоильном кармане	ChEMBL4208229; PDB 5MO4; PMID 30137981
Axitinib	умеренно	да (in vitro)	одобрен для почечноклеточного рака; для ХМЛ — кандидат на перепрофилирование	ChEMBL1289926; PDB 4WA9/4TWP; PMID 25686603

Выбор именно этих семи соединений сделан так, чтобы в наборе оказались препараты с разным поведением относительно T315I: четыре теряют активность, два сохраняют её за счёт принципиально разных механизмов (понатиниб — АТФ-конкурентный, но геометрически «обходящий» gatekeeper; асциминиб — вообще другой сайт связывания), и один — пример перепрофилирования (аксетиниб, который парадоксальным образом *активнее* против мутанта, чем против WT).

8. Экспериментальные данные активности

Найдите в BindingDB и/или ChEMBL экспериментальные значения активности для выбранных ингибиторов. Каждое отдельное измерение заносите отдельной строкой. Не усредняйте значения.

Compound	Target	Показатель	Value	Units	Assay / комментарий	Source
Imatinib	ABL1 WT	IC ₅₀	280	нМ	GST-Abl, пептид biotin-EAIYAAPFAKKK	O'Hare, Cancer Res. 2005 (PMID 15930265); ChEMBL5715937
Imatinib	ABL1 T315I	IC ₅₀	>5000	нМ	то же, мутант T315I	там же

Compound	Target	Показатель	Value	Units	Assay / комментарий	Source
Imatinib	ABL1 WT	IC ₅₀	75	нМ	нефосфорилированный ABL1 229–499, ABLtide	Chan, Cancer Cell 2011 (PMID 21481795)
Imatinib	ABL1 T315I	IC ₅₀	>10000	нМ	то же, мутант T315I	там же
Imatinib	ABL1 WT	K _d	2.2	нМ	конкурентное связывание (Ambit)	Fabian, Nat. Biotechnol. 2005 (PMID 15711537)
Imatinib	ABL1 T315I	K _d	6200	нМ	то же, мутант T315I	там же
Nilotinib	ABL1 WT	IC ₅₀	15	нМ	GST-Abl, пептидный субстрат	PMID 15930265
Nilotinib	ABL1 T315I	IC ₅₀	>5000	нМ	то же, мутант T315I	там же
Nilotinib	ABL1 WT	K _d	10	нМ	KINOMEscan, нефосф. киназный домен	Davis, Nat. Biotechnol. 2011 (PMID 22037378)
Nilotinib	ABL1 T315I	K _d	660	нМ	то же, мутант T315I	там же
Dasatinib	ABL1 WT	IC ₅₀	0.6	нМ	GST-Abl, пептидный субстрат	PMID 15930265
Dasatinib	ABL1 T315I	IC ₅₀	>10000	нМ	то же, мутант T315I	PMID 21481795
Bosutinib	ABL1 WT	IC ₅₀	0.5	нМ	ингибирование ABL1	Remsing Rix, Leukemia 2009 (PMID 19039322)
Bosutinib	ABL1 T315I	IC ₅₀	26	нМ	то же, мутант T315I	там же
Bosutinib	ABL1 WT	K _d	0.12	нМ	KINOMEscan, нефосф. киназный домен	PMID 22037378
Bosutinib	ABL1 T315I	K _d	21	нМ	то же, мутант T315I	там же
Ponatinib	ABL1 WT	IC ₅₀	0.37	нМ	ингибирование автофосфорилирования ABL	Huang, J. Med. Chem. 2010 (PMID 20513156)
Ponatinib	ABL1 T315I	IC ₅₀	2.0	нМ	то же, мутант T315I	там же
Ponatinib	ABL1 WT	IC ₅₀	8.6	нМ	TR-FRET, 1 ч	там же
Ponatinib	ABL1 T315I	IC ₅₀	40	нМ	TR-FRET, 2 ч	там же
Asciminib	ABL1 WT	IC ₅₀	0.5	нМ	ABL1 64–515, <i>E. coli</i>	Schoepfer, J. Med. Chem. 2018 (PMID 30137981)
Asciminib	ABL1 T315I	—	не найдено	—	в ChEMBL нет записи с assay_variant_mutation	поиск: ChEMBL API, molecule CHEMBL4208229
Axitinib	ABL1 WT	K _d	84	нМ	KINOMEscan, нефосф. киназный домен	PMID 22037378
Axitinib	ABL1 T315I	K _d	3.6	нМ	то же, мутант T315I	там же
Axitinib	ABL1 WT	IC ₅₀	2.6	нМ	Z'-LYTE	ChEMBL3886395
Axitinib	ABL1 T315I	IC ₅₀	0.418	нМ	Z'-LYTE	там же

Приведена репрезентативная выборка; полный набор (78 строк) — в файле BCR_ABL_dataset.csv. Значения получены запросом к ChEMBL API по парам «соединение — мишень» (CHEMBL1862 — ABL1, CHEMBL2096618 — BCR-ABL1) с разделением по полю assay_variant_mutation.

Можно ли напрямую сравнивать все найденные значения IC₅₀ / K_i / K_d? Обоснуйте ответ.

Нет, напрямую нельзя, и это хорошо видно уже по нашей выборке.

1. Это разные физические величины. K_d — термодинамическая константа диссоциации комплекса «белок–лиганд», она не зависит от концентрации АТФ. IC_{50} — операционная величина: концентрация, подавляющая активность фермента вдвое в данных условиях. Для АТФ-конкурентных ингибиторов IC_{50} зависит от концентрации АТФ в пробе (соотношение Ченга–Прусоффа $K_i = IC_{50}/(1 + [ATP]/K_m)$), поэтому две лаборатории с разным $[ATP]$ получают разные IC_{50} для одного соединения.
2. Разные форматы экспериментов. В таблице есть радиометрические анализы, TR-FRET, Z'-LYTE, ADP-Glo, конкурентное связывание на иммобилизованной киназе. Для иматиниба против WT значения в собранном наборе лежат в диапазоне от 75 до 7700 нМ — разброс в 100 раз только за счёт методики и состояния белка.
3. Разные конструкции белка. Изолированный киназный домен 229–499, полноразмерная цитоплазматическая часть, клеточный BCR-ABL1 — это разные мишени. Кроме того, важно, фосфорилирована ли киназа: для нилотиниба K_d против T315I составляет 660 нМ для нефосфорилированной формы и $> 10\,000$ нМ для фосфорилированной.
4. Цензурированные значения. Значительная часть данных для T315I — не числа, а границы (> 5000 , $> 10\,000$ нМ), означающие лишь «в исследованном диапазоне активности не обнаружено». Их нельзя использовать как точные величины.
5. Биохимия против клеток. Часть записей ChEMBL — клеточные анализы (например, BaF3), где на результат влияют проницаемость мембраны и связывание с белками среды.

Вывод: сравнивать корректно можно только внутри однородных групп — один тип показателя, один формат анализа, желательно одна публикация. Именно поэтому в разделе 10 каждое измерение сохраняется отдельной строкой с указанием типа показателя и источника, а не усредняется.

9. Химические структуры ингибиторов

Найдите выбранные ингибиторы в PubChem и сохраните их основные химические идентификаторы. SMILES обязательно сохраните для дальнейших лабораторных.

Compound	PubChem CID	Molecular Formula	MW	SMILES
Imatinib	5291	C ₂₉ H ₃₁ N ₇ O	493.6	<chem>CC1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)CN3CCN(CC3)C)NC4=NC=CC(=N4)C5=CN=CC=C5</chem>
Nilotinib	644241	C ₂₈ H ₂₂ F ₃ N ₇ O	529.5	<chem>CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)NC2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)N3C=C(N=C3)C)NC4=NC=CC(=N4)C5=CN=CC=C5</chem>
Dasatinib	3062316	C ₂₂ H ₂₆ ClN ₇ O ₂ S	488.0	<chem>CC1=C(C(=CC=C1)C1)NC(=O)C2=CN=C(S2)NC3=CC(=NC(=N3)C)N4CCN(CC4)CCO</chem>
Bosutinib	5328940	C ₂₆ H ₂₉ Cl ₂ N ₅ O ₃	530.4	<chem>CN1CCN(CC1)CCCOC2=C(C=C3C(=C2)N=CC(=C3)NC4=CC(=C(C=C4)C1)OC)C#N)OC</chem>
Ponatinib	24826799	C ₂₉ H ₂₇ F ₃ N ₆ O	532.6	<chem>CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)NC2=CC(=C(C=C2)CN3CCN(CC3)C)C(F)(F)F)C#CC4=CN=C5N4N=CC=C5</chem>
Asciminib	72165228	C ₂₀ H ₁₈ ClF ₂ N ₅ O ₃	449.8	<chem>C1CN(C[C@@H]1O)C2=C(C=C(C=N2)C(=O)NC3=CC=C(C=C3)OC(F)(F)C1)C4=CC=NN4</chem>
Axitinib	6450551	C ₂₂ H ₁₈ N ₄ OS	386.5	<chem>CNC(=O)C1=CC=CC=C1SC2=CC3=C(C=C2)C(=NN3)/C=C/C4=CC=CC=N4</chem>

Данные получены через PubChem PUG REST API (свойства MolecularFormula, MolecularWeight, SMILES, InChIKey); скрипт `scripts/fetch_pubchem.py`. Для асциминиба и аксетиниба приведён изомерный SMILES: у асциминиба есть стереоцентр (`[C@@H]`), у аксетиниба — *E*-конфигурация двойной связи (`/C=C/`).

Почему SMILES удобен для компьютерной обработки молекул?

SMILES — это строка, однозначно кодирующая молекулярный граф: атомы, связи, циклы, стереохимию. Такая запись компактна (несколько десятков байт против сотен строк координат в MOL/SDF), не зависит от конформации и легко хранится в обычной таблице, базе данных или CSV — то есть ровно в том формате, который нужен для машинного анализа. Любая химинформатическая библиотека (RDKit, Open Babel) читает SMILES напрямую и строит из него 2D/3D-структуру, считает дескрипторы, отпечатки (fingerprints), сходство молекул, применяет фильтры типа правила Липинского. Кроме того, канонический SMILES позволяет сравнивать соединения на идентичность простым сравнением строк, а также служит входом для генеративных и QSAR-моделей.

10. Формирование dataset

Создайте файл *BCR_ABL_dataset.xlsx* или *BCR_ABL_dataset.csv*. Одна строка должна соответствовать одному экспериментальному измерению.

Compound	PubChem_CID	SMILES	Target	Mutation	Activity_type	Activity_value	Units	PDB_ID	Source
Imatinib	5291	CC1=C(...	ABL1	WT	IC50	280	nM	2HYX	PMID 15930265; ChEMBL5715937
Imatinib	5291	CC1=C(...	ABL1	T315I	IC50	>5000	nM	—	PMID 15930265
Dasatinib	3062316	CC1=C(...	ABL1	WT	IC50	0.6	nM	2GQG	PMID 15930265
Ponatinib	24826799	CC1=C(...	ABL1	T315I	IC50	2	nM	3IK3	PMID 20513156

(пример первых строк; SMILES в файле приведён полностью)

Объём: 78 строк, 7 соединений, 2 формы мишени (WT и T315I), 2 типа показателей (IC_{50} , K_d), 11 первичных источников.

Принятые соглашения при заполнении:


- Target: ABL1 — анализ на изолированной киназе (ChEMBL1862), BCR-ABL1 — на слитном белке (ChEMBL2096618).
- Mutation: WT или T315I; строки с другими мутациями (E255K, Y253H, F317L и др.) в набор не включались.
- Activity_value: цензурированные значения сохранены со знаком (>10000), чтобы не выдавать границу за измеренную величину.
- PDB_ID: структура, в которой данное соединение закристаллизовано с соответствующей формой белка; если такой структуры нет, поле оставлено пустым.
- Source: первичная публикация (PMID) + идентификаторы документа и анализа ChEMBL, чтобы любое значение можно было проверить.

Имя созданного файла: BCR_ABL_dataset.csv (дублируется как BCR_ABL_dataset.xlsx; разделитель «;», кодировка UTF-8 с BOM)

11. Простая визуализация данных

Постройте одну визуализацию в Excel, Google Sheets или Python. Можно выбрать: число PDB structures WT/T315I; распределение resolution; число структур с лигандом/без лиганда; сравнение активности ингибиторов WT/T315I.

Название выбранной визуализации: Сравнение активности (IC_{50}) ингибиторов против BCR::ABL1 WT и T315I



Медианные значения IC_{50} для каждого соединения по всем измерениям из собранного набора данных; логарифмическая шкала. Знак «>» над столбцом означает, что в число измерений входят цензурированные значения, то есть истинное IC_{50} ещё выше. Построено скриптом `scripts/plot_activity.py` по файлу `BCR_ABL_dataset.csv`.

Краткая интерпретация графика:

Для ингибиторов 1-го и 2-го поколений (иматиниб, нилотиниб, дазатиниб) переход от WT к T315I увеличивает IC_{50} на 1–4 порядка: наиболее драматично для дазатиниба, у которого активность падает с $\approx 0,9$ нМ до $> 10\,000$ нМ. Бозутиниб занимает промежуточное положение: потеря активности заметная ($0,5 \rightarrow 26$ нМ), но не катастрофическая, хотя клинически он против T315I всё равно не применяется. У понатиниба разница между формами составляет менее одного порядка, а у аксетиниба активность против мутанта даже *выше*, чем против WT — именно этот эффект стал основанием рассматривать его как кандидата для перепрофилирования при T315I-резистентности. График наглядно показывает, что T315I — не «общее ухудшение связывания», а избирательный эффект, зависящий от того, опирается ли конкретная молекула на контакт с gatekeeper-остатком.

12. Target Data Passport

Параметр	BCR::ABL1 WT	BCR::ABL1 T315I
Исследуемый domain	ABL1 kinase domain, остатки 242–493 (UniProt P00519)	то же, ABL1 kinase domain 242–493
Аминокислота 315	Thr	Ile
PDB structures доступны?	да, 60 записей с киназным доменом	да, 8 записей (из них 4 — человеческий ABL1)
Выбранный PDB ID	2HYY	3QRJ
Experimental method	X-ray diffraction	X-ray diffraction
Resolution	2.40 Å	1.82 Å
Ligand	STI — иматиниб	919 — ребастиниб (DCC-2036)
Известные inhibitors	иматиниб, нилотиниб, дазатиниб, бозутиниб, понатиниб, асциминиб (все активны)	понатиниб, асциминиб; in vitro также аксетиниб; TKI 1–2 поколений неактивны
Activity data доступны?	да: IC ₅₀ и K _d , 42 измерения в собранном наборе	да, но частично цензурированы (> 5000, > 10 000 нМ), 36 измерений
Достаточно данных для дальнейшего modelling?	да	да, с оговорками (см. раздел 13)

13. Итоговый вывод

Ответьте на вопрос: достаточно ли доступных данных по BCR::ABL1 WT и T315I для дальнейшего computational drug discovery? Отдельно оцените структурные данные, известные ингибиторы, activity data и наличие машиночитаемых химических структур.

В целом — да, обе формы мишени обеспечены данными достаточно, чтобы переходить к структурному анализу, докингу и хемоинформатике.

Структурные данные. Достаточно. Для киназного домена ABL1 доступно 68 записей PDB, из них 60 соответствуют форме WT и 8 — T315I; подавляющее большинство получено рентгеновской дифракцией с разрешением 1,8–2,5 Å. Выбранные структуры 2HYY (2,40 Å) и 3QRJ (1,82 Å) — человеческий белок без посторонних мутаций, с полностью разрешённым сайтом связывания.

Данные о лигандах. Достаточно. Известно как минимум шесть одобренных препаратов и десятки исследовательских соединений; 64 из 68 структур киназного домена содержат связанную малую молекулу, то есть доступны экспериментальные позы лигандов — это позволит валидировать протокол докинга редокингом.

Activity data. Достаточно, но требует осторожности. Собрано 78 измерений IC₅₀/K_d из 11 первичных источников. Значения разнородны по методике, и для T315I заметная часть данных цензурирована.

Chemical data. Достаточно. Для всех соединений получены PubChem CID, брутто-формула, молекулярная масса и SMILES (с учётом стереохимии), то есть данные полностью машиночитаемы.

Обнаруженные ограничения и пробелы в данных:

- Асимметрия по формам мишени.** Структур T315I в 7,5 раза меньше, чем WT (8 против 60), а человеческих — всего 4. Для мутанта выбор структуры практически безальтернативен.
- Нет структуры полноразмерного BCR::ABL1.** Все экспериментальные данные относятся к изолированному киназному домену ABL1; вклад BCR-части структурно не охарактеризован.
- Цензурированные значения активности.** Для иматиниба, нилотиниба и дазатиниба против

T315I большинство величин — это границы (> 5000 , $> 10\,000$ нМ). Для регрессионных моделей (QSAR) такие данные напрямую непригодны.

4. **Неоднородность анализов.** Разброс IC_{50} одного соединения между публикациями достигает двух порядков (иматиниб против WT: 75–7700 нМ).
5. **Пробелы в ChEMBL.** Для асциминиба не нашлось записи активности с явной пометкой T315I, хотя из литературы известно, что он сохраняет активность против этого мутанта. Автоматическая выгрузка из базы не заменяет проверку по первичным публикациям.
6. **Нет AlphaFold-модели мутанта и слитного белка.** Модель T315I при необходимости придётся строить самостоятельно.
7. **Разные системы нумерации остатков** (изоформы 1a/1b, мышинный ортолог) — источник ошибок при сопоставлении структур и литературных данных.

Итог: накопленных данных достаточно для следующих этапов курса. Для дальнейшей работы фиксируются структуры **2HYU (WT)** и **3QRJ (T315I)** и набор данных `BCR_ABL_dataset.csv` (78 измерений, 7 соединений).

Подпись студента: _____

Дата: _____