

Laboratorio di Bioinformatica - Presentazione NAR

Relazione associata

Chiara Solito e Aurelia Timis

Corso di Laurea in Bioinformatica
Università degli studi di Verona
A.A. 2021/22

La presente è una relazione riguardante la presentazione nell'ambito dei database trattati nell'issue di. Per il corso di **Laboratorio di Bioinformatica** del CdS in Bioinformatica (Università degli Studi di Verona). Per la stesura di questa dispensa si è fatta fede al materiale didattico fornito direttamente dal professore nell'Anno Accademico 2021/2022. Eventuali variazioni al programma successive al suddetto anno non saranno quindi incluse.

Insieme a questo documento in formato PDF viene fornito anche il codice \LaTeX con cui è stato generato.

Contents

1	Introduzione	2
1.1	Lessico e nozioni di base	2
2	Open Targets Genetics	2
2.1	Cos'è Open Target Genetics?	2
2.2	L'Obiettivo	3
2.3	Il Metodo	3
3	Come funziona?	4
4	Pipeline	4
4.1	Assigning Variants to Genes (V2G)	4
4.2	Assigning Variants to Disease (V2D)	4
4.3	Prioritising causal genes at GWAS loci (L2G)	5
5	Un esempio di utilizzo	5
5.1	Study	5
5.1.1	Compare Studies	6
5.2	Variant	8
5.3	Gene	10
5.3.1	Gene Priorisation	11
6	Possibili domande	12

1 Introduzione

1.1 Lessico e nozioni di base

Varianti Causali Nell'ambito degli studi di associazione, le varianti genetiche responsabili del segnale di associazione in un locus sono indicate nella letteratura come VARIANTI CAUSALI. Esse hanno un effetto biologico sul fenotipo.

Trait-Associated Loci *Loci tratto associati*

Un locus a cui è associato un particolare tratto fenotipico.

QTL *Quantitative trait loci*

Un locus dei caratteri quantitativi (ovvero tratti che possono essere studiati e indagati mediante parametri numerici) è un locus che si correla con la variazione di un tratto quantitativo nel fenotipo di una popolazione di organismi.

GWAS *Genome Wide Association Study*

Un approccio della ricerca genetica per associare, a specifiche variazioni genetiche, particolari malattie.

Lead Variant La variante col miglior p-value per combinazioni gene/fenotipo significative.

P-Value La probabilità, per un'ipotesi supposta vera (ipotesi nulla), di ottenere risultati ugualmente o meno compatibili, di quelli osservati durante i test, con la suddetta ipotesi.

Tag Variants Varianti rappresentative in una regione del genoma con un alto linkage disequilibrium.

Linkage Disequilibrium

Fine Mapping Dal momento che i risultati dei GWAS (che otteniamo) non sempre ci danno una sintesi completa delle statistiche, e avendo a disposizione solo le Variant Lead, dobbiamo applicare alle Variants Tag, in modo da avere un insieme più completo. Il fine mapping è uno dei metodi: è una tecnica dei GWAS per identificare le varianti genetiche che possono influenzare causalmente il tratto esaminato, in particolare cerca di determinare la variante genetica responsabile di ????

Single Evidence Score

Proxy Un proxy è una misura indiretta del risultato desiderato che è esso stesso fortemente correlato a quel risultato. È comunemente usato quando le misure dirette del risultato non sono osservabili e/o non disponibili.

2 Open Targets Genetics

2.1 Cos'è Open Target Genetics?

Open Target Genetics è l'ultima *release* della piattaforma Open Targets: una *partnership* tra pubblico e privato che utilizza i dati genetici e genomici umani per l'identificazione sistematica e la prioritizzazione dei bersagli farmacologici.

Il portale offre tre caratteristiche al fine di mettere in luce le associazioni tra **geni, varianti e tratti**:

- Sfogliare e classificare le associazioni di geni e varianti identificate dalla pipeline di punteggio **Locus-to-Gene (L2G)**
- Scoprire set credibili per associazioni di varianti e tratti basati sulla pipeline di analisi di *fine mapping*.
- Esplorare e confrontare gli studi della UK BioBank, di FinnGen e del catalogo GWAS utilizzando lo strumento di confronto multi-tratto

La novità di OTG

La maggior parte delle varianti, individuate attraverso i GWAS, si trova nella parte non codificante del genoma: ciò suggerisce che tali varianti vadano ad intaccare tratti complessi, alterando l'espressione dei geni vicini, attraverso meccanismi di regolazione, e influenzando in maniera significativa le malattie studiate dai GWAS. Identificare un gene causale è difficile poiché bisogna integrare dati dai GWAS con dati di trascrittomica, proteomica ed epigenomica prendendo in considerazione un'ampia tipologia cellulare o tissutale. In assenza di un portale già esistente che consenta di rispondere sistematicamente a un'ampia gamma di domande biologiche, è stato costruito OTG sulla base della tecnologia più recente per consentire di aggiungere e sfogliare facilmente i dati.

2.2 L'Obiettivo

Identificare bersagli farmacologici per lo sviluppo di medicinali sicuri ed efficaci è una priorità per l'industria farmaceutica; lo sviluppo di farmaci porta spesso a perdite di tempo e risultati fallimentari. I **farmaci con targets** che hanno evidenziato prove genetiche per associazioni a malattie, hanno dimostrato di essere vincenti nello sviluppo clinico. Ecco che, una sistematica valutazione di associazioni genetiche a particolari malattie o tratti può aiutare nella scoperta di targets (genes) per lo sviluppo di farmaci:

l'obiettivo di Open Targets Genetics è quindi di aggregare gli evidenti collegamenti tra VARIANTI e MALATTIE, e VARIANTI e GENI, così che, per una specifica malattia, potenziali bersagli farmacologici possano essere prioritizzati basandosi su informazione genetica robusta, traducendo i segnali da GWAS e Biobank data in geni target, attraverso centinaia di tratti genome-wide.

Obiettivo di Open Targets Genetics

aggregare le prove che collegano

1. Varianti alla malattia
2. Varianti ai geni
3. Geni alle malattie

in modo che per una specifica malattia i potenziali bersagli farmacologici (drug targets) possano essere prioritizzati sulla base di solide informazioni genetiche.

2.3 Il Metodo

Aggregazione e fusione di:

- associazioni genetiche curate da letteratura e BioBank (UK)
- dati di genomica funzionale (sempre da UK BioBank)
 - conformazione della cromatina
 - interazione della cromatina
- loci dei tratti quantitativi
 - eQTL
 - pQTL

Viene applicata la “fine-mapping” (mappatura) statistica su migliaia di loci associati ai tratti per risolvere i segnali di associazione e collegare ogni variante ai suoi geni bersaglio, prossimali e distali, usando uno score “single evidence”.

3 Come funziona?

S = Study, Disease Association Information

Informazioni associate alla malattia, sono ottenute dai GWAS (Genome Wide Association Study) che collega lo “status” della malattia alla comune variazione genetica.

V_L = Lead Variant

Dato come sono riportati i GWAS è spesso l'unica variante che si conosce per ogni locus associato. Non può per essere assunto che la lead variant causi l'associazione.

V_T = Tag Variants

Si espande la lead variant ad includere tutte le tag variants, che crea un set più completo di potenziali varianti causali.

Metodi:

1. fine mapping / credible set analysis
2. linkage disequilibrium

G = Genes

Dato il set di tag variants, si prosegue assegnandole ai geni, usando la V2G pipeline.

L'informazione sulle malattie e sui tratti associati (**S = study**) è ottenuta dai GWA Study. In base a come i risultati ottenuti dai GWAS sono riportati, spesso conosciamo solo la **VL = Variant lead**, a ciascun locus associato. In particolare, mentre alcuni studi offrivano una completa sintesi statistica, altri ne riportavano solo le variant lead. Tuttavia, non si può assumere che la VL stia causando l'associazione → si espande la VL per includere tutte le **VT = Variant Tag**, che costituiscono un insieme più completo di varianti potenzialmente causali. L'espansione viene fatta in due modi nei due modi sopra riportati. Questa fase prevede l'utilizzo della pipeline **V2D**.

4 Pipeline

Open Targets Genetics utilizza tre pipeline diverse.

4.1 Assigning Variants to Genes (V2G)

La pipeline V2G collega Varianti e geni, combinando dati provenienti da 4 fonti.

- Esperimenti sui loci dei tratti quantitativi del fenotipo molecolare (eQTL pQTL)
- Esperimenti di interazioni con cromatina
- In silico predizioni funzionali
- Distanza dal sito di inizio della trascrizione canonica

Per ciascuna variante, la pipeline prima assegna una prova funzionale della coppia V-G su tutte le fonti, poi applica un algoritmo di punteggio per produrre punteggi V2G aggregati.

4.2 Assigning Variants to Disease (V2D)

Open Targets Genetics prende in considerazione le associazioni variante-fenotipo riportate nel catalogo GWAS con $p \leq 1e-5$. (Attualmente i dati sono derivanti da campioni di origine prevalentemente europea).

4.3 Prioritising causal genes at GWAS loci (L2G)

Ovvero la locus to gene, per cui si ha la prioritizzazione dei geni causali ai loci GWAS. Nonostante possa sembrare simile, è diversa da V2G, infatti usa un modello Machine Learning (si tratta di un addestramento di classificatore).

Al fine di consentire un apprendimento automatico supervisionato dei geni causali sono stati curati manualmente una serie di geni, utilizzando una repository di geni gold standard aperta al contributo della comunità (di questa repository si ha un'alta confidenza della funzionalità del gene implicato).

/i GSP sono i geni gold standard positivi, mentre gli altri sono definiti come GSN, ovvero geni gold negativi/ Si basa su dati di mappatura fine e collocalizzazione:

- COLOCALISATION ANALYSIS: se due tratti condividono una variante causale (sono colocalizzati) ciò aumenta l'evidenza che condividano anche un meccanismo causale.
- Approccio di gene-prioritisation malattia-specifico
- Un modello L2G produce un punteggio, compreso tra 0 e 1, che riflette la frazione approssimativa di geni GSP tra tutti i geni vicini a una determinata soglia: i geni con un punteggio L2G di 0,5 hanno una probabilità del 50% di essere il gene causale nel locus. Tenere presente che il modello L2G è addestrato per identificare i geni GSP e quindi funzionerà bene per i loci molto simili al nostro set di geni GSP, quindi non bisogna limitarsi a tale punteggio che potrebbe essere sbilanciato per certi versi, ma prendere in considerazione anche interazioni QTL e cromatina.

5 Un esempio di utilizzo

5.1 Study



Ricerca per Studio

Iniziamo la ricerca a partire dallo studio per:

- Visualizzare i loci associati a un tratto nello studio selezionato
- Identificare i geni prioritari implicati funzionalmente da ciascun locus
- Visualizzare il 95% di set credibili (se disponibili) e proxy in ogni locus

La prima cosa che visualizziamo sono le informazioni generali relative allo studio (il **summary**), come l'ID di PUBMED, il numero di casi studiati, la grandezza dello studio ecc.

Hemoglobin concentration

Chen MH (2020) *Cell*

Compare Studies

Study summary

External references


GWAS Catalog: [GCST90002310](#)

PubMed ID: [32888493](#)

Study size

N Study	563,946
N Replication	NA
N Cases	NA

Subito dopo troviamo il primo plot: i loci associati indipendentemente sono riportati in un Manhattan plot semplificato. Sull'asse delle x vengono riportati i cromosomi, sull'asse delle y invece il p-value (in logaritmo).



I dettagli completi di ogni locus sono riassunti nella tabella sotto il Manhattan plot. Il gene con il punteggio più alto è definito come il gene con il maggior peso di prove funzionali tra tutte le fonti e i tipi di cellule che lo collegano al locus specificato direttamente o tramite una Variant Tag.


Association Information								Prioritised Genes results from our gene prioritisation pipelines			
Lead Variant	P-value	Beta	Odds Ratio	95% Confidence Interval	Credible Set Size	LD Set Size	L2G	Closest Gene	Colocalisation	View	
6_26092913_G_A	2.2e-308	0.19		(0.18, 0.19)	2	13	HFE	HFE		Gene Prioritisation	
10_69334748_T_C	2.2e-308	0.14		(0.14, 0.15)	7	9	HK1	HK1	HK1	Gene Prioritisation	
22_37066896_A_G	2.2e-308	0.10		(0.097, 0.10)	5	7	TMPRSS6	KCTD17		Gene Prioritisation	
2_46133768_G_C	2.5e-303	-0.072		(-0.076, -0.069)	1	15		EPAS1		Gene Prioritisation	
12_111494996_C_T	3.7e-273	-0.065		(-0.069, -0.061)	3	19	SH2B3	SH2B3	HVCN1	Gene Prioritisation	
6_25978174_T_C	4.5e-238	0.091		(0.086, 0.097)	2	53		TRIM38		Gene Prioritisation	
7_151716108_T_C	5.1e-223	-0.066		(-0.070, -0.062)	3	31	PRKAG2	PRKAG2		Gene Prioritisation	
9_133274295_A_T	8.9e-221	-0.079		(-0.084, -0.074)	1	16	ABO	ABO		Gene Prioritisation	
2_46128709_C_A	2.4e-209	-0.10		(-0.11, -0.098)	2	8		EPAS1		Gene Prioritisation	
6_26500335_G_T	3.8e-171	0.074		(0.069, 0.079)		5		BTN1A1		Gene Prioritisation	

1-10 of 888 |< < > >|

5.1.1 Compare Studies

Dalla pagina Studio, è possibile confrontare rapidamente più studi per identificare segnali sovrapposti: **Compare Overlapping Studies**.

Il primo studio verrà caricato nella vista di confronto come root, con i loci riportati a significatività dell'intero genoma, plottati in base alla posizione. Solo gli studi con almeno un locus sovrapposto verranno visualizzati come opzione di confronto. Gli studi nel menù a tendina sono ordinati in maniera decrescente in base al numero di sovrapposizioni con la radice caricata.



Quando viene caricato più di uno studio (come in questo caso), loci intersecanti di tutti gli studi caricati vengono visualizzati in rosso sia sulla barra di intersezione nella parte superiore della vista, sia all'interno di ogni studio. I loci all'interno di ogni studio che si sovrappongono allo studio radice vengono visualizzati in nero. I loci non sovrapposti sono tracciati in grigio.

Sotto la visualizzazione del grafico, ogni locus sovrapposto in tutti gli studi caricati è riassunto in una tabella.

Download table as [JSON](#) [CSV](#) [TSV](#)

Loci in this table are shared across all selected studies.

Variant	rsID	Cytoband	Top Ranked Genes
1_3402205_C_G	rs10909942	1p36	ACTRT2 PRDM16 ARHGEF16 MEGF6 TPRGIL WRAP73 TP73 PLCH2 SMIM1 CCDC27 LRRC47 DFFB CEP104
1_3774964_A_G	rs1175550	1p36	CEP104 SMIM1 C1orf174 DFFB LRRC47 CCDC27 MEGF6 WRAP73 TP73 TPRGIL ARHGEF16 NPHP4 KCNB2
1_10297748_G_C	rs112682076	1p36	LZIC KIF1B NMNAT1 CTNNBIP1 RBP7 CLSTN1 PGD UBE4B CENPS-CORT CORT CENPS DFFA PEX14 PIK3CD TMEM201 SLC25A33
1_10423110_G_A	rs12119893	1p36	KIF1B PGD CENPS DFFA CENPS-CORT PEX14 CASZ1 UBE4B CORT RBP7 NMNAT1 LZIC CTNNBIP1 CLSTN1
1_29159616_C_T	rs113292219	1p35	EPB41 SRSF4 PTPRU MECR TMEM200B SDC3 MATN1 OPRD1 YTHDF2 LAPTM5 GMEB1 TAF12 RAB42 TRNAU1AP RCC1 SERINC2
1_43295980_C_T	rs4660253	1p34	TIE1 HYI MED8 SZT2 CDC20 MPL ELOVL1 C1orf210 EBNA1BP2 CFAP57 CCDC24 TMEM125 ZNF691 PTPRF SVBP PPCS ST3GAL3 ZMYND12 YBX1 FAM183A ATP6V0B PPIH ERMAP SLC2A1 KDM4A P3H1 B4GALT2 IPO13 DPH2 ARTN
1_45460823_C_G	rs2055145	1p34	MUTYH TESK2 TIE1 MMACHC IPP PRDX1 MED8 HYI CCDC163 UROD MPL NASP ELOVL1 AKR1A1 ZSWIM5 TOE1 GPBP1L1 CDC20 CCDC17 HECTD3 MAST2 HPDL NSUN4 FAAH EIF2B3 BTBD19 SZT2 DYNLT4 PLK3 BEST4 PTPRF PTCH2 RPS8 PIK3R3 ARMH1 TMEM69 KIF2C TMEM53 C1orf210 TMEM125 EBNA1BP2 KDM4A ST3GAL3 CFAP57 FAM183A TSPAN1 RNF220 ARTN POMGNT1
1_46031828_T_A	rs9429088	1p34	MAST2 PIK3R3 NASP TESK2 GPBP1L1 AKR1A1 IPP MUTYH CCDC163 CCDC17 LURAP1 TMEM69 UROD NSUN4 PRDX1 POMGNT1 TSPAN1 FAAH P3R3URF TOE1 RPS8 MMACHC MOB3C RAD54L P3R3URF-PIK3R3 BTBD19 DYNLT4 PLK3 HECTD3 MKNK1 EIF2B3 UQCRH KIF2C LRRC41 HPDL DMAP1 ZSWIM5 PTCH2 DMBX1 TMEM275 KNCN CMPK1 BEST4
1_147815880_A_T	rs1086605	1q21	GJA5 BCL9 GPR89B ACP6 GJA8 PDE4DIP NBPFF1 PRKAB2
1_161545536_C_T	rs55971447	1q23	FCGR2A FCGR2B FCGR3B FCGR3A HSPA6 ATF6 FCRLB DUSP12 FCRLA MPZ FCER1G TOMM40L NIT1 SDHC CFAP126 ARHGAP30 USF1 PPOX APOA2 PCP4L1 NR1I3 NDUFS2 ADAMTS4 B4GALT3 DEDD USP21 OLFML2B PFDN2 UFC1 KLHDC9 NECTIN4 TSTD1 NOS1AP FT1R

1-10 of 181 | < > >>

I geni con il punteggio più alto visualizzati sono i geni principali implicati direttamente dalla Lead Variant mostrata e non tengono conto dei geni assegnati a nessuna Tag Variant della Lead. Potrebbe quindi esserci un elemento di mancata corrispondenza tra il gene mostrato qui e il gene funzionale previsto nel locus.

5.2 Variant



Ricerca per Variante

Iniziamo la ricerca a partire dalla variante per:

- Identificare un elenco classificato di geni funzionalmente implicati dalla variante
- Visualizzare e analizzare i dati funzionali mediante i quali i geni sono assegnati a questa variante
- Visualizzare i risultati PheWAS per la variante nella biobanca britannica
- Visualizzare la struttura del collegamento intorno alla variante

Anche in questo caso per prima cosa vedremo le informazioni generali riguardo alla variante, che essa sia Lead o Tag le informazioni variano molto poco.

1_3402205_C_G

Locus Plot

Variant summary

Location

GRCh38: 1:3,402,205

GRCh37: 1:3,318,769

Reference allele: C

Alternative allele (effect allele): G

Population allele frequencies (gnomAD)

African/African-American	0.377
Latino/Admixed American	0.660
Ashkenazi Jewish	0.659
East Asian	0.627
Finnish	0.664
Non-Finnish European	0.643
Non-Finnish European Estonian	0.637
Non-Finnish European North-Western European	0.646
Non-Finnish European Southern European	0.642
Other (population not assigned)	0.644

External references

Ensembl: [rs10909942](#)

Neighbourhood

Nearest gene (52,460 bp to canonical TSS): [ARHGEF16](#)

Nearest coding gene (52,460 bp to canonical TSS): [ARHGEF16](#)

Variant Effect Predictor (VEP)

Most severe consequence: intron variant

Combined Annotation Dependent Depletion (CADD)

raw: -0.508 scaled: 0.0820

Subito sotto troviamo la tabella **Assigned Genes**, che riassume l'entità delle prove con cui la variante interrogata implica vari geni.

Assigned genes

Which genes are functionally implicated by this variant?

Summary

Distance (Canonical TSS)

pQTL (Sun, 2018)

eQTL

Enhancer-TSS corr (FANTOM5)

PCHI-C (Javierre, 2016)

DHS-

>

Download table as

JSON

CSV

TSV

Evidence summary linking this variant to different genes.

Gene	Overall V2G ↓	Distance (Canonical TSS)	pQTL (Sun, 2018)	eQTL	Enhancer-TSS corr (FANTOM5)	PCHI-C (Javierre, 2016)	DHS-promoter corr (Thurman, 2012)	PCHI-C (Jung, 2019)	VEP (Ensembl)
PRDM16	●	333,037				●			intron_variant
ACTRT2	●	380,738				●			
ARHGEF16	●	52,460							
TPRG1L	●	222,810							
MEGF6	●	209,303							
WRAP73	●	250,556							
TP73	●	250,311							
PLCH2	●					●			
CCDC27	●	344,255							
SMIM1	●	370,544							


1-10 of 14

<

>

>>

La visualizzazione predefinita riassume le prove combinate per ciascun gene per ciascuna origine dati funzionale, comprese tra i tipi di cellule all'interno dell'origine dati. Il G2V complessivo è una rappresentazione di questa ponderazione combinata delle prove per ciascun gene. La presenza di un **pallino** nella tabella indica che vi sono prove dalla data fonte di dati che collegano il gene alla variante interrogata, in almeno un tipo di cellula. Per visualizzare le prove specifiche del tessuto all'interno di un'origine dati, selezionare l'origine dati dalle schede visibili nella parte superiore del widget della tabella. Verrà aperta una vista equivalente segregata per tipo di cella anziché per origine dati, come sopra per le prove eQTL. Se l'evidenza dell'origine dati in esame può essere interpretata in modo direzionale, i proiettili verranno colorati in base alla direzione dell'effetto. Subito sotto troviamo la sezione che presenta gli studi che collegano, con la variante in esame, determinati **PheWAS**.



I risultati di PheWAS per la variante selezionata in tutti i fenotipi della BioBank del Regno Unito, vengono visualizzati come un grafico PheWAS segregato per raggruppamento di fenotipi di alto livello e dettagliato in una tabella sottostante.

Download table as									
Study ID	Trait	Trait Category	P-value	Beta	Odds Ratio	PMID	Author (Year)	N Cases	N Overall
	None	None							
NEALE2_30090_raw	Platelet crit	measurement	3.3e-18	0.00131		UK Biobank	UKB Neale v2 (2018)		350,471
GCST004607	Plateletcrit	measurement	1.4e-13	0.0367		PMID:27863252	Astle WJ (2016)		164,339
NEALE2_30100_raw	Mean platelet (thrombocyte) volume	measurement	3.1e-13	0.0255		UK Biobank	UKB Neale v2 (2018)		350,470
NEALE2_3143_raw	Ankle spacing width	Uncategorised	4.2e-12	0.115		UK Biobank	UKB Neale v2 (2018)		206,589
GCST004599	Mean platelet volume	measurement	6.6e-11	0.0320		PMID:27863252	Astle WJ (2016)		164,454
NEALE2_30040_raw	Mean corpuscular volume	measurement	0.0000012	-0.0685		UK Biobank	UKB Neale v2 (2018)		350,473
NEALE2_30050_raw	Mean corpuscular haemoglobin	measurement	0.000015	-0.0255		UK Biobank	UKB Neale v2 (2018)		350,472
NEALE2_30080_raw	Platelet count	measurement	0.000027	0.790		UK Biobank	UKB Neale v2 (2018)		350,474
NEALE2_30260_raw	Mean reticulocyte volume	Uncategorised	0.000033	-0.105		UK Biobank	UKB Neale v2 (2018)		344,728
NEALE2_30270_raw	Mean spheroid cell volume	Uncategorised	0.000049	-0.0695		UK Biobank	UKB Neale v2 (2018)		344,729
1-10 of 46 < > >>									

La direzione della freccia corrisponde alla direzione dell'effetto beta e i punti sono colorati in base al loro fenotipo ampio. Infine, vengono visualizzate due tabelle dedicate all'architettura genetica del locus a cui appartiene la variante di interesse - 'GWAS Lead Variants' e 'Tag Variants'. Il primo mostra tutte le varianti di lead GWAS (dal catalogo GWAS o dalla biobanca britannica) a cui la variante interrogata è stata assegnata come proxy (tag) in base a LD o fine-mapping. Se la variante interrogata è essa stessa una variante lead GWAS, la seconda tabella mostra tutte le varianti che le sono state assegnate come proxy. Questa tabella non verrà visualizzata se la variante interrogata non è una variante lead.

5.3 Gene



Ricerca per Gene

Iniziamo la ricerca a partire dal gene per:

- Identificare i loci che implicano funzionalmente un gene
- Collegarti a informazioni dettagliate sul gene e sui farmaci che lo prendono di mira
- Identificare in quali tratti questo gene può svolgere un ruolo, in base alle varianti a cui è assegnato

La ricerca porta alle principali informazioni sul gene e collega a vari link sulla piattaforma Open Targets Platform:

PCK1

20:57,561,080-57,568,121

Information about PCK1 from the Open Targets Platform

Target profile overview

Is there known drug data?

Is there mouse phenotype data?

Is there pathway data?

Is there expression data?

Other links

[Ensembl](#)
[GeneCards](#)
[GTEx](#)

[HGNC](#)
[UniProt](#)
[gnomAD](#)

accanto ci sono altri link. E sopra il link per collegarsi al Locus Plot, che vedremo in seguito. Subito sotto troviamo la sezione **Associated studies**, tratta dalla *locus-to-gene pipeline*.

Study Information			Association Information						
Study ID	Trait	Publication	N Initial	Lead Variant	P-value	Beta	Odds Ratio	95% Confidence Interval	L2G pipeline score
	None	None							
GCST90002310	Hemoglobin concentration	Chen MH (2020)	563,946	20_57543981_A_G	1.2e-35	0.023		(0.020, 0.027)	0.84
GCST90002308	Hematocrit	Chen MH (2020)	737,823	20_57561898_G_C	2.0e-28				0.84
GCST90002403	Red blood cell count	Vuckovic D (2020)	408,112	20_57562742_G_A	4.0e-17	0.018		(0.014, 0.022)	0.83
GCST90002384	Hemoglobin	Vuckovic D (2020)	408,112	20_57562778_A_G	2.7e-27	0.023		(0.019, 0.027)	0.83
GCST90002363	Red blood cell count	Chen MH (2020)	545,203	20_57560878_C_G	2.4e-19	0.017		(0.013, 0.020)	0.83
GCST90002383	Hematocrit	Vuckovic D (2020)	408,112	20_57560013_C_T	4.4e-24	0.022		(0.017, 0.026)	0.83
GCST90002304	Hematocrit	Chen MH (2020)	562,259	20_57561898_G_C	1.6e-30	0.021		(0.018, 0.025)	0.83
GCST008734	Waist-hip ratio	Lotta LA (2018)	663,598	20_57560143_C_T	5.0e-8				0.83

La tabella associa gli studi e i fenotipi, da UKB, che sono associati con il gene di cui stiamo visualizzando la pagina. Un gene è connesso a un tratto nei casi in cui il gene è stato funzionalmente assegnato a un locus associato a questo tratto, tramite la Variant Lead o tramite una proxy Variant Tag assegnato. Accanto ci riporta al link **Gene Priorisation**, che vedremo in seguito.

Subito dopo abbiamo altri Studi associati, ma questa volta tramite la **Colocalisation analysis**, che risponde alla domanda: quali studi hanno evidenze di colocalizzazione con qtl molecolari per il gene in questione?

Associated studies: Colocalisation analysis
Which studies have evidence of colocalisation with molecular QTLs for PCK1?

Download table as [JSON](#) [CSV](#) [TSV](#)

Study	Trait reported	Author	Lead variant	Phenotype	Tissue	Source	H3	H4	log2(H4/H3) ↓	View
	None									
NEALE2_5098_raw	6mm weak meridian (right)	UKB Neale v2	20_57245990_G_T	ENSG00000124253	small intestine	GTEX-eQTL	0.20	0.061	-1.7	Gene Prioritisation
NEALE2_5134_raw	6mm strong meridian (left)	UKB Neale v2	20_57245990_G_T	ENSG00000124253	small intestine	GTEX-eQTL	0.20	0.061	-1.7	Gene Prioritisation
NEALE2_5133_raw	6mm strong meridian (right)	UKB Neale v2	20_57245990_G_T	ENSG00000124253	small intestine	GTEX-eQTL	0.20	0.060	-1.7	Gene Prioritisation
NEALE2_5099_raw	3mm weak meridian (right)	UKB Neale v2	20_57245990_G_T	ENSG00000124253	small intestine	GTEX-eQTL	0.20	0.060	-1.7	Gene Prioritisation
NEALE2_5132_raw	3mm strong meridian (right)	UKB Neale v2	20_57245990_G_T	ENSG00000124253	small intestine	GTEX-eQTL	0.20	0.060	-1.7	Gene Prioritisation
NEALE2_5135_raw	3mm strong meridian (left)	UKB Neale v2	20_57245990_G_T	ENSG00000124253	small intestine	GTEX-eQTL	0.20	0.060	-1.7	Gene Prioritisation
NEALE2_5097_raw	6mm weak meridian (left)	UKB Neale v2	20_57245990_G_T	ENSG00000124253	small intestine	GTEX-eQTL	0.20	0.059	-1.8	Gene Prioritisation
NEALE2_5096_raw	3mm weak meridian (left)	UKB Neale v2	20_57245990_G_T	ENSG00000124253	small intestine	GTEX-eQTL	0.20	0.059	-1.8	Gene Prioritisation
GCST006661	Male-pattern baldness	Hagenaars SP	20_56815683_C_CA	ENSG00000124253	liver	GTEX-eQTL	0.23	0.058	-2.0	Gene Prioritisation
GCST90002406	Reticulocyte fraction of red cells	Vuckovic D	20_57405659_T_C	ENSG00000124253	testis	GTEX-eQTL	0.27	0.066	-2.0	Gene Prioritisation

1-10 of 49 |< < > >|

5.3.1 Gene Priorisation

Pagina dello Study-Locus a cui si può accedere da Gene e da Studio. Qui si investiga una specifica Lead Variant e un GWAS study.

Dapprima abbiamo la informazioni di base: ad esempio tramite l'odds ratio capiamo se l'allele alternativo è associato ad un alto o basso rischio della malattia su cui si concentra lo studio. Tutte le dimensioni degli effetti sono in relazione all'allele alternativo, che è l'allele riportato ultimo nell>ID della variante.

High cholesterol | non-cancer illness code, self-reported [Locus Plot](#)

UKB Neale v2 (2018) [NEALE2_20002_1473](#)

Locus around [1_55055640_G_T](#) (rs472495)

Association summary

P-value: 10e-15
Odds ratio: 1.1
Odds ratio Confidence Interval: (1.0, 1.1)

Subito sotto una tabella riporta i geni prioritizzati tramite la **Locus To Gene Pipeline**.

Gene prioritisation using locus-to-gene pipeline

Which genes were prioritised by L2G pipeline at this locus?

Download table as

JSON

CSV

TSV

Partial L2G scores							
Gene	Overall L2G score [⬇]	Variant Pathogenicity [⬆]	Distance [⬆]	QTL Coloc [⬆]	Chromatin Interaction [⬆]	Distance to locus (bp)	Evidence of colocalisation
PCSK9	0.85	0.70	0.82	0.45	0.26	16,193	No
BSND	0.030	0.062	0.032	0.017	0.019	56,707	No
USP24	0.028	0.066	0.046	0.038	0.12	159,724	No
TMEM61	0.025	0.062	0.026	0.017	0.019	75,012	No
DHCR24	0.023	0.062	0.025	0.021	0.021	168,445	No
LEXM	0.0094	0.062	0.013	0.017	0.019	249,577	No
ACOT11	0.0082	0.067	0.012	0.031	0.15		No
MROH7	0.0078	0.068	0.012	0.043	0.30	413,886	No
TTC22	0.0075	0.062	0.011	0.017	0.019	254,317	No
TTC4	0.0070	0.062	0.011	0.019	0.020	339,779	No

1-10 of 13 |< < > >|

Questi sono ordinati tramite lo score assegnato appunto dalla pipeline, riportando anche tutte le features usate per fare il training del modello che ha effettuato la prioritizzazione (quindi distanza, colocalizzazione dei QTL, ecc.). Alla luce dei dati troviamo anche la risposta alla domanda: **“L’assegnamento del gene è supportato da evidenze di colocalizzazione?”** Subito dopo visualizziamo sempre informazioni riguardanti la prioritizzazione dei geni, ma ottenute tramite la Colocalisation Analysis Pipeline: la colocalizzazione dei geni principali, ottenuti mediante la L2G pipeline, in diversi tessuti è mostrata in una heatmap e in una tabella.

Gene prioritisation using colocalisation analysis

Which molecular traits colocalise with **High cholesterol | non-cancer illness code, self-reported (UKB Neale v2, 2018)** at this locus?

Download table as

JSON

CSV

TSV

Heatmap				Table
Gene [⬆]	Molecular trait	Source	brain (substantia nigra)	
PCSK9	ENSG00000169174	Braineac2	●	

1-1 of 1 |< < > >|

Nella tabella la QTL beta è per la variante che stiamo visualizzando, più che per tutte quelle riportate. Questo permette di comparare la direzione degli effetti nei diversi tessuti o geni nei tessuti, così da poter rimanere consistenti attraverso tutti gli studi.

6 Possibili domande

Se più di un gene viene valutato allo stesso modo in questo locus, vengono visualizzati tutti i geni con il punteggio massimo. Se lo studio selezionato dispone di statistiche complete disponibili, la dimensione del set credibile per ciascun locus viene visualizzata accanto al numero di Variant Tag.