

# Automatic System Verification

## Exercices

Cominato Enrico 137396  
Department of Computer Science  
Univeristy of Udine


October 13, 2020

### 1 Exercices on the automata's notes

#### Esercizio 2.3

Sia  $\mathcal{A}$  l'automa dell'Esempio 2.2. Si consideri l'automa  $\mathcal{A}'$  ottenuto da  $\mathcal{A}$  rimuovendo lo stato  $q_0$ , e le transizioni in esso entranti e da esso uscenti, e facendo diventare  $q_1$  il nuovo stato iniziale. Si stabilisca se  $\mathcal{A}$  e  $\mathcal{A}'$  riconoscono o meno lo stesso linguaggio

Riporto di seguito i due grafi.



I due linguaggi non sono uguali. Per esempio la  $\omega$  – parola *babcabca...* appartiene al primo dei due automi, ma non al secondo (da  $q_1$  andiamo in  $q_2$  ma da lì possiamo leggere solo una *b* oppure una *c*)

#### Esercizio 2.4


Si costruisca l'automa  $\mathcal{A}'$  che riconosce la variante finita (linguaggio di parole finite) dell'Esempio 2.2

Il linguaggio richiesto è il seguente:

*L'insieme delle parole finite su  $A = \{a, b, c\}$  tali che tra ogni coppia di occorrenze consecutive di  $a$  esiste un numero pari di occorrenze di simboli diversi da  $a$ .*

Osservazione: una parola con una sola occorrenza di  $a$  deve essere sempre accettata.

L'automa risultante quindi è lo stesso dell'esempio 2.2, solo che le run su questo automa sono finite.



## Esercizio 2.5

Sia  $W$  il linguaggio riconosciuto dall'automa  $\mathcal{A}'$  dell'Esercizio 2.4. Si caratterizzi il linguaggio  $\vec{W}$ .

Riprendo la definizione di  $\vec{W}$ :

$$\vec{W} = \{\alpha \in A^\omega \text{ t.c. } \exists^\omega n \alpha(0, n) \in W\}$$

Sono quindi tutte quelle  $\omega$ -parole di cui ogni prefisso finito appartiene a  $W$ . Analizziamo per casi:

- la parola non ha neppure una  $a$ : in questo caso ogni suo prefisso appartiene a  $W$  perchè le parole  $(b|c), (b|c)^2, (b|c)^3, \dots, (b|c)^n, \dots \in W$
- la parola ha una sola occorrenza di  $a$ : anche in questo caso ogni suo prefisso appartiene a  $W$  perchè:
  - come visto nel punto precedente, fino a che non si incontra la lettera  $a$  le parole appartengono a  $W$
  - dopo l'occorrenza di  $a$ , ancora tutti i prefissi appartengono a  $W$ , dato che tutte le parole finite con una sola occorrenza di  $a$  appartengono a  $W$

- infine tutti gli altri casi sono parole con un più di una occorrenza di  $a$ : dove abbiamo che ogni prefisso, o ricade in uno dei precedenti casi, oppure è una parola che tra ogni coppia di occorrenze consecutive di  $a$  esiste un numero pari di occorrenze di simboli diversi da  $a$  e che quindi appartiene a  $W$ .

In questo caso abbiamo che  $W^\omega = \overrightarrow{W}$ .

## Esercizio 2.7

### Teorema 2.6

1. Se  $V \subseteq A^*$  è regolare, allora  $V^\omega$  è  $\omega$ -regolare
2. Se  $V \subseteq A^*$  è regolare e  $L \subseteq A^\omega$  è  $\omega$ -irregolare, allora  $V \cdot L$  è  $\omega$ -irregolare
3. Se  $L_1, L_2 \subseteq A^*$  sono  $\omega$ -regolari, allora  $L_1 \cup L_2$  e  $L_1 \cap L_2$  sono  $\omega$ -regolari

*Dimostrare le proprietà (2) e (3) del teorema*

## Esercizio 2.13

*Fornire un esempio di parola non definitivamente periodica*

Un esempio è:

$$ababbab^3ab^4ab^5\dots$$

## Esercizio 2.16

*Dimostrare che una congruenza è una relazione di equivalenza invariante destra*

Invariante a destra significa che  $\forall x, y, z \in A$ , se  $x \sim y$  allora  $xz \sim yz$ . Questo è sempre vero perchè, concatenando la stessa parola ad  $x, y$  finiremo in un'unica classe di equivalenza.

## Esercizio 2.19

*Dato un automa di Buchi  $\mathcal{A} = (\mathcal{Q}, A, \Delta, q_0, F)$ , dimostrare che, per ogni  $s, s' \in \mathcal{Q}$ ,  $W_{ss'}^F$  è regolare*

Un linguaggio è regolare se esiste un'automa in grado di accettarlo. Per poterlo accettare deve avere almeno uno stato finale. Quindi se eliminiamo dall'automa  $\mathcal{A}$ , tutti gli stati e le relazioni non interessate dai possibili cammini tra  $s$  e  $s'$  otteniamo un automa in grado di leggere solo  $W_{ss'}^F$ , e questo fa di lui un linguaggio regolare.

### Esercizio 2.23

*Dimostrare che la relazione  $\approx_A$  è una congruenza di indice finito*

Perchè  $\approx_A$  sia una congruenza deve valere che  $\forall u, u', v, v' \in A^*$  se  $u \approx_A v$  e  $u' \approx_A v'$  allora  $uu' \approx_A vv'$ . Questo è vero perchè avendo  $u \approx_A v$  e  $u' \approx_A v'$ , allora  $\exists t$  tale che:

- $s \rightarrow_u t \Leftrightarrow s \rightarrow_v t$
- $s \xrightarrow{F}_u t \Leftrightarrow s \xrightarrow{F}_v t$
- $t \rightarrow_{u'} s' \Leftrightarrow t \rightarrow_{v'} s'$
- $t \xrightarrow{F}_{u'} s' \Leftrightarrow t \xrightarrow{F}_{v'} s'$

Quindi abbiamo che  $\forall s, s' \in Q$ :

- $s \rightarrow_{uu'} s' \Leftrightarrow s \rightarrow_{vv'} s'$
- $s \xrightarrow{F}_{uu'} s' \Leftrightarrow s \xrightarrow{F}_{vv'} s'$

e quindi  $uu' \approx_A vv'$ . Il resto della dimostrazione è già stata svolta negli appunti.

### Esercizio 2.25

*Si dimostri che la relazione  $\cong_\alpha$  è una relazione di equivalenza sui naturali di indice finito*

### Esercizio 2.44

*Dimostrare la chiusura della classe dei linguaggi riconosciuti dagli automi di Buchi deterministici rispetto alle operazioni di unione e intersezione*

Siano  $\mathcal{A} = (\mathcal{Q}_A, A, \Delta_A, q_{0A}, F_A)$  e  $\mathcal{B} = (\mathcal{Q}_B, A, \Delta_B, q_{0B}, F_B)$

**Unione:** Se assumiamo che  $\mathcal{Q}_A \cap \mathcal{Q}_B = \emptyset$  allora possiamo costruire l'automa unione  $\mathcal{C}$  come segue:

- $\mathcal{Q}_C = \mathcal{Q}_A \cup \mathcal{Q}_B \cup \{q_{0C}\}$
- $A$  rimane invariato
- $\Delta_C = \Delta_A \cup \Delta_B$
- $q_{0C}$  come nuovo stato iniziale, con le stesse relazioni di  $q_{0A}$  e  $q_{0B}$ , finale nel caso che almeno uno tra  $q_{0A}$  e  $q_{0B}$  sia uno stato finale
- $F_C = F_A \cup F_B$

**Intersezione:** Costruiamo l'automa intersezione  $\mathcal{C}$ , partendo dal prodotto cartesiano degli stati:

- $\mathcal{Q}_C = \mathcal{Q}_A \times \mathcal{Q}_B \times \{1, 2\}$
- $A$  rimane invariato
- $\Delta_C = \Delta_1 \cup \Delta_2$  dove
  - $\Delta_1 = \{((q_A, q_B, 1), a, (q'_A, q'_B, i)) \mid (q_A, a, q'_A) \in \Delta_A \text{ e } (q_B, a, q'_B) \in \Delta_B \text{ e se } q_A \in F_A \text{ allora } i = 2 \text{ altrimenti } i = 1\}$
  - $\Delta_2 = \{((q_A, q_B, 2), a, (q'_A, q'_B, i)) \mid (q_A, a, q'_A) \in \Delta_A \text{ e } (q_B, a, q'_B) \in \Delta_B \text{ e se } q_B \in F_B \text{ allora } i = 1 \text{ altrimenti } i = 2\}$
- $q_{0C} = (q_{0A}, q_{0B}, 1)$
- $F_C = \{(q_a, q_b, 2) \mid q_B \in F_B\}$


Per costruzione,  $r_C = (q_A^0, q_B^0, i^0), (q_A^1, q_B^1, i^1), \dots$  è un'esecuzione su  $\mathcal{C}$  per la parola  $w$  se:

- $r_A = q_A^0, q_A^1, \dots$  è un'esecuzione su  $\mathcal{A}$  per  $w$
- $r_B = q_B^0, q_B^1, \dots$  è un'esecuzione su  $\mathcal{B}$  per  $w$

$r_A$  e  $r_B$  sono accettate se  $r_C$  è la concatenazione di una serie infinita di segmenti finiti di stati 1 (stati con terza componente 1) e stati 2 (stati con terza componente 2) alternativamente. Questa sequenza esiste se  $r_C$  è accettato da  $\mathcal{A}$


### Esercizio 2.46

Sia  $A = \{a, b\}$  e  $L = \{\alpha \in A^\omega . \exists^{<\omega} n \alpha(n) = a\}$ . Si costruisca un automa di Buchi non deterministico che riconosca il linguaggio  $L$



### Esercizio 2.48

Sia  $A = \{a, b\}$  e  $L = \overrightarrow{\{b^*a^*\}}$ . Si costruisca un automa di Buchi non deterministico che riconosca il linguaggio  $L$



### Esercizio 2.50

Dimostrare che la classe degli  $\omega$ -linguaggi  $\omega$ -regolari coincide con la classe degli  $\omega$ -linguaggi riconosciuti dagli automi di Muller non deterministici

### Esercizio 2.57

Dimostrare che l'insieme  $W_v \subseteq A^*$  dei  $V$ -testimoni, con  $V$  classe di congruenza  $\approx_A$  è regolare

## 2 Exercices of chapter 0 of Temporal Verification of Reactive Systems

### 3 Additional exercises

#### Esercizio1

*Dato un linguaggio  $L \subseteq A^*$ , dimostrare se che  $L$  è un linguaggio star-free, allora  $L$  è definibile nel frammento al prim'ordine di  $S1S_A$ , con la relazione di ordinamento  $<$  e i predicati unari  $Q_a$ , con  $a \in A$ .*

#### Esercizio2

*Dimostrare che l'insieme dei linguaggi riconosciuti da automi di Büchi su alberi infiniti con insieme degli stati finali singoletto è strettamente contenuto nell'insieme dei linguaggi riconosciuti da automi di Büchi su alberi infiniti*

#### Esercizio3

*Sia  $A = \{a, b\}$  e  $T_1 = \{t \in T_A^\omega : \text{tutti i cammini di } t \text{ contengono un numero finito di occorrenze di } a\}$ .  $T_1$  contiene l'insieme di tutti gli alberi  $t_i$ , con  $i \geq 0$ , tali che  $t_i$  ha un'occorrenza di  $a$  nelle posizioni  $\epsilon, 1^{m_1}0, \dots, 1^{m_1}01^{m_2}0 \dots 1^{m_i}0$ , con  $m_1, m_2, \dots, m_i > 0$ . Immaginiamo che esista un automa di Büchi  $\mathcal{A} = (\mathcal{Q}, A, \Delta, q_0, F)$  con  $n + 1$  stati, con  $n \geq 1$ , incluso lo stato iniziale  $q_0$  che occorre solo in posizione  $\epsilon$  tale che  $L(\mathcal{A}) = T_1$  e sia  $r$  un run di successo di  $\mathcal{A}$  su  $t_n$ . Mostrare che deve esistere un cammino in  $t_n$  contenente 3 nodi  $u, v$  e  $w$ , con  $u < v < w$ , tali che  $r(u) = r(w) = s \in F$  e  $t_n(v) = a$ .*

#### Esercizio4

*Siano  $C = \{c_1, \dots, c_m\}$  e  $\bar{c} = (c_1, \dots, c_m)$ . Sia dato  $T \subseteq T_A^\omega$  tale che  $T = T_0 \cdot \bar{c}(T_1, \dots, T_m)^\omega$*

#### Esercizio5

*Dimostrare la (correttezza e completezza della) caratterizzazione di uno degli operatori di CTL (diverso da AF) quale minimo punto fisso di un'opportuna trasformazione di predicato.*

## Esercizio6

*Dimostrare la (correttezza e completezza della) caratterizzazione di uno degli operatori di CTL (diverso da EG) quale massimo punto fisso di un'opportuna trasformazione di predicato.*