

Chandra X 射线光度与晕质量标度关系

基于 CLASH 与 LoCuSS 弱透镜质量的最终项目报告

Advanced Observational Astrophysics Final Project

2026 年 5 月

摘要

本项目使用 Chandra X 射线数据和弱引力透镜质量标定，测量星系团的 L_X - M_{500} 、 T_X - M_{500} 和 L_X - T_X 标度关系。工作样本来自 CLASH 与 LoCuSS，先排除 7 个形态或投影明显不适合的天体，对 23 个星系团完成 CIAO 成像和光谱处理，并在光谱质量控制后采用 18 个星系团作为主标度关系样本。温度和光度来自逐 ObsID 的 Sherpa 联合光谱拟合；模型包括被吸收的 APEC 星系团等离子体、在 9.5–12 keV 归一化的 blank-sky 粒子背景，以及显式的 X-ray background 分量。标度关系使用 linmix 拟合，并固定自相似红移演化。Full- R_{500} 基线结果为 $\beta_{L_X-M} = 1.08^{+0.45}_{-0.48}$ 、 $\beta_{T_X-M} = 0.50^{+0.29}_{-0.27}$ ，内禀散布分别为 0.169 dex 和 0.117 dex。Core-excised 的 0.15–1.0 R_{500} 分支给出与 full- R_{500} 一致的质量标度关系斜率。主要结论是：本项目已经形成从 Chandra 数据产品到弱透镜质量标定标度关系的完整可复现流程，但最终精度仍受样本量、背景系统误差和少数高温/低质量光谱限制。

1 科学背景

星系团是晚期宇宙中最大质量的近似维里化系统。其深引力势阱束缚着温度约为 10^7 – 10^8 K 的星系团内介质 (ICM)。在这个温度范围内，ICM 通过热轫致辐射和金属线辐射产生强 X 射线发射，因此 X 射线光度 L_X 与温度 T_X 是追踪星系团质量的自然观测量。本项目的目标是标定 L_X 、 T_X 与晕质量 M_{500} 的关系；其中 M_{500} 是 R_{500} 内包围的质量， R_{500} 定义为平均密度等于该红移临界密度 500 倍的半径。

在最简单的自相似模型中，星系团只由质量和红移相关的密度尺度决定 (Kaiser, 1986; Arnaud et al., 2005)。维里定理给出

$$T_X \propto M_{500}^{2/3} E(z)^{2/3}, \quad (1)$$

而 bolometric 轫致辐射光度近似满足

$$L_X \propto M_{500}^{4/3} E(z)^2. \quad (2)$$

等价地，bolometric 的 L_X - T_X 自相似斜率为 2。真实星系团会偏离这些简单预言，因为辐射冷却、AGN 反馈、并合激波、核心熵结构、气体分数变化、投影效应和非球对称性都会改变 ICM 的热力学状态 (Pratt et al., 2009; Mantz et al., 2010; Maughan et al., 2012)。因此，本项目不仅拟合标度关系，也显式记录质量控制、异常样本和 core-excised 对比。

本项目使用弱引力透镜质量作为独立质量标尺。CLASH 的 M_{500} 来自 [Umetsu et al. \(2016\)](#) , LoCuSS 的 M_{500} 来自 [Okabe et al. \(2016\)](#)。这样可以避免用 X 射线静水平衡质量去校准 X 射线观测量时产生的共同系统误差。

2 样本与数据产品

初始工作样本合并 CLASH 与 LoCuSS 中具有 Chandra 覆盖和弱透镜质量测量的星系团。正式处理前, 先根据形态和投影问题排除 7 个天体: Abell 0115、Abell 0141、Abell 0521、Abell 2813、MACSJ0416.1-2403、MACSJ0717.5+3745 和 MACSJ1149.5+2223。其余 23 个星系团完成成像和光谱 pipeline。光谱质量控制后, 5 个天体不进入主标度关系拟合: Abell 0697、Abell 0750、MS2137-2353、RXJ1347.5-1145 和 ZwCl 0857.9+2107。这些天体并非未探测到, 而是由于全 ObsID 拟合失败、温度极端或不稳定、reduced statistic 很差, 或与外部参考孔径/数值不一致, 因此作为质量控制排除。

主样本包含 18 个星系团, 其中 11 个标记为 good, 4 个 acceptable, 3 个 high/suspect 但保留。Abell 0611、MACSJ0647.7+7015 和 MACSJ1206.2-0847 等高温系统没有被直接删除, 而是在 baseline 中保留, 并通过 good-only 样本和 leave-one-out 重新拟合检验其影响。

Full- R_{500} 的 canonical 输入表为 output/products/spectral/spectral_summary.csv。最终报告表 output/products/final_spectral_table.csv 合并了 18 个保留星系团的红移、弱透镜质量、 R_{500} 、full- R_{500} 光谱量、core-excised 光谱量和质量标签。

3 Chandra 数据处理与光谱测量

代码库实现了分阶段的 Chandra 工作流。每个 ObsID 先用 CIAO chandra_repro 重新处理; 随后使用 merge_obs 构造合并图像, 用于可视化、X-ray peak 查找和点源探测。点源由 wavdetect 识别并 mask。合并图像只用于质量检查和区域定义; 光谱拟合来自逐 ObsID 提取的光谱, 从而保留每个观测正确的 ARF 和 RMF 响应。

光谱通过 CIAO specextract 提取, 并在 Sherpa 中联合拟合 ([Fruscione et al., 2006](#))。源模型为被吸收的 APEC 热等离子体模型; Galactic N_H 和红移固定为配置表数值, 主运行中金属丰度固定为 $0.3 Z_{\odot}$ 。拟合能段为 0.7–7.0 keV, 统计量采用 WSTAT, 适合带有测量背景的 Poisson 光谱。

背景处理是本项目的关键技术环节。粒子背景使用 CIAO blank-sky spectra, 并根据 9.5–12 keV 计数率重新归一化; 在这个高能段, 星系团热辐射很弱, 粒子背景占主导。天空背景由 local hot bubble、Galactic halo 和 cosmic X-ray background 的源区分量表示。默认采用 fixed-shape XRB 模型, 只在 full- R_{500} 行为需要时测试 flexible XRB。该策略与 Chandra 星系团背景处理文献的思路一致 ([Vikhlinin et al., 2009](#); [Donahue et al., 2014](#)), 同时保持项目脚本的可复现性。

本项目测量两个孔径。基线分支使用 full R_{500} 源区; 对比分支使用 $0.15-1.0R_{500}$, 即去除中心 cool-core 区域的文献式孔径。两个分支的光谱和标度关系结果保存在独立目录, 避免不同孔径的光度被混用。Core-excised 光度误差来自 Sherpa sample_energy_flux; 但当前 JSON




图 1: Abell 0209 的 full- R_{500} 光谱 QA 图。新版图像区分 raw source/background 和 net source/model , 避免早期 WSTAT 诊断图中 raw source counts 与 folded model 直接比较造成的视觉 offset。

中尚未保存 core-excised T_X 的 confidence interval , 因此涉及 core-excised T_X 的标度关系使用明确记录的 10% 温度误差 fallback。

4 标度关系拟合方法

标度关系使用 Kelly (2007) 的 Bayesian linear regression 方法 linmix。拟合采用以 10 为底的对数, 考虑双轴测量误差, 并报告固定自变量下因变量方向的内禀散布 (dex)。模型形式为

$$\log_{10} \left[\frac{Y}{E(z)^\gamma} \right] = \alpha + \beta \log_{10} \left(\frac{X}{X_{\text{piv}}} \right). \quad (3)$$

表 1: exclude_bad 主样本标度关系结果。

孔径	关系	N	β	内禀散布 (dex)	注释
Full R_{500}	L_X-M_{500}	18	$1.08^{+0.45}_{-0.48}$	0.169	基线
Full R_{500}	T_X-M_{500}	18	$0.50^{+0.29}_{-0.27}$	0.117	基线
Full R_{500}	L_X-T_X	18	$0.77^{+0.47}_{-0.44}$	0.227	最不稳定
0.15–1.0 R_{500}	L_X-M_{500}	18	$1.15^{+0.54}_{-0.51}$	0.186	Core-excised
0.15–1.0 R_{500}	T_X-M_{500}	18	$0.55^{+0.36}_{-0.34}$	0.157	Core T_X 使用 10% fallback
0.15–1.0 R_{500}	L_X-T_X	18	$0.69^{+0.40}_{-0.41}$	0.245	Core T_X 使用 10% fallback

具体关系为

$$E(z)^{-2} L_{X,\text{bol}} = A \left(\frac{M_{500}}{3 \times 10^{14} M_\odot} \right)^\beta, \quad (4)$$

$$E(z)^{-2/3} T_X = A \left(\frac{M_{500}}{3 \times 10^{14} M_\odot} \right)^\beta, \quad (5)$$

$$E(z)^{-1} L_{X,\text{bol}} = A \left(\frac{T_X}{5 \text{ keV}} \right)^\beta. \quad (6)$$

红移演化指数固定为自相似对比值。质量误差来自 canonical products 中记录的弱透镜文献误差。 R_{500} 误差由 M_{500} 误差传播得到，只作为孔径来源记录，不作为独立的 linmix 误差项。

5 结果

5.1 Full- R_{500} 基线结果

Full- R_{500} 主样本包含 18 个星系团。图 2 展示三个基线关系。 L_X-M_{500} 的斜率为 $\beta = 1.08^{+0.45}_{-0.48}$ ，内禀散布为 0.169 dex；在当前误差下与自相似斜率 4/3 一致。 T_X-M_{500} 的斜率为 $\beta = 0.50^{+0.29}_{-0.27}$ ，内禀散布为 0.117 dex，略低于但仍与自相似值 2/3 相容。 L_X-T_X 的斜率为 $\beta = 0.77^{+0.47}_{-0.44}$ ，内禀散布为 0.227 dex，是三个关系中最不稳定、噪声最大的一个，也明显浅于常见 Chandra 文献结果 (Maughan et al., 2012)。

5.2 Core-excised 对比

Core-excised 分支对同一 18 个星系团使用 0.15–1.0 R_{500} 孔径。图 3 展示对应结果。 L_X-M_{500} 斜率为 $\beta = 1.15^{+0.54}_{-0.51}$ ，散布 0.186 dex； T_X-M_{500} 斜率为 $\beta = 0.55^{+0.36}_{-0.34}$ ，散布 0.157 dex； L_X-T_X 斜率为 $\beta = 0.69^{+0.40}_{-0.41}$ ，散布 0.245 dex。Core-excised 与 full- R_{500} 的质量标度关系斜率在统计误差内一致。对这个小而异质的样本，core excision 并没有降低测得的散布；合理原因包括样本量小、Chandra 曝光不均匀、仍保留若干高温系统，以及 core-excised T_X 当前使用 10% 误差 fallback。




图 2: 18 个星系团 exclude_bad 样本的 full- R_{500} 基线标度关系。




图 3: 同一 18 个星系团样本的 core-excised $0.15-1.0R_{500}$ 标度关系。

5.3 质量控制与敏感性检验

被排除的 5 个系统是质量控制失败对象，而不是未探测对象。Abell 0697 和 MS2137-2353 给出极端温度和很差的拟合行为；Abell 0750 早期数据拟合质量差；RXJ1347.5-1145 在纳入全部 ObsID 后结果变差；ZwCl 0857.9+2107 与 ACCEPT 参考值/孔径比较不一致。若将这些对象放入主回归，结果会主要反映失败光谱，而不是星系团标度关系。

保留的 high/suspect 系统通过 leave-one-out 重新拟合检验。逐个移除 Abell 0068、Abell 0611、MACSJ0647.7+7015 或 MACSJ1206.2-0847 后， L_X-M_{500} 和 T_X-M_{500} 的斜率变化都小于当前统计误差。 L_X-T_X 对 Abell 0611 和 MACSJ1206.2-0847 更敏感，因此更适合作一致性检查，而不是主科学结论。

6 讨论

Full- R_{500} 与 core-excised 的质量标度关系斜率在当前误差内一致。这说明主质量标定并非完全由 cool-core 发射驱动。另一方面，core excision 没有降低散布，这与一些更大、更均匀的文献样本不同 (Pratt et al., 2009; Mantz et al., 2010, 2016)。这一点不应过度解释：本项目主样本只有 18 个星系团，CLASH 与 LoCuSS 选择函数不同，Chandra 观测深度不均匀，还包含若干高温保留系统，并且 core-excised T_X 误差仍有 fallback。

与文献比较， T_X-M_{500} 斜率大体符合自相似图像，也支持温度作为较低散布质量 proxy 的经验认识。 L_X-M_{500} 斜率低于一些陡的光度-质量测量，但在大误差下仍与自相似值相容。 L_X-T_X 斜率偏浅且不稳定，可能来自温度离群点、小动态范围和测量协方差。若要发展到发表级分析，需要进一步强化背景 QA、补齐 confidence interval，并在扩展样本后考虑带选择函数的层级模型。

7 结论

1. 本项目完成了从 Chandra 数据到标度关系的完整流程：CIAO 重新处理、点源 masking、逐 ObsID 光谱、Sherpa WSTAT 拟合、canonical 光谱表和 linmix 回归。
2. 最终主样本包含 18 个具有弱透镜质量的 CLASH+LoCuSS 星系团；5 个 bad/failed 光谱对象从主拟合中排除。
3. Full- R_{500} 基线结果为 $\beta_{L_X-M} = 1.08^{+0.45}_{-0.48}$ 、 $\beta_{T_X-M} = 0.50^{+0.29}_{-0.27}$ ，内禀散布分别为 0.169 dex 和 0.117 dex。
4. Core-excised 分支给出一致的质量标度关系斜率，因此当前结论对 core excision 稳健。
5. L_X-T_X 关系最浅、噪声最大，应作为敏感性受限的一致性检查，而不是主结果。

A 保留样本光谱表

表 2: 18 个保留星系团样本。光度为 bolometric , 单位 $10^{44} \text{ erg s}^{-1}$ 。

星系团	z	M_{500} ($10^{14} M_{\odot}$)	T_{full} (keV)	L_{full}	T_{core} (keV)	L_{core}
Abell 0209	0.206	12.34	8.05	19.22	8.74	11.26
Abell 0068	0.255	6.83	11.90	18.34	11.19	13.99
Abell 0267	0.230	5.60	8.90	13.45	8.77	7.24
Abell 0383	0.187	5.20	4.72	9.09	5.95	3.25
Abell 0586	0.171	7.20	8.10	11.41	7.62	5.19
Abell 0611	0.288	9.10	12.87	17.18	29.23	9.47
Abell 2261	0.224	15.65	8.35	23.73	11.30	10.56
MACSJ0329.7-0211	0.450	6.51	7.19	27.58	11.58	11.94
MACSJ0429.6-0253	0.399	6.85	6.43	21.14	7.75	7.14
MACSJ0647.7+7015	0.584	9.49	16.74	41.54	16.90	23.33
MACSJ0744.9+3927	0.686	11.94	10.15	42.52	10.72	20.95
MACSJ1115.9+0129	0.352	10.67	8.92	33.31	12.17	13.68
MACSJ1206.2-0847	0.440	12.24	12.35	52.51	12.96	28.60
MACSJ1720.3+3536	0.391	9.96	7.32	23.38	12.89	10.76
MACSJ1931.8-2635	0.352	10.51	7.39	39.81	6.20	10.54
RXJ1532.9+3021	0.363	4.17	5.86	41.16	6.71	14.04
RXJ2129.7+0005	0.234	4.48	6.84	18.76	7.48	8.67
RXJ2248.7-4431	0.348	12.45	12.15	78.38	12.61	40.77

参考文献

- M. Arnaud, E. Pointecouteau, and G. W. Pratt. The structural and scaling properties of nearby galaxy clusters. *Astronomy and Astrophysics*, 441:893–903, 2005.
- M. Donahue et al. Clash-x: A comparison of lensing and x-ray techniques for measuring galaxy cluster mass profiles. *The Astrophysical Journal*, 794:136, 2014.
- Antonella Fruscione et al. Ciao: Chandra’s data analysis system. *Proceedings of SPIE*, 6270: 62701V, 2006.
- Nick Kaiser. Evolution and clustering of rich clusters. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 222:323–345, 1986.
- Brandon C. Kelly. Some aspects of measurement error in linear regression of astronomical data. *The Astrophysical Journal*, 665:1489–1506, 2007.
- A. Mantz, S. W. Allen, D. Rapetti, and H. Ebeling. The observed growth of massive galaxy clusters. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 406:1759–1772, 2010.

- A. B. Mantz et al. Weighing the giants v: Galaxy cluster scaling relations. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 463:3582–3603, 2016.
- B. J. Maughan, P. A. Giles, S. W. Randall, C. Jones, and W. R. Forman. Self-similar evolution of the cluster x-ray scaling relations. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 421: 1583–1602, 2012.
- Nobuhiro Okabe et al. Locuss: Weak-lensing mass calibration of galaxy clusters. *Publications of the Astronomical Society of Japan*, 68:S13, 2016.
- G. W. Pratt, J. H. Croston, M. Arnaud, and S. Borgani. Galaxy cluster x-ray luminosity scaling relations from a representative local sample. *Astronomy and Astrophysics*, 498:361–378, 2009.
- Keiichi Umetsu et al. Clash: Joint analysis of strong-lensing, weak-lensing shear and magnification data for 20 galaxy clusters. *The Astrophysical Journal*, 821:116, 2016.
- A. Vikhlinin et al. Chandra cluster cosmology project iii: Cosmological parameter constraints. *The Astrophysical Journal*, 692:1060–1074, 2009.