

Санкт-Петербургский государственный университет

Математико-механический факультет

Бадмаев Чингис Юрьевич

Решение задачи теплопроводности
сеточными методами (явная и неявная
схемы)

Практическая работа

Санкт-Петербург
2021

Оглавление

| | |
|----------------------|---|
| 1. Постановка задачи | 3 |
| 2. Теорминимум | 4 |
| 3. Тесты | 6 |
| 4. Ссылка на код | 7 |

1. Постановка задачи

В данном задании речь идет о решении задачи теплопроводности сеточными методами.

2. Теорминимум

Задача вида

$$u_t(x, t) = \kappa u_{xx} + f(x, t),$$
$$\kappa = \text{const} > 0, \quad 0 < x < a, \quad 0 < t \leq T.$$

Заданы одно начальное и два граничных условия

$$u(x, 0) = \mu(x), \quad 0 \leq x \leq a,$$
$$u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(a, t) = \mu_2(t), \quad 0 \leq t \leq T.$$

Необходимо найти решение $u(x, t)$ нашего уравнения, удовлетворяющее этим условиям.

Разбиваем отрезок $[0, a]$ на N равных частей, а отрезок $[0, T]$ на M равных частей. Обозначим

$$h = \frac{a}{N}, \quad x_i = ih, \quad i = 0, \dots, N,$$
$$\tau = \frac{T}{M}, \quad t_k = k\tau, \quad k = 0, \dots, M.$$

Строим сетку $\{(x_i, t_k), i = 0, \dots, N, k = 0, \dots, M\}$.

Приближенное решение получаем в виде таблицы значений в узлах сетки. Обозначим u_i^k — значение в узле (x_i, t_k) .

Заменяем производные в изначальном уравнении разностными производными.

Схема с весами имеет вид

$$\frac{u_i^k - u_i^{k-1}}{\tau} = \frac{\kappa}{h^2} (\sigma(u_{i+1}^k - 2u_i^k + u_{i-1}^k) +$$
$$+ (1 - \sigma)(u_{i+1}^{k-1} - 2u_i^{k-1} + u_{i-1}^{k-1})) + f(x_i, t_{k-1} + \sigma\tau).$$

При $\sigma = 0$ получаем явную разностную схему.

В этом случае находим u_i^k из формулы, а u_i^0, u_0^k, u_N^k соответственно равны

$$u_i^0 = \mu(x_i),$$

$$u_0^k = \mu_1(t_k),$$

$$u_N^k = \mu_2(t_k).$$

При $\sigma = 1$ получаем неявную разностную схему.

$$\begin{cases} u_0^k = \mu_1(t_k) \\ \frac{\kappa}{h^2} u_{i-1}^k + \left(-\frac{2\kappa}{h^2} - \frac{1}{\tau}\right) u_i^k + \frac{\kappa}{h^2} u_{i+1}^k = -\frac{1}{\tau} u_i^{k-1} - f(x_i, t_k) \\ u_N^k = \mu_2(t_k) \end{cases}$$

Перепишем полученную СЛАУ в более удобном виде

$$\begin{cases} B_0 u_0^k = D_0^k \\ A_i u_{i-1}^k + B_i u_i^k + C_i u_{i+1}^k = D_i^k \\ B_n u_n^k = D_n^k \end{cases}$$

Решаем полученную систему методом прогонки и находим u_i^k .


3. Тесты

•


$$u_t(x, t) = 0.001u_{xx} + 3t^2x + 0.02x^3,$$

$$u(x, 0) = -x^5 - 2x + 25, \quad u(0, t) = 25, \quad u(a, t) = 10t^3 - 99995,$$


$$a = 10, T = 10, N = 100, M = 100.$$



Приближенное решение
полученное неявной схемой



Приближенное решение
полученное явной схемой



Приближенное решение полученное явной схемой, при котором не выполняется условие устойчивости

4. Ссылка на код

[Ссылка](#)